

شیوع عوامل خطرساز قلبی - عروقی در مردان (مطالعهٔ قند و لیپید تهران)

دکتر محمد جعفر قانیلی، پروین میرمیران، دکتر سید مهرداد صولتی، دکتر محمد مجید، دکتر فریدون عزیزی

چکیده

مقدمه: مطالعات متعددی که اخیراً روی عوامل خطرساز غیرمعمول قلبی - عروقی (**Non traditional risk factors**) انجام شده است، یک اختلال متابولیک سه گانه (**Metabolic triad**) را که شامل افزایش آپولیپوپروتئین B، هیپرانسولینمی و LDL کوچک و متراکم است به عنوان یک عامل خطرساز معرفی کرده‌اند. معیار ساده بالا بودن دور کمر و **LDL** کوچک و متراکم است به عنوان یک عامل خطرساز تحت عنوان **Hypertriglyceremic waist** (circumference Waist) و تری‌گلیسرید ناشتا تحت عنوان **Hypertriglyceremic waist** می‌تواند تریاد متابولیک فوق را پیش‌بینی کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تعداد مبتلایان به **Hypertriglyceremic waist** و شیوع عوامل خطرساز در این جمعیت است. **مواد و روش‌ها:** تحقیق در جمعیت تحت پوشش مطالعه قند و لیپید تهران انجام گرفته است. مردان بین سنین ۱۸-۷۰ ساله در جمعیت مذکور انتخاب شدند. سپس افراد انتخاب شده بر اساس میزان تری‌گلیسرید ناشتا سرمه و دور کمر به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول دارای تری‌گلیسرید بیشتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر از ۹۵ سانتی‌متر بودند (**TgHWH**)، گروه دوم دارای تری‌گلیسرید بیشتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر کمتر از ۹۵ سانتی‌متر بودند (**TgHWL**)، گروه سوم و چهارم دارای تری‌گلیسرید کمتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر از ۹۵ سانتی‌متر (**TgLWH**) و کمتر از ۹۵ سانتی‌متر (**TgLWL**) بودند. عوامل خطرساز قلبی - عروقی شامل متغیرهای تن‌ستجی و همچنین متغیرهای آزمایشگاهی بین گروه‌های فوق مورد بررسی آماری قرار گرفتند. **یافته‌ها:** در مجموع ۴۱۶۹ نفر معیارهای لازم برای ورود به مطالعه را داشتند. ۷۸۴ نفر از تعداد فوق دارای تری‌گلیسرید سرمه ناشتا بالا و دور کمر بالا بودند. شیوع عوامل خطرساز قلبی - عروقی در این گروه به طور معنی‌داری از گروه‌های دیگر بالاتر بود. در این گروه نمایهٔ توده بدنی (**BMI**)، **LDL-C**، **TgHWH**، **TgHWL**، **TgLWH**، **TgLWL**، کلسترول تام و تری‌گلیسرید به طور معنی‌داری بالاتر و **HDL-C** پایین‌تر از سایر گروه‌ها بود. **نتیجه‌گیری:** معیار ساده **Hypertriglyceremic waist** می‌تواند به عنوان یک متغیر پیش‌بینی کننده عوامل خطرساز قلبی - عروقی به کار رود.

واژگان کلیدی: کلسترول، تری‌گلیسرید، **LDL-C**, **HDL-C**, **hypertriglyceremic waist**, عوامل خطرساز قلبی - عروقی

پروفیل لیپیدی معمول می‌تواند پیش‌گویی کنندهٔ بروز آترواسکلروز باشد. در این مورد سه عاملی که به عنوان تریاد متابولیک از آنها نامبرده می‌شود شامل افزایش آپولیپوپروتئین B، هیپرانسولینمی و LDL کوچک و متراکم مورد توجه قرار گرفته‌اند. مطالعات مختلف هیپر-آپولیپوپروتئینی B را به عنوان یک عامل پیش‌بینی‌کنندهٔ مهم برای بیماری‌های عروق کرونر قلب مطرح کرده‌اند.^{۱-۳} هیپرانسولینمی در یک فرد غیردیابتی نیز نشان‌دهنده مقاومت

مقدمه

شواهد روزافزون نشان می‌دهد متغیرهای دیگری غیر از

مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم،
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی
نشانی مکاتبه: تهران، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۴۷۶۳، مرکز
تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، دکتر فریدون عزیزی

E-mail: azizi@erc-iran.com

گروه دوم گروهی بودند که دارای تری‌گلیسرید بالای ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر کمتر از ۹۵ سانتی‌متر بودند. به این گروه عنوان TgHwL اطلاق شد. گروه سوم دارای تری‌گلیسرید کمتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر از ۹۵ سانتی‌متر (TgLwH) بودند و در نهایت گروه چهارم تری‌گلیسرید کمتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر کمتر از ۹۵ سانتی‌متر داشتند (TgLwL).

روش‌ها

در افراد تحت مطالعه قند و لیپید تهران تمامی اطلاعات بالینی از جمله سوابق طبی، مصرف سیگار و اندازه‌گیری‌های تن‌سنگی گردآوری شده است.^{۱۴} اندازه‌گیری لیپیدهای سرم در یک نمونه خون پس از ۱۲ ساعت ناشتاوی شامل تری‌گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و قندخون ناشتا و ۲ ساعت پس از مصرف ۷۵ گرم گلوكز خوراکی انجام شد.

روش‌های آزمایشگاهی

اندازه‌گیری قندخون به روش آنژیماتیک انجام شد. کلسترول و تری‌گلیسرید به روش آنژیمی با استفاده از کیت پارس آزمون اندازه گیری شدند. LDL-C با روش فریدوالد در نمونه‌های با تری‌گلیسرید کمتر از ۴۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر محاسبه شد. در نمونه‌های با تری‌گلیسرید بالاتر از ۴۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر LDL-C محاسبه نگردید. تمامی آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم داشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. ضریب تغییرات (C.V.) برای قندخون ناشتا٪۳ کلسترول تام٪۲/۷، تری‌گلیسرید٪۲/۹ و HDL-C٪۲/۶ براورد گردید.

روش‌های آماری

اطلاعات در نرم‌افزار SPSS وارد و آزمون‌های آماری نیز توسط نرم‌افزار فوق انجام شد. برای مقایسه سن بین گروه‌های مورد بررسی از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید و برای مقایسه سایر متغیرهای مورد بررسی بین گروه‌ها از آنالیز واریانس یک متغیره و با حذف اثر سن استفاده شد. سطح معنی‌دار آماری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

به انسولین است و به خصوص در مردان می‌تواند ریسک آترواسکلروز را بالا ببرد.^{۱۵} از طرفی LDL کوچک و متراکم قدرت آتروژنیستی بالاتر از LDL بزرگ و با تراکم کم دارد.^{۱۶} در بسیاری از موارد می‌توان با اندازه‌گیری تریادمتاپولیک پیش‌گویی مؤثرتری در بیماری‌های قلبی - عروقی انجام داد. در حال حاضر با توجه به شواهد موجود و روش‌های آزمایشگاهی مشکل و پرهزینه، اندازه‌گیری متغیرهای فوق در تمام افراد جامعه ممکن نیست.


هیپرتری‌گلیسریدی به عنوان یک عامل خطرساز قلبی - عروقی شناخته شده است.^{۱۷} چاقی که با افزایش نمایه توده بدنی (BMI) و همچنین نسبت دور کمر به باسن (WHR) نشان داده می‌شود، نیز با اختلالات متابولیک مختلفی همراه است که در نهایت ریسک آترواسکلروز را بالا می‌برد.^{۱۰-۱۱} در افرادی که دچار چاقی شکنکی هستند، تجمع لیپوپروتئین‌های غنی از تری‌گلیسرید وجود دارد.^{۱۲}

لومبیو و همکاران نشان دادند که بالا بودن تری‌گلیسرید ناشتاوی سرم به همراه افزایش اندازه دور کمر (Hypertriglyceremic waist) می‌تواند پیش‌بینی‌کننده تریاد متابولیک باشد.^{۱۳} بنابراین با اندازه‌گیری این معیار ساده می‌توان وجود هیپرآپولیپروتئینی B، هیپرانسولینی و LDL کوچک و متراکم را در افراد شناسایی کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع Hypertriglyceremic waist در مردان در جمعیت تحت پوشش مطالعه قند و لیپید تهران^{۱۴} و بررسی شیوع سایر عوامل خطرساز قلبی - عروقی در گروه فوق است.

مواد و روش‌ها

جمعیت مورد مطالعه

مطالعه قند و لیپید تهران مطالعه‌ای است که در منطقه ۱۳ شهری تهران در حال انجام است و عوامل خطرساز قلبی - عروقی افراد را مورد مطالعه قرار داده است.^{۱۴} ۱۵۰۰۵ نفر تحت پوشش این مطالعه قرار دارند. از بین جمعیت مذکور، مردان سینین ۱۸-۷۰ سال انتخاب و وارد این مطالعه شدند. سپس این افراد بر اساس میزان تری‌گلیسرید ناشتاوی سرم و دور کمر به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول افرادی بودند که دارای تری‌گلیسرید بالای ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیش از ۹۵ سانتی‌متر بودند. این گروه به عنوان Hypertriglyceremic waist (TgHwH) شناخته شدند.



نمودار ۱- درصد افراد دارای عوامل خطرساز قلبی - عروقی در گروههای مورد مطالعه مردان سنین ۱۸۷۰ سال - جمعیت قند ولیپید تهران
 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بیشتر یا مساوی ۹۵ سانتی‌متر)

(تری‌گلیسرید کمتر ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر یا مساوی ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید بیشتر یا مساوی ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر کمتر از ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید بیشتر یا مساوی ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر یا مساوی ۹۵ سانتی‌متر)

نمودار ۲- درصد افراد دارای عوامل خطرساز قلبی - عروقی در گروههای مورد مطالعه مردان سنین ۱۸۷۰ سال - جمعیت قند ولیپید تهران

میلی‌گرم در دسی‌لیتر $p < 0.001$ (۳/۲ و ۲/۸۳/۶)، برای کلسترول بیشتر از ۲۲۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر $p < 0.001$ (۷/۴ و ۷/۴-۹/۶)، برای HDL کمتر از ۴۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر $p < 0.001$ (۱/۵ و ۱/۳-۱/۷)، برای فشارخون سیستولی بالاتر یا مساوی ۱۴۰ میلی‌متر جیوه $p < 0.001$ (۵/۳ و ۴/۳-۶/۶)، برای فشارخون دیاستولی بالاتر یا مساوی ۹۰ میلی‌متر جیوه $p < 0.001$ (۴/۱ و ۳/۲-۵/۰) و برای نمایة توده بدنی بیشتر یا مساوی ۲۶ کیلوگرم بر متر مربع $p < 0.001$ (۳/۳ و ۲۸/۳-۳۹/۲) بود. ضریب تغییرات CV برای کلسترول تام $p < 0.001$ (٪ ۲/۳)، تری‌گلیسرید ٪ ۷/۷، HDL-C ٪ ۳/۵ بود.

یافته‌ها

در این مطالعه مجموعاً ۴۱۶۹ مرد مورد بررسی قرار گرفتند. ۷۸۴ نفر در گروه TgHwH، ۱۱۲۹ نفر در گروه TgLwH، ۴۱۴ نفر در گروه TgHwL و ۱۸۴۲ نفر در گروه TgLwL وجود داشت. میانگین سنی در گروه‌ها به صورت TgLwL < TgHwL < TgHwH < TgLwH معنی دار بود (جدول ۱). فشارخون سیستولی و دیاستولی در گروه‌های TgHwH و TgLwH به طور معنی‌داری بالاتر از دو گروه دیگر بود. BMI نیز در گروه‌های TgHwH و TgLwH به طور معنی‌دار بالاتر از دو گروه دیگر بود (جدول ۱).

در بررسی سایر متغیرها دیده شد که سطح سرمی کلسترول تام، تری‌گلیسرید، LDL-C و قندخون ناشتا به طور معنی‌دار در گروه TgHwH (تری‌گلیسرید بالا و یا مساوی ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، دور کمر بیش از ۹۵ سانتی‌متر) بالاتر از بقیه گروه‌ها بود (جدول ۲). سطح سرمی HDL-C در گروه TgHwH پایین‌تر از بقیه گروه‌ها بود. برای بررسی ریسک تجمعی در هر گروه درصد افراد دارای LDL-C بالای ۱۲۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، کلسترول تام بالاتر از ۲۲۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و HDL-C کمتر از ۴۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و نمایه توده بدنی بالاتر و یا مساوی ۲۶، فشار سیستولی بالاتر یا مساوی ۱۴۰ میلی‌متر جیوه و فشار دیاستولی بالاتر یا مساوی ۹۰ میلی‌متر جیوه محاسبه شد. در همه موارد فوق درصد افراد در گروه‌ای TgHwH شیوع بالاتری داشت (جدول ۳). ریسک تجمعی نیز در گروه TgHwH از گروه‌های دیگر بالاتر بود (نمودار ۱). در گروه ۹۰ TgLwH درصد افراد کمتر یا مساوی ۲ عامل خطرساز داشتند در حالی که در افراد گروه TgHwH حدوداً ۷۵٪ افراد ۴ یا بیشتر عامل خطرساز داشتند. جهت بررسی میزان خطر ابتلا به عوامل خطرساز فوق در دو گروه TgHwH و TgLwL از خطر نسبی (Odds ratio) استفاده شد. نتایج نشان داد خطر ایجاد تمامی عوامل خطرساز در گروه TgHwH بالاتر از TgLwL بود. خطر نسبی در گروه ۱۳۰ نسبت به TgLwL برای LDL بالاتر از TgHwH

جدول ۱- سن، فشارخون و نمایه توده بدنی در گروههای مورد بررسی مردان سالین ۱۸۷۰ سالگی، جمعیت قند و لیپید تهران

گروهها	تعداد (درصد)	سن (سال) [*]	فشارخون سیستولی [*] (میلی متر جیوه)	فشارخون دیاستولی [*] (میلی متر جیوه)	نمایه توده بدنی [*] (مترمربع/کیلوگرم)
TgLwL	(۴۴) ۱۸۴۲	۳۷±۱۵	۱۱۵±۱۵	۷۴±۱۰	۲۲±۳
TgLwH	(۱۰) ۴۱۴	۴۸±۱۴	۱۲۸±۲۲	۸۱±۱۱	۲۰±۳
TgHwL	(۲۷) ۱۱۲۹	۴۱±۱۳	۱۱۹±۱۶	۷۷±۱۰	۲۵±۳
TgHwH	(۱۹) ۷۸۴	۴۶±۱۳	۱۲۷±۱۹	۸۲±۱۰	۳۰±۳

^{*}p<0.001

(تری‌گلیسرید > ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر > ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید > ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر ≤ ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید ≤ ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر > ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید ≤ ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر ≤ ۹۵ سانتی‌متر)

جدول ۲- متغیرهای آزمایشگاهی مورد مطالعه مردان سالین ۱۸۷۰ سال، جمعیت قند و لیپید تهران

گروهها	تعداد (درصد)	قدخدون ناشتا [*] (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	کلسترول تام [*] (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	تری‌گلیسرید [†] (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	HDL-C [‡] (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	LDL-C [‡] (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	2hpgBS (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
TgLwL	(۴۴) ۱۸۴۲	۹۱±۲۱	۱۸۳±۲۸	۱۰۳±۳۱	۴۱±۹	۱۲۱±۳۵	۱۵۷±۷۲
TgLwH	(۱۰) ۴۱۴	۹۷±۲۴	۱۹۹±۲۶	۱۴۸±۲۷	۴۰±۸	۱۲۶±۳۳	۱۸۰±۶۸
TgHwL	(۲۷) ۱۱۲۹	۹۸±۳۰	۲۱۶±۴۳	۲۶۱±۱۳۴	۲۵±۸	۱۲۱±۳۷	۱۵۹±۵۹
TgHwH	(۱۹) ۷۸۴	۱۰۸±۳۹	۲۲۶±۴۳	۲۸۲±۱۵۳	۲۵±۸	۱۴۰±۳۶	۱۷۱±۶۴

^{*}p<0.001 ; [†]p<0.03 ; [‡]p<0.001

آزمون تحمل گلوكز: اندازه‌گیری گلوكز سرم ۲ ساعت بعد از دادن ۷۵ گرم گلوكز خوراکی
 (تری‌گلیسرید کمتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر کمتر از ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید کمتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر یا مساوی ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید بیشتر یا مساوی ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر کمتر از ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید بیشتر یا مساوی ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر یا مساوی ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید بیشتر یا مساوی ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر یا مساوی ۹۵ سانتی‌متر)

جدول ۳- بررسی عوامل خطرساز و ریسک تجمعی در گروههای مورد مطالعه مردان سالین ۱۸۷۰ سال، جمعیت قند و لیپید تهران

بدنی [*] (%)	≥۹۰ فشارخون [*] دیاستولی (%)	≥۹۰ فشارخون [*] سیستولی (%)	* HDL < ۴۵	* LDL > ۱۳۰	* کلسترول > ۲۲۰	بین گروهها [*] p<0.001
۱۷	۷	۶	۶۵	۳۷	۳۱	TgLwL
۹۴	۱۹	۲۴	۷۲	۵۷	۴۸	TgLwH
۳۹	۱۱	۱۰	۸۹	۵۰	۶۲	TgHwL
۹۵	۲۳	۲۱	۸۸	۶۰	۷۳	TgHwH


(تری‌گلیسرید کمتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر کمتر از ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید کمتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر یا مساوی ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید بیشتر یا مساوی ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر کمتر از ۹۵ سانتی‌متر)
 (تری‌گلیسرید بیشتر یا مساوی ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دور کمر بیشتر یا مساوی ۹۵ سانتی‌متر)

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع عوامل خطرساز قلبی - عروقی در جمعیت دارای تریگلیسرید بالا و دور کمر بالا (TgHwH) بالاتر از سایر گروه‌ها بود. متوسط نمایه توده بدنی، فشارخون سیستولی و دیاستولی، کلسترول، تریگلیسرید و LDL-C در گروه TgHwH بالاتر و HDL-C پایین‌تر از سایر گروه‌ها بود. گروه‌ها ۱۹٪ جمعیت مورد مطالعه را تشکیل می‌دادند.

لومیو و همکاران فرضیه‌ای را مطرح کردند که در آن دور کمر برای پیش‌بینی هیپرآپولیپوپروتئینی B و سطح تریگلیسرید برای پیش‌بینی فنوتیپ C small dense LDL-C کارمند رود^{۱۳} (نمودار ۲).

محققان ۱۸۴ مرد سالم را از نظر سطح سرمی انسولین، آپولیپوپروتئین B و LDL کوچک و متراکم مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که دور کمر بالاتر از ۹۰ سانتی‌متر و تریگلیسرید بالاتر از ۲ میلی‌مول در لیتر داشتند، سطح انسولین، آپولیپوپروتئین B و LDL کوچک و متراکم بیشتر است. محققان در مرحله دوم مطالعه ۲۸۷ نفر را از نظر ابتلا به بیماری عروق کرونر بررسی کردند. آنها نشان دادند در مردان بالا بودن دور کمر و تریگلیسرید وجود بیماری‌های عروق قلب را پیش‌بینی می‌کند.



نمودار ۲- اهمیت دور کمر و تریگلیسرید ناشتا به عنوان یک ابزار غربالگری^{۱۳}

در این مطالعه نتیجه‌گیری شد که فنوتیپ TgHwH (Hypertriglyceremic waist) به عنوان یک معیار ساده می‌تواند خطر بروز بیماری‌های قلبی - عروقی و سایر عوامل خطرساز آترواسکلروز را پیش‌بینی کند. عوامل خطرساز در افرادی که تری‌گلیسرید بالا (به تنهایی) و یا دور کمر بالا (به تنهایی) دارند، بیش از دیگران است. با توجه به مقطعی بودن این مطالعه، لازم به نظر می‌رسد طرح‌های آینده‌نگر با مداخله جهت بررسی تأثیر کاهش وزن و درمان هیپرتری‌گلیسریدمی بر عوامل خطرساز ارزیابی گردد. اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین B و سطح انسولین نیز می‌توانست به تحلیل نتایج مطالعه فوق کمک شایانی بنماید.

خطرساز قلبی - عروقی باشد و از طرفی همان طور که در مطالعات قبلی نشان داده است، می‌تواند پیش‌بینی کننده تریاد متابولیک هیپر-آپولیپوپروتئینی B، هیپرأنسولینمی و LDL کوچک و متراکم نیز باشد. بنابراین از این متغیر می‌توان به عنوان یک معیار پیش‌بینی کننده برای بروز بیماری‌های قلبی عروقی استفاده کرد.

خطر نسبی عوامل خطرساز قلبی - عروقی در افراد TgHwH چند برابر TgLwL بود و در بررسی عوامل خطرساز مشاهده شد در افراد TgHwH شیوع آنها بیشتر از گروه‌های TgHwL و TgLwH بود. بنابراین می‌توان از مجموع اندازه‌گیری تری‌گلیسرید و دور کمر و تقسیم افراد به گروه‌های چهارگانه فوق عوامل خطرساز قلبی - عروقی را در آنها پیش‌بینی کرد.

References

- 1- Sniderman AD, Dagenais GR, Cantin B, Despres JP, Lamarche B. High apolipoprotein B with low high-density lipoprotein cholesterol and normal plasma triglycerides and cholesterol. Am J Cardiol 2001; 87:792-3.
- 2- Tiret L, Gerdes C, Murphy MJ, Dallongeville J, Nicaud V, O'Reilly DS, et al. Postprandial response to a fat tolerance test in young adults with a paternal history of premature coronary heart disease - the EARS II study (European Atherosclerosis Research Study). Eur J Clin Invest 2000; 30:578-85.
- 3- Azizi F, Rahmani M, Raiszadeh F, Solati M, Navab M. Association of lipids, lipoproteins, apolipoproteins and paraoxonase enzyme activity with premature coronary artery disease. Coron Artery Dis 2002; 13:9-16.
- 4- Yarnell JW, Sweetnam PM, Marks V, Teale JD, Bolton CH. Insulin in ischaemic heart disease: are associations explained by triglyceride concentrations? The Caerphilly prospective study. Br Heart J 1994; 71:293-6.
- 5- Despres JP, Lamarche B, Mauriege P, Cantin B, Dagenais GR, Moorjani S, et al. Hyperinsulinemia as an independent risk factor for ischemic heart disease. N Engl J Med 1996; 334:952-7.
- 6- Despres JP. Health consequences of visceral obesity. Ann Med 2001; 33:534-41.
- 7- Lemieux I, Couillard C, Pascot A, Bergeron N, Prud'homme D, Bergeron J, et al. The small, dense LDL phenotype as a correlate of postprandial lipemia in men. Atherosclerosis 2000; 153:423-32.
- 8- Coughlan BJ, Sorrentino MJ. Does hypertriglyceridemia increase risk for CAD? Growing evidence suggests it plays a role. Postgrad Med 2000; 108:77-84.
- 9- Voors AA, van Brussel BL, Kelder JC, Plokker HW. Usefulness of hypertriglyceridemia in predicting myocardial infarction late after coronary artery bypass operation. Am J Cardiol 1997; 79:1350-4.
- 10- St-Pierre J, Lemieux I, Vohl MC, Perron P, Tremblay G, Despres JP, Gaudet D. Contribution of abdominal obesity and hypertriglyceridemia to impaired fasting glucose and coronary artery disease. Am J Cardiol 2002; 90:15-8.
- 11- Pi-Sunyer FX. The obesity epidemic: pathophysiology and consequences of obesity. Obes Res 2002; 10 (Suppl) 2:97-104.
- 12- Bard JM, Charles MA, Juhan-Vague I, Vague P, Andre P, Safar M, et al. BIGPRO Study Group. Accumulation of triglyceride-rich lipoprotein in subjects with abdominal obesity: the biguanides and the prevention of the risk of obesity (BIGPRO) 1 study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 21:407-14.
- 13- Lemieux I, Pascot A, Couillard C, Lamarche B, Tchernof A, Almeras N, et al. Hypertriglyceridemic waist: A marker of the atherogenic metabolic triad (hyperinsulinemia; hyperapolipoprotein B; small, dense LDL) in men? Circulation 2000; 102:179-84.
- 14- Azizi F, Rahmani M, Madjid M, Allahverdian S, Ghanbili J, Ghanbarian A, et al. Serum lipid levels in an Iranian population of children and adolescents: Tehran lipid and glucose study. Eur J Epidemiol 2001; 17:281-8.
- 15- Lemieux I, Almeras N, Mauriege P, Blanchet C, Dewailly E, Bergeron J, et al. Prevalence of 'hypertriglyceridemic waist' in men who participated in the Quebec Health Survey: association with atherogenic and diabetogenic metabolic risk factors. Can J Cardiol 2002; 18:725-32.
- 16- Haidari M, Moghadam M, Chinicar M, Ahmadieh A, Doosti M. Apolipoprotein B as the best predictor of coronary artery disease in Iranian normolipidemic patients. Clin Biochem 2001; 34:149-55.
- 17- Talmud PJ, Hawe E, Miller GJ, Humphries SE. Nonfasting apolipoprotein B and triglyceride levels as a useful predictor of coronary heart disease risk in middle-aged UK men. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22:1918-23.
- 18- Sharrett AR, Patsch W, Sorlie PD, Heiss G, Bond MG, Davis CE. Associations of lipoprotein cholesterol, apolipoproteins A-I and B, and triglycerides with carotid atherosclerosis and coronary heart disease. The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Arterioscler Thromb 1994; 14:1098-104.
- 19- Kruszelnicka-Kwiatkowska O, Surdacki A, Goldsztajn P, Matysek J, Piwowarska W, Golay A. Relationship between hyperinsulinemia and angiographically defined

- coronary atherosclerosis in non-diabetic men. *Diabetes Metab* 2002;2:305-9.
- 20- Koba S, Hirano T, Kondo T, Shibata M, Suzuki H, Murakami M, et al. Significance of small dense low-density lipoproteins and other risk factors in patients with various types of coronary heart disease. *Am Heart J* 2002; 144:1026-35.
- 21- Onat A, Ceyhan K, Basar O, Erer B, Toprak S, Sansoy V. Metabolic syndrome: major impact on coronary risk in a population with low cholesterol levels--a prospective and cross-sectional evaluation. *Atherosclerosis* 2002; 165:285-92.
- 22- Jungner I, Marcovina SM, Walldius G, Holme I, Kolar W, Steiner E. polipoprotein B and A-I values in 147576 Swedish males and females, standardized according to the World Health Organization-International Federation of Clinical Chemistry First International Reference Materials *Clin Chem*. 1998; 44:1641-9.

Archive of SID