

نقش نشانگرهای سلولی p53 و Ki-67 در افتراق آدنوم و کارسینوم فولیکولر تیروئید

دکتر سید محمد توانگر، دکتر مظاہر رمضانی، دکتر باقر لاریجانی

چکیده

مقدمه: در حال حاضر جهت افتراق خوش‌خیم و بدخیم بودن نوپلاسم‌های فولیکولر تیروئید از معیارهای بافتی تهاجم عروقی یا تهاجم کپسولی استفاده می‌شود و این راه افتراق در مواردی نامطمئن، مبهم و نیازمند بررسی مقاطع هیستولوژی متعدد است. در این مطالعه نقش نشانگرهای سلولی p53 و Ki-67 در افتراق آدنوم و کارسینوم فولیکولر تیروئید مورد ارزیابی قرار گرفته است. **مواد و روش‌ها:** برای یافتن نقش نشانگرهای ایمونوھیستوشیمی در تشخیص افتراقی ضایعات فولیکولر تیروئید در این مطالعه بروز مارکرهای سلولی p53 و Ki-67 در آدنوم فولیکولر و ۵۲ کارسینوم فولیکولر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ۳۰ نیز از موارد گواتر ساده به عنوان شاهد استفاده شدند. **یافته‌ها:** ۱۰٪ موارد گواتر ساده بروز هسته‌ای p53 را نشان دادند، در حالی که بروز هسته‌ای p53 در آدنوم و کارسینوم فولیکولر به ترتیب ۰/۵۵٪ و ۰/۸۲٪ بود. رنگ‌پذیری هسته‌ای برای Ki-67 در ۰/۳۰٪ گواترهای ساده، ۰/۵۱٪ آدنوم‌های فولیکولر و ۰/۹۶٪ کارسینوم‌های فولیکولر مشاهده شد. حساسیت و ویژگی p53 در تشخیص کارسینوم فولیکولر (در مقایسه با آدنوم فولیکولر) به ترتیب ۰/۸۲٪ و ۰/۴۴٪ بود. به همین ترتیب نتایج به دست آمده برای Ki-67 ۰/۹۶٪ و ۰/۴۸٪ بود. با به کار بردن همزمان هر دو مارکر p53 و Ki-67 روشی با حساسیت عالی ولی ویژگی کم برای تشخیص کارسینوم فولیکولر فراهم خواهد شد (حساسیت ۰/۸۷٪ و ویژگی ۰/۵۷٪). **نتیجه‌گیری:** نتایج مطالعه نشان داد یافتن p53 و Ki-67 به روش ایمونوھیستوشیمی می‌تواند استفاده عملی در افتراق آدنوم از کارسینوم فولیکولر تیروئید در نمونه‌های معمول پاتولوژی داشته باشد ($p < 0/0005$). گسترش نتایج این مطالعه در نمونه‌های سیتولوژی تیروئید و انجام آن بر روی نمونه‌های FNA تیروئید شاید کمکی در جهت افتراق این دو ضایعه در نمونه‌های سیتولوژی باشد.

واژگان کلیدی: تیروئید، فولیکولر، آدنوم، کارسینوم، ایمونوھیستوشیمی، p53، Ki-67.

دربافت مقاله: ۸۴/۳/۱۸ - دریافت اصلاحیه: ۸۴/۵/۵ - پذیرش مقاله: ۸۴/۵/۸

مقدمه
 کمکی مدرن مانند فلوسیتومری هم در مشخص کردن تومورهای فولیکولر خوش‌خیم و بدخیم کمکی نکرده است. از طرفی استفاده از مارکرهای سلولی مانند Ki-67 و p53 در جهت افتراق ضایعات خوش‌خیم و بدخیم در پاراتیروئید، ضایعات آسترتوسیتی مغز، ضایعات جفتی، پروستات، آدنوم مهاجم و غیرمهاجم و کارسینوم هیپوفیز، حفره دهان

در حال حاضر جهت افتراق خوش‌خیم و بدخیم بودن نوپلاسم‌های فولیکولر تیروئید از معیارهای بافتی تهاجم عروقی یا تهاجم کپسولی استفاده می‌شود و این راه افتراق در مواردی نامطمئن، مبهم و نیازمند بررسی مقاطع هیستولوژی متعدد است. در مواردی نامطمئن و مبهم از روش‌هایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، هسته‌ای p53 و Ki-67 می‌توانند مفید باشند.

Archive of SID

محلول از پیش آماده آنتی بادی گونژوگه به مدت ۶۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه شدند (بیوتین به مدت ۳۰ دقیقه و استرپ آویدینⁱⁱⁱ به مدت ۳۰ دقیقه). بعد از شستشو در TBS محصول نهایی واکنش با دی‌آمینوبنزیدین (۱۰۰ میلی‌گرم DAB در ۱۰۰ میلی‌لیتر TBS با pH=7.2 ۱۰۰ میلی‌لیتر آب و ۶۶ میکرولیتر پر اکسید هیدروژن) قابل روئیت شد. بعد از ۵ دقیقه برش‌ها ۲ بار با آب مقطر شستشو شدند. زمینه با هماتوکسیلین به مدت ۳۰ ثانیه رنگ شد و برش‌ها با چسب انتلن^{iv} چسبانده شدند. اسلامیدها سپس با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. رنگ پذیری هسته به عنوان مثبت شدن برای Ki-67 و p53 در نظر گرفته شد.

نتایج با استفاده از نرم‌افزار 10 SPPSS و به روش regression result مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته‌ها

متوسط سن بیماران ۴۴/۴ سال (با انحراف معیار ۱۲/۲) بود. حداقل سن در سه گروه مورد بررسی، ۱۹ سال و حداکثر ۸۲ سال بود (جدول ۱). ۹۲ بیمار (۶۸/۷٪) از کل ۱۲۴ مورد زن و ۴۲ بیمار (۳۱/۳٪) مرد بودند (جدول ۱). موارد p53 مثبت در آدنوم فولیکولر ۵۵/۸٪ (۲۹/۵۲)، در کارسینوم فولیکولر ۸۲/۷٪ (۴۲/۵۲) و در گواتر ساده ۱۰٪ (۲/۳۰) بود. همچنین موارد Ki-67 مثبت در آدنوم فولیکولر (۲۷/۵۲)، در کارسینوم فولیکولر ۹۶/۲٪ (۵۰/۵۲) و در گواتر ساده ۳۰٪ (۹/۳۰) بود (جدول ۱). حساسیت و ویژگی برای p53 در کارسینوم فولیکولر (در مقایسه با آدنوم فولیکولر) به ترتیب ۸۲/۷٪ و ۴۴/۲٪ بود، حساسیت و ویژگی در مورد Ki-67 در کارسینوم فولیکولر (در مقایسه با آدنوم فولیکولر) به ترتیب ۹۶/۲٪ و ۴۸/۱٪ بود. استفاده از هر دو مارکر p53 و Ki-67 با هم در کارسینوم فولیکولر (در مقایسه با آدنوم فولیکولر) حساسیت ۸۲/۷٪ و اختصاصی بودن ۵۷/۷٪ داشت.

و گوارش بررسی شده و نتایج نوید بخشی ارایه شده است.^۲ در مطالعات انجام شده وجود p53 موتانت به عنوان عامل پیش‌آگهی نامطلوب^۲ و Ki-67 مرتبط با فاز پرولیفراتیو و نثوپلاسم‌های بدخیم از نظر بافت‌شناسی مطرح شده‌اند.^۱ ایمونوراکتیویتی p53 در تعدادی از تومورهای انسانی نشانگر رفتار تهاجمی است و بیشتر در نثوپلاسم‌های با درجه بالاتر و دارای تهاجم و متاستاز دیده می‌شود.^۲ بروز MIB-1 (بیانگر Ki-67 در بلوک‌های پارافینی و مارکر تکثیر سلولی) ممکن است در افتراق ضایعات تیروئیدی خوش‌خیم (آدنوم فولیکولر با فعالیت تکثیری کم) و بدخیم (کارسینوم فولیکولر با فعالیت تکثیری بالا) مفید باشد. به دلیل نتایج مختلف در مطالعات قبلی، هدف در این مطالعه بررسی مجدد این مسئله بود که آیا اندازه‌گیری ایمونوراکتیویتی برای Ki-67 در افتراق آدنوم و کارسینوم فولیکولر غده تیروئید کمک‌کننده است؟

مواد و روش‌ها

در این مطالعه ۱۲۴ بلوک پارافینی بررسی شد که شامل ۵۲ آدنوم فولیکولر (۲۸/۸٪)، ۲۰ گواتر ساده (۲۲/۴٪) و ۵۲ کارسینوم فولیکولر (۲۸/۸٪) بودند.

اسلایدهای H&E مربوط به بلوک‌های موجود در بخش پاتولوژی بررسی شدند و بلوک‌های مناسب مربوط با حداقل خونریزی و نکروز و با فیکساسیون مناسب جهت مطالعه انتخاب شدند. نمونه‌های گواتر ساده به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. برای یافتن p53 و Ki-67 در مقاطع باقی فیکس شده در فرمالین حاصل از برش بلوک‌های پارافینی روش ایمونوپراکسیداز غیرمستقیم استفاده شد. برش ۵ میکرومتری تهیه و تا زمان ایمونوپریستوشیمی در ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شد. بعد از پارافین‌زدایی با گزینن و آبدھی در محلول‌های الکلی برش‌ها با بافر تریس سالینⁱ شستشو شدند. فعالیت پراکسیداز داخلی با انکوباسیون به مدت ۱۵ دقیقه در TBS محتوى پراکسید هیدروژن ۲٪ مهار شد. برش‌ها سپس با آنتی بادی اولیه به مدت یک شب در ۴°C انکوبه شدندⁱⁱ سپس سه بار با TBS شستشو شده با

monoclonal mouse anti-human Ki-67 clone MIB-1 N-Ready to use
iii- Strep avidin
iv- Entellen

i- Tris buffered saline (TBS)

ii- Dako's products: Monoclonal mouse anti-human p53 protein clone Do-7 N-Ready to use and

جدول ۱- ایمونو راکتیویتی برای نشانگرهای P53 و Ki-67 در گروههای مختلف بیماران

تشخیص	P53	منفی	ثبت	Ki-67		هر دو نشانگر		جمع	
				Ki-67 و P53		Ki-67			
				+/-+/-	++	منفی	ثبت		
آدنوم فولیکولر	۲۹ (٪۵۶)	۲۲ (٪۴۴)	۲۷ (٪۵۲)	۲۷ (٪۴۲)	۲۲ (٪۵۸)	۲۲ (٪۴۲)	۲۰ (٪۱۰۰)	۵۲ (٪۱۰۰)	
کارسینوم فولیکولر	۴۳ (٪۸۲)	۹ (٪۰۱۷)	۴۳ (٪۸۲)	۵۰ (٪۹۶)	۲ (٪۴)	۴۳ (٪۸۲)	۹ (٪۰۱۷)	۵۲ (٪۱۰۰)	
گواتر	۳ (٪۱۰)	۲۷ (٪۹۰)	۹ (٪۲۰)	۲۱ (٪۷۰)	۲ (٪۰۷)	۲۸ (٪۹۲)	۲۰ (٪۱۰۰)		

نشانگر نام بردہ با درجه بدھیمی^۱ در ضایعات تومورال نشان داده شد. دو نشانگر فوق می توانند به عنوان معیار تشخیصی اضافی در ضایعات مشکوک تیروئید به صورت منفرد بہتر از آن با هم کاربرد داشته باشند.^۰

در یک مطالعه بررسی Ki-67 در آدنوم و کارسینوم فولیکولر نشان داد که Ki-67 در کارسینوم به صورت قابل توجه بیشتر از آدنوما و در آدنومای اونکوسیستیک بیشتر از آدنومای غیر اونکوسیستیک است.^۰

در مطالعه اریکسون و همکاران بروز Kip-1 p27 و Ki-67 در ۹۵ ضایعه خوش خیم و بدھیم و غیر نشوپلاستیک بررسی شد. نتیجه نشان داد که مثبت شدن نشانگرها به ویژه در افتراق آدنوم و کارسینوم فولیکولر کمک می کند.^۷

در مطالعه ای مشابه، Ki-67 و bcl-2 در آدنوم کمتر از کارسینوم بود و P53 موتانت در آدنوم دیده نشد.^۸ در مطالعه ای متفاوت کزیز و همکاران نشان دادند P53 محدود به کارسینوم فولیکولر نیست و سلول های پراکنده P53 مثبت ممکن است در آدنوم فولیکولر هم باشند. به دلیل همپوشانی، این مطالعه افتراق را وابسته به بافت شناسی دانست.^۹

در این مطالعه مثبت شدن P53 شامل هر میزان مثبت شدن بیش از ۰٪ بود. مطالعات دیگر ۰٪ و ۲۰٪ را در اکثر مواقع به عنوان نقطه عطف^{۱۰} در نظر گرفته اند که البته با تغییر این نقطه بدیهی است که نتایج تحقیق متفاوت خواهد شد. در یک مطالعه میزان مثبت شدن P53، ۰٪ در کارسینوم فولیکولر بیشتر با تهاجم کسترد و ۰٪ در آدنوم فولیکولر و گواتر گزارش شده است.^{۱۰} در مطالعه دیگری میزان P53 مثبت در کارسینوم فولیکولر ۱۷٪ گزارش شده

بحث

افتراء خوش خیم و بدھیم بودن نشوپلاسم های فولیکولر تیروئید امری است که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. معیارهای مورد استفاده فعلی معیارهای بافتی تهاجم عروقی یا تهاجم کپسولی است. که نیاز به نمونه گیری زیاد دارد و در برخی موارد نامطمئن و مبهم است. افتراق در سیتوالوژی اصولاً امکان پذیر نیست و فقط اصطلاح نشوپلاسم فولیکولر می تواند به عنوان تشخیص مطرح شود. با توجه به اینکه در سایر ارگان ها غیر از تیروئید بررسی با مارکرهای سلولی ایمونو هیستوشیمی نتایج تشخیصی نویدبخشی ارائه کرده است، محققان از این مارکرها برای تشخیص استفاده کرده اند.

دو مارکر P53 و Ki-67 در مطالعات مختلف به صورت منفرد یا با هم برای افتراق این ضایعات مورد استفاده قرار گرفته اند و نتایج متفاوتی به دست آمده است.

در مطالعه دوباشی و همکاران بروز زیاد P53 به عنوان عامل پیش آگهی در کارسینوم تیروئید مورد بررسی قرار گرفت. با حرکت در جهت تمایز کمتر، مثبت شدن بیشتر شده و در بافت طبیعی یا خوش خیم اطراف واکنش مثبت دیده نشد.^{۱۱} در سایر مطالعات رنگ پذیری بیشتر P53 و Ki-67 در کارسینوم اونکوسیستیک نسبت به آدنومای اونکوسیستیک ملاحظه شده است.^{۱۲}

بروز AgNor و MIB-1 (میبن Ki-67 در بلوک های پارافینی) در گروههای گواتر، آدنوم فولیکولر، کارسینوم فولیکولر، کارسینوم پاپیلری، کارسینوم اکسی فیلیک و کارسینوم آنالاستیک بررسی شد و ارتباط معنی دار بین دو

فراوانی بروز نشانگر کر p53 در مردان ۵۷/۱٪ (۲۴/۴۲) و در زنان ۴/۵۵٪ (۵۱/۹۲) به دست آمد که نشان می‌دهد تفاوت در بروز مارکر p53 بین مردان و زنان معنی‌دار نیست ($p=0/94$).

فراوانی بروز نشانگر Ki-67 در مردان ۱٪ (۲۴/۴۲) و در زنان ۴/۶۷٪ (۶۲/۹۲) به دست آمد که نشان می‌دهد تفاوت در بروز مارکر Ki-67 بین مردان و زنان معنی‌دار نیست ($p=0/88$).

۵۵/۸٪ موارد آدنوم و ۸۲/۷٪ موارد کارسینوم، p53 مثبت بودند که نشان می‌دهد مثبت بودن از نظر p53 یک عامل پیش‌آگهی دیاگностیک برای کارسینوم فولیکولر (در مقایسه با آدنوم) به شمار می‌رود ($p<0/04$).

۵۱/۹٪ موارد آدنوم Ki-67 مثبت و ۹۶/۲٪ موارد کارسینوم Ki-67 مثبت بودند که نشان می‌دهد مثبت بودن از نظر Ki-67 یک عامل پیش‌آگهی برای کارسینوم فولیکولر (در مقایسه با آدنوم) به شمار می‌رود ($p<0/01$).

در نهایت ۴۲/۳٪ (۲۲/۵۲) موارد آدنوم و ۸۲/۷٪ (۴۲/۵۲) موارد کارسینوم، بروز همزمان هر دو مارکر p53 و Ki-67 را داشتند که نشان می‌دهد مثبت شدن از نظر هر دو مارکر یک عامل پیش‌آگهی برای کارسینوم فولیکولر (در مقایسه با آدنوم) محسوب می‌شود ($p<0/005$).

به طور خلاصه در مطالعه حاضر تفاوت معنی‌داری بین ابتلا به آدنوم و کارسینوم در گروه مردان و گروه زنان وجود نداشت و سایر مطالعات هم تفاوتی برای جنس پیدا نکردند. بروز نشانگرهای p53 و Ki-67 هم در مردان و زنان تفاوتی نشان نداد که یافته‌هایی قابل انتظار می‌باشدند. هر یک از نشانگرهای p53 و Ki-67 به تنهایی و هر دو با هم برای افتراق آدنوم و کارسینوم فولیکولر دارای ارزش تشخیصی بودند.

با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده همزمان از هر دو نشانگر p53 و Ki-67 با توجه به معنی‌دار بودن از نظر آماری برای تشخیص کارسینوم فولیکولر در موارد مبهم توصیه می‌شود و مخصوصاً در نمونه‌های سیتوولوژی احتمال بدخیمتر بودن ضایعه و توجه بیشتر به بیمار را مطرح می‌کند.

است^{۱۰} که در این مطالعه مانند مطالعه کارسینوم‌های فولیکولر با تهاجم گسترده یا جزئی مجزا نشده‌اند. مطالعه دیگری به بررسی تومورهای هرتلی صرف‌نظر از نوع هیستوپاتولوژی (آدنوم و کارسینوم) پرداخته است که هم در تومورهای هرتلی و هم تیروئید طبیعی p53 را منفی گزارش کرده است.^{۱۱} در یک مطالعه، p53 در کارسینوم فولیکولر، ۹٪ و قوی و در آدنوم، ۱۵٪ و ضعیف (با تفاوت معنی‌دار) ذکر شده است.^{۱۲} در مطالعه حاضر رنگ‌پذیری قوی و ضعیف ملاک نبوده و هر میزان مثبت بودن به عنوان مثبت گزارش شده است. احتمالاً به همین دلیل میزان مثبت شدن نسبت به سایر مطالعات بیشتر بوده است. از طرفی در یک مطالعه با مارکرهای p53 و Ki-67 نتوانسته اند بین آدنوم و کارسینوم فولیکولر تفاوتی قائل شوند.^{۱۳}

در این مطالعه، در مورد Ki-67 هم میزان مثبت شدن به هر مقدار در نظر قرار گرفت. در یک بررسی، Ki-67 مثبت به شرط Bcl-2 منفی، همراه با تشخیص کارسینوم هرتلی با تهاجم وسیع بود.^{۱۴} در مطالعه حاضر تمایز هرتلی در تومورها مدنظر قرار نگرفت. در بررسی دیگر مقادیر Ki-67 مثبت در کارسینوم فولیکولر، آدنوم فولیکولر و تیروئید طبیعی به ترتیب ۲۰٪/۵۸٪، ۱۴٪ و ۰٪ به دست آمد^{۱۵} که از مطالعه حاضر پایین‌تر بود و برای تشخیص کارسینوم در آن مطالعه دو آستانه ۹٪ و ۱۱٪ را در نظر گرفتند که با آستانه ۹٪ حساسیت ۷۵٪ و ویژگی ۸۳٪ و با آستانه ۱۱٪ حساسیت ۶۹٪ و ویژگی ۹۰٪ به دست آمد. در مطالعه ما آستانه هر میزان بیش از ۰٪ در نظر گرفته شد و بدین ترتیب برای Ki-67 حساسیت ۶۶٪ و ویژگی ۴۸٪ (در مقایسه با آدنوم) به دست آمد. در مورد p53 این مقادیر به ترتیب ۲٪/۴۴٪ بود. در مجموع نشان داده شد استفاده همزمان از این دو نشانگر حساسیتی مطلوب برای تشخیص کارسینوم فولیکولر فراهم می‌کند اما برای کارسینوم فولیکولر چندان Multinomial regression نشان داده شد که جنس، یک عامل پیش‌آگهی در افتراق آدنوم و کارسینوم فولیکولر نیست. به این ترتیب که ۹٪/۲۶٪ (۱۴/۵۲) بیماران مبتلا به آدنوم، مرد و ۶٪/۳۴٪ (۱۸/۵۲) از بیماران مبتلا به کارسینوم نیز مرد بوده‌اند که تفاوت آماری معنی‌دار نیست ($p=0/96$). همچنین ۱٪/۷۳٪ (۳۸/۵۲) بیماران مبتلا به آدنوم زن و ۴٪/۶۵٪ (۳۴/۵۲) بیماران مبتلا به کارسینوم نیز زن بوده‌اند که تفاوت آماری معنی‌دار نیست ($p=0/78$).

شریعتی و بخش پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قدرتانی گردد. این پژوهش با حمایت مالی و علمی مرکز
تحقیقات غدد و بیماری‌های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی
تهران انجام شده است.

سپاسگزاری

لازم است از خدمات آقایان دکتر نورایی و مهندس عظیم
رمضانی جهت مشاوره آماری و خانم عظیمی و خانم
امیرانی همکاران محترم بخش ایمونوھیستوشیمی بیمارستان

References

1. Sternberg Stephen S., diagnostic surgical pathology, 3rd ed., Philadelphia: Lippincott Williams and wilkins,1999.
2. Silverberg SG, Delellis RA, Frable WJ. Principles and practice of surgical pathology and cytopathology, 3rd ed, Newyork: Churchill livingstone,1997.
3. Dobashi Y, Sakamoto A, Sugimura H, Mernyei M, Mori M, Oyama T,et al. Overexpression of p53 as a possible prognostic factor in human thyroid carcinoma.Am J Surg Pathol. 1993;17(4):375-81.
4. Muller-Hocker J. Immunoreactivity of p53, Ki-67, and Bcl-2 in oncocytic adenomas and carcinomas of the thyroid gland.Hum Pathol. 1999;30(8):926-33.
5. Lewy-Trenda I, Bienkiewicz M. Evaluation of MIB-1 immunoreactivity and nucleolar organizer regions in nonneoplastic and neoplastic thyroid lesions. Pol J Pathol. 1999;50(3):129-38.
6. Ludvikova M, Ryska A, Hovorkova E, Pikner R. [Role of the MIB-1 proliferative markers in the diagnosis and prognosis of tumors of the thyroid gland]Cesk Patol. 2002;38(1):4-10. Czech.
7. Erickson LA, Jin L, Wollan PC, Thompson GB, van Heerden J, Lloyd RV. Expression of p27kip1 and Ki-67 in benign and malignant thyroid tumors. Mod Pathol. 1998;11(2):169-74.
8. Paltsev MA, Kogan EA, Tuntsova OI [Immunohistochemistry of biomolecular markers of early thyroid cancer]Arkh Patol. 1997;59(6):18-23.
9. Czyz W, Joensuu H, Pykkonen L, Klemi PJ. p53 protein, PCNA staining, and DNA content in follicular neoplasms of the thyroid gland.J Pathol. 1994;174 (4):267-74.
10. Dabbs DJ. Diagnostic immunohistochemistry,1st ed, Newyork: Churchill livingstone; 2002,p118-582.
11. Hoos A, Stojadinovic A, Singh B, Dudaš ME, Leung DH, Shahar AR,et all. Clinical significance of molecular expression profiles of Hurthle cell tumors of the thyroid gland analyzed via tissue microarrays.Am J Pathol. 2002;160(1):175-83
12. Nasir A, Catalano E, Calafati S, Cantor A, Kaiser HE, Coppola D. Role of p53, CD44V6 and CD57 in differentiating between benign and malignant follicular neoplasms of the thyroid.In Vivo. 2004;18(2):189-95.
13. Toshiaki Moriki, Tamotsu Takahashi, Machico Hashimoto, et al: Immunohistochemistry and morphologic study of thyroid follicular neoplasm, IAC 1998 Mar.
14. Rickert D, Mittermayer C, Lindenfelser R, Biesterfeld S. MIB-1 immunohistometry of follicular adenoma and follicular carcinoma of the thyroid gland.Anal Quant Cytol Histol. 2000;22(3):229-34.