

## ارتباط پلی‌مورفیسم G-238A در پروموتور ژن TNF- $\alpha$ با چاقی

### در جمیعت ایرانی

کبری شریفی<sup>۱</sup>، دکتر رضا حاج‌حسینی<sup>۱</sup>، فاطمه رستمی<sup>۱</sup>، بیتا فام<sup>۱</sup>، دکتر مریم السادات دانشپور<sup>۲</sup>، دکتر فریدون عزیزی<sup>۳</sup>، دکتر مهدی هدایتی<sup>۳</sup>

(۱) دانشگاه پیام نور، واحد تهران مرکز، (۲) مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی، (۳) مرکز تحقیقات غدد، پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، نشانی مکاتبه‌ی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۴۷۶۳، دکتر مهدی هدایتی؛  
e-mail:Hedayati@endocrine.ac.ir

#### چکیده

مقدمه: سلول‌های بافت چربی قادر به بیان فاکتور نکروز دهنده‌ی تومور آلفا (TNF- $\alpha$ ) می‌باشند. سطح افزایش یافته‌ی این سیتوکین با چاقی و مقاومت به انسولین در ارتباط است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین این پلی‌مورفیسم با چاقی در جمیعت ایرانی بود. مواد و روش‌ها: افراد شرکت کننده در مطالعه‌ی "قند و لپید تهران" (TLGS) در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال تقسیم شدند. افراد بالای ۱۸ سال به سه گروه براساس نمایه‌ی توده‌ی بدنی (BMI) بزرگتر و مساوی، ۳۰، کوچکتر از ۳۰ و بزرگ‌تر و مساوی ۲۵ و کوچکتر از ۲۵ کیلوگرم بر مترمربع و در زیر گروه ۱۸ سال در دو گروه براساس صدک بالاتر از ۸۵ و صدک کمتر از ۸۵ قرار گرفتند. از میان آنها، در مجموع ۲۳۹ نفر انتخاب شدند. میزان قند خون ناشتا، HDL-C، تری‌گلیسرید و کلسترول اندازه‌گیری و سایر عوامل مؤثر در چاقی مانند BMI و فشار خون مشخص شدند. قطعه‌ای ۱۵۲ جفت بازی از ژن مورد نظر با استفاده از روش PCR تکثیر و پلی‌مورفیسم مورد نظر با استفاده از روش RFLP مشخص شد. یافته‌ها: فراوانی آلل‌های TNF- $\alpha$  از قانون هاردی‌واینبرگ تبعیت کرد. فراوانی ژنوتیپ‌ها در ۲۳۹ نفر مورد بررسی عبارت بود از AA (۰/۱۳)، GG (۰/۷۹/۵) و GA (۰/۱۹/۲) که با ارتباط معنی‌داری نشان نداد. فراوانی ژنوتیپ‌ها در گروه جوانان عبارت بود از GG (۰/۸۰/۵)، GA (۰/۱۹/۵) و AA (۰/۰). نفر ژنوتیپ GG و ۸ نفر ژنوتیپ GA داشتند و هیچ یک ژنوتیپ AA نداشتند. در گروه بزرگسالان فراوانی ژنوتیپ‌ها به این شرح بود: GG (۰/۷۹/۳)، GA (۰/۱۹/۲) و AA (۰/۱/۵). ۱۵۷ نفر ژنوتیپ GG، ۳۸ نفر ژنوتیپ GA و ۳ نفر ژنوتیپ AA داشتند. نتیجه‌گیری: داده‌های به دست آمده از این مطالعه بر عدم وجود ارتباط بین پلی‌مورفیسم G-238A ژن TNF- $\alpha$  با چاقی دلالت داشتند و نتیجه‌گیری می‌شود که این پلی‌مورفیسم در افزایش خطر بروز چاقی در جمیعت ایرانی نقش ندارد.

واژگان کلیدی: چاقی، نمایه‌ی توده‌ی بدن، پلی‌مورفیسم، فاکتور نکروز دهنده‌ی تومور آلفا (TNF- $\alpha$ )

دریافت مقاله: ۸۸/۱۰/۳ - دریافت اصلاحیه: ۸۸/۱۲/۱۸ - پذیرش مقاله: ۸۸/۱۲/۲۰

متربع به عنوان معمولی، ۲۵ تا ۲۹/۹ کیلوگرم بر مترمربع دارای اضافه وزن و بیشتر از ۲۰ کیلوگرم بر مترمربع چاق در نظر گرفته شدند. برای سن بالای ۱۸ سال، تری‌گلیسیرید کمتر از ۴۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، عدم مصرف دارو و فقدان بیماری قلبی-عروقی و فشار خون بالا، معیارهای ورود به مطالعه بودند. براساس معیارهای مذکور به طور تصادفی ۲۲۹ نفر در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال با میانگین سن ۱۲/۹±۲/۶ سال شامل ۱۷ مرد (۱۲/۰۸±۲/۷۸ ساله) و ۲۴ زن (۱۳/۸۵±۲/۶۶ ساله) و بالای ۱۸ سال با میانگین سن ۱۲/۰±۱/۵/۴ سال شامل ۷۸ مرد (۴۴/۳۲±۱/۶ ساله) و ۱۲۰ زن (۴۰/۹۱±۱/۴/۸۱) در گروه جوانان به ترتیب ۲۶ و ۱۵، در گروه بزرگسال به ترتیب ۷۷ و ۴۱ نفر بود. اطلاعات مربوط به سن، جنس، مصرف سیگار، میزان فعالیت بدنی، بیماری قلبی-عروقی و وضعیت زنان از نظر بارداری و یائسگی به صورت پرسشنامه‌ای ثبت شد. داده‌های مربوط به قد، وزن و فشارخون اندازه‌گیری شدند. از همه‌ی افراد مراجعه‌کننده به واحد تحقیقات قند و لپید واقع در شرق تهران، دو نمونه‌ی خون محیطی یکی لخته و دیگری دارای ماده‌ی ضدانعقاد EDTA گرفته شد. به کمک کیت‌های تجاری شرکت پارس‌آزمون، تهران، ایران، میزان کاسترول تام، تری‌گلیسرید سرم و قند خون ناشتا به روش رنگ‌سننجی آنزیمی و میزان HDL-C به روش رسوبی فسفوتونگستات سدیم اندازه‌گیری شدند.

استخراج DNA از نمونه‌ی خون دارای ضد انعقاد به روش نمک اشباع/پروتئیناز کا انجام شد. نمونه‌های DNA حاصل در ۲۰- درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شدند. پس از بررسی‌های کمی و کیفی DNA استخراجی با اسپکتروفوتومتر و الکتروفورز، تکثیر قطعه‌ی ۱۵۲ جفت بازی از ژن  $\text{TNF-}\alpha$  با استفاده از روش PCR انجام شد. هر مخلوط PCR به حجم ۱۶ میکرولیتر، شامل بافر 10X PCR (۱/۵ میکرولیتر)، میلی‌مول بر لیتر MgCl<sub>2</sub> (۵۵ میکرولیتر)، ۰/۰ میلی‌مول بر لیتر dNTPs (۰/۰۲ میکرولیتر)، Taq DNA Polymerase (۰/۰۲ میکرولیتر)، معادل ۱ واحد آنزیمی و جفت پرایمرهای رفت و برگشت با توالی‌های زیر (۰/۱۲ میکرولیتر) (تنهیه شده از شرکت سیناژن) بود:

5'-ATCTGGAGGAAGCGGTAGTG-3'  
5'-AGAAGACCCCCCTCGGAACC-3'

## مقدمه

چاقی به طور چشمگیری در حال افزایش است و با چند بیماری از جمله دیابت نوع ۲، چربی و فشار خون بالا در ارتباط است.<sup>۱</sup> چاقی و اختلال‌های مرتبط با آن پیچیده بوده و احتمالاً بخاطر تعامل بین عوامل ارثی و اکتسابی مانند تغذیه و فعالیت بدنی است.<sup>۲-۳</sup> تحلیل ارتباطی در جمعیت هندیان پیما (pima Indians)، ارتباط بارز میان مارکرهای نزدیک ژن فاکتور نکروزدهنده بافتی (TNF- $\alpha$ ) در ناحیه‌ی کروموزومی 6p21 را با چاقی نشان داد.<sup>۴</sup> سیتوکین TNF- $\alpha$ ، به عنوان یک تنظیم‌کننده بیان ژن در سلول‌های چربی عمل می‌کند و سبب افزایش مقاومت به انسولین و چاقی می‌شود.<sup>۵-۷</sup> بافت چربی یکی از منابع مهم تولید TNF- $\alpha$  است. بیان این سیتوکین در بافت چربی و ماهیچه انسان در زمان ابتلا به چاقی افزایش می‌یابد.<sup>۸-۱۰</sup> ارتباط قابل ملاحظه‌ای میان افزایش بیان  $\alpha$  TNF با سطح بالای انسولین و میزان دفع گلوكز در طول اعمال روش Glycemic clamp گزارش شده است.<sup>۱۰-۱۱</sup> یکی از پلی‌مورفیسم‌های شناخته شده ژن TNF- $\alpha$  که روی بازوی کوتاه کروموزم ۶ قرار دارد، جا به جایی نوکلئوتید G با نوکلئوتید A در جایگاه ۲۲۸- ژن مذکور است. این پلی‌مورفیسم در جعبه‌ی فرضی Y قرار دارد که یک موتیف تنظیمی مشخص ناحیه‌ی پرموتر MHC ژن‌های کلاس ۲ است.<sup>۱۲</sup> هیچ مطالعه‌ای برای بررسی بیان ژن در محیط آزمایشگاهی و سنجش ارتباط عملی این پلی‌مورفیسم تاکنون انجام نشده است. با توجه به تفاوت ذخیره‌ی ژنی جمعیت‌های مختلف و عدم گزارش ارتباط پلی‌مورفیسم ۲۲۸- ژن  $\alpha$  TNF با چاقی در جمعیت ایرانی، هدف از این مطالعه تعیین ارتباط پلی‌مورفیسم مذکور با چاقی بود.

## مواد و روش‌ها

جامعه‌ی مورد بررسی از میان شرکت‌کنندگان مطالعه‌ی قند و لپید تهران (TLGS) انتخاب شدند. مطالعه‌ی TLGS بررسی آینده‌نگری است که برای بررسی عوامل خطرساز بیماری‌های غیرواگیر در ۱۵۰۰۵ نفر از جمعیت تهران انجام شد. ابتدا کل افراد شرکت‌کننده در مطالعه‌ی TLGS براساس نمایه‌ی توده‌ی بدن (BMI) ( تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر) به سه گروه تقسیم شدند: در تقسیم‌بندی مذکور افراد دارای BMI کمتر از ۲۵ کیلوگرم بر

- (۲) مرحله واسرشت ۱ دقیقه در دمای ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد
- (۳) مرحله اتصال (Annealing): ۳۰ ثانیه در دمای ۶۲/۱ درجه‌ی سانتی‌گراد
- (۴) مرحله طویل‌سازی (Extension): ۶۰ ثانیه در دمای ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد (مراحل ۲ تا ۴، ۲۵ سیکل تکرار شد)
- (۵) مرحله Extension نهایی ۱۰ دقیقه در دمای ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد (یک سیکل).

به هر لوله، ۲ میکرولیتر از DNA استخراج شده اضافه شد و پس از افزودن روغن معدنی استریل به نمونه‌ها، این لوله‌ها سانتریفیوز و سپس به دستگاه ترموسایکلر ساخت کارخانه‌ی Corbet استرالیا منتقل شدند. شرایط ترموسایکلر پس از بهینه‌سازی شرایط، شامل موارد زیر بود:

(۱) مرحله واسرشت (Denaturation) ابتدایی ۱۰ دقیقه در دمای ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد (یک سیکل)

جدول ۱- متغیرهای بالینی، تن‌سنگی و بیوشیمیایی به تفکیک جنس در سه گروه پلیمورفیسم در گروه سنی زیر ۱۸ سال

متغیر(واحد)	پسران (۱۷-تعداد)						دختران (۲۴-تعداد)					
	GG	GA	AA	GG	GA	AA	GG	GA	AA	GG	GA	AA
سن (سال)	۱۱/۹±۲/۸	۱۲/۵±۲/۷	-	۱۴/۰±۲/۷	۱۲/۷±۱/۸	-	۱۲/۷±۱/۸	۱۲/۵±۲/۷	-	۱۱/۹±۲/۸	۱۲/۵±۲/۷	-
فشار خون سیستولی (میلی‌متر جیوه)	۱۰/۱±۸/۱	۱۱/۰/۶±۲/۳	-	۹/۹±۸/۹	۹/۸±۵/۹	-	۹/۰±۸/۹	۹/۸±۵/۹	-	۹/۱±۸/۱	۹/۰/۶±۲/۳	-
فشار خون دیاستولی (میلی‌متر جیوه)	۶/۷±۶/۸	۶/۷±۷/۸	-	۶/۵±۲/۷	۷/۳±۱/۷	-	۶/۰±۷/۸	۷/۳±۱/۷	-	۶/۱±۸/۱	۷/۰±۷/۸	-
نسبت دور کمر به دور باسن	۰/۸۶±۰/۰۴	۰/۸۹±۰/۰۶	-	۰/۸±۰/۰۳	۰/۷۱±۰/۰۵	-	۰/۷۶±۰/۰۳	۰/۷۳±۱/۷	-	۰/۷۰±۰/۰۵	۰/۷۰±۰/۰۵	-
نمایی تودهی بدن (کیلوگرم بر مترمربع)	۱۹/۲±۲/۷	۲۱/۰±۱/۱	-	۲۰/۶±۲/۴	۱۷/۰±۰/۰۷	-	۲۰/۴±۲/۴	۱۷/۰±۰/۰۷	-	۱۹/۰±۰/۰۷	۱۷/۰±۰/۰۷	-
قند خون ناشتا (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۸/۶±۶/۲	۵/۸±۸/۹/۵	-	۸/۸±۶/۲	۷/۹±۵/۷	-	۸/۴±۶/۲	۷/۹±۵/۷	-	۸/۰±۸/۹/۵	۷/۰±۵/۷	-
کلسیتروول تام (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۱۶۰/۴±۲۵/۰	۱۵۰/۶±۲۸/۷	-	۱۶۳/۲±۲۳/۸	۱۴۲/۱±۲۸/۳	-	۱۶۲/۲±۲۳/۸	۱۴۲/۱±۲۸/۳	-	۱۶۰/۴±۲۵/۰	۱۵۰/۶±۲۸/۷	-
تری‌گلیسرید (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۸/۷±۳/۱/۸	۸/۹±۳/۰/۰	-	۹/۸±۴/۱/۵	۷/۰/۳±۳/۱/۳	-	۹/۸±۴/۱/۵	۷/۰/۳±۳/۱/۳	-	۹/۷±۳/۱/۸	۹/۰±۳/۱/۳	-
HDL-C (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۴۵/۳±۹/۱	۴۳/۰±۱۱/۴	-	۴۲/۸±۶/۵	۴۳/۲±۳/۲/۲	-	۴۲/۸±۶/۵	۴۳/۲±۳/۲/۲	-	۴۳/۰±۱۱/۴	۴۲/۸±۶/۵	-
LDL-C (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۹/۷/۴±۲۰/۵	۸/۹/۸±۳۵/۱	-	۹/۷/۴±۲۰/۵	۸/۰/۱±۱۹/۱	-	۹/۷/۴±۲۰/۵	۸/۰/۱±۱۹/۱	-	۹/۷/۴±۲۰/۵	۸/۰/۱±۱۹/۱	-
اینترلوكین ۶ (پیکوگرم در میلی‌لیتر)	۴/۱±۳۲/۷	۵/۴±۶/۶	-	۳/۱±۲۳/۹	۲۹/۹±۲۵/۲	-	۳/۱±۲۳/۹	۲۹/۹±۲۵/۲	-	۳/۱±۲۳/۹	۲۹/۹±۲۵/۲	-
اینترلوكین ۱۰ (پیکوگرم در میلی‌لیتر)	۴/۸±۱۱۰/۱	۲۵/۹±۴۹/۴	-	۵/۷±۳/۶	۴/۳±۱/۰	-	۵/۷±۳/۶	۴/۳±۱/۰	-	۵/۷±۳/۶	۴/۳±۱/۰	-
آدیپونکتین (نانوگرم در میلی‌لیتر)	۱۴/۵±۸/۳	۱۶/۳±۸/۹	-	۱۶/۶±۱۰/۴	۲۷/۳±۵/۸	-	۱۶/۶±۱۰/۴	۲۷/۳±۵/۸	-	۱۶/۶±۱۰/۴	۲۷/۳±۵/۸	-
دور باسن (سانتی‌متر)	۷/۹/۳±۹/۸	۸/۱/۵±۲/۷	-	۸/۷/۸±۸/۴	۸/۱/۰±۸/۸	-	۸/۷/۸±۸/۴	۸/۱/۰±۸/۸	-	۸/۷/۸±۸/۴	۸/۱/۰±۸/۸	-
HOMA (شانص)	۸/۷±۵/۴	۹/۸±۴/۵	-	۱۲/۱±۶/۷	۱۰/۷±۰/۵	-	۱۲/۱±۶/۷	۱۰/۷±۰/۵	-	۱۲/۱±۶/۷	۱۰/۷±۰/۵	-
CRP (نانوگرم در میلی‌لیتر)	۲۳۲/۷±۷۵۳/۱	۲۴۵/۰/۸±۲۸۹۸/۰	-	۲۷۹/۳±۶۸۰/۸	۸۲۹/۱±۱۱۶/۰/۴	-	۲۷۹/۳±۶۸۰/۸	۸۲۹/۱±۱۱۶/۰/۴	-	۲۷۹/۳±۶۸۰/۸	۸۲۹/۱±۱۱۶/۰/۴	-
دور کمر (سانتی‌متر)	۸/۶/۸±۱۱۰/۰	۷/۳/۱±۳/۳	-	۷/۰/۵±۷/۶	۵/۸/۰±۵/۴	-	۷/۰/۵±۷/۶	۵/۸/۰±۵/۴	-	۷/۰/۵±۷/۶	۵/۸/۰±۵/۴	-

\* اعداد به صورت میانگین± انحراف معیار بیان شده‌اند،  $P<0.05$  معنی‌دار در نظر گرفته شده است.

می‌باشد. فراوانی ژنوتیپ‌ها در گروه سنی بالای ۱۸ سال عبارت بود از GG (۸۶/۶٪)، GA (۱۲/۴٪) و AA (۱٪). در جدول ۲ شاخص‌های بالینی، تنفسی و بیوشیمیایی به تفکیک جنس در سه گروه پلی‌مورفیسم این رده‌ی سنی بررسی شده است. میزان کلسترول تام و میانگین LDL-C در مردان در حالت AA به طور معنی‌داری بیشتر از دو حالت دیگر بود در حالی که LDL-C و کلسترول سرم در زنان در حالت GG بیشتر از دو حالت دیگر بود. متغیرهای بالینی و بیوشیمیایی در افراد مورد بررسی بر اساس BMI در نوجوانان در دو گروه براساس صدک گروه اول صدک کمتر از ۸۵ و گروه دوم صدک بالاتر از ۸۵ و در بزرگسالان در سه گروه نمایه‌ی توده بدنی گروه اول  $\leq 25$  و گروه دوم  $25 < \text{BMI} \leq 30$  و گروه سوم  $30 \geq \text{BMI} \geq 34$  قرار گرفته‌است که به ترتیب در جدول‌های ۳ و ۴ آمده است.

در گروه نوجوانان میانگین BMI، اندازه‌ی دورکمر، دور باسن، CRP، نسبت دور کمر به دور باسن در گروه دوم به طور معنی‌داری بیشتر از گروه اول بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود در گروه بزرگسالان سن، فشارخون سیستولی، فشار خون دیاستولی، نسبت دور کمر به دور باسن، BMI، قند خون ناشتا، کلسترول، تری‌لیپید، HDL-C، دور باسن، CRP و دور کمر تفاوت معنی‌داری دارند. بر اساس آزمون تعقیبی توکی میانگین سن، فشار خون سیستولی و فشار خون دیاستولی در گروه یک و دو همگن بود و در یک دسته قرار گرفت ولی میانگین سن، فشار خون سیستولی و فشار خون دیاستولی در گروه سه با دو گروه دیگر همگن نبوده و در دسته‌ی جدالگانه‌ای قرار گرفت. همچنین، نسبت دور کمر به دور باسن در گروه دو و سه همگن بود و در یک گروه قرار گرفت ولی در گروه یک با دو گروه دیگر همگن نبود و در دسته‌ی جدالگانه‌ای قرار گرفت. میانگین کلسترول، CRP در گروه یک و دو با هم و گروه دو و سه با هم در یک دسته و میانگین تری‌لیپید در گروه یک و سه با هم و گروه دو و سه با هم در یک دسته قرار گرفتند. میانگین HDL-C گروه دو نیز با یک در یک دسته و یک با سه در دسته‌ی دیگر قرار گرفت. میانگین قند خون ناشتا در هر سه گروه با هم‌همگن بودند و در یک دسته قرار گرفتند و میانگین‌های دور کمر، BMI و دور باسن نیز هریک در دسته‌های جدالگانه قرار گرفتند.

کنترل صحت تکثیر PCR با استفاده از کنترل‌های مثبت و منفی بررسی شد. درستی تکثیر قطعه‌ی مورد نظر روی ژل آگارز ۲٪ بررسی شد و نمونه‌های تکثیر شده برای برش با آنزیم دارای اثر محدود آماده گردیدند. ۱۰ میکرولیتر از محصولات PCR توسط آنزیم MSPI (شرکت Fermentas) انتکوبه شدند. نتیجه‌ی الکتروفورز محصولات RFLP<sup>۱</sup> برروی ژل آگارز ۲٪ پس از رنگ‌آمیزی با اتیدیومبرماید توسط دستگاه Transilluminator مشاهده شد.

داده‌ها به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. متغیرهای کمی به صورت میانگین±انحراف معیار و متغیرهای کیفی به صورت درصد بیان شدند. از آزمون کروسکال-والیس و برای مقادیر دارای توزیع نرمال از آزمون آنوا بهره گرفته شد. برای مقایسه‌ی یافته‌های آزمایشگاهی سه گروه BMI استفاده شد. سطح معنی‌دار آماری،  $p < 0.05$  ر رنظر گرفته شد.

## یافته‌ها

در این مطالعه ۲۳۹ نفر شامل ۹۵ مرد (۱۷ نفر زیر ۱۸ سال و ۷۸ نفر بالای ۱۸ سال) و ۱۴۴ نفر زن (۲۴ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۲۰ نفر بالای ۱۸ سال) از مطالعه TLGS انتخاب شدند.

فراوانی آلل‌ها -۲۲۸ TNF-α در جمعیت مورد بررسی از قانون هاردی-وانبرگ تبعیت کرد. فراوانی ژنوتیپ‌ها در گروه جوانان عبارت بود از GG (۸۰/۵٪)، AA (۱۹/۵٪) و GA (۱۹/۰٪). نفر ژنوتیپ AA و نفر ژنوتیپ GG، ۸ نفر ژنوتیپ GA و ۰ نفر ژنوتیپ AA داشتند. در گروه بزرگسالان، فراوانی ژنوتیپ‌ها به این شرح بود GG (۷۹/۳٪)، GA (۱۹/۲٪) و AA (۱/۵٪). ۱۵۷ نفر ژنوتیپ GG، ۳۸ نفر ژنوتیپ GA و ۳ نفر ژنوتیپ AA داشتند. در جدول ۱ شاخص‌های بالینی، تنفسی و بیوشیمیایی به تفکیک جنس در سه گروه پلی‌مورفیسم در گروه سنی زیر ۱۸ سال بررسی شده است. فشار خون سیستولی و CRP در پسربان در حالت GA به طور معنی‌داری بیشتر از GG بود. در دختران، در حالت GA، فشارخون دیاستولی به طور معنی‌داری بیشتر از حالت دیگر بود و نسبت دور کمر به دور باسن، قند ناشتا و دور کمر در حالت GG بیشتر از GA

جدول ۲- شاخص‌های بالینی، تنفسی و بیوشیمیایی به تفکیک جنس در سه گروه پلیمورفیسم جایگاه ۲۳۸- پرومومتر ژن TNF-*a* در گروه سنی بالای ۱۸ سال

متغیر(واحد)	مردان								زنان								
	مردان				زنان				(تعداد=۷۸)				(تعداد=۱۲۰)				
P	مقدار	AA	GA	GG	P	مقدار	AA	GA	GG	P	مقدار	AA	GA	GG			
۰/۲۶	۹۸±۷/۰	۱۱۰±۱۱/۰	۱۱۴±۱۵/۵	۰/۲۸	۱۳۴	۱۱۹±۱۴/۷	*	۱۱۴/۵±۱۴/۶	فشار خون سیستولی (میلی متر جیوه)	۰/۴۶	۶۸±۶/۳	۷۷/۲±۷/۷	۷۴/۰±۷/۱	۰/۱۵	۷۶/۵	۷۸/۰±۷/۰	فشار خون دیاستولی (میلی متر جیوه)
۰/۲۹۹	۰/۷۶±۰/۰۳	۰/۸۱±۰/۰۸	۰/۸۳±۰/۰۷	۰/۷۹۳	۰/۹۶	۰/۹۴±۰/۰۷	۰/۹۳±۰/۰۶	نسب دور کمر به دور باسن	۰/۷۳	۲۴/۸±۲/۴	۲۷/۴±۵/۴	۲۶/۹±۴/۷	۰/۲۹	۲۰/۳	۲۶/۰±۳/۶	۲۵/۵±۳/۵	نمایه‌ی توده‌ی بدن (کیلوگرم بر مترمربع)
۰/۳۴	۸۴/۵±۶/۳	۸۶/۵±۹/۰	۸۹±۲۹/۴	۰/۴۲	۱۰۶/۵	۹۰/۵±۳۲/۶	۹۰/۵±۵۶/۲	قند خون ناشتا (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۰/۰۱	۱۶۰/۷±۵/۳	۱۷۵/۴±۲۹/۶	۲۰/۱/۰±۴۰/۶	۰/۰۱	۲۲۱	۱۹۴/۰±۴۴/۵	۱۹۵/۸±۴۰/۳	کلسترول تام (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
۰/۵۷	۹۰/۷±۱۸/۰	۱۴۲/۵±۵۹/۲	۱۱۶±۹۵/۴	۰/۶۲	۱۸۶/۵	۱۵۳±۴۹/۹	۱۴۱/۲±۹۷/۶	تری‌گلیسرید (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۰/۸۷	۴۳±۴/۹	۴۵/۸±۱۰/۹	۴۴/۸±۸/۶	۰/۷۲	۳۹	۳۷/۷±۷/۲	۳۹/۵±۸/۷	HDL-C (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
†۰/۰۰	۹۹/۶±۳/۱	۱۰۲/۶±۲۵/۸	۱۲۸/۵±۳۴/۶	۰/۰۰	۲۴۴/۹	۱۲۲/۷±۲۶/۴	۱۲۱/۶±۳۳/۱	LDL-C (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۰/۱۴	۱/۳±۰/۲	۳/۹±۲۰/۴	۳/۳±۲۰/۰	۰/۹۶	۵/۱	۴/۴±۵/۰	۳/۹±۵۳/۱	اینترولوکین ۶ (پیکوگرم در میلی‌لیتر)
۰/۹۱	۴/۱±۰/۶	۳/۷±۳/۵	۴/۳±۴۱/۴	۰/۴۷	۸/۵	۴/۵±۲/۹	۴/۴±۲۴/۴	اینترولوکین ۱۰ (پیکوگرم در میلی‌لیتر)									

\* اعداد به صورت میانگین±انحراف معیار بیان شده‌اند،  $^{†}P<0.05$  معنی‌دار در نظر گرفته شده است.

جدول ۳- شاخص‌های بیوشیمیایی فراوانی پلیمورفیسم پرومومتر ژن TNF-*a* در جایگاه ۲۳۸- در افراد مورد مطالعه براساس گروه‌های نمایه‌ی توده‌ی بدن افراد زیر ۱۸ سال

متغیر	صدک کوچکتر- مساوی ۸۵								صدک بزرگتر- مساوی ۸۵							
	(تعداد=۲۶)				(تعداد=۱۵)				(تعداد=۲۶)				(تعداد=۱۵)			
P	مقدار	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
۰/۰۶	۱۰۴/۴±۷/۷	*	۹۹/۴±۸/۴	۰/۰۶	۶۷/۳±۵/۴	۶۶/۹±۵/۶	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۶
۰/۸۴																
۰/۰۱	۰/۸۵±۰/۰۵															
†۰/۰۰	۲۲۱/۱±۲/۶															
۰/۸۳	۸۷/۲±۴/۸															
۰/۱۱	۱۶۷/۳±۲۷/۴															
۰/۴۰	۹۷/۹±۴۶/۶															
۰/۰۹	۴۶/۳±۸/۹															
۰/۳۹	۱۰۱/۱±۲۵/۰															
۰/۲۲	۳/۲±۴/۲															
۰/۲۷	۵/۷±۲۸/۰															
۰/۳۰	۱۴/۸±۷/۳															
۰/۰۰۴	۸۹/۱±۷/۶															
۰/۶۹	۱۰/۲±۶/۳															
۰/۰۱	۵۸۲/۶±۱۶۷۷/۲															
†۰/۰۰	۷۶/۲±۷/۶															

\* اعداد به صورت میانگین±انحراف معیار بیان شده‌اند،  $^{†}P<0.05$  معنی‌دار در نظر گرفته شده است.

جدول ۴- شاخص‌های بالینی، بیوشیمیایی و فراوانی پلی‌مورفیسم ژن TNF- $\alpha$  در افراد مورد بررسی براساس گروه‌های نمایه‌ی توده‌ی بدن در افراد بالای ۱۸ سال جایگاه -۲۳۸

متغیر	نمایه‌ی توده‌ی بدن (کیلوگرم بر مترمربع)	گروه ۱		گروه ۲		مقادیر P	
		گروه ۳		گروه ۴			
		بیشتر و برابر ۳۰ (تعداد)	۲۵-۳۰ (تعداد)	کمتر از ۲۵ (تعداد)	۲۵-۳۰ (تعداد)		
(فرابوی)	(فرابوی)	(%) ۳۲ (۷۸٪)	(%) ۶۰ (۷۷٪)	(%) ۶۵ (۸۱٪)	(%) ۶۰ (۷۷٪)	-	
(فرابوی)	(فرابوی)	(%) ۹ (۲۲٪)	(%) ۱۶ (۲۰٪)	(%) ۱۳ (۱۶٪)	(%) ۱۶ (۲۰٪)	-	
(فرابوی)	(فرابوی)	.	(%) ۱ (۱٪)	(%) ۲ (۲٪)	(%) ۱ (۱٪)	-	
فشار خون سیستولی (میلی‌متر جیوه)	فشار خون دیاستولی (میلی‌متر جیوه)	۱۱۸/۵±۱۷/۳	۱۱۵/۰±۱۴/۸	۱۱۱/۷±۱۲/۶	۷۸/۰±۷/۸	†/۰...	
نسب دور کمر به دور باسن	نمایه‌ی توده‌ی بدن (کیلوگرم بر مترمربع)	۷۸/۰±۷/۸	۷۴/۱±۷/۵	۷۲/۱±۷/۲	۰/۸۹±۰/۰۸	†/۰...	
قدن ناشتا (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	کلسترول تام (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	۰/۸۹±۰/۰۸	۰/۸۹±۰/۰۸	۰/۸۳±۰/۰۸	۰/۸۹±۰/۰۸	†/۰...	
کلسترول گلیسرید (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	ایترولوکین ۶ (پیکوگرم در میلی‌لیتر)	۳۲/۵۷±۳/۱	۲۷/۵۰±۱/۴	۲۲/۲۷±۱/۸	۱۱۵/۰±۱۷/۳	†/۰...	
ایترولوکین ۱۰ (پیکوگرم در میلی‌لیتر)	ایترولوکین ۱۰ (پیکوگرم در میلی‌لیتر)	۹۲/۰±۱۵/۰	۸۹±۲۶/۰۳	۸۷±۵۴	۷۸/۰±۷/۸	/۰۱	
آدیپونکتین (نانوگرم در میلی‌لیتر)	دور باسن (سانتی‌متر)	۲۰/۸/۲±۳۴/۰	۲۰/۰/۵±۴۲/۱	۱۸۶/۳±۴۱/۵	۰/۰۱	/۰۱	
دور کمر (سانتی‌متر)	HOMA	۱۳۵/۰±۶۹/۸	۱۴۴/۵±۱۱۱/۴	۱۱۰/۵±۶۹/۱	۱۳۱/۸±۳۰/۳	†/۰...	
CRP (نانوگرم در میلی‌لیتر)	دور کمر (سانتی‌متر)	۴۵/۳±۱۱/۳	۴۰/۶±۸/۲	۴۳/۳±۸/۴	۳/۹±۲۰/۲	/۰۲	
دور کمر (سانتی‌متر)	دور کمر (سانتی‌متر)	۱۳۱/۸±۳۰/۳	۱۲۶/۲±۳۴/۷	۱۱۷/۱±۲۶/۶	۰/۰۷	/۰۷	
دور کمر (سانتی‌متر)	دور کمر (سانتی‌متر)	۳/۹±۲۰/۲	۴/۴۵±۲۸/۶	۲/۸±۴۸/۴	۰/۲۰	/۰۰	
دور کمر (سانتی‌متر)	دور کمر (سانتی‌متر)	۴/۰±۲/۶	۴/۴±۱۳/۸	۴/۶±۵۲/۲	۱۱/۳±۱۱/۷	/۰۲۱	
دور کمر (سانتی‌متر)	دور کمر (سانتی‌متر)	۱۱/۳±۱۱/۷	۱۱/۲±۹/۵	۱۲/۶±۹/۴	۱۱۱/۰±۸/۳	†/۰...	
دور کمر (سانتی‌متر)	دور کمر (سانتی‌متر)	۱۱۱/۰±۸/۳	۱۰/۱/۱±۴/۸	۹۳/۹±۵/۰	۱۰/۰۲	/۰۰۰	
دور کمر (سانتی‌متر)	HOMA	۱۰/۰۴±۶/۷	۱۲/۱±۹/۷	۱۱/۳±۸/۹	۲۰/۷۰/۷±۲۱۷۰/۶	†/۰...	
دور کمر (سانتی‌متر)	دور کمر (سانتی‌متر)	۲۰/۷۰/۷±۲۱۷۰/۶	۱۵۷۲/۴±۱۵۳۰/۵	۷۶۱/۷±۱۳۸۸/۵	۹۹/۵±۸/۱	†/۰...	

\* اعداد به صورت میانگین±انحراف معیار بیان شده‌اند،  $P<0.05$  معنی‌دار در نظر گرفته شده است.

منجر به بروز سندروم‌های ژنتیکی تأثیرگذار بر تمایز سلول‌های چربی می‌شود.<sup>۱۱</sup> مطالعه‌های اخیر دربارهٔ نقش ژن TNF- $\alpha$  در مقاومت به انسولین و چاقی متمرکز شده‌اند اما در مطالعه‌ی حاضر ارتباط بین این پلی‌مورفیسم و چاقی بدون بیماری متابولیک بررسی شده است. به علاوه، دو مطالعه نقش بالقوه‌ی ژن TNF- $\alpha$  در چاقی توسط مطالعه‌ای واپس‌گردی تأیید شده که در آن بررسی‌ها ارتباط بین جایگاه ژن TNF- $\alpha$  و اندازه‌های کلی و متفاوت چاقی در جمعیت هندیان پیما و اروپایی‌های قفقاز گزارش شده است.<sup>۴,۱۱</sup> در مورد جایگاه ۲۳۸، یافته‌های مطالعه‌های مختلف متناقض است. در مطالعه‌ای در کشور انگلستان بین بستگان غیردیابتی و گروه شاهد این متغیر با افزایش حساسیت به انسولین که توسط دو روش مستقل اندازه‌گیری شد، ارتباط

## بحث

هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط پلی‌مورفیسم TNF- $\alpha$  G-238A با چاقی و شاخص‌های تن‌سننجی در جمعیت مطالعه‌ی قد و لیپید تهران بود. یافته‌ها، ارتباط پلی‌مورفیسم مذکور را با افزایش BMI در افراد مورد بررسی نشان ندادند از آنجا که TNF- $\alpha$  یکی از سیتوکین‌های مهم ترشح شده از بافت چربی در چاقی است، ژن آن می‌تواند یکی از ژن‌های انتخابی برای بررسی چاقی و بیماری‌های مرتبط با آن باشد. چاقی یک نارسایی متابولیک پیچیده با اجزا ژنتیکی قوی است و ژن‌های داولطلب زیادی برای چاقی و فنتوتیپ‌های مرتبط با آن وجود دارد. بیشتر این ژن‌ها به خاطر این داولطلب شده‌اند که جهش در آنها به ندرت

بیشتر که نماینده افراد چاق است، فراوانی ژنوتیپ AA افزایش پیدا نمود اما این افزایش معنی دار نبود (جدول های ۳ و ۴). متوسط BMI افراد با ژنوتیپ AA از متوسط ژنوتیپ های دیگر بیشتر بود (جدول های ۱ و ۲). از آن جا که چاقی به عنوان یک بیماری مزمن از زمان کنگره ای در سال ۱۹۸۵<sup>۱</sup> شناخته شده است، مطالعه ها در خصوص عوامل مؤثر در بروز چاقی، راهکارهای پیشگیری و درمان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. بیماری چاقی معمولاً همراه با اختلال های گستردگی و بیماری های مختلف است که قدر مسلم این اختلال ها بر عملکرد افراد در جامعه اثر سوء دارند. با بررسی های ژنتیکی و تعیین ارتباط آلل ها با بروز بیماری می توان از طریق تشخیص پلیمورفیسم های مرتبط، این عارضه را از بدبو تولد و حتی قبل از آن تشخیص داد و برای پیشگیری از بروز بیماری اقدام نمود. تقدم پیشگیری بر درمان می تواند صرفه جویی در هزینه های مالی و معنوی را به دنبال داشته باشد.

یافته های حاصل از این مطالعه نشان دهنده یکی از دلایل احتمالی ژنتیکی در بروز بیماری چاقی در جمعیت ایرانی است و می تواند راهی مطمئن برای تشخیص زود هنگام و بررسی زمینه های ژنتیکی در بروز این بیماری باشد. اما با توجه به این که چاقی، یک مجموعه ای پیچیده از عوامل متقابل با قابلیت انتقال ارثی است و ژن های متعددی در آن دخیل هستند تنها بررسی پلیمورفیسم یک ژن و ارتباط آن با چاقی کافی به نظر نمی رسد؛ بنابراین بررسی سایر ژن های دخیل در چاقی در مطالعه های بعدی ضروری به نظر می رسد.

داشت<sup>۹</sup> در حالی که این متغیر در مطالعه ای در نیونگلند با دیابت نوع ۲ هیچ ارتباطی نشان نداد.<sup>۱۰</sup> در مطالعه ای در قفقاز های اروپایی و افراد آمریکایی-افریقایی هیچ ارتباطی بین این پلیمورفیسم و شاخص های مرتبط به چاقی و مقاومت انسولین یافت نشده است.<sup>۱۱</sup>

جالب این که چاقی به عنوان حالتی همراه با افزایش میزان TNF-*a* mRNA و پروتئین در بافت چربی هم در انسان ها و هم در جوندگان چاق ژنتیکی و جوندگان دیابتی شناخته شده است.<sup>۱۲</sup> علاوه بر این، در مطالعه ای نشان داده شد که سطح TNF-*a* mRNA در بافت چربی به طور آشکاری با درصد چربی بدن در افراد چاق در ارتباط است.<sup>۱۳</sup> مطالعه ای دیگری حاکی از بیان و ترشح لپتین توسط TNF-*a*، در سلول های چربی کشت داده شده بود.<sup>۱۴</sup> به تازگی، در مطالعه ای با تأیید ارتباط ژن TNF-*a* با چاقی در خانواده های فرانسوی- کانادایی ارتباط مهمی بین این جایگاه ژنی و فشار خون بالا یافت شد.<sup>۱۵</sup> همچنین، ارتباط مثبت مهمی بین غلظت سطح سرمی TNF-*a* و فشار خون سیستولی در افرادی از جمعیت کانادایی صرف، در طیف وسیعی از چاقی مشاهده شده است.<sup>۱۶</sup> ترکیب TNF-*a* در عروقی، اندوتلین ۱، در سلول های عضله ای صاف است.<sup>۱۷</sup> همین طور، تولید سوبسترای رنین - آنژیوتنسینوژن در بافت چربی را تحريك می کند.<sup>۱۸</sup>

یافته های مطالعه ای حاضر، حاکی از عدم وجود ارتباط معنی داری میان افزایش BMI با حضور آلل A بود، هر چند BMI که در گروه دوم جوانان و گروه سوم بزرگسالان با

i - National Institute of Health consensus

## References

- WHO Obesity preventing and managing the global epidemic, editor. WHO Consultation on Obesity, Geneva: WHO; 1997.p.1-276.
- Pérusse L, Bouchard C. Genotype-environment interaction in human obesity. Nutr Rev 1999; 57: S31-7.
- Comuzzie AG, Allison DB. The search for human obesity genes. Science 1998; 280: 1374-7.
- Norman RA, Bogardus C, Ravussin E. Linkage between obesity and marker near the tumor necrosis factor-alpha locus in Pima Indians. J Clin Invest 1995, 96: 158-62.
- Hotamisligil GS, Spiegelman BM. Tumor necrosis factor alpha: a key component of the obesity-diabetes link. Diabetes 1994; 43: 1271-8.
- Hamann A, Mantzoros C, Vidal-Puig A, Flier JS. Genetic variability in the TNF-alpha promoter is not associated with type II diabetes mellitus (NIDDM). Biochem Biophys Res Commun 1995; 211: 833-9.
- Fernandez-Real JM, Gutierrez C, Ricart W, Casamitjana R, Fernandez-Castaner M, Vendrell J, et al. The TNF-alpha gene Neo I polymorphism influences the relationship among insulin resistance, percent body fat, and increased serum leptin levels. Diabetes 1997, 46: 1468-72.
- Day CP, Grove J, Daly AK, Stewart MW, Avery PJ, Walker M. Tumour necrosis factor-alpha gene promoter polymorphism and decreased insulin resistance. Diabetologia 1998; 41: 430-4.
- Hotamisligil GS, Arner P, Caro JF, Atkinson RL, Spiegelman BM. Increased adipose tissue expression of tumor necrosis factor-alpha in human

- obesity and insulin resistance. *J Clin Invest* 1995; 95: 2409-15.
10. Saghizadeh M, Ong JM, Garvey WT, Henry RR, Kern PA. The expression of TNF alpha by human muscle. Relationship to insulin resistance. *J Clin Invest* 1996; 97: 1111-6.
  11. Hotamisligil GS, Shargill NS, Spiegelman BM. Adipose expression of tumor necrosis factor-alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance. *Science* 1993; 259: 87-91.
  12. D'Alfonso S, Richiardi PM. A polymorphic variation in a putative regulation box of the TNFA promoter region. *Immunogenetics* 1994; 39: 150-4.
  13. Bouchard C, Pérusse L, Leblanc C, Tremblay A, Thériault G. Inheritance of the amount and distribution of human body fat. *Int J Obes* 1988; 12: 205-15.
  14. Walston J, Seibert M, Yen CJ, Cheskin LJ, Andersen RE. Tumor necrosis factor-alpha-238 and -308 polymorphisms do not associate with traits related to obesity and insulin resistance. *Diabetes* 1999; 48: 2096-8.
  15. Kern PA, Saghizadeh M, Ong JM, Bosch RJ, Deem R, Simsolo RB. The expression of tumor necrosis factor in human adipose tissue. Regulation by obesity, weight loss, and relationship to lipoprotein lipase. *J Clin Invest* 1995; 95: 2111-9.
  16. Kirchgessner TG, Uysal KT, Wiesbrock SM, Marino MW, Hotamisligil GS. Tumor necrosis factor-alpha contributes to obesity-related hyperleptinemia by regulating leptin release from adipocytes. *J Clin Invest* 1997; 100: 2777-82.
  17. Pausova Z, Deslauriers B, Gaudet D, Tremblay J, Kotchen TA, Larochelle P. Role of tumor necrosis factor-alpha gene locus in obesity and obesity-associated hypertension in French Canadians. *Hypertension* 2000; 36: 14-9.
  18. Zinman B, Hanley AJ, Harris SB, Kwan J, Fantus IG. Circulating tumor necrosis factor-alpha concentrations in a native Canadian population with high rates of type 2 diabetes mellitus. *J Clin Endocrinol Metab* 1999; 84: 272-8.
  19. Kahaleh MB, Fan PS. Effect of cytokines on the production of endothelin by endothelial cells. *Clin Exp Rheumatol* 1997; 15: 163-7.
  20. Nyui N, Tamura K, Yamaguchi S, Nakamaru M, Ishigami T, Yabana M, et al. Tissue angiotensinogen gene expression induced by Lipopolysaccharide in hypertensive rats. *Hypertension* 1997; 30: 859-67.

**Original Article**

## **Association of TNF- $\alpha$ promoter G-238A Polymorphism and Obesity in an Iranian Population**

Sharifi k<sup>1</sup>, Haj Hosseini R<sup>1</sup>, Rostami F<sup>1</sup>, Faam B<sup>1</sup>, Daneshpour M<sup>2</sup>, Azizi F<sup>3</sup>, Hedayati M<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Payam Nour University, Branch of Tehran, <sup>2</sup>Obesity Research Center, and <sup>3</sup>Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran

e-mail:Hedayati@endocrine.ac.ir

Received: 24/12/2009 Accepted: 03/11/2010

**Abstract**

**Introduction:** Tumor necrosis factor- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ ) is expressed primarily in adiposities, and elevated levels of this cytokine have been linked to obesity and insulin resistance. We, therefore, examined the relationship between this variant and obesity in an Iranian population. **Materials and Methods:** Subjects of the Tehran Lipid and Glucose Study were classified in two age groups, the under 18 and the above 18; adults were classified in three groups according to their body mass index; BMI<25, 25≤BMI<30, BMI≥30 subjects aged under 18 years were classified in the two groups according to their body mass index: under the 85th percentile for their age and sex and above the 85th percentile for their age and sex. Overall 239 persons were selected. We measured FBS, HDL-C, LDL-C, triglycerides, cholesterol levels and blood pressure, CRP, IL-6, IL-10, Adiponectin, and HOMA for all individuals. A 152 base pair segment of the mentioned gene with PCR was amplified and the polymorphism with RFLP (MSPI) revealed. **Results:** The allele frequency of TNF- $\alpha$  polymorphism was in the Hardy Weinberg equilibrium and the allele frequency was GG (79.5%), GA (19.2%), AA (1.3%) and there was no relation between BMI and the frequency of this allele. The genotype frequency in adolescents was GG (80.5%), GA (19.5%), AA(0%); 33 persons were GG genotype 8 GA genotypes and none had AA genotype. In adults, the genotype frequency was GG (79.3%), GA (19.2%), AA(1.5%); 157 persons had the GG genotype, 38 persons the GA genotype and 3 persons the AA genotype. **Conclusion:** No association was found between G-238A TNF- $\alpha$  promoter polymorphism and obesity, indicating probably that it is not an important risk factor for obesity or consequently for cardiovascular disease.

**Keywords:** Obesity, BMI, Polymorphism, TNF- $\alpha$