

بررسی اثربخشی برنامه همگانی ایمن سازی علیه هپاتیت ب بر بار بیماری در ایران

دکتر محمدحسین فروزان فر^{1*}، دکتر کاظم محمد¹، دکتر سیدرضا مجدزاده¹، دکتر رضا ملکزاده²، دکتر فرید ابوالحسینی³، دکتر مهدی محمدنژاد²، دکتر کورش هلاکوئی نائینی¹، دکتر مصطفی حسینی¹، دکتر محسن نقوی⁴

1- گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2- مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3- مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران 4- معاونت سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Title: *Effectiveness of adolescents' immunization against hepatitis B on burden of the disease in Iran*

Author(s): *Forouzanfar MH, (MD, PhD); Mohammad K, (PhD); Majdzadeh R, (PhD); Malekzadeh R, (MD); Abolhasani F, (MD); Mohammadnejad M, (MD); Holakouie Naeini K, (PhD); Hosseini M, (PhD); Naghavi M, (PhD).*

Introduction: *Hepatitis B is a common problem in many countries. Due to high efficacy, safety and low cost of vaccine, mass immunization has become a favorite strategy to improve population health. In this study, we tried to estimate marginal effectiveness of adolescents' immunization program in Iran.*

Methods: *Epidemiologic data about of hepatitis B in Iran was gathered through literature review, expert opinion, existing resources of data and synthesis by modeling of other data. In a state transition model, different stages of disease were simulated in 15 to 100 year old individuals. Comparing the results of burden of hepatitis B with and without immunization revealed an estimate of avoidable burden of disease with intervention. Monte Carlo simulation and sensitivity analyses were done for uncertainty analysis of results.*

Results: *Immunization of around one million 15- year. old males and females prevents 2071 of male and 581 of female premature deaths due to acute hepatitis B, cirrhosis and hepatocellular carcinoma annually. Moreover, it prevents loss of about 52 and 36 percent of YLL (years of life lost) due to hepatitis B complications in males and females respectively. On average, it avoids loss of Disability Adjusted Life Years (DALY) of 0.012 and 0.006 years, according to present value of life. Monte Carlo simulation of populations showed that effectiveness of the intervention is quite significant and about half of males and one third of females with disability, equal to at least one year of full health, will be free. With sensitivity analyses, results were standing in acceptable limit of values in both bivariate and probabilistic calculations.*

Conclusion: *Our study showed that effectiveness of adolescents' immunization against hepatitis B is quite significant. Calculation using basic estimates of cost of intervention program implies that this intervention is possibly very cost effective. For final judgment, results should be combined with cost effectiveness analysis, and compared to other interventions.*

Keywords: *Hepatitis B, immunization, adolescents, effectiveness, burden.*

Hakim 2006; 9(2): 1- 11.

* نویسنده مسؤول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی. تلفن: 88989123 شماره: 88989127
پست الکترونیک: frouzan@tums.ac.ir

چکیده

مقدمه: عوارض کبدی بیماری هپاتیت ب از مشکلات شایع بسیاری از جوامع است. به واسطه کارایی بالا و قیمت پایین واکسن، ایمن‌سازی رده‌های مختلف سنی و گروه‌های پرخطر در بسیاری کشورها صورت می‌گیرد. با این وجود انتخاب برنامه ایمن‌سازی پس از تولد و کودکی در کشورهای با شرایط شیوع متوسط بیماری بایستی بر اساس برآورد مقدار اثربخشی برنامه صورت گیرد. مطالعه حاضر به منظور محاسبه اثربخشی ایمن‌سازی علیه هپاتیت ب در نوجوانان با توجه به ویژگی‌های اپیدمیولوژیک بیماری در کشور انجام گرفته است.

روش کار: داده‌های اپیدمیولوژیک بیماری هپاتیت ب از متون علمی، مقالات، نظر متخصصین و مدل‌سازی داده‌های موجود گردآوری و برآورد شدند. داده‌های مختلف، سیر طبیعی بیماری در جامعه از زمان ابتلای حاد تا مرگ در مدل گذر جامعه ترکیب شد و پیامدهای مختلف بیماری در افراد 15 تا 100 ساله بازسازی شدند. در نهایت اثربخشی برنامه ایمن‌سازی با محاسبه تفاضل مرگ‌ومیر و بار بیماری هپاتیت ب بین دو حالت (با و بدون ایمن‌سازی) و بر اساس نرخ تنزیل، 3٪ برآورد شد. بازسازی احتمالی مونت کارلو جامعه و نیز تحلیل حساسیت دو بعدی و احتمالی بر مقادیر مورد استفاده در محاسبات صورت گرفت.

یافته‌ها: محاسبات نشان داد ایمن‌سازی نوجوانان 15 ساله در نزدیک به یک میلیون نفر مرد و زن به ترتیب از مرگ 2071 و 581 نفر در اثر هپاتیت حاد، سیروز و سرطان کبد جلوگیری می‌کند و سال‌های از دست‌رفته به‌علت مرگ زودرس (YLL) را به میزان 52٪ در مردان و 36٪ در زنان کاهش می‌دهد و نیز از هدر رفتن سال‌های عمر به‌علت مرگ و ناتوانی (DALY) حاصل از عوارض هپاتیت ب، با ارزش فعلی، 0/012 و 0/006 سال جلوگیری می‌کند. بازسازی مونت کارلو جامعه نشان داد که این اقدام تأثیر مشخص و معناداری بر سلامت جامعه می‌گذارد و نیمی از مردان و یک سوم زنانی را که حداقل معادل یک سال زندگی با کیفیت را بایستی به‌واسطه بیماری از دست می‌دادند، از ناتوانی رها می‌کند. تحلیل‌های حساسیت نیز نشان داد در محدوده قابل قبول از مقادیر مورد استفاده چه به تنهایی و چه در حضور یکدیگر، مقدار برآورد کماکان قابل توجه می‌باشد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد ایمن‌سازی جوانان علیه هپاتیت ب به میزان قابل توجهی از بار بیماری هپاتیت ب در جامعه می‌کاهد. محاسبات با برآوردهای مقدماتی هزینه چنین می‌نماید که احتمالاً این مداخله بسیار هزینه- اثربخش نیز می‌باشد. توصیه می‌شود در مطالعات آتی، ملاحظات هزینه و درمان نیز لحاظ گردد و با سایر مداخلات سلامتی مقایسه شود.

کل واژگان: هپاتیت ب، ایمن‌سازی، جوانان، اثربخشی، بار بیماری.

مقدمه


5 درصد گزارش شده است. از آنجایی که عمده موارد ابتلا در دوران نوزادی اتفاق می‌افتد، واکسیناسیون زمان تولد از سال 1371 تاکنون در کشور انجام می‌شود. گزارش طرح «سلامت و بیماری» اشاره به افزایش شیوع مبتلایان به هپاتیت مزمن با افزایش سن از 1/2 در 9-7 سالگی به 2/9 در 50 تا 59 سالگی دارد که ابتلای قابل توجه پس از کودکی را مطرح می‌سازد (6). بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت، پس از ایمن‌سازی نوزادان، سنین بالاتر نیز بهتر است تحت پوشش ایمن‌سازی قرار گیرند (5). البته کارآمدی این تصمیم، منوط به

وجود 350 میلیون بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن ب در دنیا این بیماری را از تهدیدهای قابل توجه سلامت در دنیا نموده است (1). بیماران مزمن مبتلا به این بیماری در سال‌های آتی زندگی خود با عواقب وخیم از جمله سیروز کبدی و سرطان کبد و در نهایت مرگ زودرس مواجه هستند (2 و 3). 75٪ از 50 میلیون بیماری که در هر سال به آن مبتلا می‌گردند، متعلق به کشورهای آسیایی هستند (4). ایران در زمره کشورهای با شیوع متوسط هپاتیت مزمن ب قرار دارد (5 و 6) که این میزان 1/7 تا

سال‌های ازدست رفته در اثر مرگ و ناتوانی⁴ در دو وضعیت با مداخله فرضی و بدون مداخله فرضی محاسبه شد که تفاضل آن دو، برآوردی از مقدار اثربخشی برنامه می‌باشد. محاسبات در نرم‌افزار مایکروسافت اکسل صورت گرفت. تحلیل‌های عدم قطعیت احتمالی⁵ و مونته کارلو⁶ با برنامه‌نویسی در فضای ویژوال بیسیک و اکسل با الگوریتم‌های تولید اعداد تصادفی بر اساس توزیع آماری متغیر انجام شد (9).

مدل سیر طبیعی بیماری هپاتیت ب در جامعه: برای بررسی اثربخشی ایمن‌سازی هپاتیت ب در ابتدا، سیر طبیعی بیماری در جامعه تبیین گردید. به این منظور بررسی مراجع و مقالات مروری منتشر شده صورت گرفت و بر اساس نظر متخصصین گوارش، نمودار سیر طبیعی بیماری هپاتیت ب به صورت زیر در جامعه برای افرادی که پس از سن 15 سالگی در معرض ویروس قرار گرفته و به عوارض آن دچار می‌شوند، در نظر گرفته شد (نمودار 1).

نمودار 1- سیر طبیعی بیماری هپاتیت ب بدون مداخلات درمانی که در مدل‌سازی نهایی به کار رفت.



هر فرد در طول زندگی خود علاوه بر گذر از مراحل مختلف بیماری، در معرض مرگ به سایر علل شبیه بقیه افراد جامعه خواهد بود. مرگ افراد جامعه و نیز مرگ مبتلایان به عفونت مزمن هپاتیت ب در دو گروه مرگ کلی N Death (غیراختصاصی و مرتبط با هپاتیت ب) نظیر مرگ به علل قلبی-عروقی، سرطان، بیماری‌های متابولیک و مرگ اختصاصی (به علل سیروز و نارسایی کبدی، سرطان کبد و نارسایی کبدی حاد

سهم قابل توجه موارد ابتلا به هپاتیت مزمن در بزرگسالی است تا از این طریق بتوان بار بیماری را در جامعه به نحو قابل توجهی کاهش داد.

مطالعات هزینه- اثربخشی ایمن‌سازی علیه هپاتیت ب، نشان از کارآمدی این روش به‌ویژه در نوزادان دارد. مطالعه‌ای در دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان داد اگر بتوان در نزدیک به 46 هزار دانش‌آموز واجد شرایط، ایمن‌سازی را تا 95٪ پوشش داد، می‌توان از 37 مرگ زودرس به‌علت عوارض هپاتیت ب و هدر رفتن 845 سال عمر جلوگیری کرد. همچنین با صرف هزینه‌ای معادل 2100 دلار می‌توان یک‌سال از عمر افراد را حفظ کرد که این میزان در مناطقی که بروز بیماری بیش از 3 بیمار در 100 هزار نفر است، چشمگیرتر است (7). مطالعه دیگری که با داده‌های کشور هند (شیوع متوسط) انجام شده بیانگر آن است که واکسیناسیون بدو تولد، سال‌های زندگی افراد را 0/173 سال و بر مبنای سال‌های زندگی باکیفیت¹ آن را 0/213 سال افزایش می‌دهد (8).

برنامه ایمن‌سازی همگانی نوجوانان بر علیه هپاتیت ب مدتی است که مورد توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های لازم برای اجرای این برنامه ملی، لازم است مقدار اثربخشی برنامه برآورد شده تا به‌همراه ملاحظات هزینه، ارزیابی روشی در مورد کارآمدی این مداخله برای ارتقای سلامت جامعه صورت گیرد. در این راستا مطالعه حاضر سعی نمود، اثربخشی ایمن‌سازی در جوانان را برآورد کند. نتایج این مطالعه، امکان برآورد مقدار بار تحمیل شده در هر سال و هر گروه سنی را برای تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. انتخاب جوانان 15 ساله به‌دلیل ویژگی دانش‌آموز بودن، سن ابتدای بزرگسالی و عدم ایمن‌سازی دوران نوزادی است. البته امکان تعمیم به گروه‌های سنی بالاتر، در تحلیل حساسیت بررسی خواهد شد.

روش کار

محاسبه بار بیماری قابل پیشگیری² با محاسبه تعداد وقایع و مراحل مختلف بیماری و نیز عوارض آن اعم از مرگ و ناتوانی است که با ایمن‌سازی از آنها جلوگیری می‌شود. برای نشان دادن اثربخشی ایمن‌سازی شاخص‌های سال‌های زندگی با کیفیت QALY و سال‌های از دست رفته در اثر مرگ³ و

⁴ Disability Adjusted Life Years (DALY)

⁵ Uncertainty Analysis

⁶ Monte Carlo

¹ Quality Adjusted Life years (QALY)

² Avoidable burden

³ Years of Life Lost (YLL)

در اثر ابتلای حاد) به صورت S Death در نمودار 1 نمایش داده شده است.

بازسازی جامعه: بازسازی و شبیه‌سازی¹ جامعه در مدل گذر جامعه² و بر مبنای مدل مارکوف صورت گرفت (8 و 10). در مدل مارکوف، احتمال رخداد یا مشاهده پیامدهای جدید در هر گروه و مرحله بیماری بستگی به مسیری که فرد از آن گذشته و مدت زمانی که در آن بوده نداشته و همه افراد تحت تأثیر احتمال واحدی از گذر به مرحله دیگری از بیماری هستند. این مدل، متناسب با شرایط خاص جامعه انتخاب شده است. برای مثال براساس متون (11-12) و اظهار نظر متخصصین، در جوامعی که ابتلا عمدتاً در سنین پس از تولد رخ می‌دهد، تقریباً تمام موارد سرطان کبد سلولی در بیماران سیروزی رخ می‌دهد و در مواردی که سرطان در ابتدا تشخیص داده شده، زمینه سیروزی در آن مشاهده می‌شود. در بازسازی سیر بیماری، موارد سرطان به علت هپاتیت ب به تنهایی و بدون سیروز صرف نظر شده است.

تعداد بیماران در هر کدام از مراحل مختلف بیماری، در گذر جامعه در طول زمان و متأثر از احتمال‌های مختلف ماتریس گذر، برآورد گردید. برای مثال تعداد مبتلایان مزمن در هر سال، حاصل جمع مبتلایان سال قبل که زنده مانده و به پیامدهای بعدی دچار نشده‌اند و موارد جدید ناشی از ابتلا است. برآوردهای احتمال در این ماتریس در مردان و زنان و در سنین مختلف، متفاوت در نظر گرفته شد. علت این امر، تغییر برخی پارامترهای آن نظیر مرگ‌ومیر کلی، ابتلا و ... با سن و زمان است. البته تعدادی از پارامترهای آن نیز ثابت فرض شد (نظیر احتمال مزمن شدن هپاتیت حاد که در بالغین حدود 0/05 است).

جامعه هدف و افق مطالعه: افق زمانی در نظر گرفته شده در این مطالعه به گونه‌ای بوده که دوره زندگی افرادی که هم‌اکنون 15 ساله هستند را پوشش دهند. به همین منظور تأثیر برنامه ایمن‌سازی تا 100 سالگی جوانان 15 ساله بوده و از سال 1385 تا 1470 را در بر می‌گیرد. بر اساس سرشماری نفوس در سال 1375 و برآورد اداره آمار ایران از جمعیت سال 1384 کشور (مراجعه به سایت مرکز آمار ایران، در تاریخ 1384/5/20) جمعیت 15 ساله‌های زنده پسر، بالغ بر 969863 و دختران حدود 931434 نفر در سال 1385 می‌باشد.

مرگ‌ومیر کلی جامعه: قدرت بیماری‌زایی، نسبت میزان مرگ مبتلایان به عفونت مزمن بر اساس مرگ‌ومیر اختصاصی سنی، جنسی و علتی (که از داده‌های نظام ثبت مرگ 23 استان سال 1383 کشور استخراج شده) برآورد گردید. از آنجا که ثبت مرگ و برآورد میزان مرگ جامعه هنوز کامل نبوده و سابقه چندانی نیز ندارد، امکان برآورد میزان‌های مرگ در سالیان آینده به‌طور مستقیم و دقیق ممکن نبود و در محاسبات نیز به کار نرفت.


قدرت بیماری‌زایی هپاتیت ب در جامعه: احتمال بیمار شدن فردی که قبلاً با ویروس تماس نداشته و مستعد ابتلا است، از مهمترین مقادیر مورد نیاز برای بازسازی جامعه از بعد هپاتیت ب می‌باشد. این احتمال بستگی زیاد به شیوع مبتلایان به عفونت مزمن در جامعه و الگوی تماس و توزیع راه‌های انتقال بیماری در جامعه دارد. به‌عنوان یک اصل در کشورهای اندمیک که شیوع مبتلایان به عفونت مزمن بالا است (بیش از 8٪)، انتقال عمدتاً از مادر به فرزند می‌باشد. در کشورهای با شیوع متوسط و پایین، اکثر موارد انتقال پس از تولد و در اثر تماس خونی و رفتارهای پرخطر جنسی است (13). در ایران مطالعه‌ای برای برآورد میزان بروز موارد حاد یا قدرت بیماری‌زایی صورت نگرفته است؛ بنابراین جهت برآورد آن از مدل‌سازی بر داده‌های طرح «سلامت و بیماری» سال‌های 1372 و 1379 استفاده شد. در این روش با مدل‌سازی و ارتباط بین شاخص‌های شیوع سنی عفونت مزمن هپاتیت ب، نسبت مرگ مبتلایان به جامعه عادی و مرگ‌ومیر جامعه، همچنین قدرت بیماری‌زایی هپاتیت ب در هر سال برآورد گردید. توضیح این که نسبت مرگ حاملین آنتی‌ژن سطحی به غیرحاملین با مدل‌سازی تعداد مرگ در اثر سیروز، هپاتیت حاد و سرطان کبد و شیوع آنتی‌ژن سطحی در آنها و در کل جامعه برآورد شده که نتایج و شیوه کار در مقاله دیگری منتشر شده است (14).

سایر مقادیر سیر طبیعی بیماری در جامعه: سایر مقادیر و پارامترهای مورد استفاده در مدل‌سازی با بررسی متون و مقالات مروری و کتب مرجع به‌دست آمد. پس از این مرحله، همه داده‌ها با نظر متخصصین و به‌طور مستقل بررسی شد و تصحیح و تغییر لازم به‌ویژه برای تحلیل حساسیت بر روی آنان صورت گرفت. در مواردی نیز استفاده از مقادیر مرجع مستقیماً مورد تأیید قرار گرفت. اکثر مقادیر از مقالات مروری یا مقالات مبتنی بر کنفرانس‌های اجماعی هپاتیت ب به‌دست آمد (13). در مواردی که مقاله‌ای از کشور وجود داشت، مستقیماً از برآوردها و فاصله اطمینان آن استفاده شد (15). مقادیر مورد استفاده و

¹ Simulation

² State transition model

نشده‌اند نیز کاهش می‌یابد (ایمنی جامعه¹). ایمن‌سازی نوزادان بر انتقال بیماری در جامعه و گروه‌های سنی بالاتر که ایمن نشده‌اند در سال‌های پیش‌رو به‌میزان متفاوتی تأثیر می‌کند که برآورد شده و در محاسبات به کار رفت (نمودار 2). انتظار می‌رود ایمن‌سازی نوزادان در سال 1372 به بعد، احتمال بیمار شدن افراد سالم و غیرایمن جامعه را در گروه‌های سنی مختلف به میزان 35٪ در سال 1400 کاهش دهد و در سال 1430 زمانی که واکسن‌زده‌ها به 60 سال می‌رسند، به 0/1 تقلیل دهد (16). با توجه به شیوع متفاوت عفونت مزمن در سنین مختلف و تأثیر هرم سنی در شیوع کلی و میزان انتقال بیماری در آینده، از هرم سنی برآورد شده توسط صندوق جمعیت سازمان ملل از ترکیب سنی و جنسی جمعیت ایران تا سال 2050² بهره برده شد.



نمودار 2- شیوع حاملین آنتی‌ژن سطحی هپاتیت ب و نسبت کاهش در قدرت بیماری‌زایی بیماری در سالیان آینده نسبت به 1385

محاسبه شاخص اثربخشی ایمن‌سازی: اثربخشی ایمن‌سازی با تحلیل سال‌های از دست رفته در اثر مرگ زودرس (YLL) و ناتوانی (YLD) و مجموع آنها (DALY) و نیز سال‌های زندگی با کیفیت (QALY) محاسبه شد. میزان تأثیر ناتوانی و بار بیماری ناشی از آن با تحلیل سال‌های زندگی توأم با ناتوانی در اثر عوارض حاد و مزمن ابتلا به هپاتیت ب و وزن‌های ناتوانی محاسبه شد (17). وزن‌های ناتوانی مورد استفاده از کتابچه محاسبه بار جهانی بیماری‌های سال 1990 و نیز وزن‌های ناتوانی Dutch اقتباس شد (18). برآورد امید زندگی استاندارد از جدول طول عمر استاندارد Coale Demeny

شیوه گردآوری آنها در جدول 1 آمده است. انحراف معیار اشاره شده در تعدادی از متغیرها برای تحلیل حساسیت احتمالی به کار رفته است.

جدول 1- مقادیر مورد استفاده و فاصله‌های مورد قبول آنان که در محاسبات و تحلیل حساسیت به کار رفته‌اند.

متغیر	مقدار	حداقل مقدار قابل قبول	حداکثر مقدار قابل قبول	انحراف معیار	مرجع
اثربخشی واکسن	0/94	0/90	0/98	0/014	متون
شیوع موارد HBc Ab مثبت	0/05	0/02	0/10	0/015	استخراج
احتمال مرگ در هپاتیت حاد	0/0008	0/0005	0/005	0/0002	متون
درصد موارد علامتدار هپاتیت حاد	0/40	0/25	0/50	0/05	متون
احتمال مزمن شدن	0/05	0/01	0/10	0/015	متون
احتمال مزمن شدن در بیماران قبلا واکسن‌نینه	0/005	0	0/015	0/002	متون
احتمال سالانه از دست رفتن کارایی واکسن	0/043	0/01	0/06	0/015	متون
بهبودی خودبخود موارد مزمن	0/005	0/001	0/02	0/002	متون
درصد بیماران هپاتیت مزمن در کل HBs Ag مثبت‌ها	0/45	0/25	0/65	0/05	متون
احتمال تبدیل عفونت مزمن به هپاتیت مزمن	0/01	0/005	0/02	0/004	متون
احتمال تبدیل هپاتیت مزمن به عفونت مزمن	0/10	0/05	0/15	0/02	متون
میزان بروز سیروز در هپاتیت مزمن	0/033	0/02	0/04	0/005	متون
میزان بروز سرطان کبد در عفونت مزمن	0/001	0	0/002	0/0003	متون
میزان بروز سرطان کبد در سیروز	0/022	0/01	0/04	0/003	متون
میزان بروز حمله جبران نشدگی در سیروز	0/045	0/01	0/08	0/005	متون
میزان بقا سالانه سیروز جبران نشده	0/32	0/60	0/90	0/10	متون
میزان بقای سالانه سرطان کبد	0/2	0/02	0/37	0/07	متون
میزان بقای سرطان کبد در سیروز	5	0/00	0/14	1/5	متون
قدرت بیماری‌زایی هپاتیت ب در مردان:	0/013	0/006	0/021	0/0035	استخراج
>30 سال	0/032	0/016	0/047	0/008	
30 تا 50 سال	0/016	0/000	0/042	0/01	
<50 سال	0/016	0/000	0/042	0/01	
قدرت بیماری‌زایی هپاتیت ب در زنان:	0/005	0/0001	0/011	0/0025	استخراج
>30 سال	0/012	0/005	0/021	0/004	
30 تا 50 سال	0/008	0/000	0/016	0/008	
<50 سال	0/008	0/000	0/016	0/008	
پوشش ایمن‌سازی	0/85	0/70	0/95	-	متون
نرخ تنزیل سالانه	0/03	0	0/05	-	متون

تأثیر ایمن‌سازی نوزادان بر ایمنی جامعه: برنامه ایمن‌سازی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ابتلای افراد جامعه تأثیر می‌گذارد. به‌طور مستقیم به‌واسطه مقاومتی است که افراد واکسن‌زده در برابر بیماری پیدا می‌کنند (ایمنی فردی). از سوی دیگر، از آنجا که به‌واسطه وجود تعدادی فرد مقاوم در اثر ایمن‌سازی، زنجیره انتقال بیماری در جامعه قطع یا محدود می‌شود، به‌طور غیرمستقیم احتمال بیمار شدن افرادی که ایمن

¹ Herd Immunity

² World Population Prospects: The 2004 Revision and World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, <http://esa.un.org/unpp>, 02 September 2005

(که برای محاسبه بار بیماری‌های 1990 به کار رفته است) استخراج گردید (17).

نرخ تنزیل¹: از آنجا که فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان مداخله و نتایج منتظره از مداخله وجود داشته و از نظر جامعه نیز تمایل برای نتایج زودرس بیشتر می‌باشد، همچنین نیاز به افق زمانی محدود برای برآورد نتایج، لازم است تمام مقادیر به یک زمان واحد ارجاع گردد. به این منظور نرخ تنزیل سالانه معادل 3٪ برای وقایعی که در آینده رخ دهند، لحاظ شد. این نرخ تنزیل در غالب مطالعات هزینه- اثربخشی به کار رفته و توصیه می‌گردد (19). نتایج به صورت تنزیل یافته و غیرتنزیل یافته برای DALY و QALY ارایه شده ولی در تحلیل‌های حساسیت، اندازه‌ها تنها به صورت تنزیل یافته ارایه شده است.

تحلیل عدم قطعیت نتایج: تحلیل حساسیت برای تمام مقادیر مورد استفاده در مدل (به جز مقادیری چون تعداد جامعه هدف، وزن‌های ناتوانی، نرخ تنزیل و پوشش واکسن) صورت گرفت. تحلیل حساسیت به صورت دو بعدی برای هر کدام از مقادیر در مقابل بار بیماری محاسبه شده و به صورت احتمالی در حالتی که تمام مقادیر با هم در مدل قرار گرفته و با توزیع آماری مربوط به خود تغییر کنند، صورت گرفت.

در تکرار یا بازسازی تصادفی، محدوده مقادیر با فاصله اطمینان مورد نظر محاسبه می‌گردد. متغیرهایی که در مدل تأثیر هم‌زمان تغییر آنها بر بار بیماری قابل پیشگیری قرار گرفتند آنهایی هستند که در جدول 1 برای آنان انحراف معیار گزارش شده است.

برای تحلیل عدم قطعیت نتایج به دست آمده از محاسبات، براساس احتمالات مورد استفاده، تحلیل مونته کارلو صورت گرفت. در این روش، کل جامعه هدف از نظر پیامدها بازسازی شد. در تکرار بازسازی احتمالی، تعداد پیامدها در هر سال به صورت احتمالی برآورد می‌شود و بار بیماری محاسبه می‌گردد. با تکرار بازسازی احتمالی، توزیع نتایج و بار بیماری جامعه هدف به ازای هر فرد محاسبه می‌گردد. در وضعیت دیگر، بازسازی مونته کارلو به صورت فردی صورت گرفت. به این ترتیب که فرد سال‌های عمر را طی کرده و در هر سال به طور تصادفی از مراحل مختلف بیماری تا مرگ عبور می‌کند. برای وی بار بیماری که در طول عمر خود بر دوش کشیده یا تعداد سال‌های زندگی با کیفیت وی محاسبه می‌شود. در تکرار این بازسازی، توزیع و متوسط بار بیماری برای افراد (در سطح فردی) جامعه

هدف برآورد می‌گردد. محاسبات در نرم‌افزار میکروسافت اکسل صورت گرفت. تحلیل‌های عدم قطعیت احتمالی و مونته کارلو با برنامه‌نویسی در فضای ویژوال بیسیک و اکسل با الگوریتم‌های تولید اعداد تصادفی بر اساس توزیع آماری متغیر صورت گرفت (9).

نتایج

محاسبات نشان داد، انتظار می‌رود در گروه سنی نوجوانان 15 ساله از حالا تا 85 سال آینده، در مجموع 4025 مرگ در مردان و 2062 مرگ در زنان تنها به واسطه عوارض مستقیم هپاتیت ب رخ دهد که از این میان نزدیک به نیمی از آنها در اثر سرطان کبد خواهد بود. واکسیناسیون با پوشش قابل قبول 85٪، شیوع سیروز را در مردان در سنین مختلف از 30 تا بیش از 50 درصد و در زنان 10 تا 35 درصد کاهش می‌دهد. همین طور از 221 مرگ ناشی از نارسایی کبدی حاد در مردان و 95 مرگ در زنان جلوگیری می‌کند (جدول 2). این مداخله 0/047 و 0/024 سال به امید زندگی مردان و زنان گروه هدف اضافه می‌کند.

جدول 2- بار بیماری قابل پیشگیری با ایمن‌سازی در نوجوانان 15ساله در سنین مختلف

گروه سنی	DALY		YLL	
	مرد	زن	مرد	زن
15-24	214 4	5463	2089	5318
25-34	288 0	6947	2761	6650
35-44	315 0	7150	2985	6762
45-54	414 4	8698	3993	8366
55-64	439 0	8427	4268	8174
65-74	211 5	3739	2042	3594
75-84	607 1	1007	577	949
85-100	81	133	73	118
کل	19511	41562	18787	39931

در مجموع، نزدیک به 12 هزار سال زندگی با کیفیت کامل، با ارزش فعلی، به سال‌های زندگی مردان و بیش از 5 هزار سال به سال‌های زندگی زنان اضافه کرده، بیش از نیمی از DALY در اثر هپاتیت ب را در مردان کاهش می‌دهد. در مجموع، برنامه مذکور 52٪ و 36٪ از بار بیماری هپاتیت ب را در مردان و زنان کاهش می‌دهد.

تحلیل عدم قطعیت: متوسط بار بیماری کاهش یافته جامعه، به ازای هر فرد جامعه هدف در اثر ایمن‌سازی در جدول 3 نمایش داده شده است. انتظار می‌رود ایمن‌سازی، اثربخشی قابل

¹ Discount Rate

بوده و کماکان اثربخشی مداخله قابل توجه است. تحلیل حساسیت دو مقدار مهم قدرت بیماری‌زایی و نسبت جامعه واجد شرایط برای ایمن‌سازی (قبلا با ویروس برخورد نداشته‌اند) در جداول 5 و 6 دیده می‌شود.

از آنجا که شیوع هیپاتیت ب در مناطق مختلف کشور متفاوت است، تحلیل اثربخشی ایمن‌سازی در سناریوهای مختلف شیوع آنتی‌ژن سطحی ویروس صورت گرفت. همچنین از آنجا که با بالا رفتن شیوع ناقلین نسبت افرادی که قبلا برخورد داشته و بهبود یافته‌اند نیز افزایش می‌یابد، با نسبت برابر شیوع HBC Ab نیز بیشتر در نظر گرفته شد.

جدول 4- تحلیل حساسیت مقادیر مهم مورد استفاده در بازسازی سیر طبیعی بیماری در جامعه

مقدار	مرد		زن		
	QALY*	DALY*	QALY*	DALY*	
پوشش	0/0051	0/0049	0/0109	0/0108	0/75
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/85
	0/0065	0/0063	0/0138	0/0136	0/95
احتمال مزمن شدن	0/0024	0/0025	0/0053	0/0057	0/01
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/05
	0/0100	0/0095	0/0212	0/0204	0/10
نسبت هیپاتیت مزمن در تازه مزمن شده ها	0/0053	0/0051	0/0112	0/0111	0/35
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/45
	0/0063	0/0061	0/0135	0/0133	0/55
تبدیل هیپاتیت مزمن به عفونت مزمن	0/0075	0/0071	0/0160	0/0154	0/05
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/10
	0/0049	0/0047	0/0104	0/0104	0/15
تبدیل عفونت مزمن به هیپاتیت مزمن	0/0053	0/0052	0/0114	0/0114	0/005
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/01
	0/0066	0/0063	0/0141	0/0137	0/02
سیروز در هیپاتیت مزمن	0/0046	0/0045	0/0099	0/0099	0/02
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/033
	0/0064	0/0061	0/0135	0/0134	0/04
سرطان در سیروز	0/0054	0/0052	0/0114	0/0114	0/010
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/022
	0/0063	0/0060	0/0133	0/0131	0/040
میزان اولین ایزود جبران نشدگی در سیروز	0/0048	0/0046	0/0103	0/0099	0/01
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/045
	0/0061	0/0059	0/0129	0/0129	0/06
احتمال مرگ در هیپاتیت حاد	0/0052	0/0049	0/0111	0/0106	0/0005
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/0008
	0/0062	0/0061	0/0132	0/0133	0/001
سن ایمن‌سازی	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	15
	0/0063	0/0059	0/0127	0/0119	20
	0/0081	0/0070	0/0156	0/0136	30
نرخ تنزیل	0/0243	0/0209	0/0497	0/0429	0
	0/0058	0/0056	0/0124	0/0122	0/03
	0/0027	0/0027	0/0058	0/0061	0/05

جدول 5- تحلیل حساسیت بر اساس فاصله اطمینان برآورد شده برای قدرت بیماری‌زایی بیماری در جامعه

تابستان 85، دوره نهم، شماره دوم

توجهی داشته باشد که با توجه به بزرگ بودن جامعه، تا حد زیادی نیز پایدار بوده، فاصله اطمینان کوچکی را دارا است. تحلیل بازسازی فردی رخداد بیماری در هر فرد جامعه هدف نشان می‌دهد گرچه در هر دو سناریو (با و بدون ایمن‌سازی) اکثر افراد، سالی را به علت بیماری از دست نمی‌دهند ولی در مجموع نسبت افراد متحمل عوارض بیماری پس از ایمن‌سازی به‌طور معناداری کاهش یافته و متوسط سال‌های زندگی افزایش یافته است.

جدول 3- بازسازی مونت کارلو جامعه هدف برای برآورد اثر ایمن‌سازی در آنان

جنس	شاخص بار بیماری	میانگین	فاصله اطمینان 95%
مرد:	DALY	0/04250	0/04242 - 0/04258
	Discounted DALY	0/02725	0/02719 - 0/02730
	Discounted QALY	0/03017	0/02958 - 0/03075
زن:	DALY	0/02093	0/02086 - 0/02100
	Discounted DALY	0/01312	0/01308 - 0/01317
	Discounted QALY	0/02444	0/02369 - 0/02519

تعداد تکرار: 2500

ایمن‌سازی سبب می‌شود تا تعداد و نسبت افرادی که حداقل معادل یک سال عمر با کیفیت خود را در اثر ناتوانی و عارضه هیپاتیت ب از دست داده‌اند، در مردان به نصف (از 40 در 10 هزار به 20 در 10 هزار) و زنان به دوسوم (از 27 در 10 هزار به 18 در 10 هزار) کاهش یابد.

در ادامه به تحلیل حساسیت مقادیر مورد استفاده در محاسبات اشاره می‌شود. در جدول 4، تغییر نتایج نهایی در صورت تغییر پارامترهای مورد استفاده در محاسبات به‌صورت دو بعدی نشان داده شده است. در مورد تعدادی از مقادیر، مقدار تغییر در محدوده ناچیزی (کمتر از 10٪ تغییر) از برآورد قرار داشتند. این مقادیر در جدول شماره 4 نمایش داده نشده است شامل: اثربخشی واکسن (98-90 درصد)، از دست رفتن مقاومت پس از ایمن‌سازی (0/02 تا 0/06)، احتمال مزمن شدن در بیماران ایمن‌شده‌ای که در اثر از دست دادن ایمنی به هیپاتیت حاد مبتلا شده‌اند (0 تا 0/015)، احتمال بهبودی در هیپاتیت مزمن (0/001 تا 0/02)، بقا در سیروز جبران نشده (0/67 تا 0/9) و نیز وزن‌های ناتوانی با معیار Dutch و GBD90.

دیده می‌شود، صرف‌نظر از ملاحظات اجرایی و هزینه آنها، بهترین سن برای مداخله 15 تا 30 سالگی است. نتایج نشان می‌دهد در محدوده قابل قبول مقادیر مورد استفاده، نتایج پایدار

ارزیابی اثربخشی یک مداخله سلامتی نیازمند برآورد و پیش‌بینی مقدار اثری است که از آن انتظار می‌رود. این مطالعه نشان داد ایمن‌سازی جوانان 15 سال و با پوشش قابل قبول 85٪، از بیش از 1800 مرگ مردان و 800 مرگ زنان در اثر سیروز و سرطان کبد جلوگیری خواهد کرد و امید زندگی جامعه هدف را به میزان 0/047 سال در مردان و 0/024 در زنان افزایش می‌دهد. با ایمن‌سازی، 0/041 سال برای مردان و 0/011 سال برای زنان حفظ می‌شود که با احتساب نرخ تنزیل 0/02 و 0/005 خواهد شد. برای هر 20 نفر مرد و 50 نفر زن 15 ساله یک سال از دست رفته در اثر مرگ زودرس با ایمن‌سازی حفظ می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ تنزیل برای هر 100 نفر مرد و 200 نفر زن، حداقل یک‌سال عمر بالارزش در حال حاضر حفظ می‌گردد. ارزش این مقدار اثر، زمانی آشکار می‌شود که مقدار منابع لازم برای سرمایه‌گذاری نیز در نظر گرفته شود. اثرات محاسبه شده جدا از اثرات ایمن‌سازی موجب صرفه‌جویی هزینه درمان عوارض هپاتیت ب خواهد شد.

مطالعات اثربخشی ایمن‌سازی علیه هپاتیت ب در دنیا با گروه‌های هدف متفاوت و با در نظر گرفتن اثرات متفاوت صورت گرفته‌اند. مطالعه‌ای در هند بر کودکان نشان داد ایمن‌سازی به ازای هر فرد، 0/213 سال QALY را افزایش داده و 0/173 سال از دست رفته را حفظ می‌کند (8). مطالعه‌ای که در کانادا و در سال 1998 بر نوجوانان انجام گرفت نشان داد به ازای هر فرد 0/018 سال با محاسبه نرخ تنزیل 0/03 حفظ می‌شود (7). شیوع آنتی‌ژن سطحی در هند 0/04 و در نوجوانان کانادا 0/004 می‌باشد. در بررسی که دکتر ادیبی و همکاران انجام دادند هزینه هر دوز تزریق واکسن را بر اساس تعرفه‌های موجود و انستیتو پاستور 4/8 دلار برای هر دوز برآورد کرده و در محاسبات وارد کردند (20).

بر این اساس، صرف‌نظر از هزینه‌هایی که در درمان عوارض بیماری صرفه‌جویی می‌شود، مقدار سرمایه لازم به ازای هر DALY حفظ شده 1180 دلار برای مردان و 2570 دلار برای زنان می‌باشد. بر طبق معیارهای سیاست‌گذاران آمریکا، مداخلات با هزینه کمتر از 50 تا 60 هزار دلار به ازای هر QALY کاملاً کارآمد هستند (21). نمونه آن اثربخشی بیماریابی پرفشاری خون است که هزینه - اثربخشی 17500 بر QALY دارد (21). انستیتو ملی تعالی بالینی¹ که در انگلستان مرجع ارزیابی مداخلات بالینی است، مداخلات با هزینه کمتر از

جنس	قدرت بیماری‌زایی		
	Discounted QALY	Discounted DALY	50< 30 - 50 15 - 29
مرد:	0/0064	0/0063	0 0/016 0/006
	0/0124	0/0122	0/016 0/032 0/013
	0/0175	0/0175	0/042 0/047 0/021
زن:	0/0013	0/0012	0 0/005 0/0001
	0/0058	0/0056	0/008 0/012 0/005
	0/0109	0/0106	0/026 0/021 0/011

جدول 6- تحلیل اثربخشی ایمن‌سازی در شیوع متفاوت آنتی‌ژن سطحی و آنتی‌بادی مرکزی ویروس

جنس	Discounted QALY	QALY	Discounted DALY	DALY	HBsAg	HBcAb
مرد:	0/0128	0/0516	0/0127	0/0445	0/005	0/02
	0/0124	0/0497	0/0122	0/0429	0/012	0/05
	0/0115	0/0463	0/0114	0/0400	0/025	0/10
زن:	0/0060	0/0252	0/0058	0/0218	0/005	0/02
	0/0058	0/0243	0/0056	0/0209	0/012	0/05
	0/0054	0/0226	0/0052	0/0195	0/025	0/10

در جدول 7 تحلیل حساسیت احتمالی بر تعدادی از پارامترهای مورد استفاده در محاسبه صورت گرفت. در این محاسبه همه مقادیر هم‌زمان و مستقل از هم در مدل محاسبه تغییر می‌کنند تا تحلیل حساسیت به صورت توأم صورت گیرد.

جدول 7- تحلیل حساسیت احتمالی بار قابل پیشگیری بیماری بر مقادیر مورد استفاده در مدل‌سازی بیماری

جنس	معیار بار بیماری	میانگین	صدک 2/5	صدک 97/5
مرد:	DALY	0/0432	0/0204	0/0739
	Discounted DALY	0/0128	0/0065	0/0210
	Discounted QALY	0/0202	0/0116	0/0308
زن:	DALY	0/0213	0/0078	0/0409
	Discounted DALY	0/0059	0/0022	0/0111
	Discounted QALY	0/0093	0/0036	0/0163

دیده می‌شود در صورتی که محاسبات با مقادیر مورد قبول خطا در مقادیر مورد استفاده صورت گیرد و این خطاها مستقلاً در محاسبات وارد شوند، کماکان نتایج با صفر یا عدم اثربخشی برنامه، فاصله قابل توجه دارند.

بحث

¹ National Institute for Clinical Excellence (NICE)

مواردی مانند مطالعه کانادا (7) که میزان اثر مورد انتظار گزارش شده، نتایج مشابه ایران است. اثر مشاهده شده در مطالعه حاضر با وجود برنامه ایمن‌سازی نوزادان است که در مطالعات گذشته دیده نمی‌شود. اثر ایمنی جامعه ناشی از ایمن‌سازی نوزادان بر قدرت بیماری‌زایی در سالیان آینده و در نتیجه اثربخشی برنامه محاسبه شده و در نظر گرفته شد. در صورتی که این شرایط در نظر گرفته نمی‌شد، اثربخشی ایمن‌سازی بسیار بیشتر از واقع برآورد می‌گردید.

تحلیل مونت کارلو جامعه بازسازی شده نشان داد که در جامعه بزرگ نزدیک به یک میلیونی جامعه هدف در ایران، برآورد تا حد زیادی پایدار بوده و بر اساس پارامترهای موجود در جامعه هدف این مقدار اثر ایمن‌سازی با دقت زیاد قابل انتظار است. تحلیل حساسیت در محدوده قابل قبول پارامترهای مورد استفاده نشان داد که در مجموع می‌توان انتظار داشت که اثربخشی برنامه در محدوده برآورد نهایی باشد. تحلیل حساسیت احتمالی نیز نشان داد که مقدار واقعی با اطمینان 95٪ در محدوده نصف تا دو برابر برآورد قرار دارد. توجه به اثر مشاهده شده در تحلیل حساسیت‌ها و نیز تحلیل حساسیت احتمالی نشان می‌دهد که در حداقل تأثیر نیز کماکان مداخله اثری قابل توجه در بهبود سلامت جامعه و کاهش بار بیماری‌هاست. تحلیل حساسیت بر شیوع مختلف آنتی‌ژن سطحی نشان داد که در نقاط مختلف کشور که گسترش بیماری متفاوت است، کماکان برای همه مناطق می‌توان انتظار نتیجه قابل توجه را داشت. با بررسی اهمیت سن ایمن‌سازی می‌توان دریافت که انتخاب جامعه هدف در محدوده 15 تا 30 سال برای ایمن‌سازی، دارای حداکثر اثربخشی است.

از آنجا که در مطالعات هزینه-اثربخشی، اثرات مطالعه در زمان طراحی و تحلیل وجود ندارند و قابل اندازه‌گیری نیستند، بررسی اعتبار این مطالعات بسیار مشکل است. یکی از راه‌های بررسی اعتبار مدل، مقایسه نتایج مدل با مطالعات اپیدمیولوژیک بررسی ویژگی‌های بیماران است (25). مدل محاسبه نشان داد که شیوع آنتی‌ژن سطحی در خون مردان 2/6٪ و زنان 1/8٪ بین سنین 15 تا 65 سال می‌باشد. مقایسه این مقادیر با طرح «سلامت و بیماری» سال‌های 1370 و 1379 تفاوت معنا داری را نشان نمی‌دهد. بر اساس مقایسه توزیع سنی و جنسی شیوع ناقلین در مدل و این طرح، ارزش p برابر با 0/31 در مردان و 0/18 در زنان حاصل شد. این محاسبات در حالت بدون ایمن‌سازی و بدون فرض تغییر قدرت بیماری‌زایی بیماری و به عبارتی بازسازی جامعه حاضر با مدل استفاده شده است.

20 تا 30 هزار پوند به ازای هر QALY را قابل قبول می‌داند (22). دیده می‌شود که مداخله ایمن‌سازی مورد نظر، بسیار هزینه-اثربخش است. البته در مطالعه حاضر مقدار هزینه‌هایی که در اثر پیشگیری از بیماری و عوارض صرفه‌جویی خواهد شد در محاسبات وارد نشده است و در نتیجه کارآمدی واقعی، بیشتر خواهد بود.

برآورد هر دوز تزریق واکسن در مطالعه دکتر ادیبی بر اساس تعرفه‌های موجود بوده است. دولتی بودن بسیاری از خدمات سلامت در ایران و یارانه‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به آنها پرداخت می‌شود، هزینه واقعی را بسیار بیشتر برآورد می‌کند. از سوی دیگر، هزینه مداخله باید بر اساس روش مداخله برآورد گردد که در این صورت مقادیر متفاوت خواهند بود. برای مثال ایمن‌سازی در مدارس که یکی از شیوه‌های مداخله در این گروه سنی است با توجه به تمرکز جامعه هدف و اجرایی بودن آن احتمالاً هزینه‌های پرسنلی، اتلاف دوز واکسن و ... کمتر بوده ولی به واسطه گستردگی مداخله که در شهرستان‌های بعضاً دوردست نیز باید صورت گیرد، ممکن است برآوردها بیشتر از موارد فوق باشد.

در برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، هزینه برنامه برای سه دوز واکسن در ایمن‌سازی دانش‌آموزان مدارس، 17 دلار برآورد شده است. بر این اساس هزینه-اثربخشی ایمن‌سازی فوق به ازای هر DALY (با تنزیل) 1393 دلار برای مردان و 3036 دلار برای زنان می‌شود. در مطالعه‌ای در نیوزیلند (2001) برای بررسی اثربخشی ایمن‌سازی نوزادان، هزینه هر دوز واکسن به تنهایی 17/8 بر دوز برآورد شده است (23). در مطالعه مشابهی در هند هزینه هر دوز واکسن تنها 3 دلار برآورد شده است (8). در مطالعه‌ای در کانادا (1998) که ایمن‌سازی در مدارس را شیوه مداخله برگزیده بود هزینه برنامه ایمن‌سازی را برای هر فرد 23/55 دلار و واکسن را 20/07 دلار تخمین زده است (7).

در مطالعات هزینه-اثربخشی که در کشورهای با شیوع متوسط انجام شده به ندرت تعداد سال‌های عمر مد نظر بوده است. و اکثراً تعداد بیماران مزمن که با واکسن پیشگیری می‌شوند در نظر گرفته شده‌اند. مطالعات بار بیماری قابل پیشگیری اکثراً در کشورهای با شیوع کم و بسیار کم آنتی‌ژن سطحی و ویروس انجام گرفته و در زمانی بوده که قیمت واکسن بسیار بیشتر بوده است (24). از آنجا که در مطالعه حاضر هزینه‌های مداخله، مراحل و احتمالات درمان و هزینه‌های آن محاسبه نشده است، امکان مقایسه مستقیم وجود ندارد ولی در

یکی از محدودیت‌های مطالعه، نقص اطلاعات مورد نیاز برای محاسبات بود. تقریباً همه اطلاعات مورد نیاز یا از متون خارجی استخراج شد یا با مدل‌سازی و به‌طور غیرمستقیم از داده‌های دیگر به‌دست آمد. داده‌های بروز هیپاتیت حاد در کشور و سیر طبیعی آن تا عوارض نهایی یافت نشد. لذا اجباراً مقادیر از مراجع و مطالعات مشابه خارجی و مشاوره با متخصصین استخراج و انتخاب شدند. از سوی دیگر، بسیاری از داده‌ها مربوط به یک زمان و مکان نبودند. برای مثال نتایج تحلیل طرح «سلامت و بیماری» در سال‌های 1370 و 1379 با داده‌های مرگ 23 استان کشور با هم وارد محاسبه شدند.

از سویی مطالعه سعی در برآورد بار بیماری در آینده را داشت و در این راستا نیاز به برآورد مرگ‌ومیر در 50 سال آینده بود. مطالعه ثبت مرگ در کشور چند سالی است که به‌طور محدود آغاز شده و هنوز نیز کامل نمی‌باشد. استفاده از آنها در پیش‌بینی مرگ‌ومیر آینده و استفاده از روش‌های دموگرافی ممکن نبود. این مسأله باعث شد که تحلیل با داده‌های مرگ‌ومیر فعلی انجام شود. البته با کاهش مرگ‌ومیر در سال‌های آینده و افزایش طول عمر اثر مداخله بیشتر خواهد بود. به عبارتی برآورد فعلی، کم برآوردی از اثر واقعی است. در نهایت مطالعات مقطعی و طولی آینده می‌تواند صحت برآوردهای تأثیر ایمن‌سازی در وقوع پیامدهای بیماری و نیز شاخص‌های اپیدمیولوژیک بیماری در آینده را نشان دهد.

نتایج مطالعه نشان داد با وجود محدودیت‌های اطلاعاتی مذکور با اطمینان زیاد می‌توان گفت که اثربخشی ایمن‌سازی قابل توجه می‌باشد ولی برای محاسبه هزینه اثربخشی این مداخله توصیه می‌شود، هزینه‌های مداخله و درمان عوارض و نیز نتایج درمان در یک مدل هزینه- اثربخشی و توأمان مورد محاسبه قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

نگارندگان از همکاری سرکارخانم دکتر پورشمس و جناب آقای دکتر مرآت، در اجرای پروژه تقدیر می‌نمایند. قابل ذکر است بخشی از بودجه این مطالعه در قالب طرح پژوهشی از طرف معاونت پژوهشی و مابقی از اعتبارات پایان‌نامه‌های دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تأمین شده است.

از آنجا که اثر کوهورتی شدیدی در مرگ‌ومیر وجود دارد، مقایسه مستقیم میزان مرگ گزارش شده ناشی از سرطان کبد و سیروز در بررسی سیمای مرگ 23 استان نیز با مدل فعلی که بر فرض عدم وجود اثر کوهورتی است منطبق نمی‌باشد. از سوی دیگر از آنجا که اثر کوهورتی در مرگ به علل هیپاتیت و مرگ به سایر علل تقریباً برابر است می‌توان نسبت مرگ مدل را با داده‌های اولیه مقایسه کرد. در مجموع نسبت مرگ 15 تا 80 سال در داده‌های سیمای مرگ 1/31 مشابه و اندکی کمتر از برآورد مدل یا 1/44 می‌باشد که هم‌خوانی مناسبی را نشان می‌دهد. مدل در سنین پایین نسبت مرگ را بیشتر و در سنین خیلی بالا کمتر برآورد می‌کند که به علت اثر کوهورتی ذکر شده در ابتدا به عوارض می‌باشد که در فوق نیز به آن اشاره شد.

مقایسه شیوع برآورد شده آنتی‌ژن سطحی و آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن مرکزی ویروس HBC Ab با مطالعه نهانوند (اجرا شده توسط مرکز تحقیقات گوارش بیمارستان طالقانی) که یک مطالعه با نمونه‌گیری بر مبنای جامعه بوده تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد. تحلیل با آزمون مجذور کای و مقایسه توزیع آنتی‌ژن سطحی مدل با جامعه که از نظر جنسی و سنی سازگار شده باشد $p = 0/10$ و برای HBC Ab ارزش P برابر با 0/55 به دست می‌آید. علاوه بر این، مدل محاسبه برآورد می‌کند که 14٪ از مبتلایان حامل آنتی‌ژن سطحی در خون خود مبتلا به فرم فعال یا هیپاتیت مزمن هستند. این یافته با مطالعه مشابه در ایران که آن را 12 تا 14 درصد برآورد می‌کند مطابقت دارد (26).

محاسبه تأثیر واکسن تا جایی که مربوط به کوهورت مطالعه بود پیش رفت. تأثیر واکسن از طریق افزایش ایمنی جامعه در سایر کوهورت‌ها و گروه‌های سنی جامعه و همچنین فرزندان و نسل بعد جامعه هدف، مورد توجه قرار نگرفت. این فرض باعث کم برآوردی بیشتر در محاسبات شده است. جلوگیری از بیماری نوزادان جامعه هدف گرچه اهمیت زیاد دارد ولی به دلیل دور بودن اثر، مشمول تنزیل زیاد شده و تأثیر آن ناچیز است. تأثیر افزایش ایمنی جامعه در بیماری‌زایی هیپاتیت B در کوهورت هدف به دلیل ناچیز بودن در محاسبه وارد نشد. این مقدار از آن جهت ناچیز برآورد شد این گروه از لحاظ جمعیتی سهم زیادی از جامعه بالای 15 سال را ندارد لذا سهم ایمنی آنان در کل جامعه نیز قابل صرف نظر کردن خواهد بود. گرچه این مطالعه اثربخشی واکسن را در حضور برنامه فعلی ایمن‌سازی نوزادان و علاوه بر آن برآورد نموده است.

1- Goldman L, Ausiello D. Cecil Textbook of Medicine. 22 ed. W.B.Saunders. 2004.

- 2- Xu B, Hu DC, Rosenberg DM, et al. Chronic hepatitis B: a long-term retrospective cohort study of disease progression in Shanghai, China. *J Gastroenterol Hepatol* 2003; 18(12): 1345-52.
- 3- Crook PD, Jones ME, Hall AJ. Mortality of hepatitis B surface antigen-positive blood donors in England and Wales. *Int J Epidemiol* 2003; 32(1): 118-24.
- 4- Merican I, Guan R, Amarapura D, et al. Chronic hepatitis B virus infection in Asian countries. *J Gastroenterol Hepatol* 2000; 15(12): 1356-61.
- 5- Hepatitis B Immunization, Introducing hepatitis B vaccine into national immunization services. Is available at www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF01/www598pdf2001 [cited 2005]
- 6- Zali MR, Mohammad K, Farhadi S, et al. Epidemiology of hepatitis B in the Islamic Republic of Iran. *East Mediterr Health J* 1996; 2(2): 290-8.
- 7- Krahn M, Guasparini R, Sherman M, et al. Costs and cost-effectiveness of a universal, school-based hepatitis B vaccination program. *Am J Public Health* 1998; 88(11): 1638-44.
- 8- Aggarwal R, Ghoshal UC, Naik SR. Assessment of cost-effectiveness of universal hepatitis B immunization in a low-income country with intermediate endemicity using a Markov model. *J Hepatol* 2003; 38(2): 215-22.
- 9- Ross MS. *Simulation*. 3rd ed. Academic Press. 2002.
- 10- Alfonso M, Martínez-Bravo MT, Torrea JL. Mathematical Models for the Analysis of Hepatitis B and AIDS Epidemics. *Simulation* 2000; 74(4): 219-26.
- 11- Fattovich G, Stroffolini T, Zagni I, et al. Hepatocellular carcinoma in cirrhosis: incidence and risk factors. *Gastroenterol* 2004; 127 (5 Suppl 1): S35-S50.
- 12- Ahn J, Flamm SL. Hepatocellular carcinoma. *Dis Mon* 2004; 50(10): 556-73.
- 13- EASL Jury. EASL International Consensus Conference on Hepatitis B. 13-14 September, 2002: Geneva, Switzerland. Consensus statement (short version). *J Hepatol* 2003; 38(4): 533-40.
- 14- فروزان فر م، محمد ک، مجدزاده سر و همکاران. مدل‌سازی مبتلایان به عفونت مزمن هپاتیت ب و پیامدهای آن بر امید به زندگی، پایش 1385؛ (3): 163-174.
- 15- Amini S, Andalibi S, Mahmoodi M. Anti-HBs response and its protective effect in children and adults receiving Hepatitis B recombinant vaccine in Tehran. *Iran J Med Sci* 2002; 27(3): 101-5.
- 16- فروزان فر م. بررسی اثربخشی ایمن‌سازی نوجوانان در مدارس بر بار بیماری هپاتیت ب در ایران. پایان‌نامه دکترای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت. 1385.
- 17- ابوالحسنی ف. مدیریت برنامه‌های تندرستی: رویکرد نظام‌دار برای ارتقای کارایی برنامه‌های تندرستی. تهران: انتشارات برای فردا. 1383.
- 18- Mathers CD, Vos T, Lopez AD, et al. *National Burden of Disease Studies: A Practical Guide*. 2nd ed. Global Program on Evidence for Health Policy Geneva: World Health Organization. 2001.
- 19- Gold MR, Siegel JE, Russell LB, et al. *Cost effectiveness in Health and Medicine*. New York: Oxford. 1996.
- 20- Adibi P, Rezailashkajani M, Roshandel D, et al. An economic analysis of premarriage prevention of hepatitis B transmission in Iran. *BMC Infect Dis* 2004; 4: 31.
- 21- Owens D.K. Interpretation of Cost-Effectiveness Analyses. *J Gen Intern Med* 1998; 13(10): 716-7.
- 22- Devlin N, Parkin D. Does NICE have a cost effectiveness threshold and what other factors influence its decisions? A discrete choice analysis. Department of Economics, City University of London. 2003.
- 23- Harris A, Yong K, Kermod M. An economic evaluation of universal infant vaccination against hepatitis B virus using a combination vaccine (Hib-HepB): a decision analytic approach to cost effectiveness. *Aust N Z J Public Health* 2001; 25(3): 222-9.
- 24- Beutels P. Economic evaluations of hepatitis B immunization: a global review of recent studies (1994-2000). *Health Econ* 2001; 10(8): 751-74.
- 25- Russell LB. Modelling for cost-effectiveness analysis. *Stat Med* 1999; 18(23): 3235-44.
- 26- Meraat Sh, Malekzadeh R, Rezvan H, et al. Hepatitis B in Iran. *Arch Iranian Med* 2000; 3(4) page: 192- 201