

وضعیت سلامت عمومی ورزشکاران اردوهای انتخابی تیم‌های ملی بانوان

دکتر فرزانه ترکان^۱، دکتر علی کبیر^{۲*}، دکتر لاله حاکمی^۳

۱- متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوستیک، بیمارستان مرکزی وزارت نفت ۲- پزشک عمومی، مشاور متدولوژی و آمار، مؤسسه سلامت پژوهان نیکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران ۳- متخصص داخلی، فدراسیون پزشکی ورزشی

دریافت: ۸۵/۱۰/۲۳ پذیرش: ۸۶/۱۰/۲۰

Title: Assessment of general health status of athletes participating in camps for selection of female national sport teams

Authors: Torkan F, (MD); Kabir A, (MD); Hakemi L, (MD).

Introduction: Healthy women make the society healthy both somatically and psychologically. This study was planned to assess the general health status of female athletes of national teams to recognize the strengths and weaknesses of these national capitals. This will be effective in planning for improvement of health and professional performance of these athletes.

Methods: A descriptive cross-sectional study on 156 female athletes of national teams was performed in 2001 with a census method. Specialist physicians recorded information according to history, physical examination, and paraclinic. T-test, chi-square, and correlation coefficients were used in analysis.

Results: Mean age was 20.47 (19.53-21.41) years. In orthopedic assessment 96.1%, cardiovascular 74.4%, dental 29.4%, eye 69.2%, and Ear-Nose-Throat (ENT) 66% had no problem in either history or physical examination.

Conclusion: Orthopedic status was completely desirable, cardiovascular and ENT were intermediate, visual was nearly and dental status was completely undesirable. Informing and sensitizing managers about the health status of female athletes of national teams can be an effective step in planning for disease prevention, screening, and treatment of athletes. Definitely, their health promotion is directly correlated with their success.

Keywords: General health status, women's sports, national teams.

Hakim Research Journal 2008; 10(4): 34- 39.



چکیده

مقدمه: وجود زنان سالم و با نشاط مایه سلامتی جسم و روح جامعه خواهد شد. در این طرح با هدف شناخت وضعیت سلامت عمومی ورزشکاران حرفه‌ای تیم‌های ملی بانوان، سعی در شناخت نقاط ضعف و قوت این سرمایه‌های ملی داریم. این مطلب در برنامه‌ریزی جهت ارتقای سلامت و بهبود عملکرد حرفه‌ای این قشر کاملاً مؤثر خواهد بود.

روش کار: این مطالعه مقطعی- توصیفی با سرشماری ۱۵۶ ورزشکار حرفه‌ای تیم‌های ملی بانوان در سال ۱۳۸۰ صورت گرفت. در این بررسی اطلاعات مورد نیاز بر اساس شرح حال، معاینه بالینی و آزمایش‌های پاراکلینیک توسط متخصصین ثبت می‌شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از تست‌های آماری کای دو، تی و ضرایب همبستگی استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه (۲۱/۴۱-۲۱/۰۳-۱۹/۴۷) سال بود. از نظر ارتوپادی؛ قلبی؛ ۹۶/۱٪، دهان و دندان؛ ۲۹/۴٪، بینایی؛ ۶۹/۲٪ و گوش و حلق و بینی؛ ۶۶٪ در حین معاینه سالم بودند.

نتیجه‌گیری: درصد سلامت این افراد از نظر وضعیت ارتوپادی؛ کاملاً مطلوب، قلبی و گوش و حلق و بینی؛ متوسط، بینایی تا حدودی نامطلوب و دندان کاملاً نامطلوب بود. آگاه کردن و حساس کردن نسبت به وضعیت موجود سلامتی ورزشکاران حرفه‌ای تیم‌های ملی بانوان می‌تواند گامی مؤثر در جهت برنامه‌ریزی به منظور پیشگیری، غربالگری و درمان این افراد باشد. ارتقای وضعیت سلامتی این افراد قطعاً ارتباطی مستقیم با موقعیت آنها دارد.

گل واژگان: سلامت عمومی، ورزش بانوان، تیم ملی.

مقدمه

شیراز با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی^۱، نتایج حاصل نشان داد که سلامت عمومی دانشجویان رشته پزشکی در مقایسه با دانشجویان سایر رشته‌های تحصیلی بهتر است (هر چند که سلامت عمومی کلیه دانشجویان از نمره‌های برش هنجرهای ایرانی یعنی ۲۲ بالاتر می‌باشد). محققین این مقاله معتقدند که سلامت عمومی این دانشجویان، در کل، مطلوب نبوده است (۱۱). اهتمام به ورزش بانوان در کشور ما از جمله مساوی است که مورد کم‌توجهی قرار گرفته بود. خوشبختانه چند سالی است که به این امر روح تازه‌ای دمیده شده است. بر محققین است تا با تلاش در این زمینه باعث پیشرفت ورزش بانوان از نظر کمی و کیفی شوند. در این طرح با هدف شناخت وضعیت سلامت عمومی ورزشکاران حرفه‌ای تیم‌های ملی بانوان سعی در شناخت نقاط ضعف و قوت این سرمایه‌های ملی داریم. این مطلب در برنامه‌ریزی جهت ارتقای سلامت و بهبود عملکرد حرفه‌ای این قشر کاملاً مؤثر خواهد بود.

روش کار

این مطالعه مقطعی- توصیفی^۲ بر روی تمامی ورزشکاران (۱۵۶ نفر) حرفه‌ای تیم‌های ملی بانوان در سال ۱۳۸۰ صورت

وجود زنان سالم و با نشاط مایه سلامتی جسم و روح جامعه خواهد شد، زیرا مادرانی سالم خواهند شد که توانایی تولد فرزندانی سالم داشته و روحیه با طراوت آنها، باعث سرایت تازگی و نشاط در جامعه می‌شود. از آنجایی که باید خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، جوابگویی نیازهای افراد جامعه باشد، آگاهی از وضعیت سلامتی آنها بسیار ضروری است (۱). ورزش باید برای همه افراد در هر سنی توصیه شود. چرا که باعث افزایش حداکثر توده استخوانی و کاهش وابسته به سن میزان از دست دادن توده استخوانی می‌شود (۲). توصیه به ورزش در سنین پایین از اهمیت بیشتری برخوردار است چون بعضی از مطالعات (۳) عدم تأثیر قابل توجه ورزش را بر بسیاری از مشکلات جسمی از جمله شکستگی‌های استخوانی در سنین بالا نشان داده‌اند. به هر حال تأثیر مثبت ورزش بر مسایل روحی-روانی، افزایش سطح کیفیت زندگی و احساس خوب بودن، قابلیت‌های جسمی از جمله توانایی انجام کار بیشتر، قدرت عضلانی، تعادل و راه رفتن طبیعی و بسیاری فواید دیگر در هر سنی غیرقابل انکار است (۲ و ۴-۶). در مطالعه‌ای بر روی ۱۲۰ زن ۲۰ تا ۶۴ ساله شاغل در کارخانه‌های استان قزوین، ۷۶/۲٪ از ناراحتی‌های جسمانی شکایت داشتند (۱۰). در مطالعه‌ای بر روی ۱۵۳ نفر از دانشجویان شرکت‌کننده در دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شهر

¹ General Health Questionnaire (GHQ)

² Descriptive Cross-sectional

۳۴٪ در رده سنی جوانان و ۳۴٪ در رده بزرگسالان به رقابت پرداخته بودند. بیشترین افراد مربوط به شرکت کنندگان در رشته‌های هندبال (۱۸٪)، شنا (۱۷٪)، تکواندو و فوتسال (هر یک ۷٪) و بسکتبال (۹٪) بودند. سایر رشته‌ها شامل والیبال، بدمینتون، ژیمناستیک، آمادگی جسمانی، دو و میدانی و تنیس روی میز بودند که هر یک کمتر از ۵٪ از کل افراد شرکت کننده را تشکیل می‌دادند. درصد افراد دارای آنمی و میانگین هموگلوبین آنها بین رشته‌های مختلف اختلافی نداشت. نسبت MCV به عدد RBC (به میلیون) در تمام افراد دارای آنمی کمتر از ۱۳ بود. آنالیز شاخص‌های شمارش کامل سلولی (CBC) در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- وضعیت شاخص‌های شمارش کامل سلولی ورزشکاران حرفه‌ای تیم‌های ملی بانوان در سال ۱۳۸۰

میانگین و دامنه اطمینان ٪۹۵	درصد وضعیت‌های غیرطبیعی	میانگین و دامنه اطمینان ٪۹۵
۶/۱ (۵/۹-۶/۳)	<۴: ۵/۸	سلول سفید (هزار در میلی‌لیتر)
۴/۲۹ (۴/۳۳-۴/۴۵)	<۴: ۵/۱	غلول قرمز (میلیون در هزار میلی‌لیتر)
۱۲/۹ (۱۲/۷-۱۳/۱)	<۱۱: ۵/۹/۶ <۱۲: ۱۷/۳ <۱۳: ۵/۷/۷	هموگلوبین (گرم در دسی‌لیتر)
۳۹/۵ (۳۸/۹-۴۰/۱)	<۳۶: ۱۶/۷	هماتوکریت (درصد)
۹۰/۱ (۸۹/۸-۹۱/۲)	<۸۱: ۵/۸ (میکرو‌سیتوز) >۹۹: ۵ (ماکرو‌سیتوز)	حجم متوسط سلولی (MCV) (فوتولیتر)
۲۹/۵ (۲۹/۸-۲۹/۸)	<۲۶: ۴/۵ (پیکوگرم)	MCH
۳۲/۷ (۳۲/۵-۳۲/۹)	<۳۲: ۲۲/۴ (درصد)	MCHC

از نظر معاینه ارتوپدی، هیچ‌یک از افراد اختلال راه رفتی یا وضعیت بدن، مشکلات لگنی، عضلانی و تاندون نداشتند. اختلال ستون مهره‌ها در ۰/۰۶٪، مفاصل در ۲/۶٪ و اندام‌ها در ۶٪ وجود داشت. ۱/۶٪ افراد هیچ‌گونه مشکل ارتوپدی در حین معاینه نداشتند. از نظر معاینه قلب، ۰/۷٪ ضربان قلب غیرطبیعی (تند یا کند) داشتند. تعداد تنفس در همه افراد طبیعی بود. سمع قلب این افراد در ۵/۸٪ موارد غیرطبیعی بود. ۱/۲٪ نیز نوار قلب غیرطبیعی داشتند. میانگین فشار خون سیستولیک ۷۵/۲۷٪ و میانگین فشار خون دیاستولیک ۸۵/۱۰٪ و میانگین سنی ۹۱/۶۴٪ میلی‌متر جیوه بود. فقط یک نفر از افراد مورد مطالعه دارای فشار خون بالاتر از ۹۱/۶۴٪ میلی‌متر جیوه بود. در سایر افراد فشار سیستولیک کمتر از ۱۴۰ میلی‌متر جیوه بود. فشار دیاستولیک کمتر از ۹۰ میلی‌متر جیوه بود. ۴/۷۴٪ افراد هیچ‌گونه مشکل قلبی در حین معاینه نداشتند. از نظر وضعیت دهان و دندان، ۵۹ نفر (۴۱/۳٪) نیاز به ترمیم داشتند. در ۱۲ نفر (۸/۴٪) نیاز به کشیدن و ۲ نفر (۱/۴٪) نیاز به ارتودنسی وجود داشت. میانگین دندان‌های پوسیده^{۱۱} (۴/۱-۴/۹٪) Decay

گرفت. در این بررسی به روش سرشماری^۱، تمامی ورزشکاران شرکت کننده در اردوهای انتخابی تیم‌های ملی بانوان در رشته‌های هندبال (۱۸ نفر)، شنا (۱۷ نفر)، تکواندو و فوتسال (هر یک ۱۰ نفر)، بسکتبال و آمادگی جسمانی (هر کدام ۵ نفر) و تنیس روی میز، بدمینتون و ژیمناستیک (هر کدام ۴ نفر) و سایر رشته‌ها (به تعداد کمتر از ۴ نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی این افراد وضعیت ارتوپدیک از نظر متغیرهای راه رفتی^۲، حالت بدن^۳، ضایعات طباب نخاعی، لگن و مفاصل، اندام‌ها، عضلات، تاندون‌ها و سابقه تروما، وضعیت بالینی قلبی از جهت فشار خون، تعداد و شکل ضربان، تعداد و نحوه تنفس، سمع قلب و نوار قلب^۴، وضعیت دندان‌ها از نظر شکایت اصلی، معاینه بالینی، نیاز به جراحی، جرم‌گیری، معالجه لثه، درمان ریشه، ترمیم و ارتودنسی، بررسی وضعیت بالینی گوش و حلق و بینی از نظر پرده صماخ آستانه درک گفتار^۵، نمره افترراق کلام^۶، انحراف سپتوم بینی، هایپرتروفی توربینیت‌ها، شواهدی از الرژی، حفره دهان، لوزه‌ها، آدنوئید، کیست و آدنوباتی، وضعیت بالینی چشم از نظر؛ حدت بینایی، ملتحمه، مردمک، تنایج معاینه با اسلیت لامپ^۷، فوندوسکوپی و عیوب انکساری، شمارش سلولی خون^۸، کامل ادرار، اوره، کراتینین، کلسترول و تری‌گلیسرید، عملکرد کبدی (آلکالن فسفاتاز، SGPT، SGPT) همگی به روش الیزا^۹، خون مخفی در مدفوع، بررسی سابقه بیماری‌های طبی، مصرف دارو، سن، رشته ورزشی و مشخصات فردی بر اساس شرح حال، معاینه بالینی و پاراکلینیک توسط متخصصین ثبت می‌گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های میانگین، نما، انحراف معیار، درصد، تست‌های آماری محدود کای^{۱۰} و تی به وسیله نرم‌افزار SPSS استفاده شد. سطح معناداری، کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. پایندی به اصول اعلامیه هلسینکی (۱۲) در تمام مراحل طرح توسط محققین مدنظر قرار گرفت.

نتایج

میانگین سنی ۹۵٪ دامنه اطمینان) افراد مورد مطالعه ۲۱/۴۱-۲۱/۴۷ (۵۳/۲۰٪) در رده سنی نوجوانان،

¹ Census

² Gate

³ Posture

⁴ ECG

⁵ Speech Reception Threshold (SRT)

⁶ Speech discrimination Score (SDS)


⁷ Slit lamp

⁸ CBC

⁹ ELISA

¹⁰ Chi-Square

هیچ یک از افراد گلوكوزوری، بیلی روبینوری، اوروبیلینوری^۱، کست^۲ و یا نیتریت در ادرار نداشتند. میانگین ESR، (۱۵/۳-۱۴/۴) میلی متر بود. ۶۹/۶٪ افراد ESR بالای ۱۰ میلی متر و ۸/۴٪ آنها ESR بالای ۲۲ میلی متر (غیرطبیعی) داشتند. ۴۴٪ افراد به خاطر نمی آوردن که چند سال پیش واکسن کراز زده بودند که ۶۷٪ آنها در کمتر از ۵ سال گذشته و ۹۳/۲٪ در طی ۱۰ سال گذشته واکسن کراز زده بودند. میانگین زمانی که از آخرین تزریق واکسن کراز در این افراد می گذشت، ۴/۸ (۴-۵/۵) سال بود.



نمودار ۱ - درصد ورزشکاران حرفه‌ای تیم‌های ملی بانوان در سال ۱۳۸۰ که از نظر سیستم‌های مختلف بدن (بر اساس شرح حال، معاینه و پاراکلینیکی) کاملاً سالم بوده‌اند

جدول ۳، میانگین شاخص‌های بیوشیمیابی خون را نشان می‌دهد. ۱/۱٪ قند خون ناشتاً زیر ۷۰ میلی گرم درصد داشتند. اسید اوریک در ۳/۲٪ کمتر از ۲/۴ mg/dl و در ۱/۳٪ بیشتر از ۵/۷ mg/dl بود. کلسترول در ۲/۶٪ کمتر از ۲۲۰ mg/dl (طبیعی)، ۲/۴٪ در محدوده ۲۲۰-۲۶۰ mg/dl (مرزی) و ۱/۲٪ بیشتر از ۲۶۰ mg/dl (غیرطبیعی) بود. تری گلیسرید در ۱/۹۸٪ کمتر از ۱۵۰ mg/dl (طبیعی)، ۱/۲٪ در محدوده ۲۰۰-۲۰۰ mg/dl (مرزی) و ۰/۰٪ بیشتر از ۲۰۰ mg/dl (غیرطبیعی) بود. SGOT (AST) در ۱/۹۸٪ موارد کمتر از ۴۰ U/L (طبیعی) بود. آلکالن فسفاتاز در هیچ یک از افراد با توجه به مقدار طبیعی سن برای آنها، غیرطبیعی نبود. ۳۱/۶٪ سابقه بسترتی در بیمارستان، ۲۸/۴٪ سابقه عمل جراحی، ۱۵/۵٪ سابقه اخیر مصرف دارو و ۹٪ حساسیت به ماده، دارو یا نیش حشرات داشتند. هنگام یا پس از ورزش: ۳۲/۳٪ دچار سرگیجه، ۱۴/۲٪ دچار سرفه و ۷/۷٪ دچار درد قفسه سینه شده بودند. ۶/۵٪ خستگی زودتر از بقیه در حین ورزش، ۲/۶٪ سابقه فوت بستگان درجه اول به علت مشکلات

۳/۵ عدد در هر فرد بود. حداقل و حداکثر دندان‌های پوسیده^۱ افراد، صفر و ۱۵ عدد بود. میانگین دندان‌های کشیده شده^۲ (۰/۰۹-۰/۰۴۵) عدد در هر فرد بود. حداقل و حداکثر دندان‌های کشیده شده افراد، صفر و ۱۰ عدد بود. میانگین دندان‌های پُر شده^۳ (۰/۰۸-۰/۰۴۶) عدد در هر فرد بود و حداقل و حداکثر آن صفر و ۸ عدد بود. شاخص دندان‌های پوسیده، کشیده شده و پرشده^۳ به طور متوسط (۳/۳۵-۴/۷۳) ۴/۰۴ عدد در هر فرد بود. ۳۲/۶٪ فاقد دندان پوسیده، ۹۰/۲٪ فاقد دندان کشیده شده و ۹۳٪ فاقد دندان پُر کرده بودند. ۴/۳۹٪ افراد هیچ‌گونه مشکل دهان و دندان در حین معاینه نداشتند.

از نظر وضعیت گوش و حلق و بینی، ۲/۲٪ پرده گوش غیرطبیعی، ۲/۲٪ دارای SDS و SRT غیرطبیعی، ۱۰/۸٪ انحراف تیغه بینی، ۲/۲٪ هیپرتروفی شاخک‌ها، ۳/۶٪ آلرژی، ۷٪ لوزه‌های غیرطبیعی و ۰/۷٪ آتوسمی داشتند. هیچ یک از آنها مشکلات دهانی، آدنوتئید، کیست یا آدنوپاتی در سر و گردن نداشتند. ۶۶٪ افراد هیچ‌گونه مشکل گوش و حلق و بینی در حین معاینه نداشتند.

از نظر بینایی، حدت بینایی در ۲۵/۵٪ اختلال داشت. ۱/۳٪ مشکلات ملتحمه، ۲٪ مشکلاتی در معاینه خارجی چشم و ۲۷/۳٪ دارای عیب انکساری بودند. هیچ یک از افراد مشکلی در معاینه با اسلیت لامپ و معاینه فوندوسکوپی نداشتند. ۶۹/۲٪ افراد هیچ‌گونه مشکل بینایی در حین معاینه نداشتند. نمودار ۱، درصد افراد کاملاً سالم در حیطه‌های مختلف پزشکی را نشان می‌دهد. آنالیز ادراری این افراد در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۲- آنالیز ادراری ورزشکاران حرفه‌ای تیم‌های ملی بانوان در سال ۱۳۸۰

شاخص	درصد	پروتئینوری
کتونوری	۰/۶	
هماجوری	۱۲/۹	
گلوبول سفید	>۲	
گلوبول قرمز	>۲	
سلول ابی تیال	>۳	
باکتریوری	۰/۲	
متوسط	۵/۲	
شدید	۲/۶	
اندک	۱۸/۷	
موکوس	۵/۸	
شدید	۱/۳	
اندک	۳/۲	
قارچ	۱/۳	
کربستالوری		

¹ Missing² Filling³ Decay, Missing, Filling (DMF)

وضعیت بینایی تا حدودی نامطلوب و وضعیت دندان‌ها کاملاً نامطلوب بود. نداشتن بیلی‌روبینوری یا اوروبیلینوری بهمراه آزمایشات کبدی نرمال، تا حدودی ممید وضعیت سلامت کبدی این افراد است. افرادی که در سن رشد بودند، مقادیر بالای آلكالن فسفاتاز داشتند که طبیعی است.

آزمایش ادرار نسبتاً نرمال در اکثر موارد و طبیعی بودن اوره و کراتئین تمامی افراد، حاکی از عملکرد کلیوی طبیعی است. طبیعی بودن تری گلیسیرید و کلسترول می‌تواند به علت جوان بودن جمعیت مورد بررسی یا ورزشکار بودن آنها باشد. مطالعات کنترل شده در این زمینه قضایت صحیح تری خواهد داشت. به هر حال ورزش اثربخش اکاملاً شناخته شده و مثبت بر متابولیسم چربی‌ها دارد به طوری که در جمعیت مورد بررسی این مطالعه، تنها ۱/۲٪ کلسترول و ۰/۶٪ تری گلیسیرید غیرطبیعی داشتند. نداشتن هیپو و هیپرگلیسمی و گلوکوزوری، همگی نشانه سلامت افراد از نظر متابولیسم قند می‌باشد. عدم اطلاع از آخرین تزییق واکسن کزاز می‌تواند ناشی از گذشت زمان زیاد از آخرین تزییق یا سن کم افراد باشد. به هر حال در آنها که زمان مربوطه را به خاطر می‌آورند در ۹/۲٪، کمتر از ده سال از آخرین تزییق آنها می‌گذشت که کمتر از مطلوب بود. طرح‌های گسترشده‌تر و دقیق‌تر جهت تعیین پوشش واکسیناسیون کزاز، به خصوص در افراد در معرض خطر از جمله ورزشکاران نیاز است. اثر مثبت ورزش بر روی عالیم عضلانی- اسکلتی و ظرفیت عملکردی دارد (۷)، طرز راه رفت و تعادل با واسطه افزایش قدرت عضلانی اندام‌های تحتانی (۲ و ۸ و ۹)، کاهش شکستگی (۹ و ۱۹ و ۲۰)، قابلیت و توانایی ذهنی، احساس خوب بودن و بالا بردن کیفیت زندگی (۴ و ۶) و افزایش دانسیته استخوانی مهره‌ها و نه استخوان فمور (۶ و ۲۰) در مطالعات مختلف، در مکان‌های متفاوت و بر روی افراد گوناگون کاملاً ثابت شده است. در مطالعه‌ای (۲۱) نشان داده شد که اثر مثبت ورزش‌های استقامتی بر سیستم عضلانی- اسکلتی قبل از یائسگی، با توقف ورزش معکوس می‌شود. بنابراین، ادامه تمرین‌ها، هر چند با توالی و شدت کمتر جهت حفظ این نتایج سودمند که خود باعث کاهش خطر شکستگی می‌شود، توصیه می‌گردد (۸ و ۲۱). اثرات مثبت ورزش در زنان بعد از یائسگی نیز به اثبات رسیده است (۵). در مطالعه‌ای بر روی ۴۴۳ نفر در بیستمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور، علاوه بر ارزیابی سلامت آنها این افراد معتقد به ارزیابی سلامت خود و داشت آموزان بودند و آنرا نیاز جامعه دانسته و حتی در قبال هزینه‌های مالی و نیروی انسانی لازم، آنرا مقرر به صرفه می‌دانستند (۲۶).

قلبی در سن کمتر از ۵۰ سالگی، ۹٪ مشکلات پوستی، ۲۰٪ سابقه اصابت ضربه به سر، ۸٪ سابقه تشنج و ۶۹٪ سابقه گرفتگی و کرامپ عضلانی را بیان می‌کردند. ۲۰٪ مشکل بینایی یا شنوایی داشتند. ۵۴٪ سابقه ترومما و ۶٪ سابقه دیابت داشتند. ۹٪ آنها از محافظ دهان، چشم و ... استفاده می‌کردند.

جدول ۳ - شاخص‌های بیوژنیکی خون ورزشکاران حرفه‌ای
تیمهای ملی بانوان در سال ۱۳۸۰

اطمینان ۹۵٪	میانگین و دامنه محدوده
قند خون ناشتا (میلی گرم درصد)	۷۹/۸ (۷۷/۴-۸۱/۳)
نیتروژن اوره (میلی گرم درصد)	۱۲/۳ (۱۱/۷-۱۲/۸)
کراتینین (میلی گرم درصد)	۰/۵-۱/۲ (۰/۱-۰/۷-۰/۵)
اسید اوریک (میلی گرم در دسی لیتر)	۳/۷ (۲/۴-۴/۲-۴/۶)
کلسترول (میلی گرم در دسی لیتر)	۱۵۷/۸ (۱۴۹/۵-۱۶۰/۱)
تری گلیسیرید (میلی گرم در دسی لیتر)	۶۰/۰ (۵۶/۱-۶۵/۶)
SGOT (واحد در لیتر)	۱۸/۵ (۱۷/۲-۱۹/۸)
SGPT (واحد در لیتر)	۱۱/۱ (۱۰/۱-۱۲/۴)
آلکالن فسفاتاز (واحد در لیتر)	۱۱۰/۱ (۱۰۷/۱-۱۲۸/۱)

بحث و نتیجه‌گیری

مطالعات نشان می‌دهند که ورزشکاران معمولاً هموگلوبین پاییزتری از افراد بی‌تحرک دارند که تحت عنوان آنمی ورزشکاران نامیده می‌شود (۱۳ و ۱۴). کمبود آهن شایع‌ترین عامل آنمی واقعی است که شیوعی معادل ۵٪ در بین زنان ورزشکار دارد (۱۵-۱۶). مطالعات بیان‌کننده نقش مثبت سطح هموگلوبین در عملکرد ورزشکاران، به عنوان تأمین‌کننده اکسیژن بافتی است. البته هنوز در مورد هموگلوبین ایده‌آل اختلاف نظر وجود دارد (۱۸).

سابقه بستری در بیمارستان در ۳۱/۶٪، سابقه عمل جراحی در ۲۸/۴٪، هماپوری در ۱۲/۹٪، سابقه ترومما در ۵۴/۸٪ موارد می‌تواند بیان‌کننده شیوع قابل توجه بیماری‌های مزمن یا حاد و ترومما در ورزشکاران مورد مطالعه ما و تا حدودی توجیه‌گر بعضی از علل آنمی باشد. شیوع آنمی (هموگلوبین کمتر از ۱۳ گرم در دسی لیتر) در این ورزشکاران ۱۷/۳٪ بود که درصدی از آن می‌تواند مربوط به آنمی ورزشکاران باشد. با توجه به افزایش عملکرد ورزشکاران در صورت درمان آنمی واقعی براساس اکثر منابع، درمان این افراد توصیه می‌شود. تشخیص زوردرس و درمان در سطح ملی از اهمیت بارزتری برخوردار است. لذا غربالگری و پروتوكلهای پیشگیرانه توصیه می‌شود. با توجه به این که نسبت MCV به تعداد RBC (به میلیون) در همه افراد دارای آنمی، کمتر از ۱۳ می‌باشد، احتمال تالاسمی مینور بالا بوده و این مطلب قابل توجه است.

درصد سلامت این افراد از نظر وضعیت ارتودپی؛ کاملاً مطلوب، از لحاظ وضعیت قلبی و گوش و حلق و بینی؛ متوسط،

برنامه‌ریزی به منظور آموزش بهداشت دهان و دندان، گسترش خدمات غربالگری، تبلیغات از طریق رسانه‌ها و از همه مهم‌تر آگاهی دادن به مسؤولین در این زمینه، آگاه کردن و حساس کردن مسؤولین نسبت به وضعیت موجود سلامتی ورزشکاران حرفة‌ای در جهت برنامه‌ریزی به منظور پیشگیری، غربالگری و درمان این افراد. پیامد بدتر، قابلیت درمان بالاتر این گونه بیماریها در سنین پایین و آگاهی کمتر در این سنین، مؤید انجام طرح غربالگری مشکلات بینایی (به ویژه عیوب انکساری) و مشکلات دهان و دندان است. این ارقام می‌توانند پایه‌ای برای برآورد نیاز به پرسنل، امکانات، متخصصین رشته‌های مختلف و کلینیک‌های مجهز در سیستم درمانی وزارت بهداشت و درمان باشد.

References

- 1- Bailis DS, Segall A, Chipperfield JG. Two views of self-rated general health status. *Soc Sci Med* 2003;56(2):203-17
- 2- Rutherford OM. Is there a role for exercise in the prevention of osteoporotic fractures? *Br J Sports Med* 1999; 33(6):378-86
- 3- Preisinger E, Kerschan-Schindl K, Wober C, et al. The effect of calisthenic home exercises on postmenopausal fractures—a long-term observational study. *Maturitas* 2001;40(1):61- 7
- 4- Emery CF, Gatz M. Psychological and cognitive effects of an exercise program for community-residing older adults. *Gerontologist* 1990;30(2):184- 8
- 5- Caplan GA, Ward JA, Lord SR. The benefits of exercise in postmenopausal women. *Aust J Public Health* 1993;17(1):23- 6
- 6- Bravo G, Gauthier P, Roy PM, et al. Impact of a 12-month exercise program on the physical and psychological health of osteopenic women. *J Am Geriatr Soc* 1996;44(7):756- 62
- 7- Skargren E, Oberg B. Effects of an exercise program on musculoskeletal symptoms and physical capacity among nursing staff. *Scand J Med Sci Sports* 1996;6(2): 122- 30
- 8- Lord SR, Lloyd DG, Nirui M, et al. The effect of exercise on gait patterns in older women: a randomized controlled trial. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 1996;51(2):M64- 70
- 9- Ringsberg KA, Gardsell P, Johnell O, et al. The impact of long-term moderate physical activity on functional performance, bone mineral density and fracture incidence in elderly women. *Gerontology* 2001;47(1):15- 20.
- 10- شاهرخی ا. وضعیت سلامت عمومی زنان کارگر کارخانه‌های قزوین (۱۳۸۰-). مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین. پاییز ۱۳۸۲؛ ۲۸: ۳۲-۳۵.
- 11- اسدی مج، براتی سف، بهمنی ب و همکاران. بررسی میزان سلامتی عمومی و عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار شرکت کننده در دو میاد ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجله طب و تزکیه. بهار ۱۳۸۱؛ شماره ۴۳-۴۹: ۴۳-۴۹.
- 12- Smith T. Ethics in Medical Research. 1st ed. UK: Cambridge University Press; 1999: 12-49
- 13- Eichner ER. Sports anemia, iron supplements, and blood doping. *Med Sci Sports Exerc* 1992;24(9 Suppl):S315-8
- 14- Garrett WE, Kirkendall DT, Squire DT. Principles and Practice of Primary Care Sport Medicine. 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001: 293-8.
- 15- Fields KB, Fricker PA, Delaney MJ, et al. Medical Problems in Athletes. 1st ed. USA: Blackwell Science; 1997: 258-266
- 16- Magazanik A, Weinstein Y, Dlin RA, et al. Iron deficiency caused by 7 weeks of intensive physical exercise. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol* 1988;57(2):198-202
- 17- Trikas A, Tentolouris K, Katsimaklis G, et al. Exercise capacity in patients with beta-thalassemia major: relation to left ventricular and atrial size and function. *Am Heart J* 1998;136(6):988- 90.
- 18- Shaskey DJ, Green GA. Sports haematology. *Sports Med* 2000;29(1):27- 38.
- 19- Lord SR, Ward JA, Williams P, Zivanovic E. The effects of a community exercise program on fracture risk factors in older women. *Osteoporos Int* 1996;6(5):361- 7.
- 20- Robinson RJ, Krzywicki T, Almond L, et al. Effect of a low-impact exercise program on bone mineral density in Crohn's disease: a randomized controlled trial. *Gastroenterology* 1998;115(1):36- 41.
- 21- Winters KM, Snow CM. Detraining reverses positive effects of exercise on the musculoskeletal system in premenopausal women. *J Bone Miner Res* 2000;15(12):2495-503
- 22- Lord SR, Ward JA, Williams P. Exercise effect on dynamic stability in older women: a randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil* 1996;77(3):232- 6.
- 23- Berard A, Bravo G, Gauthier P. Meta-analysis of the effectiveness of physical activity for the prevention of bone loss in postmenopausal women. *Osteoporos Int* 1997;7(4):331-7
- 24- Crilly RG, Willems DA, Trenholm KJ, Hayes, et al. Effect of exercise on postural sway in the elderly. *Gerontology* 1989;35 (2-3):137- 43.
- 25- Kerschan-Shindl K, Uher E, Kainberger F, et al. Long-term home exercise program: effect in women at high risk of fracture. *Arch Phys Med Rehabil* 2000;81(3):319-23.
- 26- Gheiratmand R, Kabir A. Evaluation of general health of the managers of education and training of Iran and their attitude to the necessity of determining the general health. 20th national seminar. Tehran, Iran, 2002 July, 11-12 (unpublished data).