

مقایسه رخداد مرگ سوانح ترافیکی در محورهای درون و برون‌شهری با تکیه بر عوامل محیطی

فاطمه خسروی شادمانی^۱، حمید سوری^{۲*}، الهه عینی^۲، فرید زایری^۳، محمدرضا مهمند^۴

۱- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-۲- مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-۳- گروه آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-۴- رئیس پلیس راه کشور * نویسنده مسؤول: تهران، اوین، جنب بیمارستان طالقانی، ساختمان شماره ۲ ستاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طبقه هفتم، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها. تلفن: ۰۲۶۴۳۹۹۸۰- فاکس: ۰۲۶۴۳۹۹۸۰ پست الکترونیک: hsoori@yahoo.com

دریافت: ۹۱/۱/۲۹ پذیرش: ۹۱/۹/۲۷

چکیده

مقدمه: عوامل محیطی یکی از عوامل خطر مهم در سوانح ترافیکی می‌باشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سوانح ترافیکی و عوامل محیطی در محورهای درون و برون‌شهری انجام شد.

روش کار: بر اساس داده‌های موجود، ۱۶۱۰۷۴ نفر با پیامد فوتی و غیر فوتی وارد مطالعه شدند. عوامل محیطی مورد بررسی عبارت بودند از: نقص جاده، وضعیت روشنایی، سطح جاده، وضعیت هوا، نوع منطقه و مکان هندسی که این اطلاعات از موارد ثبت شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی کشور استخراج و مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها در قالب آمار توصیفی ارایه و تحلیل آن‌ها با آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی و انحراف معیار جامعه مورد بررسی ۳۴/۰ \pm ۱۰/۶۱ بود. ۹۱٪ مرد و ۷٪ زن بودند و جنسیت ۱/۹٪ ثبت نشده بود. مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر کشنندگی سوانح ترافیکی در محورهای درون شهری لغزنده‌گی سطح جاده ($OR=0.4/60$)، رانندگی در طلوغ آفتاب ($OR=5/30$)، جاده یخبدان و برفی ($OR=1/82$)، منطقه کوهستانی ($OR=56/84$)، منطقه کوهستانی (۱/۳۲)، رانندگی در طلوغ آفتاب (۰/۹۱)، رانندگی در طلوغ آفتاب ($OR=2/12$)، جاده خیس ($OR=1/42$)، منطقه کوهستانی (۰/۱۰)، هوا مه‌آلود ($OR=1/79$) و مکان مستقیم/سر بالای سرپایینی ($OR=1/26$) بود. همچنین اثرگذارترین متغیرها در محورهای برون‌شهری اختلاف بین سطح آسفالت و شانه راه ($OR=2/41$)، رانندگی در طلوغ آفتاب ($OR=2/10$) و مکان مستقیم/سر بالای سرپایینی ($OR=1/7$) بود.

نتیجه‌گیری: تعامل فاکتورهای هندسه محل، شرایط آب و هوایی، وضعیت روشنایی، سطح جاده، و نوع منطقه خطر تصادفات را به شدت افزایش می‌دهند. بنابراین نیازمند توجه بیشتر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در امر سوانح ترافیکی می‌باشد که مداخلاتی را روی اثرگذارترین عوامل طراحی نمایند.

گل واژگان: سوانح ترافیکی، عوامل محیطی، محورهای درون‌شهری و برون‌شهری

مقدمه

trafیکی در ایران، از جهان و منطقه مدیترانه شرقی بالاتر است^(۱). هزینه متوسط یک مورد فوت ناشی از سوانح ترافیکی حدود ۲۰۰ میلیون تومان و هزینه متوسط یک مورد معلولیت دایم ناشی از آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورد گردیده است^(۲). با توجه به چنین هزینه سنگینی که سوانح ترافیکی بر فرد و جامعه تحمیل می‌کند، باید از نظر پیشگیری و کنترل در اولویت قرار گیرد. این امر نیازمند شناسایی عوامل خطر مؤثر بر آن‌هاست. عوامل محیطی، انسانی و وسایط نقلیه در رخداد زمستان ۹۱، دوره پانزدهم، شماره چهارم

سوانح ترافیکی از مهم‌ترین مسائل بهداشت عمومی است^(۱). بر اساس پیش‌بینی پژوهه بار بیماری سازمان جهانی بهداشت، سوانح ترافیکی می‌تواند به عنوان سومین علت مرگ و ناتوانی در سال ۲۰۲۰ رتبه‌بندی شود^(۲). سوانح ترافیکی در ایران با میزان بروز سالیانه ۳۲ مورد در صد هزار نفر، دومین علت مرگ و میر و اولین علت سال‌های از دست رفته عمر به دلیل مرگ زودرس و شایع‌ترین علت مصدومیت است^(۳). به طور کلی میزان عمر از دست رفته به دلیل مرگ زودرس در نتیجه سوانح

راهور پس از اطلاع از وقوع تصادفات در کمترین زمان ممکن، کارشناسان مربوطه را به محل حادثه اعزام می‌نمایند. فرم کام ۱۱۴ توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که بر اساس وظایف قانونی، موظف به رسیدگی اولیه به تصادفات هستند تکمیل می‌گردد. در این مطالعه کلیه افراد آسیب‌دیده به دلیل سوانح ترافیکی اعم از رانندگان وسائل نقلیه موتوری با دو چرخ یا بیشتر، سرنشینان و عابرین پیاده (تعداد: ۸۶۱۰۷۴ نفر) که در سیستم مکانیزه اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات راهنمایی و رانندگی کشور (فاؤ) در سال ۱۳۸۸ ثبت شده‌اند وارد مطالعه شدند. عوامل محیطی مورد بررسی نقص جاده، وضعیت روشنایی، سطح جاده، وضعیت هوا، نوع منطقه، مکان هندسی، و نوع جاده را شامل گردید. در این مطالعه سوانح ترافیکی رخ داده از نوع جاده‌ای مدنظر بود و بر این اساس آن دسته از حوادثی که در آن‌ها حادائق یک وسیله نقلیه موتوری اعم از دو یا بیشتر از دو چرخ دخیل بودند وارد مطالعه شدند. دیگر موارد حوادثی که فاقد این شرط بودند از مطالعه حذف شدند. با روش‌های آماری توصیفی در نرم‌افزار SPSS نگارش ۲۰ به بررسی توصیفی عوامل خطر محیطی پرداخته شد. داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک تحلیل شد. در این مدل، متغیر وابسته، نوع تصادف بود که به دو طبقه حوادث فوتی ($y=1$) و غیر فوتی ($y=0$) تقسیم شد. حوادث غیر فوتی به عنوان طبقه مرجع در نظر گرفته شدند. متغیر مستقل متغیرهای کیفی چند حالته بودند که در بالا به آن‌ها اشاره گردید. اهمیت هر کدام از عوامل خطر بر اساس نسبت شانس^۱ (OR) به دست آمده می‌باشد. همچنین مدل رگرسیونی مورد استفاده در این مطالعه بر اساس متغیرهای مخدوش گر تأثیرگذار بر حوادث ترافیکی (سطح تحصیلات، شغل، عوامل انسانی، بستن کمرنده ایمنی، سرعت و وسیله نقلیه) تعديل^۲ شدند.

نتایج

میانگین سنی و انحراف معیار افراد مورد بررسی 34.02 ± 10.61 بود. ۵۱٪ مرد و ۷۱٪ زن و جنسیت ۹٪ ثبت نشده بود. از نظر تحصیلات در جامعه مورد بررسی ۴۵٪ دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم، ۴۷٪ دیپلم و فوق دیپلم، ۷٪ لیسانس و بالاتر و ۱٪ دکترا بودند. ۳۵٪ از جامعه مورد بررسی، شغل آزاد داشتند؛ ۱۸٪ راننده، ۲۸٪ بیکار، ۸٪ کارگر، ۸٪ کارمند، و ۹٪ نظامی بودند. فراوانی عوامل محیطی دخیل در سوانح ترافیکی در جدول ۱ نشان داده شده است.

¹ Odds ratio

² Adjust

سوانح ترافیکی نقش مهمی را در قبل، حین و بعد از سانجه بازی می‌کنند که باید این عوامل در بروز سوانح مورد تحلیل قرار گیرند (۶). علت سوانح ترافیکی، تأثیر پیچیده عوامل خطر متعدد شامل ویژگی‌های فردی (مانند سن و جنس)، وسیله نقلیه (مانند نوع وسیله نقلیه)، شرایط آب و هوایی و طراحی جاده و عوامل دیگر مانند نوع بروخود است (۷). بر اساس مطالعاتی که در کشور امریکا در سال ۱۹۹۷ صورت گرفت، نقش عامل انسانی در بروز تصادفات ۵۷٪ برآورد گردید و همچنین نقش عوامل محیطی و راه، معادل ۳۴٪ که از این مقدار ۳۰٪ بین محیط و انسان مشترک بود و تنها ۴٪ وابسته به شرایط محیطی بود. در رابطه با نقش تکنولوژی در تولید خودروهای ایمن‌تر برآورد شده است که فقط ۱۲٪ حوادث به تکنولوژی ساخت خودرو مرتبط می‌باشد (۸). تحقیقات اخیر، تأثیر محیط روی وقوع تصادفات را یک عامل مهم می‌دانند و نشان داده‌اند که نقش راننده، کاهش پیدا کرده و اهمیت نسبی فاکتورهای محیطی افزایش یافته است (۹). محیط شامل سیستم جاده (نقص و نوع جاده) در محیط طبیعی است که به وسیله جغرافیا، محیط طبیعی، نور و هر چیزی که می‌تواند روی حواس انسان‌ها تأثیر بگذارد تعریف می‌شود (۱۰-۱۳). برخی عوامل محیطی را به عنوان علل غیرمستقیم تلقی می‌کنند؛ زیرا به رفتار ترافیکی کاربران بستگی دارد که نحوه رانندگی خود را با شرایط محیط سازگار کنند و گاهی نیز عوامل محیطی را به عنوان عامل مستقیم تلقی می‌کنند که این امر در شرایطی مصدق دارد که استفاده کننده از راه نتواند اتفاق منجر به تصادف را پیش‌بینی کند (۱۲).

با توجه به فقدان اطلاعات معتبر از نقش عوامل محیطی در ایجاد سوانح ترافیکی در کشور، مطالعه حاضر با هدف مقایسه نقش عوامل محیطی در ایجاد سوانح ترافیکی در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری انجام شد.

روش کار

این بررسی بر اساس داده‌های موجود که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در قالب فرم کام ۱۱۴ ثبت شده است طراحی گردید. فرم‌های کام ۱۱۴ فرم‌هایی هستند که اطلاعات مربوط به حوادث همراه با علل بروز حادثه را در پنج قسمت عمده ثبت می‌کنند. این قسمت‌ها عبارتند از: اطلاعات مربوط به شرایطی که سانجه اتفاق افتاده است، مشخصات وسیله نقلیه درگیر در سانجه، مشخصات جاده، مشخصات راننده، و وضعیت قوانین رانندگی. این فرم‌ها سوانح فوتی، جرحی و خسارتخانه را در دو بخش درون‌شهری و برون‌شهری پوشش می‌دهند. پس از وقوع تصادف، واحدهای پاسگاههای پلیس راه و ایستگاههای

برون شهری ۲/۱۲ بود. سطح جاده یخبدان و برفی بالاترین نسبت شانس (OR = ۱/۸۲) را در محورهای درون شهری داشت و در محورهای برون شهری، بالاترین شانس مرگ، مربوط به سطح جاده خیس (OR = ۱/۴۳) بود. زمانی که وضعیت هوا طوفانی و غبارآلود بود، در محورهای درون شهری ۱/۷۹ و هوای ابری ۱/۴۷ برابر شانس مرگ بیشتر بود. اما در محورهای برون شهری بالاترین شانس مرگ مربوط به هوای مه آلود با نسبت شانس ۲/۱۰ و هوای برفی با نسبت شانس ۱/۷۹ بود. در رابطه با هندسه محل، در محور درون شهری بالاترین شانس مرگ را برای مسیر مستقیم سرballایی /سرپایینی ۱/۲۶ نسبت به طبقه مرجع یعنی مسیر مسطح داشت. در محورهای برون شهری بالاترین نسبت شانس برای مستقیم سرballایی /سرپایینی ۱/۷۷ و برای پیچ سرballایی /سرپایینی ۱/۳۸ بود. همچنین عوامل زمینهای مثل سن تأثیر معناداری بر وقوع تصادفات منجر به فوت نداشت و در محورهای برون شهری مردان ۲/۷۷ برابر شانس، بیشتری برای فوت داشتند.

جدول ۲- نسبت شانس عوامل محیطی در محورهای درون شهری

متغیر	طبقه	SE	OR
سن	سال	.0002	1/.2
جنس	مرد	.014	1/.3
زن			1
لطفن جاده	غضن خط اکتشی مبیر	1	.018
سایر		.016	.019
لغزندگی سطح جاده		.064	.56/84
نفس روشنایی معبر		.030	.6/16
شیب عرضی و طولی غیر استاندارد		.063	.4/34
قوس با ازویه تند		.016	.7/37
نفس روحیه انسفالت		.0065	.0-92
نشست جاده‌ای		.016	.6/40
خطاط اسٹانڈارڈ		.0004	.0-91
فقان خطاط کاری معبر		.015	.5/29
اختلاف سطح بین انسفالت و شانده‌راه		.074	.2/93
فقان شانه خاکی و پارکینگ		.017	.5/68
وجود مانع و دست‌انداز		.018	.1/52
کم عرض بودن مبیر		.013	.1/21
نفس علامه افقی		.014	.1/22
نفس علامه عمودی		.013	.1/28
ندراء			1
وضعيت روشنایی	شب	.060	.1/17
حلو		.033	.5/30
غروب		.033	.0-64
روز			1
سطح جاده	تر	.016	.1/61
سایر		.014	.0-97
روغنی و کثیف و کل آسود		.010	.0-52
شئی و خاکی		.034	.0-81
پیخستان و برپی		.014	.1/82
خشک			1
نوع منطقه	نه ماہور	.018	.0-88
کوهستان		.017	.4/60
نامشخص		.059	.1/46
هموار			1
وضعيت هوا	بارانی	.020	.0-27
ابری		.011	.1/47
مه آسود		.022	.0-41
برپی		.013	.0-72
طوفانی و غبارآسود		.010	.1/79
صف		1	
مکان هندسی	مستقمل، سربالایی، سر پایینی	.020	.1/26
پیچ سطل		.018	.0-90
پیچ، سربالایی، سر پایینی		1	.0-89
مستقمل مستطب			1

جدول ۱- فراوانی و درصد عوامل محیطی دخیل در سوانح ترافیکی در جمیعت مورد بررسی

عامل جاده	نقص عاليه عمودي	نبع محيطه	نوع جاده
٣/٣	٢٨٦٥٩	نقص عاليه افقى	نبع محيطه
٢/١	١٨٤٩٨	كم عرض بون معبر	دون شهرى
٤/٦	٣٩٥٢٧	وجود مانع و دستار	برون شهرى
٠/٤	٣١٩٤	فقطان شاهه خاكي و پاركينگ	نامشخص
٠/٢	٩٣٣	اختلاف سطح سهل اسفلات و شانه راه	نامشخص
٠/١	٥٢١	فقطان حفاظ کاردي	نامشخص
٠/٢	١٦٥٧	حفظاظ غير استاندارد	نامشخص
٠/٠٥	٣٦٤	نشست جاده امي	نامشخص
٠/٤	٢٩٩	نقص روبي اسفلات	نامشخص
٠/١	٥٦٦	شيب عرضي و طولى غير استاندارد	نامشخص
٠/١	٥١٣	قوس با راويه تند	نامشخص
٠/١	٩٦٥	نقص روشنائي معبر	نامشخص
٠/٢	١٥٢٨	لغزندگي سطح جاده	نامشخص
٠/٢	١٤٤٥	نبارد	نامشخص
٣٥/٧	٣٧١٧٥	نقص خط كاشي معبر	نامشخص
٠/١	٤٨٥	ساير	نامشخص
٥٢/٨	٤٥٨٠٣	وضعیت روشناني	نامشخص
٧٥/٣	٦٤٤٢٤-١	رور	نامشخص
٢٣/٤	٢٠١٨٨٥	شب	نامشخص
٠/٣	١٧٢٤	طلع	نامشخص
١	٨٨٢	غروب	نامشخص
٩٢/٢	٨١٢٢٣	خشک	نامشخص
٤/٦	٣٩٩١٤	تر	نامشخص
٠/٦	٥٥١٣	ساير	نامشخص
٠/٣	١٦٧	كل الولد و روغنی و کيف	نامشخص
٠/٢	١٧٧٤	شي و شاكى	نامشخص
٠/٢	١٧٤٠	يختنان و برقى	نامشخص
٩/١	٧٧٥٨٧	صف	نوع محيطه
٤/١	٣٥١٤	ياراني	نوع محيطه
٥/٢	٤٤٤٣	ابري	نوع محيطه
٠/٣	٢٢٩٢	مهالود	نوع محيطه
٠/٢٨٥	٣٤٦١	برفي	نوع محيطه
٠/١	٦٦٢	طوفاني و غير آزاد	نوع محيطه
٤٩	٤٤٤٦٣	مهاوا	نوع محيطه
٠/٧	٥٨١٤	ته ماهر	نوع محيطه
١	٨٧١	کوھستان	نوع محيطه
٤٩/١	٤٤٤٥٦	نامشخص	نوع محيطه
٦/١	٥١١٣٩٩	مستقيم سطح	نوع جاده
٢	١٧٦٠٥	مستقيم سريالاني /سر پايني	نوع جاده
٢/٨	٢٤١٤٦	پيچ مستقيم	نوع جاده
٠/٨	٦٩٧٥	پيچ / سريالاني /سر پايني	نوع جاده
٢٤/٢	٢٩٩٩٩	نامشخص	نوع جاده
٥٩/٤	٥١١٣٩٨	دون شهرى	نوع جاده
٨/٦	٧٤٣١٥	برون شهرى	نوع جاده
٣٢	٢٧٥٣٦	نامشخص	نوع جاده
١٠	٨٦٠٧٦	نامشخص	نوع جاده

جدول های ۲ و ۳ مقایسه بین عوامل خطر محیطی دخیل در سوانح رانندگی و نسبت شانس هر عامل خطر را برای مرگ در سوانح رانندگی در محورهای درون و برون شهری نشان می دهد.

نتایج مطالعه حاکی از آن است که در عامل نقص جاده در محورهای درون شهری، قوی ترین علت لغزنده جاده بود و با وجود لغزنده بودن جاده، شانس مرگ $54/84$ برابر زمانی بود که جاده فاقد نقص بود. پس از آن قوس با زاویه تندر ($OR=7/47$)، نشست جاده ای ($OR=6/40$)، نقص روش نایی معتبر ($OR=6/16$)، فقدان شانه خاکی و پارکینگ ($OR=5/29$)، شبی عرضی و طولی غیراستاندارد ($OR=4/34$)، مهم ترین ها بودند. در محورهای برون شهری، بالاترین نسبت شانس مربوط به اختلاف بین سطح آسفالت و شانه راه با نسبت شانس $2/91$ بود. در رابطه با وضعیت روش نایی، نسبت شانس فوت در هنگام طلوع آفتاب در هر دو محور، قوی ترین عامل بود که نسبت شانس آن در محورهای درون شهری $5/30$ و محورهای

مقایسه رخداد مرگ سوانح ترافیکی...

شرايط باراني و برفی سبب رطوبت سطح آسفالت و لغزندگی شدن سطح جاده شده و خطر کشنندگی حوادث ترافیکی را افزایش می دهد (۱۳). فریدستون^۴ و همکاران نشان دادند ۶٪ از تصادفات در نروژ به شرايط آب و هوایی نامناسب منتب است و شرايط باراني با افزایش کشنندگی در سوانح ترافیکي همراه است (۱۴). در دو شهر کانادا خطر تصادفات مرتبط با هوای باراني مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اين مطالعه، خطر تصادفات در هوای باراني را تا ۷۰٪ افزایش برآورد کرد (۷). خلجی و همکاران در بررسی عوامل خطر در جاده قزوین-لوشان عنوان کردند که بارش باران و وجود مه هر دو با هم شانس وقوع صدمه را افزایش می دهند (۱۵). در مطالعه دیگري آب و هوای باراني و ابری شانسي حدود ۸۵٪ داشت که تقریباً اثر محافظتي را نشان می دهد (۱۶). همچنین بررسی صدمات شدید در ایالت واشنگتن نشان داد که سطح جاده بخی و باراني احتمال تصادفات شدید را کاهش می دهد که با یافته های بررسی حاضر منطبق می باشد (۱۷) و برف ارتباط معناداري با کاهش تصادف دارد (۱۸). هوای مه آلود به دليل کاهش دید و کاهش نور، تعداد تصادفات و کشنندگی از تصادفات را افزایش می دهد (۱۹). نتایج مطالعه ما نشان داد شانس مرگ در هوای باراني و برفی و مه آلود نسبت به هوای صاف بیشتر است. در رابطه با وضعیت روشنایي، نتایج ما حاکی از آن است که نسبت شانس فوت در هنگام طلوع در هر دو محور قوى ترین عامل می باشد. برآورد شده که يك سوم از تصادفات در صبح و يك چهارم در عصر رخ می دهند (۲۰). جوویک^۵ و همکاران شانس مرگ در شب و هنگام غروب را ۲/۲۹ برآورد کردند (۲۱). اما مطالعه لى نتایج متناقضی را عنوان کرد: رانندگی در شب شانسی برابر ۰/۸۸ داشت؛ به عبارتی عامل محافظتي بود. اما مرگ در هنگام طلوع شانسی برابر ۲/۴۳ داشت (۱۷) که با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد. توجيه اين امر می تواند رانندگی مداوم در طی ساعات شب و حالت خستگی و خوابآلودگی در هنگام طلوع آفتاب باشد. همچنین، در کشور ما رانندگی برای بیشتر رانندگان به عنوان شغل دوم محسوب می شود که انجام کار مضاعف ضمن افزایش خستگی، از دقت فرد نیز می کاهد. در خصوص سطح جاده بالاترين نسبت شانس در محورهای درون شهری سطح جاده خیس و در محورهای برون شهری جاده های خاکی و سنی می باشد. ارتباط بين وقوع سوانح ترافیکی و ساختار هندسى جاده پیچیده است (۲۲). در رابطه با مكان هندسى، بالاترين نسبت

جدول ۳- نسبت شانس عوامل محطي در محورهای برون شهری

متغير	سن	سال	نخص جاده
	جنس	مرد	زن
1	.۰/۰.۲	.۰/۰.۹	نقص خطاكتشي معبر
۲/۷۷	.۰/۰.۹		سابر
			لغزندگي سطح جاده
			نقص روشنایي معبر
			شیب عرضی و طولی غير استاندارد
			قوس با زاویه تند
			نقص رویه آسفالت
			نشست جاده ای
			حفاظت غیر استاندارد
			فقدان حفاظت کاری معبر
			اختلاف سطح بين آسفالت و شانرهاه
			فقدان شانه خاکی و پارکینگ
			وجود مانع و دستاناز
			کم عرض پون معتبر
			نقص عالمي افقی
			نقص عالمي عمودي
			ندارد
			وضعیت روشنایي
			شب
			طلوع
			غروب
			روز
			سطح جاده
			تر
			سابر
			روغنی و کنیف و گل آلود
			شنی و خاکی
			یخندهان و برفی
			خشک
			نوع منطقه
			پنه ماهور
			کوهستان
			نامشخص
			هموار
			وضعیت هوای
			بارانی
			ابری
			مه آلود
			برفی
			طوفانی و غبارآلود
			صف
			مسقطی، سربالانی، سر پاییتی
			پیچ مسطح
			پیچ سربالانی، سر پاییتی
			مسقطی مسطح
			مکان هندسى

بحث

نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در بین عوامل محطي نقص جاده، قوى ترین شانس برای مرگ در محورهای درون شهری، لغزندگی سطح جاده و در محورهای برون شهری اختلاف سطح بين آسفالت و شانرهاه می باشد. بیشترین شانس مرگ در خصوص شرايط آب و هوایی در محورهای درون شهری مربوط به هوای طوفانی و غبارآلود و هوای ابری و در محورهای برون شهری بیشترین شانس مرگ در هوای مه آلود و برفی بود. لغزندگی سطح جاده يك عامل برجسته در کشنندگی سوانح ترافیکی می باشد و خطر مرگ از تصادف را به مراتب بیشتر می کند. ابدل اتی^۳ و همکاران در بررسی خود نشان دادند که

⁴ Friston
⁵ Jovic

³ Able Aty

تجویه منطقی برای این مشاهده، تعداد کم رانندگان زن در محورهای برون‌شهری و تعدد بیشتر آن‌ها در درون‌شهرها می‌باشد. از نقاط قوت این مطالعه، حجم بالای اطلاعات و استفاده از داده‌ها در سطحی ملی است که توسط پلیس راهور ثبت گردیده است. همچنین از نقاط ضعف مطالعه می‌توان به وجود خطا در ثبت اطلاعات توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و اختلال عدم ثبت کلیه مرگ‌های ناشی از حوادث ترافیکی توسط کارشناسان تصادفات اشاره کرد. موارد فوتی ارایه شده در این مطالعه مواردی است که در صحنه تصادف ثبت شده است و مؤید شدت تصادف است که با پیامد مرگ همراه می‌باشد.

نتیجه‌گیری

رانندگی در شرایط نامناسب محیطی یک چالش است که سهم بزرگی از کشندگی حوادث ترافیکی را به خود اختصاص داده است. تعامل فاکتورهای هندسه محل، شرایط آب و هوایی، وضعیت روشنایی، سطح جاده و نوع منطقه خطر تصادفات را به شدت افزایش می‌دهد. با توجه به تمرکز پلیس راه کشور بر عوامل انسانی و اعمال قوانین و کنترل نسبی عوامل انسانی، این نیاز حس می‌شود که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توجه بیشتری به عوامل طبیعی مؤثر بر سوانح ترافیکی مبذول دارند تا بتوانند مداخلاتی را روی اثرگذارترین عوامل طراحی نمایند. اصلاح محیط فیزیکی در رانندگی موجب می‌شود تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در کنترل شدت مصدومیت نمود بیشتری داشته باشد.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند از پلیس راهنمایی و رانندگی کشور جهت تأمین اطلاعات و همکاری ایشان کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند.

⁶ Barker

⁷ Zhang

⁸ Jonesa

References

- 1- Ditsuwan V, Veerman JL, Barendregt JJ, Bertram M, Vos T. The national burden of road traffic injuries in Thailand. Population Health Metrics 2011;9(1):2.
- 2- Hyder AA, Amach OH, Garg N, Labinjo MT. Estimating the burden of road traffic injuries among children and adolescents in urban South Asia. Health Policy 2006;77(10).
- 3- Hatamabadi HR, Soori H, Vafaei R, Hadadi M, Ainy E, EsnaAshari HR. Epidemiologic pattern of road traffic injuries in Tehran- Ab-ali road: a cohort study. Payesh 2011; 1 (1): 29-37. (in Persian)
- 4- Naghavi M, Jafari N, Alaeddini F, Akbari ME. Epidemiology of injuries due to external causes in the Islamic Republic of Iran. Journal of Clinical Research in Injury Prevention and Control 2012; 3 (1): 1-10. (in Persian)

- Iran. Tehran: Iranian Ministry of Health and Medical Education; 2004. (in Persian)
- 5- World Health Organization. Eastern Mediterranean Status Report on World Safety; 2010.
 - 6- Singh A, Bhardwaj A, Pathak R, Ahluwalia SK. An epidemiological study of road traffic accident cases at a tertiary care hospital in Rural Haryana. Indian Journal of Community Health 2011;23.
 - 7- Chang LY, Mannering F. Analysis of injury severity and vehicle occupancy in truck- and non-truck-involved accidents. Accident Analysis and Prevention 1999;31:579-92.
 - 8- Schick S. Accident Related Factors Actual Date of Delivery to the CEC .Version November 1. 2007.
 - 9- Andery J, Yaga S. A temporal analysis of rain- related crash risk. Accident Analysis and Prevention 1993;25(4):465-72.
 - 10- Hill JD, Boyle NL. Assessing the relative risk of severe injury in automotive crashes for older female occupants. Accident Analysis and Prevention 2006;14:148-54.
 - 11 Peden M, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C. World Report on Road Traffic Injury Prevention Geneva: World Health Organization. 2004.
 - 12- Vahab zade A. Impact human factor on the occurrence road traffic injuries in the Karaj-Ghazvin freeway in 2005 and preventive and reduced ways. Study Traffic Management 2008;8(30). (in Persian)
 - 13- Morgana A, Mannering FL. The effects of road-surface conditions, age, and gender on driver-injury severities. Accident Analysis and Prevention 2011;43:1852-63.
 - 14- Abdel-Aty MA, Radwan AE. Modeling traffic accident occurrence and involvement. Accident Analysis and Prevention 2000;32: 633-42.
 - 15- khahaji K, Majad-Zadeh R, Eshraghian MR. Risk factors due to road traffic injuries of drivers in Ghazvin-Loshan road. Iranian journal of Epidemiology 2006;3(1):27-35.
 - 16- Fridstrom L, Ingebrigtsen S. An aggregate accident model based on pooled, regional time-series data. Accident Analysis and Prevention 1991;23(5):363-78.
 - 17- Li YM. Road Traffic Casualties and Risky Driving Behavior in Hualien County, 2001–2005. Tzu Chi Medical Journal 2007;19(3).
 - 18- Toshiyuki Y, Shankar V. Bivariate Ordered-Response Probit Model of Driver's and Passenger's Injury Severities in Collision with Fixed Objects. Presented at the 81th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington; 2002.
 - 19- Fridstrøm L, Ifver J, Ingebrigtsen S, Kulmala R, Thomsen LK. Measuring the contribution of randomness, exposure, weather, and daylight to the variation in road accident counts. Accident Analysis and Prevention 1995;27(1):1-20.
 - 20- Coate D, Markowitz S. The effects of daylight and daylight saving time on US pedestrian fatalities and motor vehicle occupant fatalities. Accident Analysis and Prevention 2004;36:351-7.
 - 21- Jovic AV, Kern J, Biloglav Z. Risk factors in urban road traffic accidents. Journal of Safety Research 2006;37:93-8.
 - 22- Shankar V, Mannering F, Barfield W. Statistical analysis of accident severity on rural freeways. Accident Analysis and Prevention 1996;28(3):391-401.
 - 23- Barker J, Farmer S, Taylor M. The Development of Accident-Remedial Intervention Levels for Rural Roads. Transport Research Laboratory, Crowthorne Berks. 1999.
 - 24- Klop J. Factors Influencing Bicycle Crash Severity on Two-Lane Undivided Roadways in North Carolina. Presented at the 78th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC; 1998.
 - 25- Zhang J, Lindsay J, Clarke K, Robbins G, Mao Y. Factors affecting the severity of motor vehicle traffic crashes involving elderly drivers in Ontario. Accident Analysis and Prevention 2000. 32:117-25.
 - 26- Jones AP, Haynes R, Kennedy V, Harvey IM, Jewell T, Lea D. Geographical variations in mortality and morbidity from road traffic accidents in England and Wales. Health & Place 2008;14: 519-535
 - 27- Valent F, Schiava F, Savonitto C. Risk factors for fatal road traffic accidents in Udine, Italy. Accident Analysis and Prevention 2002;34: 71-84.

Comparison of Road Traffic Death Occurrence within Urban and Metropolitan Roads Focusing on Environmental Factors

Khosravi Shadmani F¹ (MSc Student), Soori H^{2*} (MPH, PhD), Ainy E² (PhD Student), Zayeri F³ (PhD), Mehmendar MR⁴ (PhD Student)

¹ Department of Epidemiology, Faculty of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³ Department of BioStatistics, Faculty of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Rahvar Research Center, NAJA University, Tehran, Iran

Received: 17 Apr 2012, Accepted: 17 Dec 2012

Abstract

Introduction: Environmental factors are among important risk factors in road traffic injuries. This study was conducted to compare road traffic death occurrence within urban and metropolitan roads focusing on environmental factors

Methods: A descriptive study was carried out using existing data on 8610740 subjects with fatal and nonfatal outcomes. Environmental factors included road defects, light conditions, road surface, weather condition, and type and location of geometric. Data were collected by traffic police. Findings were presented using descriptive statistic and were analyzed using logistic regression test.

Results: Mean \pm SD of age was 34.02 ± 10.61 . Majority of subjects were male (91%), 7.1% were women and gender of 1.9% of the subjects were not recorded. The most important factors affecting case fatality traffic accidents within metropolitan were huk slippery road surface ($OR= 56.84$), driving during sunrise ($OR= 5.30$), icy roads and snowy weather ($OR= 1.82$), mountainous region ($OR= 4.60$), windy and dusty air ($OR= 1.97$), and straight /uphill /downhill road ($OR= 1.26$), respectively. The most effective factors within urban areas were the difference between level of suburban pavement and road shoulders ($OR= 2.91$), driving during sunrise ($OR= 2.12$), wet road ($OR= 1.42$), mountainous region ($OR= 1.32$), foggy weather ($OR= 2.10$), and straight /uphill /downhill road ($OR= 1.7$), respectively.

Conclusion: Interaction of factors including local geometry, weather conditions, lighting conditions, road surface, and type of region increased severity of road traffic injuries. Policy makers should pay more attention on traffic accidents to plan interventions in order to reduce death rates.

Key words: road traffic injury, environmental factors, metropolitan, urban roads

Please cite this article as follows:

Khosravi Shadmani F, Soori H, Ainy E, Zayeri F, Mehmendar MR. Comparison of Road Traffic Death Occurrence within Urban and Metropolitan Roads Focusing on Environmental Factors. Hakim Research Journal 2013; 15(4): 339- 345.

*Corresponding Author: Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Department of Epidemiology, Faculty of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Tel: +98- 21- 22439980, Fax: +98- 21- 22439980, E-mail: hsoori@yahoo.com