

بررسی وضعیت PPD، پدیده یادآور و آزمون پوستی استاندارد آنژی در

بیماران همودیالیزی مزمن

دکتر زهره امین زاده* - دکتر آیدین پور کاظمی** - دکتر فرهاد یغمایی*** - دکتر لطیف گچکار****

*دانشیار و متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیمارستان لقمان حکیم

**دستیار بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیمارستان لقمان حکیم

***متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیمارستان لقمان حکیم

****دانشیار و متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیمارستان لقمان حکیم

تاریخ دریافت مقاله: ۸۲/۳/۱۵

تاریخ پذیرش: ۸۳/۲/۱۱

چکیده

مقدمه: شیوع بیماری سل در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و تحت همودیالیز ۱۶ برابر دیگر افراد جامعه است. نتیجه انجام آزمون پوستی توپر کولین در ۳۰ تا ۴۰ درصد موارد منفی (کمتر از ۵ میلی متر) و نتیجه آزمون پوستی استاندارد آنژی در این گروه در ۴۰ تا ۴۵ درصد موارد منفی می‌باشد. شناخت وضعیت این میزان از بیماران فوق در بررسی وضعیت عفونت سل کمک کننده است.

هدف: این تحقیق به منظور بررسی وضعیت آزمون توپر کولین و نیز بررسی آنژی پوستی در بیماران همودیالیزی مزمن صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و مشاهده‌ای بود. بر روی ۴۳ بیمار همو دیالیزی در واحدهای دیالیز بیمارستان‌های طالقانی و مدرس آزمون پوستی توپر کولین و آزمون پوستی آنژی با استفاده از محلول توکسوئید دیفتری و کراز در دست فاقد فیستول به فاصله ۱۰ سانتی متر از هم انجام شد. نتیجه پس از ۴۸–۷۲ ساعت قرائت شد بیمارانی که آزمون پوستی توپر کولین کمتر از ۱۰ میلی متر داشتند دوباره PPD شدند.

نتایج: میانگین سنی بیماران در این مطالعه $۵۶/۶ \pm ۵/۷$ سال، مدت دیالیز $۵/۶ \pm ۵/۷$ ماه و دفعات دیالیز $۵/۴ \pm ۲/۹$ بار در هفته بود. اندوراسیون حاصل از تردیق PPD بار اول $۷/۱ \pm ۴/۱$ میلی متر و $۱۶/۳$ ٪ دارای تست منفی (کمتر از ۵ میلی متر) و $۵/۳ \pm ۵/۰$ ٪ دارای نتیجه بینایینی (از ۵ تا ۱۰ میلی‌متر) بود. اداری پاسخ مثبت (امساوی با پیشتر از ۱۰ میلی متر) بودند. بین نتیجه PPD نخست و سن همبستگی ضعیف وجود داشت که از لحاظ آماری معنادار نبود. بین نتیجه PPD نخست و سابقه سل رابطه معناداری وجود نداشت. بین مدت دیالیز و اندازه PPD بار اول همبستگی ضعیف وجود داشت که از لحاظ آماری معنادار نبود. بین نتیجه آزمون پوستی آنژی و سن رابطه معنی داری وجود داشت. اندازه اندوراسیون آزمون آنژی $۳/۹ \pm ۲/۲$ میلی متر بود که در $۱۸/۶$ ٪ موارد پاسخ منفی (کمتر از ۲ میلی متر) بود. $۸۳/۲$ ٪ از بیماران دارای PPD نخست کمتر از ۱۰ میلی متر، آزمون آنژی مثبت داشتند. $۲۸/۶$ ٪ بیماران نتیجه منفی برای هر دو آزمون آنژی و PPD بار اول نشان دادند. میزان اندوراسیون آزمون آنژی $۲/۸ \pm ۲/۴$ میلی‌متر بود و نفر از کل بیماران ($۴/۶$ ٪) دارای نتیجه آزمون آنژی کمتر از ۲ میلی‌متر و توپر کولین بار اول و دوم کمتر از ۵ میلی متر گردیدند.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه ۱۴% از بیماران با نتیجه آزمون آنژی منفی، در آزمون توپر کولین دوم نتیجه مثبت نشان دادند به نظر می‌رسد در بیماران همودیالیزی استفاده از ترکیب آزمون توپر کولین و پدیده یادآور و آزمون پوستی آنژی بهتر از بکاربردن آزمون توپر کولین به تهایی در غربالگری سل باشد.

کلید واژه‌ها: سل / نارسایی مزمن کلیه - تشخیص / همودیالیز خون

مقدمه

آزمون پوستی استاندارد آنژی در بیماران همودیالیزی $۷/۳۳$ ٪ (۳) و در مطالعه دیگر $۴/۴۰$ ٪ (۴) منفی بوده است. آزمون توپر کولین منفی (کمتر از ۵ میلی متر) در $۰/۴۸$ ٪ (۵) و $۰/۳۵$ ٪ (۶) و $۰/۳۲$ ٪ (۷) گزارش شده است. با توجه به اینکه حدود ۸۰۰۰ بیمار همودیالیزی در کشور ما وجود دارند،

بیماری سل یک مساله عمده بهداشتی در جهان است و سالانه ۳ میلیون نفر به دنبال ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می‌دهند(۱). شیوع بیماری سل در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه و تحت همودیالیز تا ۱۶ برابر دیگر افراد جامعه گزارش می‌شود(۲). در یک بررسی

طولي سفتی در فرم اطلاعاتی ثبت می شد.

در این مطالعه آزمون پوستی PPD با اندوراسیون کمتر از ۵ میلیمتر منفی، بین ۵ تا ۱۰ میلی متر مشکوک و ۱۰ میلی متر و بیشتر مثبت تعریف شد. در مورد آزمون پوستی آنرژی، اندوراسیون زیر ۲ میلی متر منفی و مساوی یا بیشتر از ۲ میلی متر مثبت تلقی شد. بیماران دارای PPD کمتر از ۱۰ میلی متر برای انجام آزمون یادآور با محلول PPD انتخاب شدند. روش آزمون یادآور و مواد آن مشابه آزمون بار اول بود و یک هفته بعداز آزمون نخست انجام شد. محل انجام PPD در بار دوم دست کم ۱۰ سانتیمتر از محل تزریق PPD اول فاصله داشت. نتیجه آزمون دوم ۴۸-۷۲ ساعت بعد حوانده شد.

بیمارانی که نتیجه تست PPD اول و دوم آنها کمتر از ۵ میلی متر و نتیجه تست آنرژی آنها نیز کمتر از ۲ میلی متر بود به عنوان آنرژی واقعی در نظر گرفته شدند. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS11 انجام شد.

نتایج

در این تحقیق ۳۴ بیمار (۲۳ مرد و ۲۰ زن) با سن 56.6 ± 5.7 سال مورد بررسی قرار گرفتند. مدت دیالیز این افراد 1.2 ± 0.7 سال و دفعات دیالیز آنان 0.3 ± 0.9 بار در هفته بود.

دو نفر (۷٪) سابقه ابتلا به سل را ذکر می کردند. ۸ نفر (۱۸٪) سابقه واکسیناسیون BCG داشتند و ۲۱ نفر شان (۴۸٪) سابقه چنین تزریقی را ذکر نمی کردند. ۱۴ بیمار (۳۲٪) هم اطلاعی نداشتند.

در اولین تزریق PPD مقدار اندوراسیون ایجاد شده 7.1 ± 4 میلی متر بود. ۷ بیمار (۱۶٪) تست منفی (PPD کمتر از ۵ میلی متر) و ۲۳ بیمار (۵۳٪) نتایج بینایی نی (B) مساوی یا بیش از ۵ میلی متر و کمتر از ۱۰ میلی متر) و ۱۳ بیمار (۳٪) آزمون توبرکولین مثبت (PPD مساوی بیش از ۱۰ میلی متر) داشتند.

بین اندازه پاسخ به آزمون پوستی PPD بار اول و جنس

(۶)، شناخت وضعیت ایمنی آنها در بررسی وضع عفونت سلی آنها کمک کننده است.

این تحقیق برای بررسی وضعیت آزمون توبرکولین، پدیده یادآور و آنرژی پوستی نسبت به آزمون استاندارددر بیماران همودیالیزی مزمن، انجام شده است.

مواد و روش ها

کلیه بیماران همودیالیزی مراکز دیالیز بیمارستان های طالقانی و مدرس که در طول انجام طرح در آن مرکز دیالیز می شده و شرایط واحد آماری را داشتند انتخاب شده و از آنها رضایت کتبی برای شرکت در این مطالعه گرفته شد.

روش بررسی توصیفی، و ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه و مشاهده بود. بعد از کسب موافقت مسئولین از خرداد ۱۳۸۲ تا تیر همان سال با مراجعت به بخش دیالیز بیمارستان های طالقانی و مدرس، تمام بیمارانی که دست کم ۲ ماه از شروع دیالیز شان می گذشت و حداقل ۲ نوبت در هر هفته دیالیز می شدند وارد مطالعه شدند.

بیمارانی که به هر نحو اشکال سیستم ایمنی (مثل عفونت HIV) داشتند از مطالعه کنار گذاشته شدند. در ابتدا اطلاعات دموگرافیک مانند سن، جنس، محل سکونت، سابقه واکسیناسیون BCG، مدت دیالیز و تعداد دفعات دیالیز در هفته در پرسشنامه اختصاصی نوشته می شد. سپس در قسمت قدامی ساعد دستی که همودیالیز از آن انجام نمی شد، ۰/۱ سی سی محلول توبرکولین (PPD) ۵ واحدی ساخت انتستیتوپاستور ایران، با سرنگ انسولین با سر سوزن شماره ۲۶ به روش داخل جلدی (روش ماتتو) تزریق و محل آن علامت گذاری می شد.

سپس همزمان ۰/۱ سی سی محلول توکسوئید دیفتری و کزان (Td) رقیق شده با نرم ال سالین به اندازه ۱/۱۰ در فاصله ۱۰ سانتیمتری محل تزریق PPD، داخل جلد تزریق و محل آن نیز علامت گذاری می شد. پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت از زمان تزریق، سفتی حاصل از تزریق به روش

کمتر از ۱۰ میلی‌متر بود، یک نفر از انجام آزمون توبرکولین دوم امتناع کرد. به این ترتیب در ۲۹ نفر آزمون PPD بار دوم انجام شد که میزان سفتی در آنها $\pm 2/8 \pm 2/4$ میلی‌متر بود که در این میان در ۵ نفر (۷٪) نتیجه منفی (اندوراسیون کمتر از ۵ میلی‌متر)، ۱۶ نفر (۲۳٪) سفتی ۵ تا ۱۰ میلی‌متر و فقط در ۸ نفر (۱۱٪) نتیجه آزمون مثبت بود. ۲ بیمار (۴٪) از کل بیماران نتیجه آزمون توبرکولین بار اول و دوم کمتر از ۵ میلی‌متر و نتیجه آزمون آنرژی کمتر از ۲ میلی‌متر و در واقع آنرژی واقعی داشتند.

بحث و نتیجه گیری

در این تحقیق، در ۳۰/۲٪ افراد همودیالیزی، نتیجه آزمون توبرکولین مثبت شد که مشابه مطالعه Smirnoff و Woeltje همکاران (۴) و Fang (۱۱) است ولی با مطالعه (۳و) تفاوت دارد زیرا در بررسی ایشان آزمون توبرکولین مثبت (۳٪ و ۱۰٪) بوده است، شاید علت این تفاوت ناشی از انديميك بودن سل در كشور ما باشد. در اين مطالعه بين مقدار پاسخ آزمون توبرکولين و متغيرهای جنس، سابقه BCG و مدت زمان دیالیز رابطه معنی‌داری وجود نداشت. که مشابه مطالعه Smirnoff (۴) و Woeltje (۳) و Alaattin (۵) است.

در اين بررسی بين نتیجه آزمون پوسٽي آنرژي، جنس و سابقه تزریق BCG رابطه معنی‌داری وجود نداشت که مشابه مطالعه Woeltje (۸) است. ولی بين نتیجه آزمون پوسٽي آنرژي و سن رابطه معنی‌داری بدست آمد (به ترتیب $P = 0/041$ و $P = 0/015$) که با مطالعه Fang (۱۱) هم خوانی داشت. همچنین بين نتیجه آزمون پوسٽي آنرژي و مدت زمان دیالیز رابطه معنی‌داری بود که در مطالعه هاي مشابه اين مساله را ذكر نکرده بودند.

در مطالعه حاضر برای ۲۹ بیماری که اندازه آزمون PPD اول آنها کمتر از ۱۰ میلی‌متر بود، دوباره آزمون PPD انجام شد که ۸ نفر (۶٪) از آنها پاسخ بيش از ۱۰ میلی‌متر نشان دادند. در مطالعه فرج بخش (۶) میزان پاسخ

رابطه معنی‌داری وجود نداشت ($P = 0/47$). همچنین بين اندازه پاسخ به آزمون پوسٽي PPD و سابقه تزریق BCG ارتباط معنی‌داری بدست نیامد.

بين نتیجه آزمون پوسٽي توبرکولین بار اول و سن همبستگي ضعيف ($p = 0/176$) وجود داشت که از لحاظ آماري معنی دار نبود.

و نيز بين مدت دیالیز و اندازه آزمون پوسٽي PPD بار اول همبستگي ضعيف وجود داشت. که از لحاظ آماري معنی دار نبود.

اندازه سفتی ايجاد شده در آزمون آنرژي $\pm 2/8 \pm 2/9$ بود. ۳۵ بیمار (۸۱٪) پاسخ مثبت (اندوراسیون مساوی يا بيشتر از ۲ ميلى متر) و ۸ بیمار (۱۸٪) پاسخ منفي (اندوراسیون کمتر از ۲ ميلى متر) داشتند. در ۲۵ نفر PPD (۸۳٪) از ۳۰ بیماری که در آزمون پوسٽي بار اول PPD کمتر از ۱۰ ميلى متر داشتند، نتیجه آزمون آنرژي مثبت بود. از ۷ بیماری که نتیجه PPD بار اول آنها کمتر از ۵ ميلى متر بود، ۵ نفر (۱۴٪) پاسخ مثبت (مساوي يا بيش از ۲ ميلى متر) و در دو بیمار (۶٪) نتیجه هر دو آزمون PPD بار اول و آنرژي منفي بود.

از ۳۶ بیماری که نتیجه PPD بار اول آنها بيش از ۵ ميلى متر بود، تنها در ۶ نفر (۱۷٪) پاسخ به آزمون آنرژي منفي بود.

بين نتیجه آزمون پوسٽي آنرژي و جنس رابطه معنی‌داری وجود نداشت ($P = 0/453$). بين نتیجه آزمون پوسٽي فوق و سن ارتباط معنی‌داری وجود داشت. به اين ترتیب که با افزایش سن نتیجه آزمون پوسٽي آنرژي منفي بيشتر بود. بين نتیجه آزمون پوسٽي آنرژي و سابقه تزریق BCG (۷۵٪) و نيز سابقه سل ارتباط معنی‌داری وجود نداشت ($P = 0/949$). بين نتیجه آزمون پوسٽي آنرژي و مدت زمان دیالیز ارتباط معنی‌داری بدست آمد ($P < 0/041$). بين مقدار اندازه پاسخ آزمون PPD بار اول و آزمون آنرژي همبستگي ضعيفي ($P = 0/192$) وجود داشت که از لحاظ آماري معنی دار نبود.

از ۳۰ بیماری که نتیجه آزمون توبرکولین بار اول ایشان

به اینکه در مطالعه ایشان آزمون بار دوم در بیمارانی انجام همودیالیزی نتیجه آزمون توبرکولین منفی شد. تنها در ۶/۴٪ بیماران، آزمون آنرژی و PPD بار اول و دوم همگی منفی بودند که به عنوان آنرژی واقعی تلقی شد در ۱۴٪ بیماران با توجه به آزمون آنرژی منفی، پدیده یادآور PPD مشبت بود. به نظر می رسد که در غربالگری سل در بیماران همودیالیزی، استفاده از ترکیب آزمون توبرکولین و پدیده یادآور و آزمون بولنی آنرژی بهتر از بکار بردن آزمون توبرکولین به تنها بی باشد.

مشبت بعد از آزمون بار دوم ۱۱٪ بوده است. با توجه شد که PPD کمتر از ۵ میلیمتر در بار نخست داشتند و ۱۱٪ بیش از ۵ میلیمتر و ۱۱٪ سبقتی بیش از ۱۰ میلیمتر نشان دادند. اختلاف نتیجه این تحقیق و مطالعه فرج بخش قابل توجیه است.

این تحقیق نشان داد که ۱۶/۳٪ بیماران همودیالیزی، آزمون PPD بار اول منفی داشتند، در حالی که نتیجه آزمون آنرژی در ۱۸/۶٪ آنها منفی بود. با انجام آزمون PPD بار دوم و بررسی پدیده یادآور، فقط در ۷٪ بیماران

منابع

1. Haas DW. *Mycobacterium Tuberculosis*. In: Mandell, et al. *Principles and Practice of Infectious Diseases*. 5 th ed. New york: Churchill Livingstone, 2000:2576.
2. Sasaki S, Akiba T, Suenaga- M., et al. Ten Year's Survey of Dialysis Associated Tuberculosis. *Nephron* 1979;24(3): 141-5.
3. Woeltje KF, Kilo CM, Johnson K. et al. Tuberculin skin Testing of Hospitalized Patients. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 1997;18: 561 -565.
4. Smirnoff M, Patti C, Seckler B, et al. Tuberculosis and Anergy Skin Testing of Patients Receiving Long-term Hemodialysis. *Chest* 1998; 113: 25 –27.
5. Yildiz, A. et al. Tuberculin Responsiveness Hemodialysis Patients. *Chest* 1998; 114: 947 –948.
- ۶- فرجبخش، م: بررسی وضعیت آزمون جلدی توبرکولین و پدیده یادآوری در بیماران همودیالیزی
- بیمارستان لبافی نژاد سال ۱۳۷۸. پایان نامه چاپ نشده دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۸.
7. Sokel JE. Measurement of Delayed Skin Test Responses. *NEJM* 1975;293: 501-502.
8. Keith F, Woeltje, Allen Mathew, et al: Tuberculosis Infection and Anergy in Hemodialysis. *Am J Kidney Dis* 1998; 31(5): 848-852.
9. Morrow R, Fanta J, et al: Tuberculosis Screening and Anergy in a Homeless Population. *J Am Board Fam Pract* 1997; 10(1): 5.
10. Simon TA, Pauls, et al. Tuberculosis in Hemodialysis Patients in New Jersey: A Statewide Study. *Infect Control Hospital Epidemiol* 1999; 20(9): 607 –609.
11. Fang HC, Chou KJ, et al. Tuberculin Skin Test and Anergy in Dialysis Patients of a Tuberculin Endemic Area. *Nephron*. 2002; 91(4): 682 –7.

Survey of PPD Status, Booster Phenomena and Standard Skin Anergy Test in Chronic Hemodialysis Patients

Amin zadeh Z., Poor kazemi I., Yaghmaei F., Gach kar L.

Abstract

Introduction: The incidence of tuberculosis among patients with chronic renal disorders and under hemodialysis is sixteen times more as compared to other individuals of the society and the findings of tuberculin skin test in this group were negative in 30-40% of cases. To ascertain the immunity status of the above patients is helpful in analyzing the status of tuberculosis infection.

Objective: This research has been undertaken to evaluate the status of tuberculin test and the phenomenon of remembering as well as to evaluate the skin anergy among the patients of chronic hemodialysis.

Materials and Methods: The method of research is descriptive and its data collection tool was interview and observation. Forty-three hemodialysis patients from Taleghani and Modares hospitals were subjected to tuberculin skin test and anergy. Skin test with the use of tetanus and diphtheria toxoid solution was carried out on the hand without fistula within a 10 CM distance. The result was announced after 48-72 hours. Those patients whose tuberculin skin test was less than 10 mm were subjected once again to PPD.

Results: The average age of the patients under study was 56.6 ± 5.7 . The time of dialysis was 54.2 ± 67.1 months and the instances of dialysis were 2.9 ± 0.3 times per week. First PPD induration was 7.1 ± 4 and 16.3 % of test findings were negative (<5 mm) and 53.5 % had induration measurement of 5- 10 mm and 30.2 % had positive result of more than 10 mm. There was a weak correlation between the findings of first PPD and age, which was statistically insignificant.

There was not significant correlation between the findings of first PPD and tuberculosis precedence. There was a weak correlation between the time of dialysis and the first time PPD measurement, which was statistically insignificant. Induration measurement of anergy test was 3.9 ± 2.8 ; the result of this test was negative (<2 mm) in 18.6% of the patients. 83.3% of the patients with the result of less than 10 mm on the first PPD test were positive on anergy test, 28.6 % of patients had negative results for both tests of anergy and first PPD. The indurations balance of second PPD was 7.4 ± 2.8 mm and 2 patients (4.6 %) out of the total patients had result of less than 5 mm on first and second tuberculin test and showed the result of less than 2 mm on the anergy test.

Conclusion: In attention to 14% of cases with negative results on anergy test who showed positive result on tuberculin test, it's suggested that PPD and Booster tests in combination with anergy tests can be better than using tuberculosis screening in hemodialysis patients.

Key words: Kidney Failure, Chronic/ Tuberculin Test / Tuberculosis