

بررسی میزان همخوانی هیستروسالپینکوگرافی با لایپاراسکوپی در تشخیص علل

لوله‌ای - صفاقی زنان نازا

دکتر زبیا ظهیری سروری* - دکتر رویا فرجی*

*استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳/۳/۸۳

تاریخ پذیرش: ۲۵/۷/۸۳

چکیده

مقدمه: هیستروسالپینکوگرافی یک روش تهاجمی در بررسی بیماریهای لوله‌های رحم در زوجهای نازاست و بعنوان تست غربالگری بکارهای دارد. لایپاراسکوپی standard تشخیص بیماریهای لوله‌ای است، اما چون روش تهاجمی می‌باشد بعنوان تست غربالگری نیست و در موارد خاصی انجام می‌شود نتایج متناقضی در مطالعات مختلف در مورد میزان همخوانی هیستروسالپینکوگرافی با لایپاراسکوپی موجود است.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان همخوانی هیستروسالپینکوگرافی با لایپاراسکوپی در بررسی بیماریهای لوله‌ای رحم می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کلیه ۲۰۰ بیمار نازایی که جهت بررسی فاکتور لوله‌ای تحت هیستروسالپینکوگرافی قرار گرفته بودند، تحت عمل لایپاراسکوپی در بیمارستان الزهراء(س) در سال ۱۳۷۸-۸۱ قرار گرفتند و سپس حساسیت و ویژگی، ارزش پیشگویی کننده مثبت و ارزش پیشگویی کننده منفی هیستروسالپینکوگرافی در مورد آنسداد لوله‌های رحمی - هیدروسالپتیکس - چسبندگیهای صفاقی و اندومتریوز محاسبه شد و سپس میزان همخوانی HSG با لایپاراسکوپی در موارد بالا محاسبه گردید.

نتایج: میانگین مدت نازایی $1/5 \pm 0/8$ سال بود. میانگین مدت نازایی $1/3 \pm 0/8$ سال گزارش شد. نتایج نشان داد که حساسیت و ویژگی HSG در بسته بودن لوله‌ها و میزان همخوانی آن با لایپاراسکوپی به ترتیب $81\%-81\%$ و $60\%-60\%$ بود حساسیت و ویژگی هیستروسالپینکوگرافی در تشخیص هیدروسالپتیکس و میزان همخوانی آن با لایپاراسکوپی به ترتیب $95\%-95\%$ و $79\%-79\%$ می‌باشد. حساسیت و ویژگی هیستروسالپینکوگرافی در تشخیص چسبندگیهای صفاقی، اندومتریوز و میزان همخوانی آن با لایپاراسکوپی به ترتیب $17\%-17\%$ می‌باشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در مقایسه با روش Gold standard، هیستروسالپینکوگرافی دقیقی در تشخیص بیماریهای لوله‌ای صفاقی نیست. ممکن است عدم انجام هیستروسالپینکوگرافی توسط یک رادیولوژیست منفرد با توجه به دخالت تجربه فرد در گرفتن عکس و خواندن کلیشه، در این نتیجه گیری دخیل باشد. لذا مطالعات بیشتر توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: پرتونگاری از رحم و لوله‌های رحم / حفره صفاقی / شکم بینی / ناباروری زنان

مقدمه

لوله بکار می‌رود و نخستین آزمایش برای بررسی عامل لوله‌ای است. اما چون با لایپاراسکوپی امکان دیدن مستقیم لوله و محوطه لگن وجود دارد، به عنوان Gold standard در تشخیص عوامل لوله‌ای - صفاق مطرح می‌شود. چون در تمام بیماران نازا HSG به عنوان آزمایش اولیه انجام می‌شود و در بسیاری موارد تنها راه بررسی عامل لوله‌ای است، بخصوص در جاهایی که دسترسی به لایپاراسکوپی نباشد- بنابراین حساسیت و ویژگی این روش در بررسی لوله‌های رحم و همخوانی آن با روش Gold standard (لایپاراسکوپی)

نازایی یکی از مشکلات مهم بهداشتی - درمانی جامعه است و در حدود ۲۰-۱۵٪ زوج‌ها در سن باروری از این مشکل رنج می‌برند (۱ و ۲). ممکن است هر کدام از زوج‌های نازا مشکلات آناتومیک یا فیزیولوژیک داشته باشند که قدرت باروری را کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد (۳). به این ترتیب بررسی زوج نابارور از مهم‌ترین مرحله‌ها در درمان نازایی است. ارزیابی وضعیت رحم و لوله‌های رحمی در بررسی نازایی نقش و پایه کلیدی دارد (۴ و ۵).

هیستروسالپینکوگرافی (HSG) به عنوان آزمایش غربالگری

نتایج

در این بررسی پرونده پزشکی ۲۰۰ مورد از زنان نازا بررسی شد. میانگین سنی آنها 42 ± 5 سال (۱۷-۲۸ سال) و میانگین مدت نازایی 3 ± 3 سال بود که از این میان 58% نفر (۷۹٪) نازایی اولیه و 2% نفر (۲۱٪) نازایی ثانویه داشتند. یافته‌ها نشان داد که حساسیت و ویژگی در چسبندگی‌های دور لوله‌ای و آندومتریوز با تأخیر ترشح بترتیب 37% و 79% گزارش است (جدول ۳). به طور کلی همخوانی هیسترو سالپینگوگرافی و لپاراسکوپی در تشخیص آسیب‌های ضایعات لوله‌ای-صفاقی، بسته بودن لوله‌ها 36% ، هیدروسالپینکس 23% و چسبندگی آندومتریوز با تأخیر ترشح 17% بدست آمد.

جدول ۱: نتیجه هیسترو سالپینگوگرافی و لپاراسکوپی در مورد انسداد لوله‌های رحمی

لپاراسکوپی			
جمع	هیسترو سالپینگوگرافی (منفی)	هیسترو سالپینگوگرافی (مثبت)	لپاراسکوپی
۵۳	۳۰(b)	۲۳(a)	مثبت
۱۴۷	۱۳۲(d)	۱۵(c)	منفی
۲۰۰	۱۶۲	۳۸	جمع

$$\text{حساسیت HSG} = \frac{38}{60} = (a/a+c) = 60\%$$

$$\text{ویژگی HSG} = \frac{132}{181} = (d/b+d) = 81\%$$

$$\text{ارزش اخباری مثبت} = \frac{38}{160} = a/(a+b) = 23\%$$

$$\text{ارزش اخباری منفی} = \frac{132}{181} = (d/(d+c)) = 79\%$$

توافق دو روش هیسترو سالپینگوگرافی و لپاراسکوپی (k=۳۶٪) fair

جدول ۲: نتیجه هیسترو سالپینگوگرافی و لپاراسکوپی در مورد هیدروسالپینکس

لپاراسکوپی			
جمع	هیسترو سالپینگوگرافی (منفی)	هیسترو سالپینگوگرافی (مثبت)	لپاراسکوپی
۱۸	۷(b)	۱۱(a)	مثبت
۱۸۲	۱۴۶(d)	۳۶(c)	منفی
۲۰۰	۱۵۳	۴۷	جمع

$$\text{حساسیت HSG} = \frac{47}{73} = (a/a+c) = 61\%$$

$$\text{ویژگی HSG} = \frac{146}{195} = (d/(b+d)) = 75\%$$

$$\text{ارزش اخباری مثبت} = \frac{47}{153} = a/(a+b) = 30\%$$

$$\text{ارزش اخباری منفی} = \frac{146}{195} = (d/(d+c)) = 75\%$$

توافق دور و روش هیسترو سالپینگوگرافی و لپاراسکوپی (Fair) (k=۲۳٪)

اهمیت ویژه‌ای دارد (۶ و ۷) در مطالعه‌های مختلف یافته‌های متناقضی در مورد میزان همخوانی HSG با لپاراسکوپی بدست آمده، مثلاً در برخی از آنها در دو سوم موارد بوده است (۸-۱۲). و در بعضی مقاله‌های دیگر دقت این دو روش در تشخیص آسیب شناسی یا گرفتگی لوله مشابه بدست آمد (۱۳) برخی مطالعه‌های دیگر ارزش HSG را برای تشخیص چسبندگی‌های لگنی بسیار کم دانسته‌اند (۲). بنابراین بدليل وجود این تناقض‌ها و نیز اهمیت مساله این مطالعه انجام گردید.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه، جهت‌گیری جمع‌آوری اطلاعات آینده‌نگر است. به این صورت که در یک دوره چهارساله ۷۸-۸۱ تمام ۲۰۰ بیماری که در بررسی اولیه برای عامل لوله‌ای در آنها نجات شد، لپاراسکوپی نیز شدند. متغیرها شامل: گزارش‌های HSG مبنی بر بسته بودن لوله، هیدروسالپینکس، چسبندگی‌های دور لوله با تأخیر ترشح و آندومتریوز جمع‌آوری شد و با یافته‌های لپاراسکوپی به عنوان Gold standard مقایسه شد. حساسیت، ویژگی، ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی هیسترو سالپینگوگرافی و سپس میزان همخوانی HSG با لپاراسکوپی در هر کدام از موارد تعیین شد (با استفاده از فرمول زیر)

		آزمون شماره II	
		+	-
آزمون شماره I	+	a	b
	-	c	d
		a+c	b+d
			N

میزان توافق مورد انتظار ناشی از شانس - میزان توافق مشاهده شده $= \frac{\text{آماره K}}{\text{میزان توافق مورد انتظار ناشی از شانس - ۱}}$

$$K = \frac{P0-Pc}{1-Pc} \quad Po = \frac{a+d}{N} \quad \text{توافق مشاهده شده} \quad Pc = A+B$$

$$A = \frac{a+b}{N} \quad B = \frac{d+c}{N} \quad \text{توافق} = \frac{a+c}{N} \times \frac{d+c}{N}$$

درجه توافق	Poor	Slight	Fair	Moderate	Substantial	Almost perfect	ک
	<0	0-0.2	0.21-0.4	0.41-0.6	0.61-0.8	0.81-1	

همخوانی دارد که به علت مشکل‌هایی مانند گرفتگی لوله‌ها، چسبندگی و هیدروسالپینکس است(۲۲). بررسی پارسانژاد نیز نشان داد که از ۱۲۹ مورد هیستروسالپینگوگرافی غیر طبیعی ۶۲ نفر(٪۴۸) لاپاراسکوپی طبیعی داشتند. بر عکس از میان ۱۸۱ مورد هیستروسالپینگوگرافی طبیعی ۵۳ نفر(٪۳۰) در لاپاراسکوپی یافته‌های غیر طبیعی مانند چسبندگی در لاپاراسکوپی نشان داده شده است. بررسی ضیائی نیز عدم تطابق بین نتایج لاپاراسکوپی و هیستروسالپینگوگرافی در اشکالات لوله‌های رحمی، نازایی با علت نامشخص بترتیب ٪۴۸ و ٪۵۰ گزارش شد که بیانگر لزوم رعایت نکات تکنیکی بیشتر در انجام هیستروسالپینگوگرافی و نیز کاربرد بیشتر لاپاراسکوپ به عنوان یک وسیله تشخیصی مفید در بیماران نزاک است(۲۴). میزان همخوانی هیستروسالپینگوگرافی با لاپاراسکوپی در بررسی Tsankova و همکاران ۶۶٪ بود. بیشترین اختلاف بین هیستروسالپینگوگرافی و لاپاراسکوپی در مورد چسبندگی صفاتی ٪۵۸/۷ گزارش شد. با توجه به این یافته‌ها، ایشان پیشنهاد کردند که هیستروسالپینگوگرافی در غربالگری اولیه مفید است، اما لاپاراسکوپی ارزیابی دقیق‌تری از باز بودن لوله‌های رحمی و عامل صفاتی ارائه می‌کند(۱۵). همچنین در بررسی معینی و خادمی نیز میزان همخوانی هیستروسالپینگوگرافی با لاپاراسکوپی ٪۵۲ بود. حساسیت و ویژگی هیستروسالپینگوگرافی در تشخیص باز یا بسته بودن لوله‌های رحمی در حد قابل قبول بود. (ترتیب ٪۸۲ و ٪۸۱) در تشخیص چسبندگی، با وجود حساسیت کم هیستروسالپینگوگرافی اعلام شد(٪۳۱) که یک آزمایش اختصاصی است(٪۸۸). در تقسیم بیماران به دو گروه با یا بدون سابقه عمل جراحی لگنی میزان مشابهت یافته‌های دو آزمایش در وجود سابقه عمل جراحی کم می‌شود، یعنی وجود سابقه عمل جراحی از ارزش هیستروسالپینگوگرافی در تشخیص اختلال‌های لوله‌ای می‌کاهد(۲۴).

تشخیص ندادن بسیاری از موردها با HSG و آشکارشدن آنها با لاپاراسکوپی می‌تواند علت‌های عمدۀ ای داشته باشد: مانند آن که در هیستروسالپینگوگرافی مهارت رادیولوژیست

جدول ۳: نتیجه هیستروسالپینگوگرافی و لاپاراسکوپی در مورد

چسبندگیهای لوله‌ای، آندومتریوز و تاخیر ترشح

لاپاراسکوپی			
جمع	هیستروسالپینگوگرافی (منفی)	هیستروسالپینگوگرافی (مثبت)	لاپاراسکوپی
۵۴	۲۶(b)	۲۸(a)	مثبت
۱۴۶	۹۹(d)	۴۷(c)	منفی
۲۰۰	۱۲۵	۷۵	جمع

$$\text{حساسیت HSG} = \frac{۷۵}{۲۰۰} = ۳۷\% = \frac{a}{a+c}$$

$$\text{ویژگی HSG} = \frac{۷۹}{۲۰۰} = \frac{d}{b+d}$$

$$\text{ارزش اخباری مثبت HSG} = \frac{۳۷}{۷۹} = ۵۱\% = \frac{a+b}{a+b+d}$$

$$\text{ارزش اخباری منفی HSG} = \frac{۶۷}{۷۹} = ۸۳\% = \frac{d}{d+c}$$

توافق دوروش هیستروسالپینگوگرافی و لاپاراسکوپی (Slight)(k)=٪۱۷

بحث و نتیجه گیری

براساس یافته‌ها همخوانی هیستروسالپینگوگرافی و لاپاراسکوپی در تشخیص آسیب‌های لوله‌ای صفاتی به صورت بسته بودن لوله‌ها ٪۳۶، هیدروسالپینکس ٪۲۳ و چسبندگی آندومتریوز با تاخیر ترشح ٪۱۷ است(fair). به این ترتیب بنظر می‌رسد که هیستروسالپینگوگرافی و لاپاراسکوپی در تشخیص آسیب‌های داخل و انتهای لوله همخوانی مناسبی ندارند. هیستروسالپینگوگرافی بدليل تهاجمی بودن کمتر به نسبت لاپاراسکوپی و این که یافته‌های بالرزشی از لوله‌ها و فضای داخل رحم در اختیار پزشک می‌گذارد، به عنوان روش معمول در بخشی از ارزیابی‌های نازایی بشمار می‌رود. لاپاراسکوپی در موارد نازایی با علت ناشناخته، هیستروسالپینگوگرافی غیر عادی یا اشکال‌های آناتومیک رحمی در تاریخچه پزشکی و معاینه بالینی بکار می‌رود. بنابراین هیستروسالپینگوگرافی اولین قدم پایه و اساسی در ارزیابی زنان نازا است(۵، ۱۸-۲۱).

یافته‌های این مطالعه با برخی مطالعه‌های گذشته تناقض دارد و برخلاف بعضی بررسی‌ها که همخوانی به نسبت قابل قبولی را در این دو روش بدست آورده‌اند، در مطالعه ما همخوانی این دو روش نامطلوب (Poor-fair) بوده است. در بررسی احمدی مشخص شد که هیستروسالپینگوگرافی در ٪۶۸ موارد با لاپاراسکوپی

گاهی ماده حاچب با فشار تزریق از لوله‌ها عبور می‌کند، در حالی که وضعیت لوله‌ها و فیمبریا در لایپاراسکوپی نشانده‌اند اختلال در کارکرد لوله هاست. بدین ترتیب با لایپاراسکوپی اشکال‌های فوق رفع شده و بسیاری از موارد نازائی با علتهای ناشناخته، تشخیص داده می‌شوند. بنابراین بهتر است بررسی‌های بیشتری در مورد میزان همخوانی دو روش هیستروسالپینگوگرافی و لایپاراسکوپی با تلاش محدود کردن خطاهای تشخیصی و عوامل مداخله کننده انجام شود.

Endometrial Pathology and Tubal Patency: A Comparison Between the use of Ultrasonography and X-ray Hysterosalpingography for the Investigation of Infertility Patients. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 14:200-204.

8. Spalding H, Martikainen H, Tekay A, Jouppila P. A Randomized Study Comparing Air to Echovist as a Contrast Medium in the Assessment of Tubal Patency in Infertile Women Using Transvaginal Salpingosonography. Hum Reprod 1997; 12(11): 2461- 4.

9. Spalding H, Perala J, Martikainen H, Tekay A, Jouppila P. Assessing Tubal Patency with Transvaginal Salpingosonography after the Reversal of Tubal Ligation for Female Sterilization. Hum Reprod 1998; 13(10):2819-22.

10. de Almeida I, Souza C, Reginatto F, Cunha Filho JS, Facin A, Freitas F, Lavie Y, Passos EP. Hysterosonosalpingography and Hysterosalpingography in the Diagnosis of Tubal Patency in Infertility Patients. Rev Assoc Med Bras 2000; 46(4):342-5.

11. Inki P, Palo P, Anttila L. Vaginal Sonosalpingography in the Evaluation of Tubal Patency. Acta Obstet Gynecol Scand 1998; 77(10):978-82.

12. Speroff L, et al. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 6 th ed. New York: Lippincott, 1999:165.

13. Adelusi B, al-Nuaim L, Makanjuola D, Khashoggi T, Chowdhury N, Kangave D. Accuracy of Hysterosalpingography and Laparoscopic Hydrotubation in Diagnosis of Tubal Patency. Fertil Steril 1995; 63(5):1016-20.

14. Allahbadia GN. Fallopian Tube Patency Using Color Doppler. Int J Gynaecol Obstet. 1993; 40(3):241-4.

چه در نحوه گرفتن عکس و چه در تفسیر کلیشه‌ها دخالت دارد بنابراین تفسیر یک فرد با تجربه اهمیت دارد. مثلاً انجام تهاجمی آن می‌تواند باعث اسپاسم لوله‌های رحم و در نتیجه به اشتباہ گرفتگی لوله‌ها گزارش شود. اما در لایپاراسکوپی به علت بیهوش بودن بیمار، این اشکال وجود ندارد. همچنین نکشیدن مناسب سرویکس در هنگام تزریق ماده رنگی ممکن است وضعیت رحم و لوله‌ها را غیر طبیعی جلوه دهد. چون در این مطالعه چندین رادیولوژیست HSG را گزارش کرده بودند، ممکن است باعث خطا شده باشد

منابع

- ۱-نظری، طاهره؛ زینال زاده، مهتاب؛ اسماعیل زاده، صدیقه؛ صیادی، داوود؛ کاربرد لایپاراسکوپی تشخیصی در نازائی اولیه و ثانویه. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۱۳۸۲، دوره ۵ شماره ۳، صص: ۴۰-۴۴.
- ۲- معینی، اشرف؛ خادمی، افسانه؛ بررسی مقایسه‌ای یافته‌های لایپاراسکوپی و هیستروسالپینگوگرافی در ۲۹۱ زوج نازا. مجله دانشکده پزشکی تهران، ۱۳۷۷، دوره ۵۶ شماره ۲، صص: ۳۸-۴۲.
- ۳- صالحچور، ساغر؛ طاهری پناه، ریابه؛ سلطانی، لیلا: بررسی ارزش تشخیصی سونو هیستروگرافی در آنومالی‌های حفره رحم و وضعیت لوله‌های فالlop در مقایسه با هیستروسالپینگوگرافی و لایپاراسکوپی. فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری، ۱۳۷۸، دوره ۱ شماره ۱، صص: ۲۳-۲۶.
- ۴- زینال زاده، مهتاب؛ نظری، طاهره؛ بالغی، مهرانگیز؛ مقایسه هیستروسونوگرافی و هیستروسالپینگوگرافی در تشخیص اختلالات داخل رحمی در زنان نابارور. فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری، ۱۳۸۱، دوره ۳ شماره ۱۲، صص: ۳۵-۲۹.
5. Severi FM, Bocchi C, Florio P, Cobellis L, Rosa R. La, Ricci MG, Petraglia F. Hysterosalpingography vs Hysteroscopy vs Hydrosonography. Available from http://www.obgyn.net/hysteroscopy/hysteroscopy.asp?page=/hysteroscopy/articles/cogi_paris_hydro
6. Mol BW, Collins JA, Burrows EA, Van der Veen F, Bossuyt PM. Comparison of Hysterosalpingography and Laparoscopy in Predicting Fertility Outcome. Hum Reprod 1999; 14(5):1237-42.
7. Standell A, Bourne T, Bergh C. The Assessment of

بهمن یزد. پایان نامه چاپ نشده دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد، ۱۳۷۱.

21. Zuo W, Wang P. Comparative Study on Assessment of Tubal Patency Among Tubal, Insufflation, Hydrotubation, Hysterosalpingography and Chromotubation Under Laparoscopy. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1996; 31(1):29-31.

۲۲-احمدی، فرزام: مقایسه نتایج هیستروسالپینگوگرافی و لپاراسکوپی در بیماران نازایی بیمارستان معتقد‌دی از سال ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۳۷۴. پایان نامه چاپ نشده دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ۱۳۷۴.

۲۳-پارسانزاد، محمد ابراهیم؛ قهیری، عطاءله؛ حقیقت، هاله: انجام ۴۰۶ مورد لپاراسکوپی و هیستروسالپینگوگرافی در تشخیص فاکتور لوله ای و نازایی. پنجمین سمینار سراسری باروری و ناباروری یزد، ۱۳۷۰.

۲۴-ضیائی، سعیده: کاربرد لپاراسکوپی در بررسی لوله های رحمی در مقایسه با HSG. پنجمین سمینار سراسری باروری و ناباروری یزد، ۱۳۷۰.

15. Tsankova M, Nalbanski B, Borisov I, Borisov S.A Comparative Study Between Hysterosalpingography and Laparoscopy in Evaluating Female Infertility. Akush Ginekol (Sofia) 2000; 39(1):20-2.

16. Vasiljevic M, Ganovic R, Jovanovic R, Markovic A. Diagnostic value of hysterosalpingography and Laparoscopy in Infertile Women. Srpsk Arh Celok Lek 1996; 124(5-6):135-8.

17. Watterlot A, Hamilton J, Grudzinhas JG. Advances in the Assessment of the uterus and Fallopian Tube Function. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2003; 17(2):187-209.

18. Salata I, Gottwald L, Sobkiewicz S. Comparison of Assessing the Patency of the Fallopian Tubes During Laparoscopy and During Hysterosalpingography on Television in Infertile Women with Endometriosis. Ginekol Pol 2003; 74(9):1014-7.

19. Nilgar BR, Desai BR, Henig I, Prough SG, et al. HSG, Laparoscopy and Hysteroscopy in Infertility: Comparative Study. J Reprod Med. Available at: www.jnmc.edu/research/obst/obst_02_05.htm

۲۰- زارع طرزجانی، فاطمه: مقایسه یافته‌های HSG و لپاراسکوپی و تعیین ارزش لپاراسکوپی در بررسی نازایی در ۵۰۰ بیمار مراجعه‌کننده به بیمارستان افشار و زایشگاه

Survey of The Level of Concordance Between Hysterosalpingography (HSG) and Laparoscopy in Diagnosis of Tubo-Peritoneal Factors in Infertile Women

Zahiri Sorouri Z., Faraji R.

Abstract

Introduction: The HSG is a noninvasive method for tubal assessment in infertile couple and is used as screening test, but laparoscopy is the “gold standard” of tubal disease diagnosis, but it is not used as screening test due to its invasiveness and it's only used in special circumstances. Due to different results about concordance between these two methods, this study was undertaken.

Objective: The aim of this study was to assess concordance between HSG and laparoscopy for tubal disease.

Material and Methods: This is a prospective study and laparoscopy was done on 200 patients who underwent HSG for assessment of tubal disease from 1999-2002 in Alzahra hospital and then the sensitivity , specificity, positive predictive value and negative predictive value of HSG in tubal obstructive,hydrosalpinx and peritoneal adhesion was assessed. At last the concordance between two procedures was calculated.

Results: The mean age was 28.5 ± 5.1 .The mean duration of infertility was 3.8 ± 3.1 years. The results showed that the sensitivity and specificity of HSG in tubal obstruction and concordance with laparscopy are 60%, 81% and 36% respectively. The sensitivity and specificity of HSG in hydrosalpinx and concordance with laparoscopy are 23%, 95% and 23% respectively. The sensitivity and specificity of HSG in peritoneal adhesions, endomtriosis and concordance with laparoscopy are 37%, 79% and 17% respectively.

Conclusion: Our results showed the HSG isn't an accurate procedure for diagnosis of tubo-peritoneal pathology, It seems that not doing HSG by only one radiologist can intervene with the result because of different radiologist's experience in taking film and reports of graphy, therefore it can lead to false interpretation. It's suggested that another study for completing these results be carried out.

Key words: Hysterosalpingography/ Infertility, Female/ Laparoscopy/ Peritoneal Cavity