

شیوع پوسیدگی دوران شیر خوارگی و عوامل همراه در کودکان ۲-۴ ساله

دکتر جوانه وجданی* - دکتر زهرا محتشم امیری** - دکتر محمود رضایی***

* استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

** استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

*** دندانپزشک

تاریخ دریافت مقاله: ۸۴/۴/۱۲

تاریخ پذیرش: ۸۴/۹/۱

چکیده

مقدمه: پوسیدگی دوران شیر خوارگی گونه‌ای از پوسیدگی‌های وسیع و پیشرونده می‌باشد که دندان‌های شیری کودکان را درگیر می‌کند و عادت تغذیه طولانی مدت با شیر مادر یا شیشه شیر در این‌ولوژی آن مطرح است. این پوسیدگی از الگوی خاصی پیروی می‌کند، و ثناياهای فک بالا بیشترین درگیری را نشان می‌دهند. از عوارض آن ایجاد درد، عفونت، مشکلات تغذیه‌ای برای کودک و هزینه بالای درمان‌های دندانپزشکی می‌باشد.

هدف: هدف از این تحقیق تعیین شیوع پوسیدگی دوران شیر خوارگی و عوامل همراه در کودکان ۲-۴ ساله شهرستان تالش در سال ۱۳۸۲ است. مواد و روش‌ها: تحقیق به روش مقطعی انجام گرفت. نمونه‌ها شامل ۲۶۱ کودک ۲-۴ ساله بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها استفاده از پرسشنامه‌ای حاوی اطلاعات دموگرافیک و عادات تغذیه‌ای و بهداشتی کودک و همچنین معاینه دندان‌ها می‌باشد. معیار تشخیص پوسیدگی دوران شیر خوارگی، وجود حدائق دو دندان ثنايای پوسیده در فک بالا می‌باشد. در کنار آن وضعیت dmft (تعداد دندان‌های پوسیده، کشیده شده، پر شده) نیز تعیین گردید. سپس داده‌ها وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آزمون آماری χ^2 تجزیه و تحلیل گردید.

نتایج: تحقیق نشان داد که در جامعه مورد بررسی شیوه پوسیدگی دوران شیر خوارگی ۲۸٪ می‌باشد. جنسیت، تحصیلات والدین، نحوه مساواک زدن، مصرف مایبات شیرین با شیشه، تمیز کردن دهان پس از مصرف شیرین و مصرف تنقلات ارتباط معنی داری با پوسیدگی دوران شیر خوارگی نشان داد ($P<0.05$). ولی ارتباط معنی داری بین تغذیه با شیشه شیر یا شیر مادر، مصرف شیر در شب، مصرف پستانک و نحوه مراجعته به دندانپزشک با پوسیدگی دوران شیر خوارگی بدست نیامد.

۴/۳۶٪ کودکان مورد مطالعه فقد پوسیدگی (Caries Free) بودند. میانگین dmft در کودکان دارای پوسیدگی دوران شیر خوارگی ۰/۷۸۶ و در کودکان دیگر ۰/۷۹ بود ($P<0.05$).

نتیجه‌گیری: تحقیق نشان داد که پوسیدگی دوران شیر خوارگی در شهرستان تالش از شیوع بالایی برخوردار است نیاز به آموزش هر چه بیشتر والدین در مورد کنترل عوامل همراه و دخیل در ایجاد این مشکل آشکار می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: آگاهی/پوسیدگی دندان/پیشگیری اولیه/دندان شیری/مراقبت دندان در کودکان

مقدمه

باقی می‌مانند^(۱)). این شرایط می‌تواند باعث درد، عفونت، تداخل با تغذیه و اثر نامطلوب بر دندان‌های دائمی در حال تکامل شود که یک کودک خردسال نیاز به درمان‌های وسیع و پرهزینه خواهد داشت^{(۲) و (۳)}.

اسامی گوناگونی برای توصیف پوسیدگی دوران شیر خوارگی بکار می‌رود. برخی از متداول‌ترین این اسامی NC, Baby bottle caries, Early childhood caries, Baby bottle tooth decay and Nursing bottle syndrom تحقیقات بسیاری برای تعیین

پوسیدگی دوران شیر خوارگی (Nursing Caries) با مخفف NC گونه‌ای از پوسیدگی‌های وسیع و پیشرونده دندان‌های شیری کودکان است که با الگوی نادرست تغذیه‌ای (تغذیه طولانی مدت با شیر مادر یا شیر خشک بویژه به هنگام خواب) ارتباط دارد. این پوسیدگی از الگوی خاصی پیروی می‌کند، به طوری که از ثناياهای فک بالا آغاز می‌شود و بعد سایر دندان‌های شیری با توجه به الگوی رویشی آنها درگیر می‌شوند. معمولاً ثناياهای فک پایین به علت ترشح بزاق و عملکرد حفاظتی زبان سالم

سال ۱۳۸۱، ۱۳٪ گزارش شد(۱۷). با توجه به مشکلاتی که NC در کودکان ایجاد می‌کند و بدلیل اینکه چنین تحقیقی در تالش انجام نشده بود، این مطالعه با هدف تعیین شیوع و نیز بررسی عوامل همراه پوسیدگی دوران شیرخوارگی در کودکان ۴-۲ ساله شهرستان تالش صورت گرفت.

مواد و روش‌ها

تحقیق به روش مقطعی انجام شد. نمونه‌ها ۲۶۱ کودک ۴-۲ ساله از ۲۶ خانه بهداشت و ۳ پایگاه بهداشتی شهرستان تالش بودند که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای (در مرحله اول براساس سهم هر گروه سنی و جنسی در کل جمعیت و سپس براساس جمعیت کودکان ۴-۲ ساله تحت پوشش هر مرکز بطور تصادفی) انتخاب شدند. روش جمع آوری داده‌ها معاینه بالینی و تکمیل پرسشنامه بود. پرسشنامه شامل اطلاعاتی در مورد عادات غذایی همچون نوع شیر مصرفی، مدت و دفعات تغذیه با شیر به ویژه در طول شب، میزان تحصیلات والدین و الگوهای بهداشتی کودک بود. معاینه با سوند و آینه یکبار مصرف، در نور معمولی اتفاق انجام شده و اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه ثبت می‌شد.

معیار تشخیص NC وجود حداقل دو دندان ثناخیای پوسیده در فک بالا بود. در کتاب تعیین موارد مبتلا به NC وضعیت dmft (تعداد دندان‌های پوسیده، کشیده شده و پرشده) نیز تعیین شد. پردازش اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS 11.5 انجام شده است و از آزمون آماری χ^2 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.

نتایج

در این تحقیق ۲۶۱ کودک (۱۱۱ پسر و ۱۴۷ دختر) ۴-۲ ساله معاینه شدند. سه کودک به دلیل نداشتن همکاری از مطالعه حذف شدند و از مجموع ۲۵۸ کودک، ۷۱ نفر (۲۸٪) دچار NC بودند. در این مطالعه ۴۷ نفر از دختران (۹٪) و ۲۴ نفر از پسران (۲٪) مبتلا بودند، که ابتلای بیشتر دختران به NC از نظر آماری معنی‌دار بود ($p<0.05$).

شیوع و علل پوسیدگی دوران شیرخوارگی انجام شده است.

شیوع NC:

- در سال ۱۹۸۹ این شیوع در انگلستان ۴٪ گزارش شده در این تحقیق ۲۳۰ کودک ۳ ساله مورد بررسی قرار گرفتند و معیار تشخیص، پوسیدگی در یک یا چند انسایزور ماگزیلا بوده است(۵).

- در سال ۱۹۸۵ در نیجریه شیوع NC در ۵۶۰ کودک ۷-۳ ساله لاغوس ۴/۳۸ درصد گزارش شد(۶).

- در سال ۱۹۹۰ در عراق شیوع NC ۱۵/۶ درصد بود. نمونه‌ها ۲۳۸۹ کودک ۱۲-۵۳ ماهه از مهد کودک‌ها بودند(۷).

- در سال ۱۹۹۳ در شهر خرطوم سودان شیوع NC در ۲۷۵ کودک ۳/۵ تا ۵/۵ ساله، ۵/۵ درصد گزارش شد. معیار تشخیصی در این تحقیق پوسیدگی در حداقل ۲ انسایزور ماگزیلا بود(۸).

- در سال ۱۹۹۳ در ایالات متحده شیوع NC در ۱۱۰ کودک ۱۸-۳۶ ماهه از مهد کودک ۲۰ درصد گزارش شد(۹).

از مطالعه‌های انجام شده در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- در سال ۱۳۷۴ در مشهد شیوع NC در کودکان ۶ تا ۳۶ ماهه ۱۹ درصد گزارش شد(۱۰).

- در سال ۱۳۷۴، شیوع NC در کودک ۲-۴ ساله منطقه هفتون اصفهان ۳۶ درصد بود(۱۱).

- در سال ۱۳۷۵ شیوع NC در کودکان ۳-۵ ساله منطقه حکیمیه تهران ۱۹ درصد (۱۲) و در سال ۱۳۷۶ در کودکان ۲-۴ ساله تهران ۲۱/۱ درصد گزارش شد(۱۳).

- در سال ۱۳۸۰، بررسی ۲۳۰ کودک ۲-۴ ساله مهدکودک‌های زاهدان شیوع NC را ۱۳ درصد نشان داد (۱۴).

- در سال ۱۳۸۰ شیوع NC در ۵۴۴ کودک ۱۸-۶۰ ماهه مراجعه کننده به پایگاه بهداشتی شماره یک شهر قزوین ۵/۱۹ درصد گزارش شد(۱۵).

- در سال ۱۳۸۰ شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان ۲-۵ ساله شیرازی ۴/۹٪ گزارش شد(۱۶).

شیوع NC در کودکان ۳-۵ ساله مهد کودک‌های اهواز در

جدول شماره ۳: توزیع عوامل مؤثر بر NC در کودکان مورد مطالعه

P value	ندارد		دارد		متغیر
	%	تعداد	%	تعداد	
< 0.05					جنس
	۷۷/۱	۱۰۰	۳۲/۹	۴۷	دختر
	۷۷/۸	۸۷	۲۲/۲	۲۴	پسر
< 0.0001					وضعیت مسواک زدن
	۹۱/۵	۴۴	۸/۵	۴	مرتب
	۷۵/۲	۸۸	۲۴/۸	۲۹	نامرتب
	۵۷	۴۴	۴۳	۴۹	می‌زند
< 0.0001					نوع تنقلات مصرفی
	۷۸	۷۵	۲۲	۲۰	تنقلات قندی
	۵۰	۴	۵۰	۴	تنقلات نمکی
	۶۰/۷	۷۱	۳۹/۳	۴۶	هر دو
	۹۷/۱	۳۴	۲/۹	۱	نمی‌خورند
NS					تعداد دفعات مصرف
	۷۵	۱۸	۲۵	۶	شیر در شب
	۷۶/۷	۱۱۸	۲۵/۳	۴۰	یکبار
	۶۴/۱	۴۱	۳۵/۹	۲۲	دو بار
					بیش از دو بار
NS					استفاده از پستانک
	۷۲/۷	۸	۲۷/۳	۳	استفاده از پستانک شیرین شده
	۳۳/۳	۱۳	۶۶/۷	۲۶	استفاده از پستانک شیرین نشده
	۷۲	۱۵۲	۲۷/۵	۵۵	استفاده نمی‌کند
< 0.0001					تمیز کردن دهان پس از مصرف شیر یا مایعات شیرین
	۹۴/۹	۳۹	۵/۱	۲	بله
	۶۸/۱	۱۵۱	۳۱/۹	۶۶	خیر

* NS= Non Significant

از تمام کودکان مورد مطالعه، ۳۰ کودک (۱۱/۹٪) مایعات شیرین را با شیشه مصرف می‌کردند که ۵۰٪ آنها مبتلا به NC بودند و ۲۲۸ کودک (۸۸/۱٪) از این نوع مایعات استفاده نمی‌کردند که ۵۴ نفر آنها (۲۴/۸٪) مبتلا به NC بودند. با توجه به آزمون آماری، ارتباط معنی‌دار بین تمیز نکردن دهان پس از مصرف شیر با NC وجود داشت ($P<0.0001$). (جدول شماره ۳).

در این تحقیق ارتباط معنی‌دار بین میزان تحصیلات والدین و شیوع NC بدست آمد، به طوری که با افزایش میزان تحصیلات والدین، شیوع NC کاهش یافت ($P<0.05$). جدول‌های شماره (۱و۲). ارتباط معنی‌داری بین وضعیت مسواک زدن کودکان و میزان ابتلاء به NC بدست آمد ($P<0.05$) (جدول شماره ۳).

جدول ۱: توزیع کودکان تحت مطالعه براساس سطح تحصیلات N.C مادر و ابتلاء به

میزان تحصیلات مادر	ندارد		دارد		N.C ابتلاء به
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
بی سواد	۵۲/۹	۲۷	۴۷/۱	۲۴	
زیر دیپلم	۷۱/۶	۷۸	۲۸/۴	۳۱	
دیپلم	۸۲	۵۴	۱۸	۱۱	
فوق دیپلم	۸۷/۵	۱۴	۱۲/۵	۲	
عالی	۷۸/۶	۱۴	۲۱/۴	۳	

 $P<0.05$

جدول ۲: توزیع کودکان تحت مطالعه براساس سطح تحصیلات N.C پدر و ابتلاء به

میزان تحصیلات پدر	ندارد		دارد		N.C ابتلاء به
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
بی سواد	۶۱/۴	۲۷	۳۸/۶	۱۷	
زیر دیپلم	۶۶/۴	۷۳	۳۳/۶	۳۷	
دیپلم	۷۹/۷	۴۷	۲۰/۳	۱۲	
فوق دیپلم	۸۰	۱۴	۲۰	۳	
عالی	۹۱/۳	۲۶	۸/۷	۲	

 $P<0.05$

در این تحقیق از کل کودکان مورد مطالعه در ۴۱ کودک (۱۶/۲٪) پس از خوردن شیر دهان تمیز می‌شد و از این تعداد ۲ کودک (۰/۵٪) مبتلا به NC بودند. در ۲۱۷ کودک (۸۳/۸٪) دهان کودک پس از مصرف شیر تمیز نمی‌شد و از این تعداد ۶۶ کودک (۳۱/۹٪) مبتلا به NC بودند. با توجه به آزمون آماری، ارتباط معنی‌دار بین تمیز نکردن دهان پس از مصرف شیر با NC وجود داشت ($P<0.0001$). (جدول شماره ۳).

در فک پایین بیشترین پوسیدگی در دندان‌های مولر اول شیری چپ پایین (۴۸٪) و مولر اول شیری راست پایین (۴٪) دیده شد.

میانگین dmft در کودکان مبتلا به NC ۷/۸۶ و در کودکان فاقد NC ۱/۷۹ بود.

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه شیوع پوسیدگی دوران شیرخوارگی در جامعه مورد بررسی ۲۸ درصد بدست آمد. این میزان با توجه به معیار تشخیص بکار رفته، از شیوع ۵/۵ درصد در تحقیق Raadal (۱۹۹۳) در سودان ۴ درصد در تحقیق Silver (۱۹۸۹) در انگلستان، شیوع ۱۵/۶ درصد در کودکان ۱۲-۵۳ ماهه عراقی (۱۹۹۰) و ۵/۴ درصد در اردن (۱۹۹۹)، ۱۹٪ در تحقیق ملک افضلی (۱۳۷۵) در تهران، ۲۱/۱ درصد در تحقیق برگ ریزان (۱۳۷۶)(۱۳)، شیوع ۱۹/۵ درصد در تحقیق حیدری در زاهدان (۱۳۸۰)، شیوع ۹/۴ درصد در تحقیق نوروزی در قزوین (۱۳۸۰) و ۱۳ درصد در تحقیق بنکار شیراز (۱۳۸۰) و ۱۳ درصد در تحقیق بصیر در اهواز (۱۳۸۱) (۱، ۵، ۶، ۱۲، ۹، ۱۵، ۱۴، ۱۷ و ۱۶) بیشتر است ولی از شیوع ۳۶ درصد در تحقیق جباری فر در اصفهان (۱۳۷۴) و ۵۵ درصد در کودکان Head Start بومی آسکا (۱۱ و ۱۸) کمتر است. باید توجه داشت که ارقام شیوع دقیقاً قابل مقایسه نیست و اختلاف‌های موجود می‌تواند مربوط به معیارهای تشخیصی متفاوت NC ، اختلاف گروه سنی کودکان مورد مطالعه، تفاوت‌های ژنتیکی، جغرافیایی، محیطی، تغذیه‌ای و بهداشتی جوامع مختلف باشد. شیوع NC در جامعه مورد بررسی ما با در نظر گرفتن سایر تحقیقات، بیش از حد معمول بود که جای نگرانی دارد و انجام تحقیقات بیشتری را برای شناخت عوامل مسبب آن می‌طلبد.

در تحقیق ما دختران (۵۵٪) بیش از پسران (۴۴٪) به NC مبتلا بودند. مطالعات انجام شده توسط جباری در اصفهان (۱۳۷۴)، ملک افضلی در تهران (۱۳۷۶) و بنکار در شیراز (۱۳۸۰)، Weinstein (آمریکا، ۱۹۹۲) و Hattab

صرف مایعات شیرین با شیشه و NC وجود داشت. در این مطالعه ۹۵ کودک (۳٪) فقط از تنقلات قندی استفاده می‌کردند که ۲۰ نفر (۲٪) مبتلا به NC و از ۸ کودک که فقط از تنقلات نمکی استفاده می‌کردند، ۴ نفرشان (۵٪) مبتلا بودند. ۱۱۷ کودک (۴۵٪) از هر دو نفرشان (۳٪) مبتلا بودند. ۴۶ نفر (۳۹٪) مبتلا بودند و با توجه به آزمون آماری، ارتباط معنی‌دار بین مصرف تنقلات و NC وجود داشت(جدول ۳).

در این تحقیق ۱۵۷ نفر (۶۱٪) شیر مادر مصرف می‌کردند که ۴۵ نفر (۲۹٪) مبتلا به NC بودند و ۱۹ نفر (۷٪) شیر خشک مصرف می‌کردند که ۷ نفر (۳٪) مبتلا بودند و ۸۱ نفر (۳۱٪) هر دو (شیر مادر و شیر خشک) مصرف کردند که ۱۸ نفر (۳٪) مبتلا به NC بودند. با توجه به آزمون آماری ارتباط معنی‌دار بین نوع شیر مصرفی و NC وجود نداشت.

در این مطالعه ۲۵۴ کودک در طول شب شیر می‌خوردند. (۹۸٪) با توجه به آزمون آماری ارتباط معنی‌دار بین مصرف شیر در شب با NC بدست نیامد ($p>0.05$). طبق جدول شماره ۳ ارتباط معنی‌دار بین دفعات مصرف شیر در شب با NC بدست نیامد($p>0.05$) همچنین ارتباط معنی‌داری بین مصرف پستانک با NC بدست نیامد ($p>0.05$).

بین تعداد دفعات مصرف تنقلات و سن شروع مسوک زدن با NC و dmft ارتباط معنی‌دار بدست آمد($P<0.05$) و میانگین مدت تغذیه با شیر مادر، ۲ سال با انحراف معیار ۳ ماه بود.

میانگین dmft در این تحقیق ۳/۴۲ و میانه آن ۱ بوده است. ۹۴ کودک (۳۶٪) پوسیدگی دندان نداشتهند و ۱۰۹ نفر (۴۲٪) بین ۱-۶ dmft در کودکان dmft دارند. دارای پوسیدگی بین ۱ تا ۱۲ متغیر بود.

با توجه به نتایج این تحقیق، بیشترین پوسیدگی در فک بالا در دندان‌های سانترال راست بالا (۲۷٪)، سانترال چپ بالا (۲۶٪) و دندان‌های مولر اول شیری چپ بالا (۲۶٪) و مولر اول شیری چپ پایین (۲۴٪) مشاهده شد.

استرپتوکوک موتان در دهان شود که به عنوان عاملی خطرزا برای پوسیدگی دندان محسوب می‌شود.

تحقیق ما ارتباط معنی‌داری بین طول مدت شیرخوارگی با NC نشان نداد که مشابه یافته‌های حیدری (زاده‌ان، ۱۳۸۰) ملک افضلی (تهران، ۱۳۷۶) و Weinstein (آمریکا، ۱۹۹۲) است (۱۲، ۱۴ و ۱۹).

همچنین ارتباط معنی‌دار بین مصرف شیر در شب و تعداد دفعات تغذیه با شیر در شب و شیوع NC بدست نیامد. در بررسی‌های جباری (اصفهان، ۱۳۷۴)، برگ‌ریزان (تهران، ۱۳۷۶)، ملک افضلی (تهران، ۱۳۷۶) و Weinstein (آمریکا، ۱۹۹۲) ارتباط بین دفعات تغذیه با شیشه در شب و معنی‌دار بدست آمد (۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۹).

در تحقیق حیدری در زاهدان ارتباط معنی‌دار بین تغذیه با شیر در شب و محتواهای شیشه با NC بدست نیامد. ولی ارتباط تعداد دفعات تغذیه با شیشه در شب و معنی‌دار بود. در بررسی Allausua (۱۹۹۴) و Bowen (۱۹۹۸) ارتباط تغذیه شبانه با شیر و NC معنی‌دار نبود (۲۱ و ۲۲).

Moss علت اصلی NC را کیفیت ضعیف و مقدار ناکافی بzac و بهداشت ضعیف دهان می‌داند، نه الگوی غلط تغذیه با شیر (۲۳).

تحقیق ما ارتباط معنی‌دار بین مصرف پستانک و Nursing Caries نشان نداد که مشابه مطابق یافته حیدری (زاده‌ان، ۱۳۸۰) است (۱۴). ولی ملک افضلی (تهران، ۱۳۷۶) بین این دو متغیر ارتباط معنی‌دار بدست آورد (۱۲).

کودکان مبتلا به NC در بررسی ما نسبت به دیگران بهداشت دهانی ضعیفتری داشتند و تعداد دفعات مصرف تنقلات بین وعده‌های غذایی در آنان بیشتر و سن شروع مسواک زدن در آنها بالاتر بود و نیز عادت مصرف مایعات شیرین با شیشه در آنها بیشتر مشاهده شد.

با توجه به شیوع بالا (۲۸٪) پوسیدگی دوران شیر خوارگی در جامعه مورد بررسی، لزوم آموزش هرچه بیشتر برنامه‌های پیشگیری در زمینه بهداشت دهان و دندان در منطقه تالش احساس می‌شود.

در اردن (۱۹۹۹) رابطه معنی‌داری بین جنس و شیوع NC نشان نداد (۱، ۱۲، ۱۱ و ۱۶).

در تحقیق برگ‌ریزان در تهران (۱۳۷۶) و حیدری در زاهدان (۱۳۸۰) شیوع بالاتر NC در پسران و در تحقیق رمضانی در قزوین (۱۳۸۰) شیوع بالاتر NC در دختران گزارش شد (۱۳، ۱۴ و ۱۵).

در این تحقیق ارتباط معنی‌داری بین میزان تحصیلات والدین با شیوع NC بدست آمد. به طوری‌که با افزایش میزان تحصیلات والدین، شیوع NC کاهش یافت. این یافته با یافته ملک افضلی (۱۳۷۶) مطابقت دارد. ولی برگ‌ریزان در تهران (۱۳۷۶)، حیدری در زاهدان (۱۳۸۰) و بنکار در شیراز (۱۳۸۰) بین این دو متغیر ارتباط معنی‌دار بدست نیاوردن (۱۳، ۱۴ و ۱۶).

تحقیق ما ارتباط معنی‌داری بین نحوه مسواک زدن و شیوع NC نشان داد. به طوری که درصد ابتلا به NC در کودکانی که به طور مرتب (هر شب) مسواک می‌زنند، فقط ۸/۵ درصد در کودکانی که مسواک نمی‌زنند ۴۳ درصد بود. این یافته مشابه یافته رمضانی (قزوین، ۱۳۸۰) و ملک افضلی (تهران، ۱۳۷۶) است (۱۵ و ۱۲). برگ‌ریزان (تهران، ۱۳۷۶) و حیدری (زاده‌ان، ۱۳۸۰) ارتباط معنی‌داری بین این دو متغیر بدست نیاوردن (۱۱، ۱۳ و ۱۴).

تحقیق ما نشان داد که رابطه معنی‌داری بین تمیز کردن دهان پس از خوردن شیر یا مایعات شیرین با NC وجود دارد که مشابه تحقیق ملک افضلی در تهران و Weinstein (آمریکا، ۱۹۹۲) است (۱۲ و ۱۹).

تحقیق ما ارتباط معنی‌داری بین مصرف مایعات شیرین با شیشه و NC نشان داد. این یافته مشابه یافته‌های ملک افضلی (تهران، ۱۳۷۶)، برگ‌ریزان (تهران، ۱۳۷۶)، حیدری (زاده‌ان، ۱۳۸۰) و بسیاری از مطالعه‌های دیگر است (۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۲۰).

بررسی مارتباط معنی‌داری بین دفعات مصرف موادقندی و NC نشان داد که مشابه یافته ملک افضلی (تهران، ۱۳۷۶)، بنکار (شیراز، ۱۳۸۰) و Hattab (اردن، ۱۹۹۹) است (۱۱ و ۱۲).

مصرف تنقلات از سن پایین می‌تواند باعث تجمع

منابع

- 1.Hattab FN , Al-omari M , Angmar- Mansson B. The Prevalence of Nursing Caries in One-to-Four-Year-Old Children in Jordan. *J dent child* 1999; 66: 53-58.
- 2.ACS G , Lodolini G, Kaminsky S, etal. Effect of Nursing Caries on Body Weight in Pediatric Population. *Pediatr Dent* 1992; 14: 302-305.
- 3.Quartey JB, Williamson DD. Prevalence of Early Childhood Caries at Harris County Clinics. *J Dent Child* 1999; 66: 127-131.
- 4.Veerkamp JSJ, Werheijm kl. Nursing-bottle Caries: The Importance of a Developmental Perspective. *ASDC Journal of Dentistry for Children* 1995; 64: 381-385.
- 5.Silver DH. A Comparison of 3-Year-Olds Caries Experience in 1973- 1989 in a Hertfordshire Town a Comparison Related to Family Behavior and Social Class. *Br Dent J* 1992; 172:191-7.
- 6.Salako NO. Infant Feeding Profile and Dental Caries Status in Urban Nigerian Children. *Acta Odontol Pediatr* 1985; 6: 13-17.
- 7.Yagot k, Nazhat NY, Kuder SA. Prolonged Nursing- Habit Caries Index. *J Int Assoc Dent Child* 1990; 20:8-10.
- 8.Raadal M, Elkhider ElHassan F, Rasmussen P. The Prevalence of Caries in Groups of Children Aged 4-5 and 7-8 Years in Khartoum, Sudan. *Int J Pediatr Dent* 1993; 3:9-15.
- 9.Serwint JR, Mungo R, Negrete VF, etal. Child-Rearing Practices and Nursing Caries. *Pediatrics* 1993; 92: 233-7.
- ۱۰- خوردي مود، م؛ نعمت اللهى، ح: بررسى شيع و عوامل اتيلولزىك سندرم شيشه شير در کودکان ۶-۳۶ ماهه شهر مشهد. خلاصه مقالات سومین کنگره انجمن دندانپزشکى و سى وشصعين کنگره علمى سالانه دندانپزشکى ايران. سال ۱۳۷۴: ص ۱۱۰.
- ۱۱- جبارى فر، ا، صادقيان، س: بررسى ميزان شيع پوسيدگى شيشه شير و عوامل مرتبط با آن. خلاصه مقالات مجله علمى پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى اصفهان، ۱۳۷۷.
- ۱۲- ملک افضلی، ب؛ محموديان، ژ؛ کوثری، ع: بررسى شيع Nursing Caries و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۳-۵ ساله منطقه حکيميه تهران. پایان نامه چاپ نشده
- دکترای تخصصى. دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى تهران، ۱۳۷۵-۷۶.
- ۱۳- برگریزان، م؛ رحیمی، م؛ مقدم، ب: بررسی اپیدمیولوژیک Nursing caries در کودکان ۲-۴ ساله شهر تهران در سال ۱۳۷۶ . مجله دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، ۱۳۷۹، جلد ۱۸ شماره ۴، صص: ۳۰۴-۳۰۹.
- ۱۴- حیدری، ژ؛ شیرازی، م : بررسى شيع و اتيلولزى Nursing caries در کودکان ۲-۴ ساله مهدکوهای شهر زاهدان. پایان نامه چاپ نشده دکترای عمومى دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى زاهدان، ۱۳۷۹-۸۰.
- ۱۵- رمضانى، غ، نوروزى، ع؛ ولايى، ن: بررسى شيع NC و عوامل مرتبط با آن در مراجعين ۱۸ تا ۶۰ ماهه پايدگاه بهداشتى شماره ۱ قزوين طى سالهای ۱۳۷۹-۸۰. مجله دندانپزشکى کودکان ايران، ۱۳۸۱، شماره ۱، صص: ۳-۶.
- ۱۶- بناكار، ش؛ کيامرئى، ک؛ محمودى زاده، ح: شيع سندرم شيشه شير در کودکان دو تا پنج ساله شيراز و بررسى رابطه آن با عوامل مؤثر، پاييز ۱۳۸۰. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى شيراز، ۱۳۸۲، سال چهارم شماره اول، صص: ۱-۸.
- ۱۷- بصير، ل: بررسى اپیدمیولوژیک شيع پوسيدگى ناشی از شيشه شير و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۳-۵ ساله مهد کوهای شهر اهواز. خلاصه مقالات دومین کنگره انجمن دندانپزشکى کودکان اiran، ۱۳۸۲.
18. Barnes GP, parker WA, Lyon TC, et al. Ethnicity, Location, Age, and Fluoridation Factors in Baby Bottle Tooth Decay and Caries Prevalence of head start Children. *Public Health Rep* 1992; 107: 167-73.
19. Weinstein P, Domoto P, Koday M, et al. Mexican-American Parents with Children at Risk for Baby Bottle Tooth Decay: Pilot study at a

- Migrant Farm workers Clinic. J Dent Child 1992; 59: 376-383.
20. Matta MS, et al. Nursing Caries, Linear Hypoplasia and Nursing and Weaning Habits in Tanzania infants. Comm Dent Oral Epi 1994; 22: 289-293.
21. Bown WH. Biological Mechanisms of Early Childhood caries. Comm Dent Oral Epi 1998; 26: 28-31.
22. Alalosua S, Mal Mivirta R. Early Plaque Accumulation Asign for Caries Risk in Young Children. Comm Dent Oral Epi 1994; 22: 273-276.
23. Moss SJ. The Relationship Between Diet, Saliva and Baby Bottle Tooth Decay. Int Dent J 1996; 46: 399-402.

Prevalence of Nursing Caries and Associating Factors in 2-4 year Olds Children

Vejdani J. (D.D.S.), Mohtasham Amiri Z.(M.Ph.), Rezaie M.(D.D.S)

Abstract

Introduction: Nursing caries is a specific form of rampant caries affecting the primary teeth of infants as a result of improper nursing bottle habits and/or prolonged unrestricted bottle and breast-feeding. The clinical feature is distinctive in that the maxillary incisors are the most affected. This condition can lead to pain, infection, and interference with eating and expensive dental treatment.

Objective: The purpose of this study was to determine the prevalence and associating factors of nursing caries between 2-4 year-old children in Talesh in 1382.

Materials and Methods: In this cross-sectional study 261 children aged 2-4 years were selected through a multistage random sampling and examined. Data collection was done by a questionnaire consisting of anterior teeth. Besides dmft (decayed, missed and filled teeth) was evaluated. Data analysis was done with SPSS 11.5 software and χ^2 square was used.

Results: Prevalence of nursing caries in this sample was 28%. There was a significant correlation between nursing caries and sex, tooth brushing habit, parent's educational state, feeding with liquid sweetened with sugar, cleaning the teeth after feeding and snack eating. There wasn't a significant correlation between visiting the dentist, using the sweetened pacifier, bottle-feeding and breast-feeding with nursing caries. 36.4% of children were caries free. The mean of dmft was 7.86 in nursing caries cases and 1.79 in others ($P<0.05$).

Conclusion: The prevalence of nursing caries in this community is high. It's necessary to educate parents about controlling the associating factors of nursing caries.

Key words: Dental Care for Children/ Dental Caries/ Dentition, Primary/ Knowledge/ Primary Prevention