

آکاهی زنان پست پارتوم در مورد بهداشت دهان و دندان

*دکتر مریم اصغرنیا (MD)^۱ - دکتر فربیا میربلوک (MD)^۱ - دکتر رویا فرجی (MD)^۱

^۱تویینده مسئول: رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان الزهرا (س)، مرکز تحقیقات بهداشت بازوری

پست الکترونیک: maryamasgharnia@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله: ۸۸/۷/۱۹ تاریخ پذیرش: ۸۹/۳/۱۲

چکیده

مقدمه: تغییرات هورمونی طی بارداری زنان را مستعد ژنژیوت می‌کند. عفونت‌های پریودنتال پیشرفته دوران بارداری سبب مشکلات در جفت و رحم شده و احتمال زایمان پره‌توم افزایش می‌یابد.

هدف: تعیین آکاهی زنان پس از زایمان و همبستگی بین سلامتی دهان و عوارض بارداری و دیگر عوامل دخیل در استفاده از سرویس‌های دندانپزشکی طی بارداری.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در بیمارستان دانشگاهی الزهرا(س) تنها بیمارستان دولتی تخصصی برای بیماری‌های زنان و زایمان (در رشت)، انجام شده است. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که از تلفیق پرسشنامه‌های مطالعه‌های مشابه در کویت انگلستان و آمریکا تهیه شد و بهوسیله پرسشگری توسط کارشناس مامایی به صورت چهاره به چهاره تکمیل شد. عادت مساوک زدن به عنوان یک نشانگر رعایت بهداشت دهان و دندان، و داشتن مشکلات دندانی به عنوان یک نشانگر رعایت‌تکردن بهداشت دهان و دندان در نظر گرفته شد. تعداد ۳۰۶ زن در ۴۸ ساعت پس از زایمان در مطالعه گنجانده شدند. شش زن از تکمیل پرسشگری خودداری کردند. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS ویندوز نسخه ۱۶ پردازش و به صورت آماره‌های توصیفی و در مواردی ضریب آزمون همبستگی پیرسون ارایه شده است.

نتایج: وضعیت فشارخون و حالت پرهاکلامپی از لحاظ وجود مشکل دندانی در این بارداری در دو گروه تفاوت معنی‌دار ($P = 0.048$) مشکل دندانی) نشان داده است. موارد پرهاکلامپی در گروه بدون مشکل دندانی (۲۳ مورد از ۱۸۳ زن) ۱۲/۵ درصد و در گروه با مشکل دندانی ۶ درصد (۷ مورد از ۱۱۷ زن) بود.

نتیجه‌گیری: عادت مساوک کردن و آکاهی از اهمیت مراقبت بهداشت دهان و دندان در مقایسه با جمعیت‌های دیگر کمتر و در نتیجه مشکلات دندانی آنان بیشتر بوده است. مطالعات آینده تکرر با انجام معاینه دندانپزشکی هنگام بارداری یا قبل از آن برای بررسی مشکلات مهم از جمله پریودنتیت پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه‌ها: آکاهی / بهداشت دهان / بارداری

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره نوزدهم شماره ۷۵، صفحات: ۵۷-۶۴

مقدمه

در یک مطالعه ۳۶۶ زن مبتلا به پریودنتیت را در میانه بارداری با یکی از سه روش زیر درمان کردند: تمیز کردن ساده دندان‌ها؛ مسواک کردن (پیشگیری) به اضافه درمان با داروهای ضد میکروبی، ترشیدن و هموار کردن عمیق ریشه (مدخله) همراه با دارونما بروز تولد پره ترم قبل از هفته ۳۵ در زنان دارای پروفیلاکسی ۴/۹ درصد، در زنانی که برای آنها از مداخله و مترونیدازول استفاده شد ۳/۳ درصد، و در مورد استفاده از مداخله و دارونما تنها ۰/۸ درصد بود. زایمان پره ترم در موارد استفاده از مداخله و دارونما مترونیدازول به ترتیب ۱/۴ درصد و ۱۲/۵ درصد بود(۱۱).

از عوارض دیگر، فشارخون دوران بارداری است که با موربیدیتی و مورتالیتی مادری و جنینی همراه است. بعضی از محققان زمینه‌ی ایجاد این مشکل را وضعیت التهابی شدید ژنرالیزه داخل عروقی می‌دانند. همچنین زنانی که هنگام زایمان بیماری پریودنتال شدید داشتند در معرض خطر

تغییرات هورمونی طی بارداری زنان را مستعد ژنژیوت می‌نماید. در نتیجه افزایش استروژن، لثه‌ها متلهب، متورم، و حساس شده به آسانی خونریزی می‌کنند (۱۰-۱۲). عفونت‌های پریودنتال پیشرفته در دوران بارداری سبب مشکلاتی در جفت و رحم شده؛ و به احتمال زایمان پره‌ترم افزایش می‌یابد (۱۳-۱۴). بیماری‌های پریودنتال عامل خطر مستقل برای زایمان پره‌ترم و خردورزی (LBW) نوزاد در زمان تولد است (۱۵-۱۶). باکتری‌های ایجاد کننده پوسیدگی دندان از مادر یا مراقبت‌کننده کودک به وی انتقال می‌یابد (از طریق استفاده از قاشق بچه برای چشیدن غذای کودک، آلوده شدن دهان کودک با بزاق دیگران و غیره). کولونیزاسیون باکتری در هر زمان بعد از تولد بچه در دهان او برقرار می‌شود (۷-۹) مادر شایع‌ترین مخزن این باکتری‌های است. اگر سازوکار ایجاد عوارض بیماری‌های پریودنتال بر بارداری در زمان لقاح یا لانه‌گزینی وجود داشته باشد، این خطر بیشتر است.

معیار وزن نوزادان ۲۹۴۰ و ۶۶۵ گرم (در دامنه بین ۹۸۰ تا ۴۷۳۰ گرم) بود و ۲۵ درصد نوزادان LBW داشتند. هیچ یک از زنان عادت سیگار کشیدن یا مصرف تریاک را گزارش نکردند.

تعداد ۲۳۷ (۷۹ درصد) زن فقط خانه‌دار و ۶۳ زن (۲۱ درصد) به مشاغل خارج از خانه هم اشتغال داشتند. ۱۶۸ نفر از همسران این زنان (۵۶ درصد) دارای مشاغل آزاد و سایرین سایر مشاغل گزارش شده‌اند. در مورد آخرین معاینه دندانپزشکی ۱۱۳ زن دو سال قبل، ۷۱ زن در کمتر از دو سال، و ۱۱۶ زن عدم معاینه دندانپزشکی را گزارش کردند.

جدول ۱ ویژگی‌های عمومی زنان مورد مطالعه را نشان می‌دهد. با توجه به این که عادت مسوак زدن به عنوان یک نشانگر رعایت بهداشت دهان و دندان و داشتن مشکلات دندانی به عنوان یک نشانگر رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان در نظر گرفته می‌شود یافته‌های جمعیت مورد مطالعه درباره این دو خصوصیت در دو جدول ۲ و ۳ خلاصه شده‌است.

نتایج جدول ۲ و ۳ در رابطه با موعد زایمان در کسانی که مسواك می‌زدند یا نمی‌زدند با زنانی که در بارداری مورد بررسی مشکل دندانی داشته یا نداشته‌اند از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری نشان نداده و با وجود این نسبت، زایمان زود هنگام در زنانی که مسواك نمی‌زدند ۲۲ درصد (۱۳ مورد از ۵۹ زن) و در زنانی مسواك می‌زدند، ۱۷/۸ درصد (۴۳ مورد از ۲۴۱ زن) بود. در مورد زنانی که مشکل دندانی داشته یا نداشته‌اند این نسبت‌ها به ترتیب ۱۹/۶ و ۱۸/۶ درصد بوده‌است.

یافته‌ها در رابطه با وضعیت فشارخون و حالت پره‌اکلامپسی از لحاظ وجود مشکل دندانی در این بارداری در دو گروه تفاوت معنی‌دار ($P=0.048$) (مشکل دندانی) نشان داد و افزایش موارد پره‌اکلامپسی در گروه بدون مشکل دندانی ۱۲/۵ درصد (۲۳ مورد از ۱۸۳ زن) و در گروه با مشکل دندانی ۶ درصد (۷ مورد از ۱۱۷ زن) بود. با در نظر گرفتن اثر سن در این افزایش معلوم شد که در گروه سنی ۰-۲۶ ساله این تفاوت معنی‌دار نبود [۳ نفر از ۴۹ زن (۶/۱ درصد)] ولی در گروه سنی ۲۷ سال و بیشتر ۱۱ نفر از ۸۹ نفر (۱۲/۴ درصد) و

بیشتری برای پره‌اکلامپسی بودند و بیماران پره‌اکلامپسی ۳/۵ برابر بیشتر از زنان نورموتنسیو بیماری پریودنتال داشتند (۱۴-۱۲).

با توجه به عوارض احتمالی گفته شده مطالعه ما برای بررسی میزان آگاهی مادران از رابطه سلامتی دهان و عوارض بارداری، و دیگر عوامل دخیل در استفاده از سرویس‌های دندانپزشکی طی بارداری انجام شد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در بیمارستان دانشگاهی الزهراء(س) تنها بیمارستان دولتی تخصصی برای بیماری‌های زنان و زایمان در رشت انجام شده‌است و با توجه به این که بخش عمده زایمان‌های مربوط به شهرستان رشت در این بیمارستان انجام می‌شود، یافته‌های پژوهش می‌تواند نشان دهنده نگرش و آگاهی زنان در شهر رشت در رابطه با بهداشت دندان‌ها باشد. در این مطالعه تعداد ۳۰۶ زن در مدت ۴۸-۲۴ ساعت پس از زایمان در سه ماهه اول سال ۱۳۸۸ بررسی شدند. انتخاب زنان به روش غیراحتمالی ولی نه پشت سر هم و آسان، هفت‌های سه روز انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که از تلفیق پرسشنامه‌های مطالعه‌های مشابه در کویت (۱۵)، انگلستان (۱۶) و آمریکا (۱۷) تهیه و با پرسشگری توسط کارشناس مامایی به صورت چهره به چهره تکمیل شد. بیماران در پاسخ به هر پرسش آزادی کامل داشتند و در صورت لزوم توضیحات شفاهی توسط پرسشگر ارایه شد. شش زن از تکمیل پرسشگری خودداری کردند. داده‌ها توسط نرم‌افزار ویندوز نسخه ۱۶ پردازش؛ و به صورت آماره‌های توصیفی و در مواردی ضریب آزمون همبستگی پیرسون ارایه شده‌است.

نتایج

میانگین و انحراف معیار سن تعداد ۳۰۰ زن که پرسشگری را تکمیل کردند به ترتیب ۲۶/۶ و ۵/۸ سال (در دامنه بین ۱۷ تا ۴۲ سال؛ میانگین و انحراف معیار سواد بر حسب کلاس ۸/۶ و ۳/۵ سال (در دامنه بین ۰ تا ۱۶ سال)، میانگین و انحراف معیار تعداد زایمان به ترتیب ۱/۸ و ۱، میانگین و انحراف

و در گروه بدون مشکل دندانی ۱۷ نفر (۳۳/۳ درصد) از چنان خدماتی آگاهی داشتند. در تحلیل بیشتر با حذف اثر سن در مورد این آگاهی تغییری مشاهده نشد. (در گروه بدون مشکل دندانی کمتر از ۲۷ سال و ۲۷ سال و بیشتر به ترتیب ۸ نفر و ۹ نفر آگاهی داشتند و در هر گروه ۱۷ نفر آگاهی نداشتند). ولی در گروه دارای کمترین سواد ۹ نفر، سطح سواد متوسط نفر ۶، و بالاترین سواد ۲ نفر از خدمات رایگان آگاهی داشتند که به ترتیب نسبت به جمعیت مربوطه ۱۵/۵ درصد و ۲۸/۵ درصد بودند.

طبق یافته‌های مطالعه ما متغیر نگرش نسبت به رعایت یا اثر رعایت بهداشت و دندان در زنان مورد مطالعه پس از بارداری در گروهی که مسوک نمی‌زدند، نسبت به گروهی که یک بار یا بیشتر مسوک می‌زدند، از لحاظ آماری بهشدت تفاوت معنی داری (P=۰/۰۰۳) نشان داده نسبت زنانی که تغییر نگرش مثبت داشته‌اند به ترتیب ۵۵ درصد و ۲۸ درصد، حذف اثر سواد و اثر سن نیز در این یافته تغییری ایجاد نکرد.

تفاوت معنی دار بود با وجود این در گروه دارای مشکل دندانی بروز حالت پره اکلامپسی کمتر بود.

یافته‌های مطالعه در رابطه با کمبود وزن نوزاد در دو گروه از لحاظ آماری معنی دار تفاوتی نشان نداد (P=۰/۴۳۶). ولی نسبت نوزادان دارای کمبود وزن در گروهی که مسوک می‌زدند (۲۰ درصد) بیش از گروهی بود که مسوک نمی‌زدند (۱۵ درصد) و در گروهی که مشکل دندانی در داشتند (۱۷/۱ درصد) بیش از گروهی بود که مشکل دندانی در این بارداری نداشتند (۱۲/۴ درصد)، که نشان می‌دهد عدم رعایت بهداشت و دچار شدن به مشکل دندان احتمالاً با کمبود وزن نوزاد همبستگی دارد. حذف اثر احتمالی سن مادر در کمبود وزن نوزاد نیز تغییری در این یافته‌ها نشان نداد.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که فقط ۱۸ درصد (۵۱ نفر) زنان پس از زایمان از وجود امکانات رایگان خدمات مراقبت از دهان و دندان آگاهی داشتند و از این تعداد هم در گروه مسوک نزدیک ۶ نفر (۸/۵ درصد) و در گروه مسوک زد ۴۵ نفر

جدول ۱: ویژگی‌های عمومی زنان مورد مطالعه N = ۳۰۰

نام متغیر	شرح	تعداد	درصد (نسبت به کل) N=۳۰۰	درصد (نسبت به کل) N=۳۰۰	ملاحظات	درصد (نسبت به جمعیت مربوطه)
سطح آموزش	بی سواد	۵	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷		
	۱-۵ کلاس	۶۵	۰/۲۱۷			
	۶-۸ کلاس	۹۴	۰/۳۱۳			
	۹-۱۲ کلاس	۱۰۱	۰/۳۳۷			
	بالاتر از ۱۲ کلاس	۱۶	۰/۰۵۳			
نوع زایمان	سزارین	۱۱۴	۰/۳۸۰			
	واژینال (عادی)	۱۸۶	۰/۶۲۰			
موعد زایمان	بهنگام	۲۳۱	۰/۷۷۰			
	زودهنگام	۶۹	۰/۲۳۰			
وضعیت فشار خون	عادی	۲۵۴	۰/۸۴۷			
	فقط پرفشاری	۱۵	۰/۰۵۰			
	پره اکلامپسی	۳۱	۰/۱۰۳			
تعداد زایمان	یک بار	۱۵۳	۰/۵۱۰			
	دوبار	۸۸	۰/۲۹۳			
	بیش از دوبار	۵۹	۰/۱۹۷			
نظرنسبت به اثر بارداری بر دندان‌ها	بهتر می‌شود	۱	۰/۰۰۳			
	بدتر می‌شود	۱۷۲	۰/۵۷۳			
	تغییر نمی‌کند	۷۲	۰/۲۴۰			

		۰/۱۸۳	۵۵	نمی‌دانم	
		۰/۸۰۳	۲۴۱	حداقل یکبار در روز	عادت مسوک زدن
		۰/۱۹۷	۵۹	مسوک نمی‌زده	
		۰/۰۳۳	۱۰	دهانشونیه	استفاده از مراقبت‌های دندانی دیگر
		۰/۱۴۷	۴۴	نخ دندان	
		۰/۰۵۰	۱۶۵	هیچ	مشکل دندانی در این بارداری
		۰/۲۷۰	۸۱	سایر	
		۰/۳۹۰	۱۱۷	آری	مواجعه کرد؟
		۰/۶۱۰	۱۸۳	نه	
n=117	۰/۰۹۰	۰/۲۳۰	۶۹	آری	مواجعه کرد؟
	۰/۴۱۰	۰/۱۶۰	۴۸	نه	
	۰/۵۶۵	۰/۱۳۰	۳۹	دندانپزشک	مراقبت کنند؟
	۰/۴۰۶	۰/۰۹۳	۲۸	ماما	
	۰/۰۲۹	۰/۰۰۷	۲	پزشک	
		۰/۰۴۳	۱۳	خطرناک است	نظرنسبت به اثر معاینه دندانپزشکی برجینی
		۰/۸۱۰	۲۴۳	بی خطر	
		۰/۰۱۷	۵	اثری ندارد	
		۰/۱۳۰	۳۹	نمی‌دانم	
		۰/۲۴۰	۷۲	گزارش نکرده	آخرین دندان درد؟
		۰/۳۷۰	۱۱۱	تا ۶ ماه قبل	
		۰/۰۲۷	۸	از ۶ تا ۶ ماه	
		۰/۱۶۰	۴۸	از ۱ تا ۲ سال	
		۰/۲۰۳	۶۱	بیش از ۲ سال	
n=(۳۰۰-۱۱۱)	۰/۸۲۰	۰/۰۱۷	۱۵۵	آری	مواجعه کرد؟
	۰/۱۸۰	۰/۲۴۳	۷۳	نه	
		۰/۱۸۰	۵۴	داشته	آگاهی از خدمات رایگان
		۰/۸۲۰	۲۴۶	نداشته	
n=54	۰/۰۱۹	۰/۰۰۳	۱	پزشک	منبع آگاهی
	۰/۴۰۷	۰/۰۷۳	۲۲	درمانگاه مادران	
	۰/۳۸۹	۰/۰۷۰	۲۱	بستگان	
	۰/۱۸۵	۰/۰۳۳	۱۰	سایر	
	۰/۴۲۶	۰/۰۷۷	۲۳	مرکز بهداشت	محل خدمات رایگان؟
	۰/۵۱۹	۰/۰۹۳	۲۸	بیمارستان	
	۰/۰۵۶	۰/۰۱۰	۳	سایر	
n=(۳۰۰-۱۱۶)	۰/۰۴۳	۰/۰۲۷	۳	معاینه دوره‌ای	علت مراجعت؟
	۰/۵۶۵	۰/۳۴۷	۱۰۴	دندان درد	
	۰/۳۶۴	۰/۲۲۳	۶۷	درمان	
	۰/۰۲۷	۰/۰۱۷	۵	تمیزکردن دندان	
		۰/۴۶۰	۱۳۸	آری	مایل بودن به ویزیت دندانپزشکی؟
		۰/۵۴۰	۱۶۲	نه	

		۰/۴۸۰ ۰/۰۶۰	۱۴۴ ۱۸	نیاز ندارم می ترسم	چرا نه؟
		۰/۴۴۳ ۰/۰۵۷	۱۳۳ ۱۶۷	آری نه	در این بارداری نظرتان تغییر کرد؟
n=۱۳۳	۰/۲۹۳	۰/۱۳۰	۳۹	ویزیت شوم	اگر آری چه خواهد کرد؟
	۰/۲۶۳	۰/۱۱۷	۳۵	بیشتر مسوک کنم	
	۰/۰۳۸	۰/۰۱۷	۵	در بارداری بیشتر مراقبت کنم	
	۰/۴۲۱	۰/۱۸۷	۵۶	مراقبت دندانی بیشتر	

جدول ۲: ویژگی های زنان مورد مطالعه بر حسب داشتن مشکل دندانی در این زایمان

p Value	جمع	مشکل دندانی نداشته اند n ₂ =۱۸۳	مشکل دندانی داشته اند n ₁ =۱۱۷	شرح	نام متغیر
NS	۱۶۲	۹۴	۶۸	کمتر از ۲۶ بیشتر	گروه سنی (سال)
	۱۳۸	۸۹	۴۹		
NS	۲۴۲	۱۴۷	۹۵	۲۱	تعداد زایمان
	۵۸	۳۶	۲۲	بیش از ۲	
NS	۱۰۹	۶۸	۴۱	سازارین	نوع زایمان
	۱۹۱	۱۱۵	۷۶	واژینال (عادی)	
NS	۲۴۳	۱۴۹	۹۴	بهنگام	موعد زایمان
	۵۷	۳۴	۲۳	زود هنگام	
NS	۱۶۷	۱۰۹	۵۸	۸ تا	سطح سواد (کلاس)
	۱۱۷	۷۰	۵۲	از ۹ تا ۱۲	
	۱۶	۹	۷	بیش از ۱۲	
۰/۰۱۴	۲۵۵	۱۵۴	۱۰۱	عادی	وضعیت فشارخون
	۱۵	۶	۹	پر فشاری	
	۳۰	۲۳	۷	پره اکلام پرسی	
NS	۲۴۱	۱۴۴	۹۷	حداقل یکبار در روز	عادت مسوک زدن
	۵۹	۳۹	۲۰	مسوک نمی‌زده	
NS	۷۰	۱	۶۹	آری	موابجه کرد؟
	۲۳۰	۱۸۲	۴۸	نه	
NS	۵۱	۳۴	۱۷	داشته	آگاهی از خدمات رایگان
	۲۴۹	۱۴۹	۱۰۰	نداشته	
NS	۱	۱	۰	پزشک	منع آگاهی
	۲۰	۱۳	۷	درمانگاه مادران	
	۲۰	۱۲	۸	بستگان	
	۱۰	۸	۲	سایر	
p<۰/۰۰۱	۱	۰	۱	بهتر می‌شود	نگرش نسبت به اثر بارداری بر دندان
	۱۷۴	۸۷	۸۷	بدتر می‌شود	
	۷۱	۵۴	۱۷	تغییر نمی‌کند	
	۴۴	۳۲	۱۲	نمی‌دانم	

	۷۵	۵۶	۱۹	گزارش نکرده تا ۶ ماه قبل از ۱۲ تا ۶ ماه از ۱ تا ۲ سال بیش از ۲ سال	آخرین دندان درد
NS	۱۰۶	۳۲	۷۴		
	۸	۷	۱		
	۴۷	۳۶	۱۱		
	۶۴	۵۲	۱۲		
NS	۱۱۶	۸۸	۲۸	گزارش نکرده تا ۶ ماه قبل از ۱۲ تا ۶ ماه از ۱ تا ۲ سال بیش از ۲ سال	آخرین ویزیت دندانپزشکی
	۴	۲	۲		
	۶۰	۳۰	۳۰		
	۳۲	۱۷	۱۵		
	۸۸	۴۶	۴۲		
	۹	۴	۵	معاینه دوره‌ای	علت آخرین ویزیت
	۱۰۲	۶۳	۳۹	دندان درد	
	۶۸	۳۷	۳۱	درمان	
	۵	۴	۱	تمیز کردن دندان	
۰/۰۱۲	۱۷۳	۹۵	۷۸	داشته	ویزیت در این بارداری
	۱۲۷	۸۸	۳۹	نداشته	
NS	۱۴۲	۹۳	۴۹	معاینه دوره‌ای	علت این ویزیت
	۲۶	۰	۲۶	دندان درد	
	۳	۰	۳	درمان	
	۲	۲	۰	تمیز کردن دندان	
NS	۱۳۸	۶۱	۷۷	آری	مايل به ویزیت دندانپزشکی؟
	۱۶۲	۱۲۲	۴۰	نه	
NS	۱۴۴	۱۱۱	۳۳	نیاز ندارم	چرا؟
	۱۸	۱۱	۷	می‌ترسم	
۰/۰۰۸	۱۳۳	۷۹	۶۴	آری	در این بارداری نظر تان تغییر کود؟
	۱۶۷	۱۱۴	۵۳	نه	
۰/۰۱۳	۳۸	۲۴	۱۴	ویزیت شوم	اگر آری چه خواهید کرد؟
	۳۵	۲۳	۱۲	بیشتر مسوک کنم	
	۵	۳	۲	در بارداری بیشتر	
	۵۵	۱۹	۳۶	مراقبت کنم	
NS	۵۰	۳۰	۲۰	مراقبت دندانی بیشتر	وزن نوزاد
	۲۵۰	۱۵۳	۹۷	کمتر از ۲۳۰ گرم	
				از ۲۳۰ گرم و بیشتر	

جدول ۳: ویژگی‌های زنان موردمطالعه بر حسب عادت مسوک‌زدن

p Value	جمع	مسوک می‌کرده $n_2=۲۴۱$	مسوک نمی‌کرده $n_1=۰۹$	شرح	نام متغیر
۰/۰۸	۱۶۲	۱۲۴	۳۸	کمتر از ۲۶	گروه سنی (سال)
	۱۳۸	۱۱۷	۲۱	بیشتر ۲۷	
NS	۲۴۲	۱۹۷	۴۵	۲۱	تعداد ازایمان
	۵۸	۴۴	۱۴	بیش از ۲	

NS	۱۰۹ ۱۹۱	۸۵ ۱۵۶	۲۴ ۳۵	سزارین واژینال (عادی)	نوع زایمان
NS	۲۴۳ ۵۵	۱۹۶ ۴۳	۴۷ ۱۲	بهنگام زودهنگام	موعد زایمان
۰/۱	۱۶۷ ۱۱۷ ۱۶	۱۲۸ ۹۸ ۱۵	۳۹ ۱۹ ۱	تا از ۹ تا ۱۲ بیش از ۱۲	سطح سواد (کلاس)
۰/۰۱۴	۲۵۵ ۱۵ ۳۰	۲۰۷ ۱۳ ۲۱	۴۸ ۲ ۹	عادی پرفساری پره اکلام‌پرسی	وضعیت فشارخون
۰/۰۰۵	۱۱۷ ۱۸۳	۹۷ ۱۴۴	۲۰ ۳۹	آری نه	مشکل دندانی دراین بارداری
۰/۰۲۳	۶۹ ۴۷	۵۸ ۳۷	۱۱ ۱۰	آری نه	موجعه کرد؟
NS	۵۱ ۲۴۹	۴۵ ۱۹۶	۶ ۵۳	داشته نداشته	آگاهی از خدمات رایگان
NS	۱ ۲۰ ۲۰ ۱۰	۱ ۱۸ ۱۷ ۹	۰ ۲ ۳ ۱	پرشک درمانگاه مادران بستگان سایر	منبع آگاهی
NS	۱ ۷۱ ۱۷۴ ۵۴	۱ ۵۷ ۱۳۹ ۴۴	۰ ۱۴ ۲۵ ۱۰	بهترمی شود بدتر می شود تغیر نمی کند نمی دانم	نگوش نسبت به این بارداری بر دندان
۰/۰۰۸	۱۳ ۲۴۵ ۵ ۳۸	۹ ۲۰۲ ۵ ۲۶	۴ ۴۳ ۰ ۱۲	خطرناک است بی خطر اثری ندارد نمی دانم	نظرنسبت به اثر معاینه دندانپزشکی بر جنین
NS	۷۵ ۱۰۶ ۸ ۴۷ ۶۴	۶۱ ۸۳ ۷ ۳۹ ۵۱	۱۴ ۲۳ ۱ ۸ ۱۳	گزارش نکرده تا ۶ ماه قبل از ۶ تا ۶ ماه از ۱ تا ۲ سال بیش از ۲ سال	آخرین دندان درد
NS	۱۱۶ ۴ ۶۰ ۳۲ ۸۸	۹۵ ۲ ۵۱ ۲۵ ۶۸	۲۱ ۲ ۹ ۷ ۲۰	گزارش نکرده تا ۶ ماه قبل از ۶ تا ۶ ماه از ۱ تا ۲ سال بیش از ۲ سال	آخرین ویزیت دندانپزشکی
	۸ ۱۰۲	۶ ۸۳	۲ ۱۹	معاینه دوره‌ای دندان درد	علت آخرین ویزیت

	۶۸ ۶	۵۳ ۴	۱۵ ۲	درمان تمیز کردن دندان	
NS	۱۷۳ ۱۲۷	۹۵ ۸۸	۷۸ ۳۹	داشته نداشته	ویزیت در این باره داری
	۱۴۲ ۲۶ ۳ ۲	۹۳ ۰ ۰ ۲	۴۹ ۲۶ ۳ ۰	معاینه دوره‌ای دندان درد درمان تمیز کردن دندان	علت این ویزیت
	۱۳۸ ۱۶۲	۶۱ ۱۲۲	۷۷ ۴۰	آری نه	ما بیل به ویزیت دندانپزشکی؟
NS	۱۴۴ ۱۸	۱۱۱ ۱۱	۳۳ ۷	نیاز ندارم می‌ترسم	چرا نه؟
NS	۱۳۳ ۱۶۷	۱۰۷ ۱۳۴	۲۶ ۳۳	آری نه	در این باره داری نفرتان تغییر کرد؟
NS	۲۸ ۳۵ ۵ ۵۶	۲۲ ۲۵ ۴ ۴۷	۶ ۱۰ ۱ ۹	ویزیت شوم بیشتر مسوک کنم در باره داری بیشتر مراقبت کنم مراقبت دندانی بیشتر	اگر آری چه خواهید کرد؟
NS	۵۰ ۲۵۰	۳۸ ۲۰۳	۱۲ ۴۷	کمتر از ۲۳۰۰ گرم از ۲۳۰۰ گرم و بیشتر	وزن نوزاد

بحث و نتیجه‌گیری

بارداری مراجعه به دندانپزشک داشته‌اند. در مطالعه‌ای در لندن ۳۳٪ از زنان باردار ویزیت دندانپزشکی طی بارداری داشته و نیمی از آنها نیازمند درمان بودند و تحت درمان قرار گرفته‌اند و ۱۵٪ زنان دارای بیش از یک بارداری از وجود مراقبت‌های رایگان بی‌خبر بودند. در مطالعه ما ۸ نفر (۲۷٪) مراجعت برای معاینه دوره‌ای و ۱۰۴ نفر (۳۴٪) برای درد دندان، ۶۷ نفر (۲۲٪) برای درمان و ۵ نفر (۱٪) برای تمیز کردن دهان و دندان بود.

در مطالعه‌ای در کویت هم علت مراجعته برای دندان درد ۳۰٪ و برای درمان ۵۰٪ موارد را شامل می‌شد و تنها تعداد کمی (۱۰٪) برای معاینه روتین دندانی و تمیز کردن دندان مراجعته کرده بودند و فقط ۷٪ مراجعته برای معاینه دوره‌ای بود (۱۵٪). در مطالعه‌ای در لندن ۳۶٪ از بیماران ویزیت منظم دندانپزشکی داشتند.

بیماری‌های درمان نشده دهان و دندان برای زن باردار و جنین عامل خطر محسوب می‌شود (۱۷ و ۱۸). آکادمی پریو دنتولوژی امریکا توصیه می‌کند که برای همه زنان باردار یا زنانی که قصد باردار شدن دارند، باید معاینه پریو دنتال انجام و در صورت لزوم درمان شوند (۱۹). عادت مسوک‌زدن معیاری برای رعایت بهداشت دهان و دندان به شمار می‌آید.

در این مطالعه ۵۹ زن (۱۹٪) مسوک نمی‌زدند و (۲۴۱/۸۰٪) حداقل یکبار در روز مسوک می‌زدند، در مطالعه‌ای در کویت (۱۵) (از نظر عادت مسوک‌زدن) دو سوم زنان بیش از یکبار در روز و اغلب آنان (۹۴٪) حداقل یکبار در روز مسوک می‌زدند. شاید آموزش بیشتر، یا داشتن امکانات بیشتر برای رعایت بهداشت دهان و دندان توجیه کننده این تفاوت باشد.

همچنین در این مطالعه ۵۲ درصد زنان ویزیت دندانپزشکی طی بارداری داشتند و ۵۹ درصد به علت مشکل دندانی طی

در مطالعه ما بین زنان باردار، بار اول و دوم در مقایسه با بیماران بیش از دو زایمان از نظر آماری تفاوت معنی‌دار وجود نداشت و این برخلاف مطالعه انجام شده در کویت بود که در بار اول، مشکلات دندانی بیشتر بوده است.

در تعدادی از مطالعات (۲۰-۲۲) درصد زیادی از زنان طی بارداری مراقبت‌های دندانی نداشته و حتی در صورت وجود مشکل دندانی، تنها نیمی از آنان معاینه دندانپزشکی داشتند. در این مطالعات ناآگاهی بیماران از اهمیت سلامتی دهان و دندان و آگاهی ندادن متخصصان مراقبت کننده به آنان در مورد اهمیت این موضوع مطرح شده که به طرز قابل توجهی سبب می‌شود بیماران از مراقبت‌های دهانی طی بارداری دور نگه داشته شوند.

در مطالعه ما ارتباط بین زایمان زودرس و خردوزنی در زمان تولد و مشکل دندانی طی بارداری و عادت مسواک‌زدن و همچنین بین عادت مسواک‌زدن و مشکل دندانی تفاوت از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. شاید تفاوت‌های نژادی و قومی در ایجاد مشکل دندانی مؤثر باشد و مسواک‌زدن تنها عامل مؤثر نباشد.

در مطالعه‌ای (۲۳) باکتری‌های دهانی را در مایع آمنیوتیک و جفت زنان با زایمان زودرس و پریودنتیت پیدا کرده‌اند که به نظر می‌رسد آبشار التهابی شروع‌کننده لیر پره‌ترم باشد و ظاهراً مکانیسمی مشابه خردوزنی زمان تولد دارد که آزاد شدن PGE2 سبب محدودیت جریان خون جفت، نکروز جفتی و محدودیت رشد داخل رحمی می‌شود.

همچنین در چند مطالعه (۱۸ و ۲۴ و ۲۲) همبستگی مثبت بین پره‌اکلام‌پسی و بیماری‌های پریودنتال وجود داشت که با مطالعه ما تفاوت دارد. در مطالعه ما همبستگی بین وضعیت فشارخون با مشکل دندانی معنی‌دار بوده و بیماران دارای مشکل دندانی کمتر دچار پره‌اکلام‌پسی بودند ($P=0.14$). شاید به این دلیل که در مطالعه ما زنان از نظر وجود پریودنتیت معاینه نشدن و فقط عادات مسواک‌زدن یا وجود مشکل دندانی بررسی شد. در مطالعه‌ای (۱۸) احتمال پره‌اکلام‌پسی در صورت بیماری شدید یا پیشرفت‌هه پریودنتیت طی بارداری بیشتر بوده است. اینکه ارتباط پره‌اکلام‌پسی و پریودنتیت یک همبستگی یا علت و معلولی است باید با مطالعات بیشتر و آینده‌نگر اثبات شود.

در مطالعه ما تنها ۳ درصد زنان از دهانشویه استفاده می‌کردند در مطالعه انجام شده در لندن (۱۶) که متوسط آخرین ویزیت دندانپزشکی $21 \pm 4/2$ ماه بوده؛ ۷۳/۷٪ بیماران دوبار در روز مسواک می‌زدند و ۲۲٪ حداقل یکبار مسواک می‌زدند و ۵۱٪ دهانشویه استفاده می‌کردند. در این مطالعه ما تنها ۱۸٪ بیماران از رایگان بی خبر بودند، ولی در مطالعه ما تنها ۷٪ بیماران از این امکانات باخبر بودند. کمترین منبع آگاهی آنان از طریق پزشک (۰/۰۳٪)، ۷٪ از طریق درمانگاه پرمناتال و ۷٪ از طریق بستگان بوده است.

یک‌سوم زنان مورد مطالعه ویزیت دندانپزشکی داشتند و یک‌دوم آنها نیاز به درمان داشتند و درمان نیز دریافت کردند. ۳۶٪ بیماران معتقد بودند که وضعیت دندان در بارداری بدتر می‌شود در حالی که تغییر نگرش طی بارداری نسبت به مراقبت دندانپزشکی داشتند در مطالعه ما این میزان ۴۴٪ بوده. در این بررسی آخرین ویزیت دندانپزشکی در ۱۱۶ بیمار(درصد) گزارش نشده بود.

در مطالعه‌ای در آمریکا (۱۷) بین سال‌ها ۱۹۹۹-۲۰۰۲، ۷۰٪ زنان باردار طی ۱۲ ماه قبل مراقبت دندانپزشکی داشتند؛ در این مطالعه مهم‌ترین عامل پیشگویی‌کننده نبود مراقبت دندانپزشکی، میزان درآمد و سیگار کشیدن بود. در مطالعه ما زن سیگاری وجود نداشته ولی سایر موارد بررسی نشد. در حالی که در مطالعه‌ای (۲۰) در امریکا ۵۸٪ بیماران هیچ مراقبتی طی بارداری نداشتند، ۱۵٪ بیماران با وجود نبود مشکل دندانی مراقبت دندانپزشکی داشته‌اند، ۳۸ درصد هیچ مشکلی نداشتند و مراقبت هم دریافت نکرده‌بودند و ۲۶٪ مشکل دندانی داشتند. در این مطالعه بیمارانی که مشکل دندانی گزارش نکرده‌بودند و مراقبت هم نشده بودند، در معرض خطر بوده‌اند.

در مطالعه ما ۸۲٪ بیماران با مشکل دندانی مراجعه به دندانپزشک داشتند، ۲۴٪ کل بیماران و ۱۸٪ بیماران با مشکل دندانی مراجعه دندانپزشکی نداشتند. این تفاوت‌ها را می‌توان به نبود آگاهی بیماران در مورد اهمیت مراقبت‌های دندانپزشکی طی بارداری و همچنین نبود آگاهی زنان از مراقبت‌های رایگان نسبت داد. توصیه نگردن فرد مراقبت‌کننده زنان باردار برای معاینه دندانپزشکی هم تأثیرگذار است.

بارداری تکیه نمود. همچنین احتمال می‌رود فلور دهانی مادر به نوزاد منتقل سبب مستعد شدن کودک به ایجاد پوسیدگی‌های دهانی شود. به این دلیل مراقبت‌های دندانی در دوران قبل از لقاح (Preconception) برای کاستن از پوسیدگی‌های دندانی کودکان توصیه شده است (۷-۹).

عادت مسواک‌زدن و آگاهی از اهمیت مراقبت بهداشت دهان و دندان در جمعیت مورد بررسی ما در مقایسه با جمعیت‌های دیگر کمتر و مشکلات دندانی آنان بیشتر بوده است. نسبت زایمان زود هنگام و نوزاد کم وزن در دو زیر گروه مورد مطالعه تفاوت معنی‌دار نداشت؛ مطالعات آینده‌نگر با انجام معاینه دندانپزشکی هنگام بارداری یا قبل از آن برای بررسی مشکلات مهم از جمله پریودنتیت پیشنهاد می‌شود.

اگر بیماری پریودنتیت علت پره‌اکلامپسی باشد پیشگیری از بیماری پریودنتال قبل از بارداری یا درمان طی بارداری راه جدیدی برای پیشگیری از پره‌اکلامپسی خواهد بود.

در یک متانالیز (۲۵) در مورد بیماری پریودنتال و عوارض بارداری شامل ۲۵ مطالعه، نه تنها LBW بلکه سقط و پره‌اکلامپسی هم جزو عوارض آمده است. در ۱۸ مطالعه همبستگی بیماری پریودنتال و افزایش عوارض بارداری وجود داشته، ولی در ۷ مطالعه آنها همبستگی بین آنها دیده نشده است.

بعضی مؤلفین (۲۶) معتقدند تفاوت‌های نژادی موجب نتایج متفاوتی در پریودنتیت بارداری می‌شود. مثلاً پره ترم لیر همبستگی بیشتری با پریودنتیت سیاه‌پوستان دارد. شاید هم درمان پریودنتیت در زمان بارداری ممکن است برای دستیابی به آثار مثبت با تأخیر انجام شده باشد و باید بر درمان قبل از

منابع

1. Lo E H, Silness J. Periodontal Disease in pregnancy. *Acta Odontologica Scandinavica* 1963; 21: 533–551.
2. Ferris GM. Alteration in Female Sex Hormones: Their Effect on Oral Tissues and Dental Treatment. *Compendium on Continuing Education of Dentistry* 1993; 16: 1558–1571.
3. Offenbacher S, Katz V, Fetsik G, Collins J, Boyd D, Maynor G, et al. Periodontal Infection as a Possible Risk Factor For preterm Low Birth weight. *Journal of Periodontology* 1996; 67: 1103–1113.
4. Dasanayake A. Poor Periodontal Health of the Pregnant Woman as a Risk Factor for Low Birth Weight. *Annals of Periodontology* 1998; 3: 206–212.
5. Jeffcoat M K, Geurs N C, Reddy MS, Cliver S P, Goldenerg RL, Hauth JC. Periodontal Infection and Preterm Birth: Result of prospective Study. *Journal of the American Dental Association* 2001; 132: 875–880.
6. Offenbacher S, Leiff S, Boggess KA, Murtha A P, Madianos P N, Champagne C M, McKaig R G, Jared H L, Mauriello SM, Auten R L Jr, Herbert, WN, Beck J D. Maternal Periodontitis and Prematurity. Part 1: Obstetric Outcome of Prematurity and Growth Restriction. *Annals of Periodontology* 2001; 6: 164–174.
7. Caufield PW, Cutter GR, Dasanayake AP. Initial Acquisition of MutansS treptococci by Infants: Evidence for a Discrete Window of Infectivity. *J Dent Res* 1993; 72(1):37-45
8. Berkowitz RJ. Causes, Treatment and Prevention of Early Childhood Caries: a Microbiologic Perspective. *J Can Dent Assoc* 2003; 60(5):304-307.
9. Caufield PW, Wannemuehler YM, Hansen JB. Familial Clustering of the Streptococcus Mutans Cryptic Plasmid Strain in a Dental Clinic Population. *Infect Immun* 1982; 38(2):785-787.
10. Dasanayake AP, Russell S, Boyd D, Madianos PN, Forster T, Hill E. Preterm Low Birth Weight and Periodontal Disease Among African Americans. *Dent Clin North Am* 2003; 47(1):115-1xi.
11. Jeffcoat MK, Hauth JC, Geurs NC, et al: Periodontal disease and Preterm Birth: Results of a Pilot Intervention Study. *J Periodontol* 2003; 74:1214.
12. Sibai BM, Gordon T, Thom E, Caritis SN, Klebanoff M, McNellis D, et al. Risk Factors for Preeclampsia in Healthy Nulliparous Women: a Prospective Multicenter Study. The National Institute of Child Health and Human Development Network of Maternal-Fetal Medicine Units. *Am J Obstet Gynecol* 1995; 172:642–8.
13. Boggess KA, Lieff S, Murtha AP, Moss K, Beck J, Offenbacher S. Maternal Periodontal Disease is Associated with an Increased Risk for Preeclampsia. *Obstet Gynecol* 2003; 101: 227–31.
14. Canakci V, Canakci CF, Canakci H, Canakci E, Cicek Y, Ingec M, et al. Periodontal Disease as a Risk Factor for Pre-eclampsia: a Case Control Study. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2004; 44:568–73.
15. Honkala S, Al-Ansari J. Self-reported Oral Health, Oral Hygiene Habits, and Dental Attendance of Pregnant Women in Kuwait. *J Clin Periodontol* 2005; 32: 809–814.

16. Hullah E, Turok Y, Nauta M Wai Yoong , Self-Reported Oral Hygiene Habits, Dental Attendance and Attitudes to Dentistry During Pregnancy in a Sample of Immigrant Women in North London. *Arch Gynecol Obstet* 2008; 277:405–409.
17. Timothe P, Eke PI, Presson SM, Malvitz DM. Dental Care Use Among Pregnant Women in the United States reported in 1999and 2002. *Prev Chronic Dis* 2005; 2(1):A10.
18. Boggess KA, Lieff S, Murtha AP, Moss K, Beck J, Offenbacher S. Maternal periodontal Disease is Associated with an Increased Risk for preeclampsia. *Obstet Gynecol* 2003;101:227–31.
19. Stevens J, Iida H, Ingersoll G. Health Program in a Group Prenatal Practice. *Journal of Obstetric Gynecological and Neonatal Nursing* 2007; 36():581–591.
20. Lydon-Rochelle MT, Krakowiak P, Hujoel PP, Peters RM. Dental Care Use and Self-reported Dental Problems in Relation to pregnancy. *American Journal of Public Health* 2004; 94(5):765–771.
21. Gaffield ML, Gilbert BJ, Malvitz DM, Romaguera R. Oral Health DuringPregnancy: An Analysis of Information Collected by the Pregnancy Risk Assessment Monitoring system. *Journal of the American Dental Association* 2001; 132(7):1009–1016.
22. Canakci V, Canakci CF, Canakci H, Canakci E, Cicek Y, Ingec M, et al. Periodontal Disease as a Risk Factor for Pre-eclampsia: a Case Control Study. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2004; 44:568–73.
23. Goepfert AR, Jeffcoat MK, Andrews WW, Faye-Petersen O, Cliver SP, Goldenberg RL, et al. Periodontal Disease and Upper Genital Tract inflammation in Early Spontaneous Preterm Birth. *Obstet Gynecol* 2004; 104(4):777-783.
24. Oettinger-Barak O, Barak S, Ohel G, Oettinger M, Kreutzer H, Peled M, et al. Severe pregnancy Complication (preeclampsia) is Associated with Greater periodontal Destruction. *J Periodontol* 2005; 76: 134–7.
25. Xiong X, Buekens P, Fraser WD, Beck J, Offenbacher S. Periodontal Disease and Adverse Pregnancy Outcomes: a Systematic Review. *BJOG* 2006; 113(2):135-143.
26. SILK H. Oral Health During Pregnancy. *Am Fam Physician* 2008; 77(8):1139-1144.

Knowledge of Post Partum Women about Oral Health

*Asgharnia M.(MD)¹- Mirblouk F.(MD)¹- Faraji R.(MD)¹

***Corresponding Address:** Reproductive Health Research Center, Alzahra Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, IRAN

E-mail: maryamasgharnia@yahoo.com

Received: 11 Oct/2009 Accepted : 2/Jun/200

Abstract

Introduction: Hormonal changes during pregnancy predispose women to gingivitis. Developed periodontal infections during pregnancy caused problems for uterus and placenta and increased probable of preterm deliveries.

Objective: To determine postpartum womens knowledge about oral health, and association between oral health and pregnancy outcomes and other related factors which use as dental health services during pregnancy.

Materials and Methods: We carried out our research in the only teaching maternity center for gynecologic and midwifery in Rasht. The research tool was a researcher made questionnaire that made from integration of similar questionnaires which were used in Kuwait, England, and USA. The questionnaires completed by midwifery graduates in face to face interviewing. The studied population was 306 women (24-48 hours after deliveries) six women were extrcted. Data was analyzed by SPSS (version 16) and presented as descriptive statistics; and Pearson correlation coefficient test as appropriate.

Results: There was a significant difference between blood pressure and pre-eclamptic situation in women with dental problems group ($p=0.048$). The pre-eclamptic conditions in women with dental problems group were 7 cases among 117 women (6%) and in women with no dental problems group were 23 cases 183 women (12.5%).

Conclusion: Knowledge about oral health importance and teeth brushing habit were found less than other population; and dental problem more than other population. So suggested to conducting longitudinal studies accompanied with oral examinations before or during pregnancies to determine serious problems including periodentitis.

Key words: Knowledge/ Oral health/ Pregnancy

Journal of Guilan University of Medical Sciences, No: 75, Pages: 46-57