

اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H₁ و H₂ آن بر رفتار در خرگوش

دکتر اسماعیل تمدنفر^۱ دکتر نسرین حاجی اقراری^۲ دکتر برومند مرادی^۲

The central effects of histamine and its H₁ and H₂ antagonists on behavior in the rabbit

Tamaddonfard, E.,¹ Hajjegrhary, N.,² Morady, B.²

¹Department of Physiology and Laboratory Animals, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia - Iran. ²Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia - Iran.

Objective: To examine the central role of histamine and its H₁ and H₂ receptors on behavior in the rabbit.

Design: Experimental study

Animals: Thirty-five male New Zealand White rabbits weighing 2 - 2.5 kg.

Procedure: Implantation of a 23 - gauge, 15 mm long stainless steel guide cannula into the lateral ventricle of brain, intracerebroventricular injection of normal saline (control), histamine (50g), promethazine (H₁ antagonist, 100 g) and ranitidine (H₂ antagonist, 100 g) through the guide cannula with a 25 - 1 hamilton syringe, recording of animal behavior including feeding, grooming and locomotion for 1h post - injection.

Statistical analysis: One - way ANOVA, Duncan's, Multiple Range test and paired t - test.

Results: Histamine decreased feeding, grooming and increased locomotion. Promethazine alone, with no effect on grooming, increased feeding and decreased locomotion and pretreatment by it will prevent the histamine effects on feeding and locomotion, but it will not inhibit the suppressive effect of histamine on grooming. Ranitidine alone, without any effects on grooming and locomotion, increase feeding and pretreatment by inhibition the effects of histamine on feeding. No significant changes observed among control groups.

Clinical implication: From the results of this study it is concluded that in the rabbit the brain histaminergic system via its central H₁ receptor produces inhibitory and excitatory effects on feeding and locomotion, respectively. The central H₂ receptor may involve in histamine - induced anorexia too. It also induces a suppressive effect on grooming which is not mediated through its central H₁ and H₂ receptors. In treatment of some behavioral disorders, the use of blood - brain barrier penetrating H₁ and H₂ antihistamines could be recommended. *J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 3: 49-54, 2002.*

Key words: Histamine, Brain, Behavior, Rabbits.

مختلف شرکت می کنند (۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۳، ۲۵). در سالهای اخیر انتشار هیستامین و سه نوع گیرنده H₁، H₂ و H₃ و فعالیت آنزیم سازنده آن، هیستیدین دکربوکسیلاز، در مغز مشخص شده است و نقش هیستامین به عنوان میانجی عصبی قطعیت پیدا کرده است (۳۱).

بر اساس تحقیقاتی مشخص کرده اند که هیستامین نورونی مغز در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیک مختلف مثل خواب و بیداری، تحریک مغز، درجه حرارت بدن، قلب و عروق، فعالیت سیستم سمپاتیک، چگونگی پذیرش مرکزی درد پیکری و کنترل نورواندوکورین نقش اساسی دارد (۳۸، ۳۷، ۲۴، ۳۶، ۷). هم چنین در ایجاد و کنترل رفتارهای مختلف از جمله رفتار غذا و آب خوردن (۲۲، ۳۳، ۲۱، ۶، ۲). رفتار نظافت (۴۱، ۱۸). رفتار

هدف: بررسی نقش مرکزی هیستامین و گیرنده های H₁ و H₂ آن در رفتار خرگوش.

طرح: مطالعه تجربی.

حیوانات: سی و پنج قطعه خرگوش سفید نیوزیلندی بر با وزن ۲/۵ - ۲ کیلوگرم. روش: قرار دادن کانول استانیس استیل راهنما به شماره ۲۳ و به طول ۱۵ میلیمتر در داخل بطن جانبی مغز خرگوش، تزریقات داخل بطن مغزی سالین نرمال (کنترل)، هیستامین (۵۰ میکروگرم)، پرومتازین (آنتاگونیست H₁ ۰۰ میکروگرم)، رانیتیدین (آنتاگونیست H₂ ۱۰۰ میکروگرم) از طریق کانول راهنما، به وسیله سرنگ ۲۵ میکروولیتری، ثبت رفتار حیوان شامل غذا خوردن، نظافت و حرکت کردن به مدت یک ساعت پس از تزریق.

تجزیه و تحلیل آماری: آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و آزمون "۴" زوج.

نتایج: هیستامین مدت زمان غذا خوردن و نظافت کردن را کاهش و مدت زمان حرکت کردن را افزایش داد. پرومتازین به تنهایی موجب افزایش و کاهش به ترتیب در مدت زمان غذا خوردن و حرکت کردن شد و بر مدت زمان نظافت کردن اثر نگذاشت. پیش تزریق پرومتازین از کاهش مدت زمان غذا خوردن و افزایش مدت زمان حرکت کردن ناشی از هیستامین جلوگیری کرده ولی کاهش مدت زمان نظافت کردن ناشی از هیستامین را مهار نکرد. رانیتیدین به تنهایی موجب افزایش مدت زمان غذا خوردن شد و بر مدت زمان نظافت و حرکت کردن اثر نگذاشت و پیش تزریق آن از کاهش مدت زمان غذا خوردن ناشی از هیستامین جلوگیری کرد ولی اثر افزایش دهنده و کاهش دهنده هیستامین به ترتیب بر نظافت و حرکت کردن تأثیری نداشت. بین گروههای شاهد اختلاف معنی دار مشاهده نشد.

نتیجه گیری: از نتایج مطالعه حاضر می توان چنین استنباط نمود که در خرگوش سیستم هیستامینرژیک مغز با به کارگیری گیرنده های H₁ مرکزی یک اثر مهاری بر رفتار تغذیه ای و یک اثر تحریکی بر رفتار حرکتی ایجاد می کند. گیرنده های H₂ مرکزی نیز در ایجاد بی اشتها بی ناشی از هیستامین ممکن است دخالت کنند. همچنین هیستامین مغزی موجب مهار رفتار نظافت کردن می شود که از طریق گیرنده های H₁ و H₂ مرکزی به انجام نمی رسد. استفاده از آنتی هیستامین های H₁ و H₂ قابل عبور از سد خونی - مغزی در درمان برخی از اختلالات رفتاری قابل توصیه می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (۱۳۸۱)، دوره ۵۷، شماره ۳، ۴۹-۵۴.

واژه های کلیدی: هیستامین، مغز، رفتار، خرگوش.

رفتار مجموعه ای از الگوهای حرکتی قابل مشاهده است و به انواع رفلکسی، غریزی، یادگرفتنی و پیچیده تقسیم می شود (۳۰). کنترل رفتارهای مختلف در حیوانات با هماهنگی مغزی غلایم هومورال و عصبی ارسالی از محیطهای داخل و خارج بدن انجام می گیرد. در این هماهنگی انواع ساختمانها و هسته ها و میانجیهای عصبی مغز دخالت می کنند. به طوری که قشر مغز در ارتباط با رفتارهای پیچیده و عالی، سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس در ارتباط با رفتارهای غریزی و نخاع در ارتباط با رفتارهای رفلکسی عمل می کنند و میانجیهای عصبی مختلف از جمله استیل کولین، کاتکولامین ها، سروتونین، گابا، گلیسین، گلوتامات، اندورفین ها، انکفالین ها، نوروپپتیدس، کوله سیستوکینین و غیره در انتقال سیناپسی عملکرد مغز بر روی رفتارهای

(۱) گروه آموزشی فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

(۲) دانش آموزانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.



دهم پس از کانول گذاری سالیین نرمال و در روز یازدهم هیستامین (۵۰ میکروگرم) و یا پرومتازین (۱۰۰ میکروگرم) و یا رانیتیدین (۱۰۰ میکروگرم) دریافت کردند. در مرحله دوم که شامل چهار گروه پنج تایی خرگوش بود ۱۰ دقیقه قبل از دریافت هیستامین (۵۰ میکروگرم) با پرومتازین (۱۰۰ میکروگرم) و یا با رانیتیدین (۱۰۰ میکروگرم) پیش درمانی شدند. در همه گروهها رفتار تغذیه‌ای، نظافت و حرکت در قفس نگهداری، به مدت یکساعت پس از تزریق فیلمبرداری شد. رفتار تغذیه‌ای شامل مدت زمان خوردن پلتهای غذا، رفتار نظافت شامل مدت خاراندن و لیسیدن قسمتهای مختلف سطح بدن و فعالیت حرکتی شامل زمان قدم زدن، روی دو پا بلند شدن و بوکشیدن بود که بعداً به صورت درصد مدت زمان رفتار در یکساعت از روی فیلم محاسبه گردید (۴۱، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۲۶، ۶). داده‌ها در مرحله اول با روش آماری "۴" زوج و در مرحله دوم با آزمون ANOVA یکطرفه و سپس تست دانکن تجزیه و تحلیل شدند (۲۸). در نمودارها و جداول، داده‌ها به صورت Mean±SEM آورده شده‌اند و در سطح معنی‌دار ($P < 0.05$) ارزیابی گردیده‌اند.

نتایج

تزریق داخل بطن مغزی هیستامین در مقدار ۵۰ میکروگرم موجب کاهش درصد مدت غذا خوردن و رفتار نظافت در مدت یکساعت پس از تزریق شد. در حالی که درصد مدت زمان فعالیت حرکتی را افزایش داد ($P < 0.05$). تزریق به تنهایی پرومتازین در مقدار ۱۰۰ میکروگرم موجب افزایش درصد مدت زمان غذا خوردن و کاهش درصد مدت زمان فعالیت حرکتی شد ($P < 0.05$) در حالی که بر درصد مدت زمان رفتار نظافت اثری نداشت. همچنین در تزریق به تنهایی رانیتیدین به مقدار ۱۰۰ میکروگرم فقط درصد مدت زمان غذا خوردن افزایش یافت ($P < 0.05$) و بر درصد مدت زمان نظافت و فعالیت حرکتی اثری نگذاشت. بین اثر تزریق داخل بطن مغزی پرومتازین و رانیتیدین به تنهایی بر درصد مدت زمان غذا خوردن و فعالیت حرکتی اختلاف معنی‌داری مشاهده شد ($P < 0.05$). در ضمن در مقایسه سه رفتار مذکور، بین گروههای کنترل اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۱).

تزریق داخل بطن مغزی پرومتازین (۱۰۰ میکروگرم) قبل از هیستامین (۵۰ میکروگرم) از اثر کاهش دهنده هیستامین بر درصد مدت زمان غذا

جدول ۱- اثرات تزریقات داخل بطن مغزی هیستامین، پرومتازین و رانیتیدین بر روی رفتار در خرگوش.

تیمار	غذا خوردن (درصد مدت زمان)	نظافت کردن (درصد مدت زمان)	حرکت کردن (درصد مدت زمان)
سالیین نرمال هیستامین (۵۰ میکروگرم)	۱۱/۷±۱۱/۷ ۳/۸±۱/۸*	۳۷/۸±۶/۷ ۱۴/۹±۲/۵*	۸/۱±۱/۷ ۲/۱±۲/۹*
سالیین نرمال پرومتازین (۱۰۰ میکروگرم)	۱۵/۳±۲/۶ ۲۵/۵±۲/۳**	۲۶/۷±۵/۷ ۲۱/۷±۶/۱	۷/۷±۱/۸ ۳/۳±۱/۴**
سالیین نرمال رانیتیدین (۱۰۰ میکروگرم)	۱۲/۷±۲/۱ ۱۶/۳±۲/۳**	۳۰/۱±۸/۴ ۲۶/۳±۸/۱	۹/۱±۲ ۱۰/۷±۲/۷۵*

* در مقایسه با سالیین نرمال ($P < 0.05$). + در مقایسه با هیستامین ($P < 0.05$). x در مقایسه با رانیتیدین ($P < 0.05$)

جستجوگری (۴۱، ۱۷)، رفتار حرکتی (۲۹)، یادگیری و حافظه (۴۱، ۲۹). رفتار اضطراب (۱۳) و اختلالات رفتاری (۲۷) دخالت می‌کند. طی مطالعاتی مشخص کرده‌اند که هیستامین مغزی اثر مهاری بر رفتار غذا خوردن و اثر تحریکی بر رفتار آب خوردن در رت و خرگوش ایجاد می‌کند (۲۲، ۲۳، ۲۱). در حالی که از اثرات مرکزی هیستامین بر رفتار نظافت، جستجوگری و فعالیتهای حرکتی بسته به محل، زمان تزریق، نوع حیوان و روش تجربه نتایج مختلفی به دست آمده است. تزریق داخل بطن مغزی هیستامین موجب افزایش رفتار نظافت در رت شده است و در تزریق آن به داخل هیپوکامپ، رفتار نظافت کاهش یافته است. هم چنین تزریق داخل بطن مغزی هیستامین موجب کاهش رفتار جستجوگری در رت شده است (۱۸) و تزریق آن به داخل هسته آکومبنس موجب افزایش رفتار جستجوگری درماز به علاوه مترفع نامتقارن AEPM: Asymetric elevated plus maze شده است و در اثر اخیر مطرح کرده‌اند که هر دو نوع گیرنده H_1 و H_2 هیستامین نقش دارند (۳). تزریق هیستامین به داخل هسته آکومبنس و هیپوکامپ شکمی به ترتیب موجب افزایش و کاهش در فعالیت حرکتی شده است (۱۸). تزریق کلرفینرامین (آنتاگونیست H_1) به داخل بطن سوم مغز موش رت موجب افزایش فعالیت حرکتی در ارتباط با اخذ غذا شده است (۱۴). همچنین در موشهای سوری فاقد گیرنده H_1 ، رفتار حرکتی و جستجوگری در هر دو محیط عادت یافته و جدید دچار اختلال شده است (۱۷). این موضوعات نشان می‌دهند که اثر هیستامین بر فعالیت حرکتی از طریق گیرنده H_1 مرکزی به انجام می‌رسد. با توجه به اثرات متنوع هیستامین نورونی مغز بر رفتار، در این تجربه اثرات مرکزی هیستامین، پرومتازین (آنتاگونیست H_1) و رانیتیدین (آنتاگونیست H_2) بر رفتار خرگوش بررسی شده است. بخشی از نتایج این تحقیق در اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران ارایه شده است (۳۵، ۳۴).

مواد و روش کار

این تجربه بر روی ۳۵ رأس خرگوش سفید نر با وزن ۲ الی ۲/۵ کیلوگرم انجام شده است. خرگوشها از مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تهیه و به طور انفرادی در داخل قفسهای نگهداری در آزمایشگاه با درجه حرارت 22 ± 1 درجه سانتیگراد و چرخه روشنایی - تاریکی ۱۲ ساعت نگهداری شدند. غذای بلتی تجارنی و آب به طور آزاد در دسترس حیوانات قرار داشت. برای تزریقات داخل بطن مغز، پس از مخرومیت شبانه از غذا و نه آب، خرگوشها با تزریق داخل عضلانی مخلوطی از کتامین (۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و گزیلازین (۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند و طی یک عمل جراحی استریل کانول استانیلیس شماره ۲۳ به طول ۱۵ میلی متر در داخل بطن جانبی مغز قرار داده شد (۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۲۶، ۲۵). خروج مایع مغزی نخاعی از انتهای کانول دلیل بر صحت قرار گرفتن کانول در داخل بطن مغز بود. خرگوشها پس از تزریق 60000 واحد پنی سیلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به داخل عضله ران به قفس برگردانده شدند (۹). در این تجربه پودر هیستامین دی‌هیدروکلراید، پرومتازین هیدروکلراید و رانیتیدین هیدروکلراید (مرک، آلمان) در سالیین نرمال (گروه کنترل) حل و در حجم ۵ میکرولیتر و در مدت ۲۰ الی ۳۰ ثانیه با سرنگ هامیلتون ۲۵ میکرولیتری تزریق شدند. این تجربه در دو مرحله انجام گرفت؛ مرحله اول شامل سه گروه پنج تایی خرگوش بود که هر گروه به طور مستقل در روز




تغذیه‌ای از طریق هر دو نوع گیرنده‌های H_1 و H_2 مرکزی با برتری گیرنده H_1 انجام می‌گیرد. در حالی که در اثر مهارى آن بر رفتار نظافت گیرنده‌های H_1 و H_2 دخالتی ندارند. در ضمن اثر تحریکی هیستامین بر رفتار حرکت از طریق گیرنده H_1 مرکزی به انجام می‌رسد. در مطالعات انجام شده برای یافتن نقش هیستامین نورونی مغز و گیرنده‌های مرکزی آن بر رفتار تغذیه‌ای مشخص کرده‌اند که تزریق داخل بطن مغزی هیستامین اثر مهارى بر رفتار تغذیه‌ای رت، خرگوش، جوجه‌های گوشتی و مرغان تخمگذار ایجاد کرده است (۱، ۱۱، ۲۲، ۳۳). تزریق داخل بطن مغزی هیستامین در رت نه تنها موجب کاهش مقادیر اخذ غذا شده است، بلکه مدت زمان نهفته تا شروع خوردن غذا را پس از ارایه غذا به تأخیر انداخته است (۱۲، ۲۲). چنین نتیجه‌ای در مورد خرگوش نیز به دست آمده است (۳۳). بنابراین کاهش مدت زمان غذا خوردن در مطالعه حاضر می‌تواند به علت به عقب انداخته شدن شروع خوردن غذا و کاهش مدت زمان مصرف غذا باشد. تزریق داخل صفاقی و یا داخل بطن مغزی آلفا - فلوروثومیل هیستیدین (کاهش دهنده هیستامین نورونی مغز) موجب کاهش مدت زمان تا شروع خوردن غذا و افزایش میزان اخذ غذا شده است حتی در روزهای آخر تجربه موجب افزایش وزن حیوان نیز شده است (۱۴، ۱۲). از طرف دیگر تزریق داخل صفاقی L- هیستیدین اخذ غذا را در رت کاهش داده است. با توجه به اینکه L- هیستیدین اسیدامینه پیش‌ساز هیستامین است و پس از عبور از سد خونی - مغزی به هیستامین تبدیل می‌شود مطرح کرده‌اند که اثر مهارى هیستیدین بر رفتار تغذیه‌ای با درگیری مکانیسم‌های هیستامینرژیک مغز انجام می‌گیرد (۴۰). از طرف دیگر تزریق داخل صفاقی متوپیرین موجب کاهش اخذ غذا در رت شده است. متوپیرین به راحتی از سد خونی - مغزی عبور کرده و از کاتوبولیس هیستامین جلوگیری می‌کند (۲۱). همه یافته‌های مذکور بیانگر این نکته‌اند که هیستامین مغزی اثر مهارى بر رفتار تغذیه‌ای دارد. بر اساس مطالعاتی مشخص کرده‌اند که گیرنده H_1 مرکزی هیستامین در اثرات مهارى آن بر رفتار تغذیه‌ای نقش دارد. چون تزریق به تنهایی کلرفنیرامین (آنتاگونیست H_1) به داخل بطن سوم مغز و یا هسته وترومدیال رت و یا به داخل بطن جانبی مغز خرگوش اخذ غذا را افزایش داده است (۱۴، ۳۳). همچنین تزریق داخل بطن مغزی آگونیست گیرنده H_1 ، تری فلوروثومیل فینیل هیستامین، اخذ غذا را در رت کاهش داده است (۲۲). در مطالعه حاضر اثر مهارى و جلوگیری کننده به ترتیب ناشی از تزریق به تنهایی و پیش تزریق پرومتازین شدیدتر از رانیتیدین بود که نشان دهنده درگیری هر دو نوع گیرنده با برتری گیرنده H_1 می‌باشد. در گزارشات ارایه شده مطرح کرده‌اند که گیرنده H_2 هیستامین در رفتار تغذیه‌ای نقشی ندارد. اگرچه اثر تحریکی ضعیفی از تزریق داخل بطن سوم سایمتیدین (آنتاگونیست H_2) در رت مشاهده شده است (۱۴). و در خرگوش افزایش غیرمعنی داری در اخذ غذا متعاقب تزریق داخل بطن مغزی به تنهایی سایمتیدین رخ داده است (۱، ۳۳). همچنین در جوجه‌های گوشتی و مرغان تخمگذار پیش تزریق سایمتیدین از اثر تضعیفی هیستامین بر اخذ غذا جلوگیری کرده است (۱۱). علت تفاوت اثر می‌تواند از تفاوت در مکانیسم اثر آنتاگونیست‌های H_2 همانند آنتاگونیست‌های H_1 و یا نوع حیوان مورد آزمایش منشأ بگیرد. چون در رت از تزریق داخل بطن مغزی کلرفنیرامین، میپیرامین و پرومتازین فقط کلرفنیرامین اثر تحریکی بر اخذ غذا ایجاد کرده است (۱۴). در حالی که در یک تحقیق دیگر اثر تحریکی از میپیرامین بر اخذ غذا در رت گزارش شده است (۲۲). برای تأیید نقش برتر گیرنده H_1 نسبت

خوردن نه تنها جلوگیری کرد. بلکه در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری ایجاد نمود ($P < 0.05$) و بر درصد مدت زمان نظافت علی‌رغم افزایش آن تغییر معنی داری ایجاد نکرد ولی اثر افزایش دهنده هیستامین بر روی درصد مدت زمان فعالیت حرکتی جلوگیری کرد ($P < 0.05$). تزریق داخل بطن مغزی رانیتیدین (۱۰۰ میکروگرم) قبل از هیستامین (۵۰ میکروگرم) از اثر کاهش دهنده هیستامین بر درصد زمان غذا خوردن جلوگیری کرد ($P < 0.05$) ولی بر درصد مدت زمان رفتار نظافت علی‌رغم کاهش آن تأثیر معنی داری ایجاد نکرد. هم چنین از اثر افزایش دهنده هیستامین بر درصد زمان حرکتی جلوگیری نکرد. در مقایسه بین پیش تزریق پرومتازین و رانیتیدین، بر درصد مدت زمان غذا خوردن و حرکت اختلاف معنی دار وجود داشت ($P < 0.05$) ولی در رفتار نظافت اختلاف معنی دار مشاهده نشد (نمودار ۱).

بین گروههای کنترل مرحله اول با گروه کنترل مرحله دوم تجربه و همچنین بین تزریق یکبار هیستامین از مرحله اول با تزریق هیستامین پس از سالیان نرمال گروه دوم در درصد مدت زمان غذا خوردن، نظافت و حرکت اختلاف معنی دار مشاهده نشد (جدول ۲).

نمودار ۱- اثرات تزریقات داخل بطن مغزی هیستامین، پرومتازین و رانیتیدین بر رفتار تغذیه‌ای، نظافت و حرکت در خرگوش.



* در مقایسه با سالیان نرمال + سالیان نرمال ($p < 0.05$), + در مقایسه با سالیان نرمال + هیستامین ($p < 0.05$), x در مقایسه با رانیتیدین + هیستامین ($p < 0.05$), اعداد داخل پرانتز SEM را نشان می‌دهند.

جدول ۲- تغییرات رفتاری در خرگوش در گروههای کنترل مرحله اول و دوم تجربه و گروه هیستامین مرحله اول با گروه سالیان نرمال + هیستامین مرحله دوم متعاقب تزریقات داخل بطن مغزی.

تیمار	غذا خوردن (درصد مدت زمان)	نظافت کردن (درصد مدت زمان)	حرکت کردن (درصد مدت زمان)
کنترل‌های مرحله اول	11.7 ± 1.7	37.1 ± 6.7	8.1 ± 1.7
(تزریق داخل بطن مغزی یکبار از سالیان نرمال)	15.3 ± 2.6	26.7 ± 5.7	7.7 ± 1.8
کنترل مرحله دوم	12.7 ± 2.1	30.1 ± 8.4	9.1 ± 2
(تزریق داخل بطن مغزی سالیان نرمال دوبار با فاصله ۱۰ دقیقه)	11.3 ± 2.3	35.3 ± 5.2	10.1 ± 2.3
هیستامین (۵۰ میکروگرم) (مرحله اول)	3.8 ± 1.8	14.9 ± 2.5	2.1 ± 2.9
سالیان نرمال + هیستامین (۵۰ میکروگرم) (مرحله دوم)	2.8 ± 1.6	13 ± 2.8	2.2 ± 4

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهند که افزایش دادن میزان هیستامین مغز خرگوش یک اثر مهارى بر رفتار تغذیه‌ای و نظافت و یک اثر تحریکی بر رفتار حرکتی در محیط عادت کرده ایجاد می‌کند. اثر مهارى بر رفتار



آن را کاهش انتقال سیناپسی هیستامینرژیک از طریق گیرنده H_1 مطرح کرده‌اند (۱۷). تزریق هیستامین به داخل هیپوکامپ خلفی موجب کاهش فعالیتهای حرکتی در رت شده‌است در حالی که تزریق ۳ - متیل هیستامین به داخل هیپوکامپ خلفی رفتار حرکتی را کاهش داده است (۵). در طی مطالعه دیگری مشخص شده است که در هیپوکامپ اثر هیستامین بر رفتار جستجویی با تداخل هر دو نوع گیرنده H_1 و H_2 آن به انجام می‌رسد (۴). تزریق داخل صفاقی هیستیدین در مقادیر زیاد همان اثرات هیستامین مرکزی را در رت ایجاد کرده‌است (۳۹). همه مطالعات فوق بیانگر این نکته هستند که در یک محیط عادت یافته، افزایش دادن میزان هیستامین همه جنبه‌های فعالیت حرکتی به ویژه رفتار جستجویی را افزایش می‌دهد در حالی که در یک محیط جدید که فرآیندهای یادگیری را به دنبال دارد افزایش میزان هیستامین مغزی فعالیتهای حرکتی به ویژه رفتار جستجویی برای یادگیری را کاهش می‌دهد چون تحریک هسته توبرومامیلاری، هسته حاوی اجسام سلولی نورونهای هیستامینرژیک، موجب کاهش انتقال اطلاعات به هیپوکامپ برای ایجاد رفتار جستجویی شده است مطرح کرده‌اند که هیستامین مغزی یک نقش منفی در فرآیندهای حرکتی یادگیری مثل رفتار جستجویی دارد (۴۱، ۳۹).

با توجه به این که انتشار نورونهای هیستامینرژیک در مغز خرگوش مطالعه و مشخص شده است که بدنه سلولی نورونهای هیستامینرژیک در هسته توبرومامیلاری قرار دارند و تقریباً به همه نقاط مغز اکسونهایی فرستاده‌اند (۱۹). به طور خلاصه می‌توان چنین مطرح نمود که در خرگوش فعال شدن سیستم هیستامینرژیک مغز موجب مهار رفتار تغذیه‌ای و نظافت و تحریک فعالیت حرکتی از طریق گیرنده‌های مختلف آن در محیطی می‌شود که حیوان به آن عادت کرده‌است و ارزیابی اثر هیستامین بر رفتار خرگوش در یک محیط جدید نیاز به بررسی دارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از خانم صنوا سیدنژاد مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی، خانم لادن واحدی مسئول اینترنت و اطلاع‌رسانی، آقای رضا اسدی مسئول سمعی و بصری دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه و آقای محمد فرخی پور قدردانی و تشکر می‌گردد.

References

۱. تمدنفر، ا. (۱۳۷۸): اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی رفتار تغذیه‌ای در خرگوش. پایان‌نامه دکتری تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی، شماره ۱۰۰، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، صفحه: ۶۳ - ۲۶.
۲. تمدنفر، ا.، باباپور، و. و فرشید، ا. ع. (۱۳۸۰): اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش، مجله شماره ۲ دوره ۵۶، صفحه: ۱۱۲ - ۱۰۷.
3. Alvarez, E. O. and Banzan, A. M. (1986): Histamine in dorsal and ventral hippocampus. II: Effects of H_1 and H_2 histamine antagonists on exploratory behavior in male rats, *Physiol. Behav.*, 37, 1: 39 - 45.
4. Alvarez, E. O. and Gurrea, F. A. (1982): Effects of histamine microinjection into the hippocampus on open - field behavior in rats, *Physiol. Behav.*, 28, 6: 1035 - 1040.

به H_2 در مطالعه حاضر باید گفت که اثر به تنهایی پرومتازین قویتر از رانیتیدین بود و در پیش تزریق پرومتازین به علت مهار شدن گیرنده H_1 و آزاد بودن گیرنده H_2 ، تزریق بعدی هیستامین اثر ضعیفی از طریق گیرنده H_2 ایجاد کرده است در حالی که در پیش تزریق رانیتیدین به علت مهار شدن گیرنده H_2 و آزاد بودن گیرنده H_1 ، تزریق بعدی هیستامین اثر قویتری از گیرنده H_1 به وجود آورده است.

در ارتباط با اثر هیستامین مرکزی بر رفتار نظافت گزارشات متناقضی ارائه شده است. بدین صورت که تزریق داخل بطن مغزی هیستامین موجب افزایش رفتار نظافت از طریق گیرنده‌های H_1 در رت شده است. در حالی که در تزریق آن به داخل هیپوکامپ پشتی و شکمی کاهش رفتار نظافت در رت مشاهده شده است. از طرف دیگر تزریق هیستامین به داخل بخش خلفی میانی هسته راف رفتار نظافت ایجاد کرده است (۱۸) و یا در تزریق آلفا - فلونورومتیل هیستیدین به داخل هیپوکامپ شکمی اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی رفتار نظافت مشاهده نشده است (۴). در حالی که تزریق ۳ - متیل هیستامین به داخل هیپوکامپ خلفی موجب افزایش رفتار نظافت در موشهای رت شده است (۵). رفتار نظافت شامل خاراندن، لیسیدن و گاز گرفتن سطوح خارجی بدن در پاسخ مستقیم به تحریکات محیطی محرک پوست مثل رطوبت، گرد و غبار و انگل‌های خارجی رخ می‌دهد و نیز در هنگام قرار گرفتن در مقابل استرسها مثل محیط جدید با دخالت هورمون آدرنوکورتیکوتروپ ایجاد می‌شود (۲۲). با توجه به این که هیستامین مغزی در پاسخهای نورواندوکربینی و رفتاری انواع مختلف استرسها نقش دارد (۷، ۸). کاهش رفتار نظافت در مطالعه حاضر می‌تواند در ارتباط بین هیستامین، استرس و رفتار نظافت در خرگوش قابل توجه باشد و چون در مطالعه حاضر گیرنده‌های H_1 و H_2 از اثر کاهش دهنده هیستامین جلوگیری نکرده‌اند، می‌توان مطرح نمود که هیستامین یا از طریق گیرنده‌های غیر H_1 و H_2 و یا از طریق تنظیم آزاد شدن سایر میانجیهای عصبی عمل نموده‌است. به هر حال در مورد رفتار نظافت خرگوش و نقش هیستامین مغزی در آن گزارش مستدلی ارائه نشده است. گزارشات مختلفی در مورد اثر هیستامین مرکزی بر روی فعالیت‌های حرکتی ارائه شده است. تزریق هیستامین به داخل بطن جانبی مغز و یا هیپوکامپ پشتی موجب کاهش فعالیتهای حرکتی در رت شده است در حالی که در تزریق آن به داخل هسته آکومینس فعالیت حرکتی افزایش یافته است (۱۸). از طرف دیگر از تزریق داخل بطن مغزی هیستامین در رت یک اثر دو مرحله‌ای مشاهده شده است. بدین صورت که ابتدا فعالیت حرکتی کاهش و سپس افزایش یافته است. کاهش حرکت مرحله اول با پیش تزریق تیموپرامید (آنتاگونیست H_3) مهار شده است و از افزایش فعالیت حرکتی متعاقب، با پیش تزریق میپرامین (آنتاگونیست H_1) جلوگیری شده است (۱۰). همچنین تزریق هیستامین به داخل هسته آکومینس موجب افزایش رفتار جستجویی درماز به علاوه مرتفع نامتقارن شده است و پیش تزریق هر دو پیریلامین (آنتاگونیست H_1) و رانیتیدین (آنتاگونیست H_2) از اثر هیستامین جلوگیری کرده است (۳). مشخص شده است که در جوندگان میزان هیستامین مغز در اوایل پریرود تاریکی کمتر از اوایل پریرود روشنایی است (۱۴) و با افزایش دادن میزان هیستامین در شب توانسته‌اند رفتار حرکتی را افزایش بدهند و بیداری ایجاد کنند (۲۹). در موشهای سوری فاقد گیرنده H_1 ، فعالیتهای حرکتی در محیط عادت داده شده افزایش می‌یابد. در حالی که در محیط جدید رفتار جستجویی و بر روی دویا بلند شدن کاهش می‌یابد که علت



5. Alvarez, E. O. (1998): Histaminergic systems of limbic structure in learning and motivation, presented at INABIS 98 -5th Internet World Congress on Biomedical Sciences, Available at URL [http:// www.mcmaster.ca /inabis98/huston/alvarez_0117/index, html](http://www.mcmaster.ca/inabis98/huston/alvarez_0117/index.html).
6. Babapour, V. and Tamaddonfard, E. (1999): The effect of ICV injection of histamine on water intake in the rabbit, In proceedings of 26th World Veterinary Congress, Lyon, France.
7. Brown, R. E., Stevens, R. D. and Haas, H. L. (2001): The physiology of brain histamine, *Prog. Neurobiol.*, 63, 6: 637 - 672.
8. Cacabelos, R. (1991): Histaminergic regulation of the neuroendocrine system, In: *Histaminergic Neuron: Morphology and Function*, Watanabe, T., and Wada, H., (Editors), CRC Press, Inc. Boca Raton, USA, PP: 241 - 271.
9. Carpenter, L., Mashima, T. Y., Gentz, E. J. and Harrentein, L. (1995): Caring of rabbits: An overview and formulary, *Vet. Med.*, 90, 4: 340 - 364.
10. Chiavegatto, S., Nasello, A. G. and Bernardi, M. M. (1998): Histamine and spontaneous motor activity, biphasic changes, receptors involve and participation of the striatal dopamine system, *Life Sci.*, 62, 20: 1875 - 1888.
11. Denbow, D. M. (1997): ICV histamine decreases food intake in broilers and leghorns, In 86th Annual Meeting Abstracts, *Poultry Sci.*, 76; suppl 1, N: 176.
12. Doi, T., Sakata, T., Yoshimatsu, H., Machidori, H., Kurakawa, M., Jayasehara, L. A. L. W., and Niki, N. (1994): Hypothalamic neuronal histamine regulates feeding circadian rhythm in rats, *Brain Res.*, 641: 311 - 318.
13. Frisch, C., Hasenohrl, R. U., Krauth, J. and Huston, J. P. (1998): Anxiolytic - like behavior after lesion of the tuberomammillary nucleus E2 - region, *Exp. Brain Res.*, 119, 2: 260 - 264.
14. Fukagawa, K., Sakata, T. Shiraishi, T., Yoshimatsu, H., Fujimoto, K., Ookuma, K. and Wada, H. (1989): Neuronal histamine modulates feeding behavior through H₁- receptor in rat hypothalamus, *Am. J. Physiol.*, 256: R605 - R611.
15. Ganong, W. F. (1999): *Review of Medical Physiology*, 19th ed, Appleton Lange, New York, USA, PP: 221 - 249.
16. Gould, J. L. and Gould, C. G. (1994): *The animal mind*, Scientific American Library, New York, USA, PP: 213 - 218.
17. Inoue, I., Yani, K. Kitamura, D., Niimura, K. and Watanabe, T. (1996): Impaired locomotor activity and behavior in mice lacking histamine H₁ receptors, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 93, 23: 13316-13320.
18. Itowi, N. and Yamatodani, A. (1991): Comprehensive list of effects of centrally administered histamine and related compounds, in: *Histaminergic Neuron, Morphology and Function*, Watanabe, T., and Wada, H., (Editors), CRC Press. Inc., Boca Raton, New York, USA, PP: 383 - 402.
19. Iwase, M., Homma, I., Shioda, S. and Nakai, K. (1993): Histamine immunoreactive neurons in the brain stem of the rabbit, *Brain Res. Bull.* 32, 3: 267 - 272.
20. Kandel, E. R., Schwartz, J. H. and Jessell, T. M. (1991): *Principles of Neural Science*, 3rd Edition, Appleton and Lange, New York, USA, PP: 5 - 32.
21. Lecklin A., Tumisto, L. (1998): The blockade of H₁ receptors attenuates the suppression of feeding and diuresis induced by inhibition of histamine catabolism, *Pharmacol. Biochem. Behav.*, 59, 3: 753 - 758.
22. Lecklin, A., Etu - Seppala, P., Stark, H. and Tuomisto, L. (1998): Effects of intracerebroventricularly infused histamine and selective H₁, H₂, H₃ agonist on food and water intake and urine flow in wistar rats, *Brain Res.* 793: 279 - 288.
23. Levitan, I. B. and Kaczmarek, L. K. (1991): *The neuron: Cell and Molecular Biology*, Oxford University Press, Inc., New York, USA, PP: 373-395.
24. Malmberg - Aiello, P., Lamberti, C., Ghelardini, C., Giotti, A., and Bartolini, A. (1994): Role of histamine in rodent antinociception, *Br. J. Pharmacol.*, 111: 1264 - 1279.
25. McFarland, D. (1999): *Animal Behaviour*, 3rd ed, Longman, Harlow, England, PP: 107 - 231.
26. Merali, Z. and Kateb, C. C. (1993): Rapid alternations of hypothalamic and hippocampal bombesin - like peptide levels with feeding status, *Am. J. Physiol.* 265: R420 - R425.
27. Onodera, K., Yamatodani, A., Watanabe, T. and Wada, H. (1994): Neuropharmacology of the histaminergic neuron system in the brain and its relationship with behavioral disorders, *Prog. Neurobiol.*, 42: 685 - 702.
28. Phillips, D. S. (1978): *Basic Statistics for Health Science Students*, W. H. Freeman and Company, New York, USA, PP: 93 - 108.
29. Phillipu, A. and Prast, H. (1998): Importance of brain histamine in locomotion, memory and EEG spectral power, Presented at INABIS 98 - 5th Internet World Congress on Biochemical Sciences, Available at URL http://www.mcmaster.ca/inabis98/huston/philip_u0262/index.html.
30. Polsky, R. H. (1994): *Ethology: A foundation for treating behavior problems*, *Vet. Med.*, 89, 3: 192- 195.
31. Schwartz, J. C., Arrang, J. M., Garbarg, M., Pollard, H., and Ruat, M. (1991): Histaminergic transmission in mammalian brain, *Physiol. Rev.*, 71, 1: 1-50.
32. Spruijt, B. M., Van Hoof, J. A. R. A. M. and Gispen, W. H. (1992): Ethology and neurobiology of grooming behavior, *Physiol. Rev.*, 72, 3: 825 - 852.
33. Tamaddonfard, E., Babapour, V. and Farshid, A. A. (1999): The effect of ICV injection of histamine on food intake in rabbits, In *Proceedings of 26th World Veterinary Congress*, Lyon, France.
34. Tamaddonfard, E. and Hajieghrary, N. (2000): The effect of ICV injection of ranitidine - histamine on the



- some of behavior in rabbits, Proceedings of The First Iranian Congress of Veterinary Basic Sciences, P: 311.
35. Tamaddonfard, E. and Morady, B. (2000): The effect of ICV injection of histamine on the some of behavior in rabbits, Proceedings of the first Iranian Congress of Veterinary Basic Sciences, P: 315.
36. Tammaddonfard, E., Azamparsa, A. and Behjat, B. (2000): The effects of ICV injection of cimetidine and histamine on pain response in the rabbit. Proceedings of 15th Iranian Congress of Physiol. Pharmacol. Shiraz, Iran, P: 1-104.
37. Tammaddonfard, E., Reyhani, S. and Azimpouran, A. (2001): The central effects of chlorpheniramine and histamine on pain behavior in the rabbit. In Proceedings of the 15th Iranian Congress of Physiol. Pharmacol. Shiraz, Iran, P: 2-22.
38. Tammaddonfard, E., Seiednegahad – Y, S. (2001): The effects of intracerebroventricular injection of histamine on body temperature in the rabbit. Proceedings of 15th Iranian Congress of Physiol. Pharmacol. Shiraz, Iran, P: 4-2.
39. Trivedi, C. P. and Balothia, P. K. (1978): Neuropharmacological studies on histamine and its precursor L – histidine in rats, Ind. J. Pharmacol., 10, 1: 27 – 34.
40. Vaziri, P., Dang, K. and Anderson, G. H. (1997): Evidence for histamine involvement in the effect of histidine loads on food and water intake in rats, J. Nutr. 127, 8: 1519 – 1526.
41. Wiler, H. T., Hasenohrl, R. U., Van Ladeghem, A. A., Van Ladeghem, M. Brankock, J., Huston, J. P., and Haas, H. H. (1998): Differential modulation of hippocampal signal transfer by tuberomammillary nucleus stimulation in freely moving rats dependent on behavioral state, Synapse, 28, 4: 294 – 301.

