

بررسی فراوانی هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری‌ها در موارد ورم پستان تعدادی از گله‌های گاوها در نژاد هلشتاین اطراف مشهد

دکتر مسعود طالب خان گروسی^{*} دکتر جعفر نویدمهر^۱ دکتر فریبا یدالهی^۲

دریافت مقاله: آذرماه ۱۳۸۲

پذیرش نهایی: ۱۶ آبانماه ۱۳۸۲

The survey of *Histophilus somni* and other bacteria frequency in mastitis of Holstein dairy cattle herds in suburb of Mashhad

Talebkhan Garoussi. M.,¹ Navid Mehr. J.,² Yadolahe. F.³

¹Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran. ²Razi Serum and Vaccine Research Institute of Mashhad, Mashhad-Iran. ³Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran.

Objective: 1-If *Histophilus somni* can be involved of mastitis in Holstein dairy cattle. 2- The frequency of *Histophilus somni* and other bacteria isolated in mastitis cases.

Design: Cross-sectional.

Animals: 116 Holstein dairy cattle.

Procedure: Cows were examined in 6 dairy cattle herds in suburb of Mashhad, Iran. They were tested for clinical (No: 22; 18.64%) and sub clinical mastitis (No: 94; 81.04%) by using routine clinical methods and California Mastitis Test (CMT). They were cultured in Brain Heart Infusion Yeast agar at 37°C in 10% CO₂ for *Histophilus somni* and other bacteria infection. They were evaluated after 24- 48 hours.

Statistical analysis: Chi- square and Fisher tests.

Results: *Histophilus somni* was isolated from only 2 (1.73%) clinical mastitis cows. Sub clinical mastitis cows were not infected by *Histophilus somni*. There were significant differences between clinical and sub clinical mastitis in respect to mammary gland infection ($P<0.05$). The infection rate in winter and spring seasons were 1.73% (No: 58) and (1.73%), respectively. However, 8 bacteria were isolated, too.

Conclusion: The infection rate of mastitis due to *Histophilus somni* was very low (1.73%). It was cultured difficulty. The real infection rate may be higher. It is necessary to use more sensitive methods. *J.Fac.Vet.Med.Univ.Tehran.* 60,2:137-141,2005.

Keywords: *Histophilus somni*, Clinical mastitis, Sub clinical mastitis, dairy cow.

Corresponding author's email: garoussi@ferdowsi.um.ac.ir

است. این ارگانیسم برای اولین بار توسط Griner و همکارانش در سال ۱۹۵۶ به عنوان عامل اتیولوژیک ترمبوامیولیک مننگوآسفالیت (TEME) (Shuttleworth) شناخته شد (۱۷). هیستوفیلوزین (*Histophilus*) در گاوها شیری و گوشته مطرح است. میزان آلودگی سرمی بیش از موارد بالینی آن می‌باشد. بررسی سروولوژیک نشان داده است که تقریباً ۲۵ درصد از گاوها شیری دارای تیتر آنتی‌بادی برعلیه

هدف: ۱- آیا آلودگی بواسطه باکتری هیستوفیلوس سومنی در دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی مطرح است؟ ۲- میزان فراوانی آلودگی به این باکتری و سایر باکتری‌ها در دامهای تحت بررسی چقدر است؟ طرح: مطالعه مقطعی.

حيوانات: يكصد و شانزده رأس گاوشيري نژاد هلشتاین مبتلا به ورم پستان از نظر آلودگی روش: يكصد و شانزده رأس گاوشيري نژاد هلشتاین مبتلا به ورم پستان از نظر آلودگی پستان بالیني (۱۸/۹۶ درصد، ۲۲ رأس) و تحت باليني (۸۱/۰۴ درصد، ۹۴ رأس) به ترتيب از طريق معاینه باليني بافت پستان، تغيير وضعیت و قوام شیر و انجام (CMT) California Mastitis Test نمونه‌های تهیه شده در شرائط بيهوازی (۵ الی ۱۰ درصد CO_2) در محیط Agar و ۳۷ درجه سانتيگراد صورت گرفت. نتایج

کشت پس از گذشت ۲۴ الی ۴۸ ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری: روش آماری مربع کای و تست Fisher. نتایج: در این بررسی مشخص گردید که فقط ۲ رأس (۱/۷۳ درصد) از دامهای تحت بررسی، آلوده به باکتری هیستوفیلوس سومنی می‌باشند. این باکتری فقط از دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی جدا گردید و هیچ یک از دامهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، آلوده به این باکتری نبودند. ارتباط معنی داری بین دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی با منشاء هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری‌ها وجود دارد ($P<0.05$). توزیع آلودگی در دامهای تحت مطالعه در فصول زمستان (۳/۱ درصد)، یک مورد از ۵۸ رأس (۱/۷۳) و بهار (۵۸ رأس) برابر بود. در این بررسی مشخص گردید که نمونه‌های مورد مطالعه نیز به ۸ نوع باکتری دیگر آلوده می‌باشند.

نتیجه گیری: در این بررسی مشخص گردید که میزان آلودگی به باکتری هیستوفیلوس سومنی در موارد ورم پستان، کم (۱/۷۳ درصد) می‌باشد. با توجه به رشد کند و سخت این باکتری در محیط کشت باکتریال، احتمالاً میزان آلودگی واقعی بیش از نتایج حاصله بوده که این مسئله ممکن است ناشی از مخفی ماندن هیستوفیلوس سومنی توسط سایر باکتری‌ها باشد. که در این راسته، بکار گیری روش‌های دقیق‌تر تشخیص ضروری می‌باشد. مجله دانشکده دامپژوهشکی دانشگاه تهران، ۱۴۱، ۲، دوره ۱۴۱، شماره ۱۴۱-۱۳۷.

واژه‌های کلیدی: هیستوفیلوس سومنی، ورم پستان بالینی، ورم پستان تحت بالینی، گاوشيري.

هیستوفیلوس سومنی باکتری گرم منفی، کوکوباسیل پلی مرفیک و فاقد کپسول

(۱) گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشکده دامپژوهشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

(۲) موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی مشهد، مشهد - ایران.

(۳) دانش آموخته دانشکده دامپژوهشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

*(نویسنده مسؤول: garoussi@ferdowsi.um.ac.ir)



جدول ۱- توزیع آلودگی ورم پستان با منشاء هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری ها.

نوع ورم پستان							
نوع باکتری			هموفیلوس سومنوس				
جمع	-	+	جمع	-	+		
(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)		
۹۴	۵ (۵/۳۲)	۸۹ (۹۴/۶۸)	۹۴	۹۴ (۱۰۰)	- (-)	تحت بالینی	
۲۲	۳ (۱۳/۶۴)	۱۹ (۸۶/۳۶)	۲۲	۲۰ (۹۰/۹۱)	۲ (۹۰/۹)	بالینی	
۱۱۶	۸ (۶/۹)	۱۰۸ (۹۳/۱)	۱۱۶	۱۱۴ (۹۸/۲۷)	۲ (۱/۷۳)	جمع	

ارتباط معنی دار است ($P < 0.05$).

(Chocolate agar) و در شرائط بیهوده ای فوق الذکر ادامه کشت داده می شد. با توجه به نوع پرگنه (شبینی شکل و بالتلاؤز رد کمر نگ)، اندازه پرگنه، همولیزو یا عدم همولیز، نحوه رشد، گسترش، رنگ آمیزی و مشاهده میکروسکوپیک، تشخیص اولیه باکتری هیستوفیلوس سومنی داده شد. به منظور تأیید تشخیص این باکتری، از آزمایشات بیوشیمیابی و آنزیمی تكمیلی استفاده شد (۸، ۱۴). در این بررسی نیز، سایر باکتری های جداسده با استفاده از روش های تشخیصی، از موارد ورم پستانها، مورد شناسایی قرار گرفت.

اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون مربع کای و تست Fisher مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج

به دنبال کشت و تأیید میکروسکوپیک و انجام آزمایش های تكمیلی آنزیمی و بیوشیمیابی، مشخص گردید که فقط ۲ رأس (۱/۷۳ درصد) از دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی، به طور خالص، آلوده به باکتری هیستوفیلوس سومنی بوده، در حالی که ۹۳/۱ درصد (۱۰۸ رأس) از موارد تحت بررسی آلوده به سایر باکتری ها بودند (جدول ۱).

همان گونه که در جدول ۱ک مشاهده می شود هیچ یک از موارد ورم پستان تحت بالینی آلوده به هیستوفیلوس سومنی نمی باشد. آزمون مربع کای و تست Fisher ارتباط معنی داری بانوع ورم پستان و آلودگی با هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری های جداسده نشان می دهد ($P < 0.05$).

جدول ۲ نمایانگر ارتباط بین فصل و آلودگی بافت پستان به باکتری هیستوفیلوس سومنی در دامهای تحت بررسی می باشد.

در این بررسی مشخص گردید که یک رأس (۱/۷۳ درصد) از گاو های مبتلا به ورم پستان، در فصل زمستان و یک رأس (۱/۷۳ درصد) از گاو های تحت بررسی در فصل بهار، به طور خالص آلوده به هیستوفیلوس سومنی می باشد. اما آزمون مربع کای و تست Fisher ارتباط معنی داری را بین فصل و آلودگی بافت پستان توسط این باکتری نشان نداد (۵). جدول ۳ نشان می دهد که دامهای تحت بررسی، علاوه بر هیستوفیلوس سومنی، به ۸ نوع

این باکتری می باشند (۵). این باکتری علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن سیستم عصبی، قادر به بروز سپتی سمی، میوکاردیت، برونوکوبونومونی، تورم فیبرینی پرده جنب، اووتیت میانی، سینوویت، ورم مفاصل، ویمباریهای مختلف سیستم تولید مثل در گاونرو ماده است (۲، ۵، ۱۰، ۱۶). این باکتری به تنها یکی ممکن است عامل مهمی در بروز ورم پستان گاو باشد (۱۹، ۳، ۶، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۵، ۱۶).

بررسی و جدا سازی مقایسه ای هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری ها از موارد ورم پستان، بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت اقتصادی ورم پستان، که در نهایت منجر به کاهش عمر اقتصادی دام می گردد و نظر به اینکه جدا سازی هیستوفیلوس سومنی از موارد ورم پستان در ایران مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. در این راستاء، اهداف این بررسی، پاسخگوی سؤالات ذیل است: ۱- آیا گاو های شیری مبتلا به ورم پستان، آلوده به باکتری هیستوفیلوس سومنی هستند؟ ۲- فراوانی آلودگی به این باکتری و سایر باکتری ها در موارد ورم پستان بالینی و تحت بالینی در گله های شیری تحت بررسی اطراف مشهد چگونه است؟

مواد و روش کار

در این بررسی از ۱۱۶ رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در ۶ واحد دامپروری صنعتی اطراف مشهد به ظرفیت های ۱۰۰ الی ۳۰۰ رأس گاو شیری با مدیریت و ثبت مشخصات صحیح و تقریباً یکسان نمونه گیری شد.

روش نمونه برداری

نمونه برداری از دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی، به طور کاملاً تصادفی انجام گرفت. پس از شست و شوو خشک نمودن بافت پستان و سرپستانک، دامها از نظر ابتلاء ورم پستان بالینی و تحت بالینی مورد معاینه قرار می گرفتند. بررسی موارد ورم پستان تحت بالینی با استفاده از روش California Mastitis Test (CMT) با استفاده از محلول شیر آزما (گروه تحقیقاتی شرکت نور دارو- ایران) انجام گرفت. در این مطالعه به ترتیب از ۲۲ رأس (۱۸ درصد) و ۹۴ رأس (۸۱ درصد) گاو مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی نمونه گیری به عمل آمد. پس از ضد عفنی کارتیه های مبتلا، با استفاده از بینه و الكل و رعایت کلیه مسائل بهداشتی و نمونه برداری، ۱۰ الی ۱۵ سی سی از شیر به داخل شیشه های استریل درب پیچ داریخته شد. اطلاعات موردنیاز شامل: نام دامپروری، شماره دام، نوع ورم پستان (بالینی و یا تحت بالینی) و کارتیه مبتلا بر روی برچسب های لوله ها و پرسشنامه مربوطه ثبت گردید. نمونه هادر کناریخ به آزمایشگاه تشخیص دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل گردید.

کشت و بررسی باکتریولوژیک: نمونه شیر های تهیه شده از گاو های مبتلا به ورم پستان، پس از انتقال به آزمایشگاه تشخیص، در زیر ھود، در محیط Brain Heart Infusion Yeast Agar (BHIYA) (Hispan Lab. S.A., Spain) در جاری بیهوده (۵۰۰۰ درصد CO_2) و انکوباتور (۳۷ درجه سانتیگراد) کشت داده شد. در صورت نیاز و به منظور بررسی و مطالعه بیشتر، در آگار شکلات

جدول ۳- توزیع سایر باکتری‌های جدنشده از موارد ورم پستان بالینی و تحت بالینی.

جمع	کشت باکتریال		نوع باکتری
	(درصد)-	(درصد)+	
۱۵۱	(۸۸/۰۷)۱۳۳	(۱۱/۹۲)۱۸	اشریشیاکلی
۱۵۱	(۸۱/۴۵)۱۲۳	(۱۸/۵۴)۲۸	استافیلوکوک اورئوس
۱۵۱	(۹۸/۰۱)۱۴۸	(۱/۹۸)۳	استرپتوكوک آگلاکتیب
۱۵۱	(۵۱)۷۷	(۴۹)۷۴	باسیلوس سرئوس
۱۵۱	(۸۰/۱۳)۱۲۱	(۱۹/۸۶)۳۰	استافیلوکوک اینترمیدیکوس
۱۵۱	(۹۴/۰۳)۱۴۲	(۶/۳۳)۹	پروتئوس
۱۵۱	(۹۸/۶۷)۱۴۹	(۱/۳۳)۲	کلستریدیوم پرفیرینجنس
۱۵۱	(۹۷/۳۵)۱۴۷	(۲/۶۴)۴	استافیلوکوک ساپروفیتیکوس

بار توسط Armstrong و همکارانش در سال ۱۹۸۶ در کانادا انجام گردید(۴). در بررسی انجام شده توسط Wedderkopp در سال ۱۹۹۷ مشخص گردید که کشت‌های به عمل آمده از ۶۸۰۹ کارتیه ۳۷۸۳ رأس گاو مبتلا به ورم پستان، هیستوفیلوس سومنی فقط از یک مورد جدا گردید و علائم بالینی به طور ملایم در گاو مربوطه بروز کرده بود(۲۰).

باکتری هیستوفیلوس سومنی، کوکوباسیل کوچک گرم منفی است که کاتالاز منفی و اکسیداز مثبت بوده و در شرائط بیهوازی در محیط‌های کشت به کندی رشد می‌کند. هر ۲ مورد (۱/۷۳) درصد جدنشده از تعداد ۱۱۶ رأس گاو مبتلا به ورم پستان، که در محیط بیهوازی و در آگار BHIYA کشت داده شده بودند، کلیه خصوصیات میکروسکوپیک، آنزیمی و بیوشیمیابی مربوطه رانشان داده بودند (۱۸، ۸). در این راسته در بررسی انجام شده توسط Greer و همکاران در سال ۱۹۸۹ بر روی یک مورد شیرگاو مبتلا به ورم پستان بالینی، باکتری هیستوفیلوس سومنی، علاوه بر رشد در محیط بیهوازی در محیط هوایی نیز رشد کرد(۷). مطالعه انجام شده توسط طالب خان گروسوی و همکاران در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار در ایران نشان داد که سیستم تولید مثل گاوی به هیستوفیلوس سومنی آلوده بوده و دارای تمامی خصوصیات آنزیمی و بیوشیمیابی مربوطه می‌باشد(۲).

شناسایی و تشخیص باکتریولوژیک هیستوفیلوس سومنی، به دلیل تغییر پذیر بودن مرغولوژی و خصوصیت بیوشیمیابی آن، مشکل می‌باشد. محققین مختلفی گزارشات متعددی از نتایج گوناگون بیوشیمیابی ارائه نموده‌اند. این مسئله احتمالاً ناشی از رشد کند این باکتری در محیط‌های رشد است. رشد این باکتری در محیط کشت بسیار کم می‌باشد. براساس تحقیقات Janzen و همکاران در سال ۱۹۸۱، علّت رشد ناکافی این باکتری احتمالاً ناشی از تکنیک‌های ناقص باکتریولوژیک است(۱۱). بر اساس اظهارات Stephens و همکاران در سال ۱۹۸۱ ممکن است رشد کند این باکتری به دلیل رشد سریع سایر باکتری‌ها و مخفی شدن هیستوفیلوس سومنی توسط سایر باکتری‌ها باشد(۱۷). در این بررسی علاوه بر باکتری هیستوفیلوس سومنی، نوع باکتری دیگر از جمله E. coli (۹)، استافیلوکوک اورئوس (۱۸/۵۴)، رأس (۲۸)، رأس (۱۱/۹۲) درصد.

جدول ۲- ارتباط بین فصل و رم پستان با منشاء باکتری هیستوفیلوس سومنی.

جمع	فصل		هیستوفیلوس سومنی
	بهار (درصد)	زمستان (درصد)	
۲	۱ (۱/۷۳)	۱ (۱/۷۳)	+
۱۱۴	۵۷ (۹۸/۲۷)	۵۷ (۹۸/۲۷)	-
۱۱۶	۵۸	۵۸	جمع

ارتباط معنی دار نیست (P>0.05).

باکتری دیگر نیز آلوده بودند. از شیر دامهای مبتلا به ترتیب: ۱۱/۹۲ درصد، ۱۸/۵۴ درصد و ۱/۹۸ درصد آلوده به E. coli. استافیلوکوک ارشوس و استرپتوكوک اگلاگتیب بودند. سایر باکتری‌های جدنشده از شیرهای آلوده عبارتنداز: باسلوس سرئوس (۴۹ درصد)، استافیلوکوک اینترمیدیکوس (۱۹/۸۶ درصد)، پروتئوس (۳۳/۶۴ درصد)، کلستریدیوم پرفیرینجنس (۱۱/۳۳ درصد)، استافیلوکوک ساپروفیتیکوس (۲۲/۶۴ درصد).

بحث

مطالعه حاضر به منظور بررسی فراوانی آلودگی باکتری هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری‌های آلوده کننده بافت پستان در دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی (۱۸/۹۶ درصد، ۲۲ رأس) و تحت بالینی (۸۱/۰۴ درصد، ۹۴ رأس) انجام شد. در این بررسی مشخص گردید که ۲ رأس (۱/۷۳) درصد از دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی، به طور خالص، آلوده به این باکتری بوده، به گونه‌ای که در محیط کشت بیهوازی BHIYA باکتری دیگری جدانگر نیست. اما سایر باکتری‌های ایجاد کننده ورم پستان با منشأ محیطی، واگیردار و نیز باکتری‌های ثانویه نیز مورد شناسایی قرار گرفت (جدول ۳). در دامهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، موردي از آلودگی با هیستوفیلوس سومنی، در ۶ واحد دامپوری صنعتی اطراف مشهد به ظرفیت ۱۰۰ الی ۳۰۰ رأس دیده نشد. در این راسته توزیع آلودگی به هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری‌ها در ارتباط با دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی معنی دار می‌باشد (جدول ۱).

هیستوفیلوس سومنی عامل اصلی TEME است که می‌تواند باعث بروز بیماریهای گوناگون در دستگاه‌های تنفسی، تولید مثلی، شنوایی، حرکتی و بافت پستان شود (۱۹، ۱۶، ۱۳، ۱۵، ۷، ۱۰، ۵، ۶، ۳). ورم پستان ناشی از هیستوفیلوس سومنی برای اولین بار توسط Hazlett و همکاران از شناسش در سال ۱۹۸۳ به طور تجربی در گاو شیری ایجاد گردید. در این تجربه، علائم بالینی ورم پستان در گاوهای آلوده، به صورت ورم پستان مزمن یا حاد گانگرنوز توأم با تأثیر بر روی سیستم عمومی بدن به صورت باکتریمی و آندوتوكسمی گردید. در بررسی هیستوپاتولوژیک کارتیه دامهای مبتلا، نکروز و ترمبوز عروقی مشاهده گردید (۹). جداسازی این باکتری از موارد ورم پستان در گاوهای شیری برای اولین



References

۱. طالب خان گروسوی، م. (۱۳۸۰): ارتباط عفونت هیستوفیلوس سومنی دستگاه تناسلی با ناباروری در گاوهاشی بری. بایان نامه دکتری تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره ۱۳۰.
۲. طالب خان گروسوی، م.، هورشتی، پ.، برین، ع.، حسنی طباطبائی، ع.، بلورچی، م. (۱۳۸۱): بررسی آلدگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هیستوفیلوس سومنی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. صفحات: ۲۹-۲۵. ۱. ۰۵۷
3. Alenjandro, G., Nehaya, K. and Alexandra, K. (1993): Chronic mastitis caused by *Haemophilus somnus* in a dairy cow. Can. Vet. J. 34, 4: 236-237.
4. Armstrong, KR., Osborne, ED., Janzen, ED. (1986): *Haemophilus somnus* mastitis in a dairy cow. Can. Vet. J. 27, 211- 212.
5. Blood. D., Radostitis. D. M., Gay. C. C. (1994): Veterinary Medicine. 8th Edition. Baillier Tindal, 812- 822.
6. Blowey, R. and Edmonton, P. (1995): Mastitis control in dairy herds. Farming press. P: 42.
7. Greer. D, connell . M. C , Ball . H (1989): Isolation of *Haemophilus somnus* from bovine milk. Vet. Rec, Vol. 125, No. 14, 381-382.
8. Grotelueschen, D., M, martiner, R, G, Ellis, R, P. (1994): Vesicular adenitis syndrome in beef bulls. JAVMA. Vol. 205, No. 6, PP: 874- 877.
9. Hazlett, M, J., Little, pp, B., and Barnum, D. A. (1983): Experimental production of mastitis with *Haemophilus somnus* in the lactating bovine mammary gland. Can. Vet. J. 24, 135- 136.
10. Humphrey. L. R and Stephens. L. R. (1983): 'Haemophilus Somnus': A review. Vet. Bul. Vol. 53. No. 11. P: 987-1004.
11. Janzen, D., Cates, W. F., Barth, A., Nechala, L., Pawlyshyn, V., Saunders, J. R., Osborne, A. D., (1981): Prevalence of *Haemophilus somnus* in the semen of bulls in Saskatchewan. Can. Vet. J. 22, 361- 362.
12. Martin, S, W., Harland, R, J., Bateman, K, G, Magy, E. (1998): The association of titters of *Haemophilus somnus* and other pathogens with occurrence of bovine respiratory disease and weight gain in feedlot calves. Can. J. of Vet. Res. 62, 4. 262-267.
13. Murry, J., Hazlett, P, B., Little, D, A., Barnum, G, M., Maxie, K, E., Leslie, R, B. (1985): *Haemophilus somnus*; investigations of its potential role in bovine

استریتوکوک آگلاکتیه (۱/۹۸ درصد، ۳ رأس) که از عوامل مهم ورم پستان در گاو هستند، در دامهای تحت بررسی جدا گردید. همانگونه که در جدول ۳ نشان داده شد، باکتری های دیگری در کشت باکتریال مشخص گردید. لذا ممکن است که میزان آلدگی اورام پستان بامنشا هیستوفیلوس سومنی بیش از مقداری به دست آمده باشد و این باکتری به دلیل رشد سایر باکتری های فوق الذکر، مخفی مانده باشد. به منظور شناسایی این باکتری در موارد ورم پستان بالینی و تحت بالینی، انجام یک تست ژنتیکی ضروری بنظر می رسد (۱).

در این مطالعه مشخص گردید که از ۵۸ رأس گاو مبتلا به ورم پستان که در فصل سرما (زمستان) نمونه گیری به عمل آمد، فقط یک رأس (۱/۷۳ درصد) آلدوده به باکتری هیستوفیلوس سومنی بوده است. همین نتیجه نیز در مورد فصل گرم (بهار) به دست آمد که نشان دهنده عدم ارتباط معنی دار بین آلدگی پستان به این باکتری و فصل های مورد مطالعه بوده است ($P < 0.05$) (جدول ۲). در بررسی انجام شده توسط Martin و همکارانش در سال ۱۹۹۸ مشخص گردید که میزان مرگ و میر به دلیل TEME و بیماریهای تنفسی ناشی از هیستوفیلوس سومنی، در طول ماههای آبان، آذر و دی افزایش می یابد (۱۲). در مطالعه انجام شده توسط طالب خان گروسوی و همکاران در سال ۱۳۸۱ در مورد آلدگی سیستم تولید مثل به هیستوفیلوس سومنی مشخص گردید که آلدگی به این باکتری در فصل های سرد (پائیزو زمستان) بیشتر از فصول گرم (بهار و تابستان) می باشد (۲).

در این بررسی و سایر بررسی های انجام شده توسط محققین گوناگون، به نظر می رسد که هیستوفیلوس سومنی در گاوهای مبتلا به ورم پستان، مشکل عمده ای نبوده، اما بایستی توجه نمود که در مواردی که نتایج کشت باکتریال ورم پستان در روشهای متداول آزمایشگاهی منفی است، احتمال وجود این باکتری را بایسیستی از نظر دورداشت (۱۵).

از مجموع مطالب به دست آمده، موارد ذیل قابل نتیجه گیری است: ۱- باکتری هیستوفیلوس سومنی در موارد گاو های مبتلا به ورم پستان ممکن است یافت شود. ۲- رشد این باکتری در محیط های کشت بسیار کند است، لذا مخفی ماندن دامهای آلدوده، امکان پذیر بوده و به همین دلیل شناسایی آنها را مشکل می سازد. ۳- تشخیص و فراوانی هیستوفیلوس سومنی در موارد کشت باکتریال کم بوده، لذا با توجه به اثبات آلدگی بافت پستان در موارد ورم پستان گاوهای شیری و نیز اهمیت اقتصادی گاوهای شیری، پیشنهاد می گردد که در کنار کشت های متداول آزمایشگاهی در مراکز تشخیص دامپزشکی، کشت بیهوده ای در اتمسفر حاوی CO_2 ، به منظور شناسایی و تشخیص باکتری هیستوفیلوس سومنی در نظر گرفته شود. با توجه به نتایج حاصله، بررسی جامعتری، در این زمینه بایسیستی صورت گیرد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تشکر و قدردانی می گردد.

- mastitis. Am. J. Vet. Res. 46, 11, 2229-2234.
14. Otte, M., J., Raven, B.T. Huttner, K. (1995): A pilot study of elevated abortion and stillbirth ration in cattle in the foothills of the Eastern plains of Clombia. Pre. Vet. Med. 22, 203- 113
15. Robert, H., Jean, R., M., Yues, L., and Gerard, G. (1987): Mastitis caused by Haemophilus somnus in a dairy cow. Can. Vet. J. 38. 8. 117- 118.
16. Robert S. J. Stephen. (Reprint 1991): Veterinary Obstetrics and Genital Diseases (Theriogenology). Edwards Brothers, inc. P: 469- 471 & 848.
17. Stephens, L., R., Little, R. B., Wilke, B., N., Barhum, D, A. (1981): Infectious Thromboembolic Meningoencephalitis in cattle. A review. JAVMA, 178, 4, 378-384.
18. Qystein, A., Peter, A., Conny T. (1998): Development of a PCR test for identification of Haemophilus Somnus in pure and mixes culture. Vet. Mic. 63: 1, 39- 48.
19. Waldham, D, G, Hall, R, F, Meiners, W, A, Hagen, C, S., Frank, F,W. (1974): Haemophilus somnus infection in the cow: a possible contributing factor to weak calf syndrome isolation and animal inoculation studies. Am. J. Vet. Res, 35, 1401-1403.
20. Wedderkopp. A. (1997). Haemophilus somnus - unlikely to be a causative microbiological agent in bovine clinical mastitis in Denmark. Acta Vet. Scan. 38. 2. 193- 195.

