

مطالعه فراوانی تیپ‌های مسمومیتزا انسانی کلستریدیوم بوتولینوم (A, B, E) در بعضی از ماهیان دریای شمال (سفید و کفال) و ماهیان دریای جنوب (شوریده و حلوا) ایران

ودود رضویلر^{۱*} حمید رضا توکلی^۲

دریافت مقاله: ۱۰ آبان ماه ۱۳۸۲
پذیرش نهایی: ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

A Prevalence Study of Human Toxicogenic Types of *Clostridium botulinum* (A, B, E) in Some Sea Water Fishes of Northern (*Rutilus frisikutum* and *Mugil auratus risso*) and Southern (*Otolithus ruber* and *stromateus niger*) Regions of Iran

Razavilar, V.¹, Tavakoli, HR.²

¹Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran.

Objective: To evaluate the prevalence of human toxicogenic types of *C. botulinum* (A, B, E) in some sea fishes of northern and southern regions of Iran.

Design: Prevalence study.

Animals: *Rutilus frisi kutum*, *Mugil auratus risso*, *Otolithus ruber* and *stromateus niger*.

Procedure: One hundred and twenty samples of 4 kinds of fishes were tested for *C. botulinum* types from intestine and gills (240 examinations), using cooked meat medium. After centrifugation of the samples, bioassay technic was used for toxin detection to diagnose the type of *C. botulinum*.

Statistical analysis: Descriptive study.

Results: Ten (8.33%) out of 120 tested samples of intestine and gills in northern sea fishes, were positive for *C. botulinum* toxin. In this regard, 8 out of 60 (13.33%) intestine and 2 out of 60 (3.33%) gill samples were positive. From 120 samples of intestine and gills examined for bacterial detection in southern sea fishes only 2 samples (1.66%) were positive, which both belonged to intestine samples. Overall, the order of contamination of *C. botulinum* in 4 kinds of fishes were *Mugil auratus risso* (10%), *Rutilus frisi kutum* (6.6%), *Otolithus ruber* (3.33%) and *Stromateus niger* (0%). Type E showed the highest prevalence rate (50%) in this study.

Conclusion: From the results of this study, type E of *C. botulinum* (psychrotrophic type) showed the highest prevalence rate which indicates health hazard and therefore proper and special control measures needed for food safety.

J.Fac.Vet.Med.Univ.Tehran. 61,1:39-42,2006.

Keywords: *C. botulinum*, marine fishes, prevalence study, food safety, toxigenesis.

Corresponding author's email: vrazavi@ut.ac.ir

اسپورهای کلستریدیوم بوتولینوم بطور گسترده‌ای در خاک، رسوبات دریایی و آبزیان پراکنده می‌باشد(۱۴). درین تیپ‌های مختلف کلستریدیوم بوتولینوم تیپ‌های E,B,A بعنوان مهمترین تیپ‌های بیماری‌زدای انسان

هدف: تعیین فراوانی تیپ‌های مسمومیت‌زا انسانی کلستریدیوم بوتولینوم (B,E)

(A) در بعضی از ماهیان دریای شمال و جنوب ایران.

طرح: مطالعه فراوانی.

حیوانات: ماهیان سفید و کفال (شمال) و شوریده و حلوا (جنوب).

روش: ۱۲۰ نمونه از چهار نوع ماهی از نظر وجود تیپ‌های مسمومیت‌زا انسانی کلستریدیوم بوتولینوم در دونمونه روده و برانش (کلاً ۲۴۰ نمونه) با استفاده از محیط کشت مایع گوشتش پخته مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌های کشت شده بدنبال سانتریفیوز از طریق تزریق به موش مورداً از مایش تعیین توکسین قرار گرفته و با استفاده از آنتی توکسین‌های مونووالان استاندارد تیپ توکسین تعیین گردید.

تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی برای تعیین میانگین حسابی و درصد نتایج بدست آمده.

نتایج: از مجموع ۱۲۰ نمونه روده و برانش آزمایش شده مربوط به ماهیان دریایی شمال در ۱۰ مورد (۱۰/۳۳ درصد) وجود باکتری و توکسین مورد تأیید قرار گرفت که ۸ مورد از ۶۰ نمونه روده آن‌ها (۱۳/۳۳ درصد) و ۲ مورد از ۶۰ نمونه برانش آن‌ها (۳/۳۳ درصد) مثبت بودند. همچنین از مجموع ۱۲۰ نمونه روده و برانش آزمایش شده مربوط به ماهیان دریایی جنوب تنها ۲ مورد (۲/۶۶ درصد) وجود باکتری و توکسین مورد تأیید قرار گرفت که هر دو مورد مربوط به نمونه‌های روده بوده و در نمونه‌های برانش هیچ‌گونه آلودگی مشاهده نگردید. بطور کلی درین گونه‌های مختلف مورد آزمایش ماهی، بیشترین میزان آلودگی در ماهیان کفال (۱۰ درصد) و پس از آن ماهیان سفید (۶/۶۶ درصد)، ماهیان شوریده (۳/۳۳ درصد) مشاهده گردید. ماهیان حلوا هیچ‌گونه آلودگی نشان نداند. ضمناً تیپ E بعنوان کلستریدیوم بوتولینوم بعنوان شایعترین تیپ باکتری شناخته شد طوری که به تنهایی ۵۵ درصد موارد مشتبه درین ۳ تیپ مورداً از مایش B,E (A) را بخود اختصاص داد (۵ مورد از ۱۰ مورد مشتبه ماهیان دریایی شمال و یک مورد از ۲ مورد مشتبه ماهیان دریایی جنوب).

نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به خصوصیت سرما درستی تیپ E کلستریدیوم بوتولینوم (قدرت رشد و تولید توکسین در شرایط یخچالی) و فراوانی بالای آن در نمونه‌های آزمایش شده معیارهای کنترل بهداشتی خاص و مناسبی در تولید فرآورده‌های غذایی این ماهی‌ها ضروری می‌باشد. مجله دانشکده دامپرشکی دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، دوره ۱۶، شماره ۳۹-۴۲.

واژه‌های کلیدی: کلستریدیوم بوتولینوم، ماهیان دریایی، مطالعه فراوانی، بهداشت غذا، سرمایی.

(۱) گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپرشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

(۲) دانش آموخته گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپرشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

(*) نویسنده مسؤول: vrazavi@ut.ac.ir



جدول ۲- میزان توزیع و فراوانی کلستریدیوم بوتولینوم در ماهیان دریایی جنوب (شوریده و حلوا). اعداد داخل پرانتز رصدموارد نسبت به تعداد نمونه ها را نشان می دهد.

جمع	تعداد موارد وجود توکسین		تعداد و نوع نمونه		گونه ماهی	
	برانش	روده	برانش	روده		
۲ (۳/۳۳)	۰	۲	(۲/۶۶)	۳۰	۳۰	شوریده
(۰)	۰	۰	(۰)	۳۰	۳۰	حلوا
۱ (۱/۶۶)	۰	۲	(۳/۳۳)	۶۰	۶۰	جمع

کفال (Mugil auratus risso)، شوریده (Otulitus ruber) و حلوا (Stromataus) هر گونه ۳۰ نمونه مستقیماً از محل صید آنها در شمال و جنوب کشور تهیه و در مجاورت بیخ به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه های ماهی تازمان آزمایش دردهای یک درجه سانتیگراد نگهداری شدن برای انجام آزمایشات از نمونه های روده و برانش بصورت جداگانه استفاده گردید و جمماً ۲۴۰ نمونه روده و برانش از نظر وجود تیپ های A, B, C, D, E, F کلستریدیوم بوتولینوم مورد آزمایش قرار گرفتند.

ابتدا مقدار ۵-۱۰ گرم از هر نمونه با مقدار معادل بافر فسفات ژلاتین مخلوط و یکنواخت گردید و سپس ۵-۳ گرم از هر نمونه در لوله های حاوی محیط گوشت پخته (cooked meat medium) کشته داده شد و پس از ۱۰ دقیقه حرارت در دمای ۶۰ سانتیگراد (شوك حرارتی)، به مدت ۷-۳ روز در دمای ۳۰ سانتیگراد در شرایط بیهوده (با استفاده از واپار) نگهداری گردیدند. مایع رویی نمونه های رشد کرده جدا گردید و پس از سانتریفیوژ در شرایط یخچالی (۲۰ دقیقه در دور ۱۰۰۰۰ pH) و تنظیم (۶/۲) (توسط پتانس و اسید کلریدریک یک نرمال) هر نمونه به سه قسمت حرارت دیده، حرارت ندیده، و تریپسینه تقسیم گردید. از هر نمونه ۵/۰ میلی لیتر بصورت داخل صفاقی به موش سفید آزمایشگاهی بوتولینوم (۲۰-۲۵ گرمی) تزریق گردید و موشهای به مدت ۹۶ ساعت از نظر بروز نشانه های بوتولینوم تحت نظر قرار گرفتند. برای تعیین تیپ توکسین از آنتی توکسین های مونووالان (A, B, C, D, E) استاندارد استفاده گردید (۱۴).

نتایج و بحث

نتایج بدست آمده از این مطالعه بر حسب انواع نمونه ها، گونه های مختلف ماهیان و میزان شیوع کلستریدیوم بوتولینوم در جداول شماره ۱ و ۲ نشان داده شده است.

مطالعات زیادی در مردمیزان توزیع و پراکندگی کلستریدیوم بوتولینوم

جدول ۱- میزان توزیع و فراوانی کلستریدیوم بوتولینوم در ماهیان دریایی شمال (سفید و کفال). اعداد داخل پرانتز رصدموارد نسبت به تعداد نمونه ها را نشان می دهد.

جمع	تعداد موارد وجود توکسین		تعداد و نوع نمونه		گونه ماهی		
	برانش	روده	برانش	روده			
۴ (۶/۶۶)	۱	(۳/۳۳)	۳	(۱۰)	۳۰	۳۰	سفید
۶ (۱۰)	۱	(۳/۳۳)	۵	(۱۶/۶۶)	۳۰	۳۰	کفال
۱۰ (۸/۳۳)	۲	(۳/۳۳)	۸	(۱۳/۳۳)	۶۰	۶۰	جمع

طرح هستند. تیپ های A, B, C, D, E دارای منشاء خاکی بوده و تیپ F دارای منشاء آبی می باشد. اسپور این تیپ ها بطور گسترده ای در خاک، رسوبات دریاهای، محیط های آبی، و قسمتهای مختلف بدن ماهیان (روده، آبشیش، ...) پراکنده می باشد (۱۵، ۱۶). گزارشات زیادی از کشورهای مختلف جهان مبنی بر میزان انتشار کلستریدیوم بوتولینوم در ماهیان مختلف، تیپ های شایع باکتری، و وقوع مسمومیت بوتولینوم در اثر مصرف غذاهای دریایی وجود دارد (۱۸، ۱۶، ۱۴، ۲، ۳). در کشور مانیزی به دلیل تهیه، نگهداری، و مصرف تاریست ماهیان فرآوری شده این مسمومیت مکرر آبه و قوع پیوسته و تلفاتی رانیزی به همراه داشته است که بعنوان نمونه می توان به وقوع چندین ایضدمی در مناطق شمالی کشور اشاره نمود (۲). میزان شیوع کلستریدیوم بوتولینوم در ماهی متغیر بوده و به عوامل متعددی از جمله نوع ماهی و نحوه تغذیه آن بستگی دارد بطوریکه احتمال وجود آسودگی در ماهیان کفسی، بعلت تماس بیشتر با گل ولای و لجن محل پرورش خود بیشتر می باشد در انتشار جغرافیایی تیپ های مختلف کلستریدیوم بوتولینوم در کشورهای جهان اختلافاتی وجود دارد به طوری که در غرب ایالات متحده و بعضی از کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا و آلمان تیپ A، در شرق ایالات متحده و بعضی از قسمتهای اروپا نظیر فرانسه، ایتالیا و انگلستان تیپ B، در هندوستان تیپ C، در دانمارک، فنلاند، راپن و ایران تیپ E بعنوان شایعترین تیپ های باکتری معرفی گردیده اند (۱۶، ۱۳، ۱۰، ۴). بدون تردید، تعیین تیپ های باکتری و فراوانی باکتری و شناخت تیپ های شایع آن موضوع بسیار مهمی می باشد که به کمک آن می توان متابع آسودگی کننده و تیپ آسودگی را شناسایی نمود و اقدامات مناسب به منظور کنترل بهداشتی غذاهای دریایی را انجام داد.

مواد و روش کار

تعداد ۱۲۰ نمونه ماهی از ۴ گونه سفید (Rutilus frisi kutum)،

میزان فراوانی باکتری در نمونه‌های روده مطالعه مایشراز مطالعه Huss می‌باشد در حالی که میزان فراوانی باکتری در نمونه‌های برانش مطالعه Huss بیشتر از مطالعه مابوده است. همچنین در مطالعه Huss همچون مطالعه ما فراوانی تیپ E در ماهیان دریایی بیشتر از سایر تیپ‌های باکتری بوده است و پس از آن تیپ‌های A، B، C، D، E، F، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z در مطالعه Macdonald در سال ۱۹۹۹ در کانادا و Macdonald در سال ۲۰۰۰ در فنلاند، Yamakawa در سال ۲۰۰۱ در ژاپن نیز در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تیپ E شایع‌ترین باکتری در محیط‌های آبی و آبیان می‌باشد (۷، ۸، ۹). در مطالعه ماجهت تشخیص وجود توکسین و تعیین تیپ‌های باکتری از رو ش Bioassay استفاده گردید. مطالعات انجام شده توسط Yamakawa، Huss، Hyttia، Lalitha، Macdonald و نیز نشان داد که این روش علی‌رغم تمام معایبی که برای آن ذکر گردیده است (سرعت کم، هزینه بالا، موارد مشبت کاذب، وجود استرس زیاد هنگام تزریق، ...) هنوز هم یکی از حساسترین و دقیق‌ترین روش‌ها برای تشخیص کلستریدیوم بوتولینوم محسوب می‌گردد. با این وجود بعضی از محققین نظری Kristi و gwtcome بر این باورند که باید روش‌های *in vitro* که دارای دقت و سرعت بیشتری هستند، جایگزین روش Bioassay گردند (۱۰).

Yamakawa، Huss، Hyttia، Lalitha، Macdonald باورند که بین فراوانی و انتشار تیپ‌های مختلف کلستریدیوم بوتولینوم در محیط‌های آبی و آبیان پرورش یافته در این محیط‌ها ارتباط مستقیم و نزدیکی وجود دارد (۱۱، ۱۲). این موضوع در مورد مناطق شمالی کشور مانیز صدق می‌کند زیرا در مطالعه‌ای که توکلی در سال ۲۰۰۲ بر روی میزان توزیع و انتشار تیپ‌های مختلف کلستریدیوم بوتولینوم در سوابات نواحی ساحلی دریای خزر انجام داد، تیپ E بعنوان شایع‌ترین تیپ باکتری ۵۵/۴٪ درصد مواد مشبت (شناخته شد) (۱۳). در مطالعه اخیر نیز تیپ E بعنوان شایع‌ترین تیپ باکتری به تنهایی ۵/۵ درصد مواد مشبت را به خود اختصاص داده است. با توجه باینکه در مناطق شمالی کشور مانندین اپیدمی بوتولینوم به دلیل مصرف فرآورده‌های حاصل از ماهی نظیر ماهیان دودی، سور، کنسروشده، و بسته‌بندی شده رخداده است (۱۴). بنابراین برای جلوگیری از بروز مسمومیت احتمالی بوتولینوم، توجه به روش‌های صحیح تهیه، نگهداری، و مصرف این فرآورده‌ها و انجام اقداماتی نظیر تخلیه سریع امצעات و احتشاء، استفاده از دمای زیر ۳ درجه سانتی‌گراد نگهداری برای غذاهای پروسس شده به منظور پیشگیری از رشد باکتری و تولید توکسین توصیه می‌گردد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران و همچنین همکاری صمیمانه کارشناسان آزمایشگاه بهداشت و کنترل مواد غذایی سرکار خانم طیار، آقای مصیب واحدی، آقای سعید محفوظی و آقای محمدرضا عمامدی در انجام این طرح سپاسگزاری می‌گردد.

در محیط‌های آبی و آبیان صورت گرفته است که در انتشار جغرافیایی تیپ‌های این باکتری در نقاط مختلف جهان اختلافاتی را نشان می‌دهد (۱۶، ۱۷، ۱۸). با توجه به اینکه یکی از منابع مهم این باکتری قسمتهای مختلف بدن انواع آبیان می‌باشد.

در این مطالعه میزان فراوانی باکتری در هر دو نوع ماهیان دریایی شمال و جنوب، در نمونه‌های روده بیش از نمونه‌های برانش می‌باشد: با توجه به اینکه دستگاه گوارش ماهی یکی از منابع مهم باکتری محسوب می‌گردد، بالا بودن میزان آلدگی نمونه‌های روده نسبت به نمونه‌های برانش قابل توجه می‌باشد. در مطالعه‌ای که توسط Lalitha و همکاران در سال ۲۰۰۰ بر روی میزان توزیع و انتشار تیپ‌های مختلف کلستریدیوم بوتولینوم در ۶۸ نمونه ماهی دریایی و ۷۱ نمونه رسوی، صورت گرفت، در ۲۲ درصد نمونه‌های روده و عذر صد نمونه‌های پوست و عضله و ۲۱ درصد نمونه‌های رسو و جود باکتری تایید گردید. در این مطالعه همچون مطالعه مفروانی باکتری در نمونه‌های روده بیش از نمونه‌های دیگر بوده است. Lalitha تیپ‌های C, D را عنوان شایع‌ترین تیپ‌های باکتری در محیط‌های آبی و آبیان هندوستان معرفی نموده است (۱۵). در مطالعه‌ای که توسط Hyttia و Hielm در سال ۲۰۰۲ بر روی ۴۲۸ نمونه روده و ۲۰۸ نمونه آبشش مربوط به ماهیان صید شده از دریای بالاتریک صورت گرفت، در ۴/۴ درصد نمونه‌های روده و ۳/۲ درصد نمونه‌های آبی و ۴/۸ درصد نمونه‌های روده در مطالعه میزان فراوانی باکتری در نمونه‌های روده و برانش ماهیان دریایی مورد مطالعه مکمل از میزان فراوانی آن در نمونه‌های روده در مطالعه Hyttia بوده است (۱۶). در مطالعه میزان فراوانی باکتری در ماهیان دریایی شمال (۱/۲ درصد) بیش از ماهیان دریایی جنوب (۶/۶ درصد) می‌باشد که شاید یکی از دلایل احتمالی آن بالا بودن میزان نمک در آبهای جنوبی (شوری بیش از ۳ برابر) نسبت به آبهای دریای شمال (کشور) باشد.

در مطالعه Hyttia همچون مطالعه ما تیپ E بعنوان شایع‌ترین تیپ باکتری در ماهیان دریایی معرفی گردیده است. میزان فراوانی تیپ E در مطالعه Hyttia (۷۹ درصد مواد مشبت) بیش از فراوانی آن در مطالعه Huss است در حالی که در مورد تیپ‌های A, B, C، D، E، F، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z در سال ۱۹۹۸ بر روی نمونه‌های روده، آبشش، و سطوح خارجی ۱۴۰/۷ نمونه ماهی صید شده از آبهای نواحی اسکاندیناوی، دریای شمال، و آتلانتیک شمالی صورت گرفت، در نمونه‌های مربوط به آتلانتیک شمالی هیچ‌گونه آلدگی مشاهده نگردید اما در ۱۲/۴ درصد نمونه‌های مربوط به آبهای اسکاندیناوی و ۴/۷ درصد نمونه‌های مربوط به ماهیان دریای شمال وجود باکتری مورد تایید قرار گرفت. در نمونه‌های مربوط به هر دو منطقه، میزان آلدگی نمونه‌های روده بیش از نمونه‌های آبی و سطوح خارجی بوده است. همچنین در ۶۴ درصد مواد مشبت نمونه‌های مربوط به آبهای اسکاندیناوی و ۴۷ درصد نمونه‌های مشبت مربوط به آبهای دریای شمال تیپ E تشخیص داده شده است (۱۷).



References

۱. رضویلر، و. (۱۳۷۸): میکروبهای بیماری زادر مواد غذایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه: ۱۶۳-۱۶۸.
۲. مدرس، ش. (۱۳۷۵): نقش انواع کلستریدیوم بوتولینوم در آلوودگی مواد غذایی در ایران، مجموعه مقالات نهمین کنگره صنایع غذایی، صفحه: ۲۹۸-۲۹۰.
3. Brett, M. (1999): Botulism in the U.K Eurosveillance monthly archives 4:119-12.
4. Eddie, B. (1995): Fifty years of botulism in the U.S. and Canada. J. Med. 289: 1002-1010.
5. Hielm, S. and Hyttia, E. (2000): Detection of C. Botulinum in fish and environmental samples using PCR and Bioassay techniques. Int.J.Food Microbiol. 31: 357-65.
6. Hilferich, W., Winter, K. (2001): Food toxicology text. Printed in the U.S.A. 5.
7. Huss, H. H. and Pedersen, A. (1998): *C. botulinum* in fish. Nord Vet Med. 31: 214-21.
8. Hyttia, E. and Hielm, S. (2002): Prevalence, molecular Epidemiology and growth of *C. Botulinum* in fish and fishery products in Baltic sea. (Online Source).
9. Lalitha, K.V. and Gopakamar, K. (2000): Distribution and ecology of *C. botulinum* in fish and aquatic environments. J. Food Microbiology. 17: 535-41.
10. Macdonald, D. (1999): The outbreak of type E Botulism in seafoods products in Canada; CDC archives 33: 390-95.
11. Sakaguchi, G. and Haq, I. (2000): Prevalence of *C. botulinum* in fishes in Osaka, Japan. J Med. Sci. boil. 33: 2-6.
12. Tavakoli, H. R. (2002): Detection of *C. Botulinum* types A, B and E from coastal areas sediments of Iran. Proceeding of 3th international congeress of natural resources, Russia, Moscow. 154-8.
13. Vanderzant, C. and Splitstoesser, D.F. (1992): Compendium of methods for the microbiological examinations of foods. American public health association.
14. Varnam, A. and Evans, H. (1991): Foodborne pathogens text. Wolf publishing, London, England.
- 15-Wermer, E. and Cowden, M. (2003): Botulism in the European Union, Euro surveihance monthly archives. 4: 112-17.
- 16-Wictome, M. and Kirsti, A. (2001): Development of in vitro assays for the detection of botulinum toxins in foods. FEMS. Immun. 16: 319-23.
- 17-Yamakawa, K. (2001): Prevalence of *C. botulinum* types E and B in the rivers soils of Japan. Microbial- Immunol. 36: 583-91.
- 18-Yamasaki, S. (2000): Incidence of food-borne botulism in Japan 1977-1998. IASR, 21: 241-42.