

بررسی آلودگی‌های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران

دکتر بهنام مشگی^{*} دکتر علی اسلامی^۱ دکتر هونم بزدانی^۲

دریافت مقاله: ۱۸ مهرماه ۱۳۸۳

پذیرش نهایی: ۵ اسفندماه ۱۳۸۳

Study on the Parasitic Infections of Aquarium Fishes around Tehran

Meshgi, B.^۱, Eslami, A.^۱, Yazdani, H.^۲

^۱Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran - Iran. ^۲Private Practitioner.

Objective: Determination of parasitic infections of aquarium fishes around Tehran.

Design: Random sampling.

Animal: One thousands and eight aquarium fishes.

Procedure: Parasitic infections of different organs including skin, gills, eyes, blood, alimentary canal, liver, kidney, abdominal cavity, muscle and swimming bladder in six different species: *Barbus tetrazona* (n=119), *Betta splendens* (n=170) *Carassius auratus* (n=101) *Cichlasoma severum* (n= 267), *Gymnocorymbus ternetzi* (n= 201) and *Poecilia reticulata* (n=150) were examined. Blood samples were stained with Geimsa. were prepared for studying skin, gills, alimentary canal and other organs.

Results: In spite of different infectious rates for different parasitic infections in examined fishes, total percentage of infection for protozoa, arthropods and helminthes were 25.3%, 2.9% and 6.65%, respectively. *Dactylogyurus vastator*, *Chiloldonella sp.*, *Hexamita sp.*, *Ictyobodo necator*, *Ichthyophthirius multifiliis*, *Microsporidium*, *Myxosporida* sp., *Tricodina* sp. and *Lernaea cyprinacea* were collected from 5 (83%) species. Furthermore *Gymnocorymbus ternetzi* was the least infected fish and *Argulus foliaceus* was the only parasite infective.

Conclusion: Our findings revealed that the protozoal infections are very common among aquarium fishes. Although, no gross pathology was observed among infected fishes, but it is likely that in case of any changes in the environment, then parasites, become pathogen. J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. *J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran.* 61,1:1-5,2006.

Keywords: fish, aquarium, parasite.

Corresponding author's email: bmeshgi@ut.ac.ir

جهانی این ماهیها که در حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد گردیده است، اهمیتی خاص به آن داده است. بعد از باگبانی، پرورش و نگهداری ماهیان آکواریومی دو میلیون سرگرمی خوب مردم جهان است. در دنیای قدیم سوم ریها و اهالی بین النهرين به پرورش و نگهداری این ماهیان علاقمند بوده اند و در عصر حاضر برخی از کشورها از جمله ایتالیا، چین و زاپن نقش مهمی در این صنعت ایفا کرده اند. گفته می شود که در تجارت جهانی پرورش نوعی نژاد

هدف: تعیین آلودگی‌های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین در استان تهران.

طرح: نمونه‌گیری تصادفی.

حيوانات: ۱۰۰۸ قطعه ماهی آکواریومی متعلق به شش گونه مختلف.

روش: پوست، باله‌ها، آبشش، چشم، خون، دستگاه‌گوارش، کبد، کلیه، محوطه شکمی، کیسه‌شنا و عضلات هر قطعه ماهی از نظر آلودگی انگلی بررسی شد، برای این منظور از سه‌اندام اول گسترش مرتبط، از خون گسترش نازک و رنگ آمیزی آن باگیمسا و از سایر انداها به دلیل کوچک بودن، گسترش فشاری تهیه گردید و هر نمونه بطور مجزا جهت دیدن جرم آلوده و یا جداسازی و شناسایی عامل آلودگی تحت بررسی میکروسکوپی قرار گرفت.

نتایج: در ۹/۵ درصد از ماهیان مطالعه شده آلودگی کرمی ۲۵/۳ درصد آلودگی به انواع تک یاختگان و در ۹/۴ درصد ابتلاء به بندپایان مشاهده شد، نتایج حاصل بر حسب نوع ماهی به شرح ذیل می‌باشد. در ماهی تایگر (*Barbus tetrazona*) (مجموعاً ۶۷ گونه) انگل شامل یک گونه مونوژن: (داکتیلوزیروس)، هفت گونه تک یاخته (شیلودنلا، هگرامیتا، ایکتیوبودو، ایکتیوفتیریوس، میکروسپوریدیوم، میکسوسپوریدیا، تریکوکیدینا) و یک گونه پا (لونه‌آ) تشخیص داده شد. در ماهی فایتر (*splendens*) یک گونه مونوژن (داکتیلوزیروس)، شش گونه تک یاخته (شیلودنلا، ایکتیوبودو، ایکتیوفتیریوس، میکروسپوریدیوم، میکسوسپوریدیا، تریکوکیدینا) و یک گونه بند پا (لونه‌آ) تشخیص داده شد. در ماهی گلدفیش (*Carassius auratus*) یک گونه مونوژن (داکتیلوزیروس)، پنج گونه تک یاخته (شیلودنلا، هگرامیتا، ایکتیوفتیریوس، میکسوسپوریدیا، تریکوکیدینا) و دو گونه بندپا (لونه‌آ و آرگولوس) تشخیص داده شد. در ماهی سروم (*Cichlasoma severum*) یک گونه مونوژن (داکتیلوزیروس)، یک گونه نماتود (کامالانوس)، شش گونه تک یاخته (شیلودنلا، هگرامیتا، ایکتیوفتیریوس، میکسوسپوریدیا، تریکوکیدینا) و دو گونه بندپا (لونه‌آ و آرگولوس) تشخیص داده شد. در ماهی بلکویدو (*ternetzi*) یک گونه مونوژن (داکتیلوزیروس) و در ماهی گوبی (*Gymnocorymbus reticulata*) یک گونه مونوژن (داکتیلوزیروس) شش گونه تک یاخته (شیلودنلا، ایکتیوبودو، ایکتیوفتیریوس، میکسوسپوریدیوم، میکسوسپوریدیا، تریکوکیدینا) و یک گونه بندپا (لونه‌آ) تشخیص داده شد.

نتیجه‌گیری: آلودگی پروتوزوائی در ماهیان آکواریوم شایع است. مجله دانشکده

دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، دوره ۱۴، شماره ۱-۵.

واژه‌های کلیدی: ماهی، آکواریوم، انگل.

اگرچه پرورش ماهیان زیستی هم علم و هم صنعت است ولی سهم تجارت

(۱) گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) دامپزشک بخش خصوصی.

*bmeshgi@ut.ac.ir



جدول ۱- وضعیت و شدت آلودگی انگلی اندامهای مختلف ۱۱۹ قطعه ماهی تایگر (.Barbus tetrazona)

نام علمی انگل	عضو آلوهه گتنده	درصد آلوهه	میانگین تعداد انگل
<i>Dactylogyrus vastator</i>	آبشن	۵/۹	۲/۷
<i>Chilodonella sp.</i>	پوست، آبشن	۵	++
<i>Hexamita sp.</i>	روده	۰/۸	+
<i>Ichthyobodo necator</i>	پوست، باله	۶/۷	++
<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	پوست	۰/۸۴	++++
<i>Microsporidium sp.</i>	روده	۳/۴	++
<i>Myxosporidia sp.</i>	آبشن	۲۵/۲	++
<i>Trichodina sp.</i>	پوست، باله	۵/۹	+++
<i>Lernaea cyprinacea</i>	پوست	۰/۸۴	۳

نتایج

در بررسی آلودگی های انگلی ۱۰۰۸ قطعه ماهی آکواریومی در ۲۵۵ قطعه (درصد ۲۵/۳) آلودگی به تک یاخته، در ۷۰ قطعه (درصد ۹/۹۵) آلودگی کرمی و در ۲۹ قطعه (درصد ۲/۹) ابتلاء به بندپا مشاهده گردید. وضعیت آلودگی انگلی بر حسب نوع ماهی آزمایش شده به شرح زیر می باشد:

- در ماهی تایگر (Barbus tetrazona) در بررسی آلودگی های انگلی ۱۱۹ قطعه ماهی تایگر یک گونه مونوژن، هفت گونه تک یاخته و یک گونه بندپا تشخیص داده شد. نتایج حاصل در جدول انشان داده شد.

درین انگلهاهی جدادشده از ماهی تایگر شایعترین انگل میکروسکوپی بیدایا (درصد ۲۵/۲) و بعد از آن به ترتیب تیکوبدینا و داکتیلوزیروس (۵/۹ درصد) قرار داشت. در بررسی ریزبینی ایکتیوفیتیزیروس مولتی فیلیس به شکل بیضی، مژه دار، بادو هسته بزرگ و کوچک مشاهده می گردد.

- ۲ ماهی فایتر (Betta splendens) نتایج حاصل از بررسی ۱۷۰ قطعه ماهی فایتر در جدول ۲ نشان داده شده است.

از ماهی فایتر یک گونه مونوژن، شش گونه تک یاخته و یک گونه بندپا جدا گردید، شایعترین انگلها به ترتیب شدت شیوع داکتیلوزیروس و استاتور جدول ۲- وضعیت و شدت آلودگی انگلی اندامهای مختلف ۱۷۰ قطعه ماهی فایتر (Betta splendens).

نام علمی انگل	عضو آلوهه گتنده	درصد آلوهه	میانگین تعداد انگل
<i>Dactylogyrus vastator</i>	آبشن	۱۸/۲	۲/۵
<i>Chilodonella sp.</i>	پوست	۱۴/۷	+
<i>Ichthyobodo necator</i>	پوست، باله	۲/۹	+
<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	پوست	۴/۷	++++
<i>Microsporidium sp.</i>	روده	۲/۹	+
<i>Myxosporidia sp.</i>	آبشن	۱۲/۹	+
<i>Trichodina sp.</i>	پوست، باله	۱/۸	+++
<i>Lernaea cyprinacea</i>	پوست، باله	۱/۸	۲

برتر ماهی کارپ به نام ماهی کپور (Koi) از ایران شروع و به سایر نقاط جهان صادر شده است (۹). به دلیل اهمیت اقتصادی این آبزیان عوامل مختلفی که بهداشت و سلامتی آنها را به خطر اندازد مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است، بویژه حمل و نقل انواع ماهیان آکواریومی به بازارهای مختلف جهانی به دلیل استرس مسافت و یا عدم سازش با محیط جدید، گاهی با تلفات شدیدی همراه می باشد و در بسیاری موارد باعث ورود آلودگی جدید به منطقه جغرافیایی خاصی می گردد، لذا برای جلوگیری از این مسائل باید عوامل آسیب رسان شناسایی گردد و راههای پیشگیری و کنترل آنها تعریف شود. هدف از بررسی حاضر مطالعه آلودگی های انگلی ماهیان آکواریومی آب شیرین استان تهران می باشد.

مواد و روش کار

در تحقیق حاضر ۱۰۰۸ قطعه ماهی آکواریومی از ۶ گونه مختلف شامل:

تایگر (Betta splendens) ۱۱۹ قطعه، فایتر (Carassius auratus) ۱۰۱ قطعه، سورم (Gymnocorymbus ternetzi) ۲۶۷ قطعه، بلک وید (Poecilia reticulata) ۱۵۰ قطعه از نظر آلودگی به انگلها داخلي و خارجي تحت بررسی قرار گرفت، اين تعداد ماهي با نمونه گيری تصادفي از مجتمع هاي پرورش اعم از کل (۴۲۱ قطعه)، خانگی (۲۹۶ قطعه)، توزيعي (۲۴۷ قطعه) و جزئي (۴۴ قطعه)، بدون درنظر گرفتن اندازه و وضعیت ظاهری ماهی صورت پذيرفت.

جهت بررسی آلودگی انگلی در هر قطعه ماهی: پوست، آبشن، باله، چشم، خون، دستگاه گوارش، کبد، کلیه، محوطه شکمی، کيسه شناو عضلات مورد آزمایش قرار می گرفت. از پوست، باله ها و آبشن (بعد از برداشت سرپوش های آبشن) گسترش مرتبط تهیه می گردد و تحت بررسی میکروسکوپی قرار می گرفت، کمانهای آبشن نیز بعد از جداسازی آزمایش می شد. دستگاه گوارش به همراه سایر اندامهای داخلی از بدن خارج می شند و با توجه به ظرافت و کوچکی ابتدا روی لام باز شده و تو سطح لوب از نظر آلودگی انگلی بررسی می گردد و سپس با تهیه گسترش فشاری انگلها جدا می شدند. خون با تهیه گسترش نازک و رنگ آمیزی گیمسا بررسی می گردد. شدت آلودگی در انگلهاهی پریاخته ای با شمارش تعداد آنها در هر قطعه ماهی و در مورد تک یاخته ها با شمارش تعداد آنها در هر میدان میکروسکوپی صورت می گرفت، بدین منظور چنانچه در هر صحنه میکروسکوپی با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر ۲۰، ۵۰ و بیشتر از ۵۰ جرم تک یاخته ای مشاهده می گردد، شدت آلودگی به ترتیب به صورت +، ++، +++, و +++++ نشان داده می شد. جهت بررسی آلودگی به انواع بندپایان: پوست، باله ها و آبشن با چشم غیر مسلح، بزرگنمایی دستی یا لوب تحت آزمایش قرار می گرفت و در صورت مشاهده آلودگی برای ثابت کردن انگل از الکل گرم ۷۰ درجه استفاده می شد.

جدول ۴- وضعیت و شدت آلودگی انگلی اندامهای مختلف ۲۶۷ قطعه ماهی سوم
(*Cichlasoma severum*)

نام علمی انگل	عضو آلوده کننده	درصد آلودگی	میانگین تعداد انگل
<i>Dactylogyrus vastator</i>	آبشنش	۷/۵	۱/۵
<i>Camallanus sp.</i>	روده	۰/۴	۱
<i>Chilodonella sp.</i>	پوست	۱/۹	+
<i>Hexamita sp.</i>	روده	۲/۶	+
<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	پوست	۷/۱	++++
<i>Microsporidium sp.</i>	روده	۱/۹	+
<i>Myxosporidia sp.</i>	آبشنش	۱/۵	+
<i>Trichodina sp.</i>	پوست، باله	۴/۹	+
<i>Lernaea cyprinacea</i>	پوست	۱/۱	۱

می باشد، کیسه های تخمی در انتهای خلفی بدن استقرار دارند.

۵- ماهی بلک ویدو (*Gymnocorymbus ternetzi*)

خلاصه نتایج حاصل از بررسی ۲۰۱ قطعه ماهی بلک ویدو در جدول ۵ نشان داده شده است. علی رغم تعداد آزمایش از این ماهی که نسبت به سایر ماهیان تحت بررسی زیادتر بود ولی فقط یک انگل خارجی از آن جدا گردید.

۶- ماهی گوبی (*Poecilia reticulata*) در بررسی ۱۵۰ قطعه ماهی گوبی ۸ گونه انگل جدا گردید که نتایج آن در جدول ۶ نشان داده شده است. همان طور که در جدول ۶ ملاحظه می شود بالاترین میزان آلودگی در آبشنش با تک یاخته میکسوسپوریدیا (۷/۱۶ درصد) و حداقل شدت آلودگی در پوست و باله مربوط به ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس می باشد.

بحث

در ایران حدود ۱۵۰ گونه ماهی اکواریومی وجود دارد که ۴۰ گونه آن در داخل کشور پرورش داده می شود. در بررسی حاضر که بنظر می رسد جامع ترین مطالعه برروی انگل های اندامیان اکواریومی باشد، ۶ گونه مختلف این ماهیان، از نظر آلودگی های انگلی تحت بررسی قرار گرفتند. از ۰۸۰ قطعه ماهی آزمایش شده ۳۰۱ قطعه (۹/۲۹۰ درصد) مبتلا به ۷ نوع تک یاخته، یک گونه کرم و دو گونه بندپا بودند. این ارقام نشان دهنده پراکنش وسیع تر آلودگی با تک یاخته ها می باشد. جز ماهی بلک ویدو (*Gymnocorymbus ternetzi*) که در ۲۰۱ قطعه فقط در باله ۵/۰ درصد آنها یعنی در یک قطعه، ارگولوس فولیا سئوس دیده شد، در ۵ گونه دیگر آلودگی های انگلی نسبتا مشابه و عمده تا شامل یک گونه کرم (داکتیلوژیروس واستاتور)، ۶-۵ گونه تک یاخته (شیلودنلا، هگزرامیتا، ایکتیوفتیریوس، میکروسپوریدیوم، میکسوسپوریدیا، ایکتیوبودو و تریکودینا) و یک گونه بندپا (لرنه آسپرینی سه) بود اگرچه از روده یک قطعه ماهی سوروم (*Cichlosom severum*) یک عدد نماتود کامالانوس نیز جدا گردید. در تحقیق حاضر که نمونه گیری از چهار بخش کلی (۴۲۱ قطعه)، توزیع (۲۴۷ قطعه)، خانگی (۲۹۶) و جزیی (۴۴) صورت پذیرفت، درصد آلودگی انگلی ۴

جدول ۳- وضعیت و شدت آلودگی انگلی اندامهای مختلف ۱۰۱ قطعه ماهی گلدفیش (*Carrassius auratus*)

نام علمی انگل	عضو آلوده کننده	درصد آلودگی	میانگین تعداد انگل
<i>Dactylogyrus vastator</i>	آبشنش	۳	۱
<i>Chilodonella sp.</i>	پوست	۵	++++
<i>Ichthyobodo necator</i>	پوست	۴	+
<i>Microsporidium sp.</i>	روده	۱	+
<i>Myxosporidia sp.</i>	آبشنش	۴	+
<i>Trichodina sp.</i>	پوست	۴۶/۵	۴/۹
<i>Lernaea cyprinacea</i>	پوست، باله	۱۴/۹	۳
<i>Argulus foliaceus</i>	پوست، باله	۲	۱

(۱۸/۲ درصد)، شیلودنلا (۷/۱۴ درصد) و میکسوسپوریدیا (۹/۱۲ درصد) بود. درصد آلودگی به سایر انگلهای دار حد پایین و بین ۷/۴-۷/۰ درصد تغییر بود. داکتیلوژیروس واستاتور به طول کمتر از یک میلیمتر با اندام چسبنده هاپتور و قلابک های حاشیه ای (باتوجه به شکل و اندازه آنها) شناسایی می گردد.

۳- ماهی گلدفیش (*Carassius auratus*) در آزمایش ۱۰۱ قطعه ماهی گلدفیش آلودگی کرمی در ۳ مورد (۹۸/۲ درصد)، آلودگی تک یاخته ای در ۶۱ نمونه (۵/۰۴ درصد) و ابتلاء به بندپایان در ۱۷ مورد (۹/۱۶ درصد) وجود داشت، خلاصه نتایج این قسمت از بررسی در جدول ۳ مشاهده می شود. از هشت گونه انگل جدا شده از ماهی گلدفیش، پوست آلوده ترین اندام و تریکودینا شایع ترین انگل (۵/۰۴ درصد) و بعد از آن لرنه آسپرینی سه آ (۹/۱۴ درصد) قرار داشت و درصد آلودگی به سایر انگلهای بین ۵-۱ درصد متغیر بود. مهمترین شاخص ریخت شناسی جنس ماده آرگولوس وجود ساختار میله مانند محافظت کننده در اطراف بادکش فکی می باشد، که در آرگولوس فولیا سئوس دارای ۵-۸ اسکلریت بوده و اسکلریت قاعده ای از سایر اسکلریت ها طوبیتر است و در اطراف هر بادکش ۴۷-۳۸ ردیف میله محافظت کننده وجود دارد.

۴- ماهی سوم (۰۰۱) (بررسی ۲۶۷ قطعه ماهی سوم در جدول ۴ ملاحظه شدت ابتلاء به آنها در بررسی ۰۰۱ قطعه ماهی سوم در جدول ۴ ملاحظه می شود).

اگرچه آلودگی انگلی اندامهای مختلف در بررسی ماهی سوم از ۵/۰-۷/۷ درصد در تغییر بود ولی بیشتر شدت آلودگی مربوط به تک یاخته ایکتیوفتیریوس در آلودگی پوست می باشد. جنس ماده لرنه آسپرینی سه آ استوانه ای شکل بوده و دارای قلاب های مشخصی در انتهای قدامی

جدول ۵- وضعیت و شدت آلودگی انگلی اندامهای مختلف ۲۰۱ قطعه ماهی بلک ویدو (*Gymnocorymbus ternetzi*).

نام علمی انگل	عضو آلوده کننده	درصد آلودگی	میانگین تعداد انگل
<i>Argulus foliaceus</i>	باله	۰/۵	۱



نمی‌گیرد این خطره‌میشه به صورت بالقوه وجود دارد. در یک بررسی که بر روی ۸۰۰ قطعه ماهی بیمار اکواریومی صورت گرفت (۱). آلودگی به دونوع مونوزن ژیروداکتیلوس و داکتیلوزیروس، یک گونه تک یاخته تریکودینا و یک گونه نماتود کاپیلاریا دیده شد، در این مطالعه تلفات ناشی از این آلودگی هاگاهی تا ۲۰٪ درصد عنوان شده است. در بررسی دیگری در ایران (۲). تلفات شدید ماهیان طلاسی وارداتی در اثر آلودگی عمدتاً به انگل ژیروداکتیلوس و به نسبت کمتر داکتیلوزیروس گزارش شده است. با توجه به گزارشات مربوط به آلودگی انگلی ماهیان اکواریوم در ایران، جز تریکودینا و داکتیلوزیروس که قبل از این ماهیان گزارش شده اند سایر انگل های اولین بار از ماهیان اکواریوم در ایران گزارش می‌شوند، اگرچه ابتلا سایر ماهیان نظیر ماهی قزل آلا و کپوریه ایکتیویود، ماهیان خاویاری به تریکودینا و ماهی بیاح به شیلودنلا نیز از ایران گزارش شده است (۳،۵). علاوه بر این چهار گونه مختلف قارچ در ایجاد ضایعات جلدی ماهی گلدفیش (*auratus*) شناسایی شده است (۶). در مورد پرورش خارج اکواریومی ماهیان مسلم آلودگی محیط زیست آبزیان بخصوص آلودگی آب به مواد شوینده بر سلامتی ماهیان پرورش داده شده موثر خواهد بود، تاثیر نامطلوب ترکیبات شوینده آنیونی بر بافت پوششی ماهی قرمزمثالی از این موردمی باشد (۴).

در میان اندامهای آلوده پوست و باله با ابتلابه ۴ گونه تک یاخته از ۷ گونه گزارش شده در بررسی حاضر و یک گونه بندپا آلوده ترین عضو بود و پس از آن روده با ابتلابه ۲ گونه تک یاخته و یک گونه نماتود و آبشنش با ابتلابه یک گونه مونوزن و یک گونه تک یاخته قرار داشت. اگرچه نحوه نمونه‌گیری، تعداد نمونه (۲۰٪) قطعه) و نحوه بررسی آلودگی انگلی ماهی بلک ویدو ۵ گونه دیگر این ماهی فقط آلودگی به بندپا ارگولوس فولیاسئوس دیده شد این موضوع می‌تواند حاکی از وجود نوعی مقاومت در برابر آلودگی های انگلی، بخصوص ابتلابه تک یاخته ها باشد و دخالت سایر عوامل در عدم آلودگی این ماهی باید مورد بررسی قرار گیرد. گزارش ۱۱ گونه انگل اعم از مونوزن، نماتود، تک یاخته و بندپا در شرایط طبیعی نگهداری ماهیان اکواریومی و در ماهیان به ظاهر سالم حاکی از شیوع زیاد این آلودگی هادر ماهیان زینتی می‌باشد و لذا باید در مطالعات آسیب شناسی، ضایعات ایجاد شده در اثر هر یک از انگل های گزارش شده بویژه تک یاخته ها و آلودگی توام به چند نوع آنها بررسی شود و امکان بیماریزا شدن آنها در اثر بهم خوردن شرایط زیست محیطی ماهیان تحت مطالعه قرار گیرد و اقدامات لازم جهت پیشگیری و کنترل این آلودگی ها اعلام گردد.

جدول ۶- وضعیت و شدت آلودگی انگلی اندامهای مختلف قطعه ماهی گوبی (*Poecilia reticulata*)

نام علمی انگل	عضو آلودگی	درصد آلودگی	میانگین تعداد انگل
<i>Dactylogyrus vastator</i>	آبشنش	۵/۳	۱/۱
<i>Chilodonella sp.</i>	پوست	۲	+
<i>Ichthyobodo necator</i>	پوست	۵/۳	++
<i>Ichthyophthirius multifillis</i>	پوست، باله	۱/۳	++++
<i>Microsporidium sp.</i>	روده	۶/۲	+
<i>Myxosporidia sp.</i>	آبشنش	۱۶/۷	++
<i>Trichodina sp.</i>	پوست، باله	۰/۲	+
<i>Lernaea cyprinacea</i>	پوست، باله	۲/۷	۱/۷۵

بخش بترتیب ۱۵/۲ درصد، ۴۸/۶ درصد، ۳۹/۲ درصد و ۲۹/۹ درصد بود که نشان دهنده حدود نیمی از موارد آلودگی در بخش توزیع است. یکی از مسایل مهم بهداشتی در مسیر پرورش ماهیان اکواریومی، از آنجا که این ماهیان از محیط های وحشی به محیط بسته اکواریوم منتقل می‌شوند و گونه های مختلف باهم درین ماهیان بسیار زیاد است. بخصوص در بخش توزیع یک اپیدمی انگلی درین ماهیان بسیار زیاد است. یکی از ماهیان گذگاه تلقی شده و ماهیها بطور موقت نگهداری می‌شوند و مسولین مربوطه صرف مسایل کوتاه مدت اقتصادی را در نظر میگیرند، امکان گسترش آلودگی های انگلی بیشتر است. در گزارشی *Joong* و همکاران در سال ۲۰۰۲ در ماهیان گوبی (*Poecilia reticulata*) وارداتی به کره جنوبی از اندونزی در یک مزرعه که ۳۰٪ درصد تلفات داشت آلودگی به نماتود کاملانوس کوتی (*Camallanus cotti*) دیده شد، اگرچه به دلیل ماده بودن تعیین گونه کاملانوس در بررسی حاضر میسر نگردید ولی بیماری زایی گونه دیگر این انگل یعنی کاملانوس اوکسی سفالوس (*oxycephalus*) (شامل تخریب اپی تیلیوم روده و ایجاد خم (مگوئید وئور)، گزارش شده است که گونه گزارش شده از ایران نیز می‌تواند بیماری زایی مشابهی داشته باشد. در تعدادی از ماهیان تلف شده علاوه بر آلودگی به این نماتود آلودگی به تک یاخته تراهیمنا کورلیزی (*Tetrahyrema cortisi*) نیز دیده شد که در گروه اخیر علت تلفات وجود دو انگل گزارش شده است (۷). در بررسی حاضر در یک قطعه ماهی سوم نماتود کاملانوس همراه با ابتلابه تعدادی از تک یاخته های روده ای دیده شد که در صورت ایجاد شرایط نامناسب می‌تواند موجب خسارت اقتصادی گردد. در مورد آلودگی به تک یاخته ها در اکثر موارد شدت آلودگی به ایکتیو فتیریوس نسبت به سایرین بیشتر بود که منجر به تورم کلیه، کبد و آسیت در ماهیان تلف شده وجود لکه های سفید بر روی بدن ماهیان بیمار می‌گردد.

یکی از مسایل مهم درباره آلودگی انگلی ماهیان آکواریومی انتقال آلودگی از ماهیان وارداتی به ماهیان بومی و بومی شدن انگل در اقلیم جدید می‌باشد، با توجه به اینکه علی الاصول قرنطینه ماهیان اکواریومی انجام

References

۱. ابراهیم زاده موسوی، ح.ع. (۱۳۸۰): بیماری های انگلی شایع در ماهیان زینتی در ایران. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، ۲۳-۲۵ بهمن ۱۳۸۰- تهران. جامعه دامپزشکی کشور.
۲. ابراهیم زاده موسوی، ح.ع. و جلالی، ب. (۱۳۸۱): تلفات شدید در ماهی طلایی (*Gold fish*) وارداتی در اثر آلودگی به انگل ژیروداکتیلوس. خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. ۹-۱۷ آبان ۱۳۸۱، مشهد.
۳. جلالی، ب. (۱۳۷۲): بیماری های شایع ماهیان پرورشی ایران، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران.
۴. شاهسونی، د.، موتفقی، ا.ر. و مقصود لوع. (۱۳۸۱): بررسی بالینی و آسیب شناسی ماده شوینده آنیونی برپافت پوششی ماهی قرمز. خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. ۷-۹ آبان ۱۳۸۱ مشهد.
۵. مخیر، ب. (۱۳۵۹): بررسی انگل های ماهیان حوزه سفید رود، نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۳۶- شماره ۴.
۶. مغینیمی، ر. (۱۳۷۴): گزارش نهایی پژوهه مطالعه آلودگی انگلی در ماهیان بومی تالاب هور العظیم دشت آزادگان، موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.
6. Ebrahimzadeh Mousavi, H.A., Khosravi, A.R. (2003): study of involved fungi in ulcerative cutaneous infection in gold fish (*Carassius auratus*). Asian Pasific Aquaculture Congress, Bangkok, Thailand. 90.
7. Jeong-Ho, K., Craig, J.H., Gang-Joon, H. (2002): Nematode worm infections (*Camallanus cotti*, *Camallanidae*) in guppies (*Poecilia reticulata*) imported to Korea. Aquaculture. 205, 3-4, 231-235.
8. Meguid, M.A., Eure, H.A. (1996): Pathobiology associated with the spiruroid nematodes *Camallanus oxycephalus* and *Spinitectus carolini* in the intestine of green sunfish *Lepomis cyanellus*. J Parasitol. 82:118-123.
9. www.Petplace.netscape.com.

