

مقایسه اثر دیمینازین و ایمیدوکارب دی پروپیونات در درمان گوسفندان آلوده شده تجربی با بابزیا اوویس

دکتر زهره خاکی^{۱*} دکتر صادق رهبری^۲ دکتر محمدقلی نادعلیان^۱ دکتر ناصر علیدادی^۱ دکتر جواد اشرفی هلان^۱

دریافت مقاله: ۱۰ آبان ماه ۱۳۸۳

پذیرش نهایی: ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

Comparison of the Effect of Diminazen and Imidocarb in Experimentally Infected sheep with Babesia ovis

Khaki, Z.¹, Rahbari, S.², Nadealian, M.G.¹, Alidadi, N.¹, Ashrafi Halan, J.³

¹Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran -Iran. ²Department of parasitology Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran. ³Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran -Iran.

Objective: To evaluate the efficacy of treatment in ovine babesiosis.

Design: Experimental study.

Animals: Thirty six sheep about 1-2 year -old .

Procedure: Thirty six sheep, which were negative for any blood parasites, were selected. The animals were categorized into the splenectomized and unsplenectomized groups and each group into 3 subgroups: control, Diminazen and Imidocarb ones. Babesiosis was induced by intravenous injection of 5.2×10^6 infected erythrocytes per animal. When body temperature and parasitemia raise, Diminazen (3.5 mg /kbw) and Imidocarb (1.2 mg/kbw) were administrated to each animal in the corresponding groups. Animals were kept up to day 9 post infection. After clinical manifestations, blood samples were daily collected from each animal and hematological parameters determined.

Statistical analysis:t-student test.

Discussion and Results: The results indicated that Diminazen is more effective than Imidocarb. Furthermore, clinical signs and parasites were recurred in the treated sheep with Imidocarb. *J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 61,1:43-46,2006.*

Keyword: babesia ovis, ovine babesiosis Diminazen, Imidocarb, Iran.

Corresponding author's email: zhaki@chamran.ut.ac.ir

می شود. مثلا درمان ارلیشیا کائیس در سگ و گربه (۴، ۹) و بابزیا اکوبی در اسب (۷، ۱۴) و بابزیا کائیس در سگ (۳) و تیلریا سرجنتی و بابزیا دایورجن و بابزیا بابزیمینادر گاو (۱۱، ۱۰، ۳) و بابزیا اوویس در گوسفند در تحقیق حاضر پس از ایجاد آلوده شده تجربی در گوسفند اثرات دوداروی فوق در درمان بابزیا اوویس با یکدیگر مقایسه شده است.

مواد و روش کار

تعداد ۳۶ راس گوسفند نر ۱ تا ۲ ساله به ظاهر سالم انتخاب شدند و در ابتدا از

هدف: مطالعه اثرات درمانی داروهای ایمیدوکارب و دیمینازن در درمان گوسفندان آلوده شده تجربی با بابزیا اوویس.

طرح: مطالعه تجربی.

حیوانات: ۳۶ راس گوسفند یک تا دو ساله نر.

روش: ابتدا با آزمایشات خون مشخص شد که گوسفندان مورد تجربه آلوده شده ببا بابزیا اوویس یا هرگونه انگل خونی دیگر اندازند. سپس حیوانات به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه از آنها طحالشان با روش جراحی برداشته شد. تلقیح انگل بابزیا اوویس از طریق ورید و داج به میزان 2×10^6 ارتروسویست آلوده انجام گرفت و پس از ظهور تب هرگروه به سه زیر گروه دیگر (شاهد- درمان با دیمینازن- درمان با ایمیدوکارب) تقسیم شدند. زیر گروه درمان با دیمینازن $3/5$ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و زیر گروه درمان با ایمیدوکارب $1/2$ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دارو دریافت کردند. زیر گروه شاهد بو ابر با میزان تزریق داروس فیزیولوژی دریافت کردند. عالیم بالینی و نتایج آزمایشگاهی خون شناسی در تمام گروه ها ثبت گردید.

آنالیز آماری: آزمون آماری تی استیومن (p<0.05).

بحث و نتایج: استفاده از دیمینازن در درمان بابزیا اوویس موثر تراست زیرا عود مجدد بیماری مشاهده نگردید. در صورتی که در حیوانات درمان شده با ایمیدوکارب ظهور مجدد انگل در خون توأم با علائم کلینیکی بیماری (تب) مشاهده گردید. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، دوره ۶، شماره ۱، ۴۶-۴۳.

واژه های کلیدی: بابزیا اوویس، بابزیوگ گوسفند، دیمینازن، ایمیدوکارب، ایران.

بابزیا اوویس پیرو بلاسم کوچکی است که معمولاً به صورت منفرد یا زوج در داخل ارتروسویت ها مشاهده می شود. در صورتی که زوج باشد زاویه بین آنها باز است و معمولاً در حاشیه ارتروسویت قرار دارد. بیماری زایی آن بیشتر از بیماری زایی بابزیا موتازی است (۸). گزارشاتی از پراکندگی و بیماری زایی شدید آن در گوسفندان ایرانی به ویژه در اوخر بهار و جود دارد. از آنجا که این انگل می تواند باعث ایجاد کم خونی بی اشتہایی، لاغری، زردی، کاهش شیر و حتی مرگ و میر گوسفندان گردد و انتقال آن از طریق کنه یا سوزن آلوده نیز می باشد بنابراین امکان و اگری قابل توجهی نیز در گله و جود دارد. لذا ممکن است این تک یا اخته خدمات اقتصادی جدی به دامداران نیز وارد کند (۲).

از دیمینازن (Diminazene) یا بنزیل (Berenil) برای درمان بابزیو زای جمله بابزیا بابزیمینادر گاو ها و بوفالوها (۱۲، ۱۳) و ایمیدوکارب (Imidocarb) یا ایمیزول (Imizol) نیز برای درمان انواع انگل های خونی در دام های مختلف استفاده

۱) گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

۲) گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

۳) گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

* نویسنده مسؤول: zhaki@chamranut.ac.ir



جدول ۱- تغییرات پارامترهای خونی و درجه حرارت و میزان پارازیتی در گروه فاقد طحال درمان شده با دیمینازن و ایمیدوکارب و گروه شاهد آلووده.

hematocrit (drصد)			گلوبولهای سفید $\text{ml}^3 \times 10^3$			nottrophil segmante (drصد)			lenfosit (drصد)			درجہ حرارت (c)			parasitemi (drصد)			روز	
C	DI	IM	C	DI	IM	C	DI	IM	C	DI	IM	C	DI	IM	C	DI	IM		
۲۹±۱/۱	۲۹/۶±۱/۳	۲۹±۱/۱	۶/۸±۱/۲	۶/۶±۱/۵	۷/۷±۱/۲	۴۳±۵	۴۸/۳±۰/۲	۴۷/۵±۰/۲	۵۵±۵	۴۹/۳±۰/۲	۵۰/۳±۰/۲	۸/۸±۰/۰	۲۸/۹±۰/۱	۲۸/۹±۰/۲	۰	۰	۰	۰	
۲۷/۶±۲/۶	۲۹±۱/۵	۲۸±۱	۴/۵±۰/۵	۷±۲/۲	۶/۴±۲/۱	۶/۹±۲/۳	۶/۳±۲/۸	۶/۳±۲/۷	۳۷/۳±۲/۳	۲۸/۳±۲/۳	۳۸/۳±۲/۳	۴۱/۷±۰/۱	۴۱/۶±۰/۲	۴۱/۶±۰/۲	۳±/۵	۳±/۵	۳±/۱	۱	
۱۹/۶±۲/۰	۲۹±۱ ^b	۲۳/۵±۰/۵ ^b	۳/۸±۱/۶ ^b	۶/۲±۲/۵ ^b	۸±۱/۱ ^b	۴۶±۶	۴۱/۵±۲/۵	۶۱±۱۳	۳۴/۳±۲/۸	۵۸±۲	۲۸/۵±۱۲	۴۱/۸±۰/۲	۴۰/۶±۰/۱	۴۱/۵±۰/۰	۴۱±۱	۳±۰/۵	۳±۰/۰	۲	
۱۹/۷±۲/۷ ^b	۲۴±۱ ^b	۲۴/۵±۰/۵ ^b	۳/۲±۰/۱ ^b	۷/۶±۳/۵ ^b	۷/۶±۲/۳ ^b	۳۰/۵±۴/۰ ^b	۳۵±۶ ^b	۳۵/۵±۴/۰ ^b	۶۱/۵±۶/۰ ^b	۶۱±۷ ^b	۴۴±۰/۱ ^b	۳۹/۴±۰/۰ ^b	۳۹/۱±۰/۳ ^b	۶/۵±۲ ^b	۲±۰/۵ ^b	۲/۱±۰/۲ ^b	۴		
۱۶±۳ ^c	۲۵/۷±۱/۸ ^c	۲۵/۳±۱/۸ ^c	۳/۲±۰/۱ ^c	۷/۹±۱/۷ ^c	۷/۱±۲/۱ ^c	۳۲±۲ ^c	۳۵/۳±۲/۲ ^c	۲۶/۴±۲/۲ ^c	۶۷±۰ ^c	۶۲±۲/۶ ^c	۴۱/۳±۰/۰ ^c	۳۹/۶±۰/۱ ^c	۳۹/۴±۰/۰ ^c	۶/۵±۲/۰ ^c	۲±۰/۰ ^c	۲±۰/۱ ^c	۵		
۱۴ ^c	۲۵/۶±۱/۶ ^c	۲۵/۳±۱/۰ ^c	۳ ^c	۸/۱±۳/۰ ^c	۷/۹±۱/۶ ^c	۱۱ ^c	۲۶/۴±۲/۸ ^c	۵/۳±۳/۰ ^c	۸۵ ^c	۶۰/۳±۵/۱ ^c	۶۳±۲/۶ ^c	۴۰ ^c	۳۹/۱±۰/۲ ^c	۳۹/۶±۰/۱ ^c	۵/۰/۵ ^c	۱±۰/۱ ^c	۱/۱±۰/۰ ^c	۶	
۱ ^c	۲۵/۵±۱/۷ ^c	۲۴±۱ ^c	۲ ^c	۷/۷±۱/۵ ^c	۵/۴±۱ ^c	۱ ^c	۲۵/۴±۲/۹ ^c	۴۲±۲/۱ ^c	۸۵ ^c	۶۰/۲±۲/۰ ^c	۵۸±۱ ^c	۴ ^c	۳۹/۱±۰/۲ ^c	۴۰/۰±۰/۰ ^c	۵/۰/۰ ^c	۰ ^c	۱/۷±۰/۰ ^c	۷	
d ^c	۲۶/۵±۱/۴ ^c	۲۴±۱ ^c	d ^c	۸/۱±۲/۱ ^c	۵±۱/۰ ^c	d ^c	۳۵/۴±۲/۸ ^c	۴۱±۲ ^c	d ^c	۶۰/۱±۳/۰ ^c	۵۷±۱ ^c	d ^c	۳۹/۱±۰/۲ ^c	۳۹/۵±۰/۱ ^c	d ^c	۰ ^c	۱/۲±۰/۱ ^c	۸	
d ^c	۲۶/۵±۰/۴ ^c	۲۵/۶±۰/۶ ^c	d ^c	۹/۱±۱/۳ ^c	۶/۵±۰/۳ ^c	d ^c	۲۵/۴±۲/۸ ^c	۳۹/۵±۱ ^c	d ^c	۶۳/۴±۲/۰ ^c	۵۸/۵±۲ ^c	d ^c	۳۹/۴±۰/۰ ^c	۳۹/۲±۰/۰ ^c	d ^c	۰ ^c	۰/۷±۰/۰ ^c	۹	

حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار ($P < 0.05$) مابین هریک از گروه های درمان با گروه شاهد آلووده است.

C - Control Group, DI - treatment group with Diminazen, IM - treatment group with Imidocarb, d - death.

آنها خونگیری به عمل آمد و همان مقدار گوییچه آلووده به بازیابی اوویس به گوسفندان طحال دار تزریق شد. بدین ترتیب گوسفندان طحال درانیز آلووده شدن و تب و پارازیتمی نیز در آنها مشاهده شد. بس از ایجاد تب در هر گروه و آنها نمونه خون EDTA دار تهیه شد و پارامترهای خونی در آنها اندازه گیری شدند. سپس یک یاد روز بس از ایجاد تب و پارازیتمی گروه های درمان بدون طحال و با طحال دار دیمینازن و ایمیدوکارب درمان شدند. بدین ترتیب که تحت گروه های درمان با دیمینازن به میزان ۳/۵ میلیگرم به ازای کیلوجرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی عمیق و تحت گروه های درمان با ایمیدوکارب نیز به از اهر کیلوجرم وزن بدن ۱/۲ میلیگرم دارو را به صورت داخل عضلانی عمیق دریافت کردند. از ابتدای بررسی تا ۹ روز پس از درمان نیز به طور مرتب درجه حرارت بدن دام ها و نمونه خون EDTA دار از آنها گرفته شد. سپس با استفاده از آزمون آماری

همه آن های نمونه خون با ماده ضد انقاد اتیلن دی آمین تراستیک اسید (EDTA) و گسترش های خونی از گوش آنها تهیه شد و آزمایش کامل خون و ارزیابی گسترش های خونی از نظر حضور انگل صورت گرفت. پس از اطمینان از طبیعی بودن کلیه پارامترهای خونی و عدم آلوودگی انگلی حیوانات ابتدای ۲ گروه طحال دار و بدون طحال تقسیم شدن و در هر گروه به سه زیر گروه شامل شاهد آلووده درمان با دیمینازن و درمان با ایمیدوکارب در نظر گرفته شد.

جهت ایجاد آلوودگی انگلی از خون بخ زده حاوی $10/۲\pm ۵/۰$ ایتریتوسیت آلووده به بازیابی اوویس جدایه خراسان پاساژ دوم (۱۲ درصد آلوودگی) استفاده شد. بدین ترتیب که ویل حاوی خون بخ زده رادر آب ۳۷ درجه قرار داده تاخون داخل ویل به صورت مابع در آید و ابتدای گوسفندان بدون طحال به صورت تزریقی داخل وریدی آلووده شدند. پس از ایجاد تب و پارازیتمی در گوسفندان بدون طحال از

جدول ۲- تغییرات پارامترهای خونی و درجه حرارت و میزان پارازیتمی در گروه واحد طحال درمان شده با دیمینازن و ایمیدوکارب و گروه شاهد آلووده.

hematocrit (drصد)			گلوبولهای سفید $\text{ml}^3 \times 10^3$			nottrophil segmante (drصد)			lenfosit (drصد)			درجہ حرارت (c)			parasitemi (drصد)			روز
C	DI	IM	C	DI	IM	C	DI	IM	C	DI	IM	C	DI	IM	C	DI	IM	
۲۱/۵±۰/۵	۲۹/۲±۱/۲	۲۱/۵±۰/۶	۹/۷±۰/۷	۸/۰±۰/۹	۹/۸±۰/۷	۳۴/۲±۲	۳۵/۲±۱	۳۴/۲±۲	۶۰±۴	۶۲±۰/۸	۶۵±۳/۵	۳۹/۶±۰/۲	۳۹/۱±۰/۱	۳۹/۱±۰/۲	۰	۰	۰	۰
۲۳/۵±۰/۵	۲۷/۵±۲/۲	۲۷/۵±۲/۳	۹/۲±۰/۷	۷/۷±۰/۸	۷/۸±۰/۷	۵۸±۲	۵۶/۷±۷/۴	۵۶/۷±۷/۳	۴۱±۲	۴۱/۲±۷/۶	۴۱/۱±۰/۶	۴۱/۲±۰/۲	۴۱/۲±۰/۱	-۰/۷±۰/۱	-۰/۷±۰/۲	-۰/۷±۰/۱	۱	
۲۳/۵±۰/۵	۲۳/۵±۰/۵	۲۲/۵±۱	۸±۱	۷/۷±۰/۸	۷/۸±۰/۷	۶۱±۱۳ ^b	۳۹±۸ ^b	۳۹/۵±۲/۵ ^b	۳۸/۵±۲/۱ ^b	۵۸±۸ ^b	۵۸/۵±۷/۵ ^b	۴۱/۵±۰/۰ ^b	۳۸/۹±۰/۱ ^b	۳۹/۰±۰/۰ ^b	-۰/۷±۰/۱	-۰/۵±۰/۱	-۰/۶±۰/۲	۲
۲۲±۰/۶ ^c	۲۵/۵±۰/۵ ^c	۲۵/۵±۰/۵ ^c	۷/۲±۰/۵	۸/۱±۰/۶	۸/۱±۰/۵	۵۲±۲ ^c	۳۲±۱ ^c	۳۲±۱ ^c	۴۶±۲ ^c	۶۵±۰/۵ ^c	۶۴±۰/۰ ^c	۴۱±۰/۰ ^c	۴۱±۰/۰ ^c	۳۹/۲±۰/۰ ^c	۱±۰/۰ ^c	-۰/۵±۰/۰ ^c	-۰/۵±۰/۰ ^c	۴
۲۲±۰/۶ ^c	۲۵/۷±۱/۱ ^c	۲۵/۷±۱/۰ ^c	۶/۵±۰/۵	۷/۶±۰/۱	۷/۷±۰/۲	۵۰±۳/۰ ^c	۲۸/۷±۴/۸ ^c	۲۹/۸±۳/۰ ^c	۴۸±۲ ^c	۵۷/۲±۴/۵ ^c	۵۶/۲±۳/۵ ^c	۴۰/۴±۰/۰ ^c	۳۹/۴±۰/۰ ^c	-۰/۸±۰/۱ ^c	-۰/۲±۰/۰ ^c	-۰/۵±۰/۰ ^c	۵	
۲۱/۵±۰/۵	۲۷/۷±۱/۰ ^c	۲۵/۲±۱/۱ ^c	۴/۱±۰/۰	۷/۲±۰/۱	۷/۱±۰/۱ ^c	۴۰±۲/۵	۳۷/۷±۴/۰ ^c	۳۷/۸±۴/۰ ^c	۵۸±۲	۵۹/۲±۵/۰	۵۹/۲±۴/۰ ^c	۴۰/۴±۰/۰ ^c	۳۹/۲±۰/۰ ^c	-۰/۸±۰/۱ ^c	-۰/۲±۰/۰ ^c	-۰/۰±۰/۰ ^c	۶	
۱۵/۶ ^c	۲۷/۱±۱/۰ ^c	۲۵/۰±۰/۵ ^c	۱/۷ ^c	۷/۲±۱/۹ ^c	۷/۷±۰/۸ ^c	۱۶/۵ ^c	۲۷/۷±۵/۰ ^c	۲۷/۷±۵/۰ ^c	۸۱/۵ ^c	۵۹/۱±۵/۰ ^c	۵۸±۸ ^c	۴۰/۰/۰ ^c	۳۹/۲±۰/۰ ^c	-۰/۵ ^c	-۰/۰/۰ ^c	-۰/۰/۰ ^c	۷	
۱۷ ^c	۲۷/۰±۱/۰ ^c	۲۷/۰±۱/۰ ^c	۱ ^c	۸±۰/۹ ^c	۶/۹±۰/۲ ^c	۲۶ ^c	۲۷/۷±۵/۰ ^c	۲۷/۸±۵/۰ ^c	۷۷ ^c	۵۹/۱±۵/۰ ^c	۵۹/۱±۵/۰ ^c	۴۰/۰/۰ ^c	۳۹/۲±۰/۰ ^c	-۰/۳ ^c	-۰/۰/۰ ^c	-۰/۰/۰ ^c	۸	
۱۷ ^c	۲۷/۰±۱/۰ ^c	۲۳/۵±۰/۵ ^c	۲/۵ ^c	۷/۷±۰/۸ ^c	۶±۱ ^c	۳۲ ^c	۳۵/۲±۱ ^c	۵۶/۷±۷/۰ ^c	۶۶ ^c	۶۳/۵±۰/۸ ^c	۴۱/۲±۷/۰ ^c	۳۹/۲±۰/۰ ^c	-۰/۰/۰ ^c	-۰/۰/۰ ^c	-۰/۰/۰ ^c	۹		

حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار ($P < 0.05$) مابین هریک از گروه های درمان با گروه شاهد آلووده است.

نوتروفیل‌های سگمانته و لنفوسیت‌ها از روز ۴ نسبت به گروه شاهد معنی دار است. در گروه درمان شده واجد طحال نیز مقادیر هماتوکریت از روز ۴ و گلبول‌های سفید از روز ۶ پس از ایجاد تپ به بعد مقادیر نوتروفیل سگمانته و لنفوسیت‌ها از روز ۷-۹ و ۲-۵ نسبت به گروه شاهد طحال دار معنی دارد.

تعداد نوتروفیل‌های سگمانته و لنفوسیت‌ها در گروه شاهد به ترتیب پس از ایجاد آلوگی به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری را می‌باید که این روند در گروه شاهد طحال دار همچنان تاروز پنجم پس از آلوگی و در گروه شاهد بدون طحال تاروز چهارم ادامه یافته و از آن به بعد کاهش نوتروفیل‌های سگمانته و افزایش لنفوسیت‌ها رامی توان دید. در گروه درمان بدون طحال و طحال دارهای دیمینازن این روند غیرطبیعی بعد از مصرف دارو کاهش یافته. در گروه درمان با ایمیدوکارب به علت عدم جدیدیماری در روز هفتم در گروه بدون طحال و روز نهم در گروه واجد طحال افزایش نوتروفیل‌ها و کاهش لنفوسیت‌ها را نسبت به روز قبل از عود بیماری مشاهده می‌کنیم.

تفییرات خونی گروه درمان با ایمیدوکارب مشابه با گروه درمان با دیمینازن است فقط در هنگام عود مجدد تپ (روز ۹) افزایش نوتروفیل‌ها و کاهش لنفوسیت‌ها نسبت به گروه شاهد آلوگ و دیمینازن معنی دار است. نتایج آزمایشات پارامترهای خونی به همراه تپ و درصد پارازیتمی گوسفندان طحال دار و بدون طحال شاهد آلوگ و درمان با دیمینازن و درمان با ایمیدوکارب در جدول شماره یک و دو آمده است.

بحث

تب مهمترین نشانه حضور انگل در خون محیطی است و قطع تب نیزاولین نشانه تاثیر دارویی باشد که در بررسی حاضر نیز به خوبی مشخص می‌باشد. مشاهدات میکروسکوپی گسترش‌های خونی نشان می‌دهد که به تدریج با افزایش تب تعداد انگل در خون محیطی افزایش می‌باید و اوج تپ با وجود پارازیتمی هماهنگ می‌باشد اما به تدریج که هماتوکریت کاهش می‌باید پارازیتمی نیز در گروه‌ای شاهد کاهش یافته و علت این امر می‌تواند ناشی از خارج شدن گلبول‌های قرمز آلوگ به انگل از جریان خون یا لیز گلبول‌های قرمز باشد (۶). اندازه گیری هماتوکریت به تنها یکی از مهمترین شاخص‌های تاثیر تغییرات خونی انگل است. مشاهدات نشان می‌دهد که در گوسفندان بدون طحال و طحال دار درمان شده با دیمینازن و ایمیدوکارب هماتوکریت به ترتیب از روز دوم و چهارم پس از درمان نسبت به گروه شاهد معنی دار می‌باشد و درمان با هر دو دارو باعث متوقف شدن کاهش هماتوکریت در آن هاشده و میزان هماتوکریت را پس از مدتی کم به حد طبیعی و قبل از ایجاد آلوگی نزدیک ساخته است. در گروه درمان با ایمیدوکارب به هنگامی که تپ مجدد برگشت می‌نماید کاهش میزان هماتوکریت نسبت به گروه درمان با دیمینازن مشاهده می‌شود که این روند کاهش در گروه درمان با ایمیدوکارب به علت درمان مجدد با این دارو متوقف می‌گردد.

اندازه گیری گلبول‌های سفید به همراه ارزیابی تعداد نوتروفیل‌های سگمانته و لنفوسیت‌ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. کاهش تعداد

تب-استیودنت (۰/۰۵) پارامترهای خونی گروه درمان با پارامترهای خونی گروه شاهد آلوگ که درمانی بر روی آنها صورت نگرفته بود مقایسه شدند.

نتایج

پس از تزریق خون سرد به گوسفندان بدون طحال ۷-۵ روز بعد تپ و به دنبال آن پارازیتمی مشاهده شد. پارازیتمی در این دامها بتدابع ۴ درصد آغاز شد. البته باید توجه داشته باشیم که حد اکثر تپ تمام با حد اکثر پارازیتمی بود. در روز ۴ پس از آلوگی حد اکثر به ۲۰ درصد افزایش یافت. امامیانگین پارازیتمی ۵/۶ درصد بود.اما به ترتیب پارازیتمی کاهش یافته تاینکه به طور متوسط به ۵ درصد تقلیل یافت. اما در گوسفندان طحال دار که با خون گرم یعنی خون آلوگ گوسفندان بدون طحال آلوگ شده بودند یک یا بروز پس از تزریق خون آلوگ تپ و پارازیتمی مشاهده شد. در این گروه پارازیتمی در ابتدا بامیانگین ۵/۵ درصد آغاز و در روز چهارم پس از بروز تپ پارازیتمی به طور متوسط به یک درصد افزایش یافت. در گوسفندان طحال دار و بدون طحال درمان با دیمینازن ۲۴ ساعت پس از تزریق دارو تپ قطع و برگشت تپ نیز مشاهده نگردید. درصد پارازیتمی نیز ۴ روز پس از درمان به صفر رسید. عود مجدد انگل نیز مشاهده نشد. نوسانات درجه حرارت در فواصل زمانی روز چهارم تا هفتم پس از بروز تپ مایین تحت گروه‌های درمان بدون طحال و شاهد آلوگ و همچنین تغییرات درجه حرارت در فواصل روزهای دوم الی هشتم پس از بروز تپ در تحت گروه‌های درمان طحال دار نسبت به گروه شاهد آلوگ از نظر آماری معنی دارد.

تب در گوسفندان طحال دار و بدون طحال که با ایمیدوکارب درمان شده بودند نیز ظرف ۲۴ ساعت پس از تزریق دارو قطع شد ولی در روز ششم در گروه درمان ایمیدوکارب بدون طحال و روز هشتم در طحال دارها مجدد راحعت تپ مشاهده گردید که پس از تزریق مجدد دارو تپ فروکش کرد تعداد انگل در خون پس از تجویز دارو کاهش یافته اما هرگز به صفر نرسید. تغییرات درجه حرارت نیز درین تحت گروه‌های درمان شده درمان نشده از نظر آماری معنی دار می‌باشد. هموگلوبینوری پیشتر در گوسفندان بدون طحال حداث گردید به طوری که در این موارد در ۴ راس از گوسفندان بدون طحال شاهد در روزهای ۵-۳ بعد از ایجاد تپ و در ۱ راس از گوسفندان بدون طحال دار شاهد در روزهای ۴ پس از ایجاد تپ مشاهده شد. در هیچ یک از گوسفندان گروه درمان هموگلوبینوری مشاهده نشد.

تلفات در گوسفندان بدون طحال آلوگ ۳ روز پس از ایجاد تپ و پارازیتمی آغاز شد و تاروز ۸ بعد از ایجاد تپ ادامه یافت و در نهایت کلیه آنها تلف شدند. اما در گوسفندان طحال دار شاهد آلوگ مرگ و میرا روز ۴ تا ۶ پس از ایجاد تپ و در نهایت نیمی از گوسفندان طحال دار شاهد آلوگ تلف گردیدند و نیمی دیگر بهبودی خودبخودی یافتندو زنده ماندند. قابل ذکر است که هیچ‌کدام از دام‌های گروه درمان تلف نگردیدند.

نتایج آزمایشات پارامترهای خونی نشان می‌دهد که در گروه گوسفندان بدون طحال درمان با دیمینازن میزان هماتوکریت از روز ۲ پس از ایجاد تپ نسبت به گروه شاهد معنی دار است و تغییرات مقادیر گلبول‌های سفید از روز دوم و



References

- اشرفی هلان، ج.، خاکی، ز.، ساسانی، ف.، علیدادی، ن.، نادعلیان، م.ق.، رهبری، ص. (۱۳۸۳): مطالعه ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجریبی بازیا اوویس در گوسفند. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره ۱۴. شماره ۱. ۴۹-۵۶.
- Anwar,M.(1974):Geographical distribution of blood protozoan parasites of ruminant in Iran.Bull office Int Epiz.81(9-10):793-798.
- Baudet-MH. (1995): Piroplasmosis in France. Production Laitiere- Moderne.247:42.
- Buoro-IBJ;Atwll-RB;Kiptoon-JC;Ihiga-MA(1989): "Feline anemia associated with ehrlichia like bodies in three domestic short haired cats. Vet Rec. 125:17,434-436.
- Coldham,N.G., Moore,A.S., Sivapathasundaran,S., Sauer,MJ.(1994):"Imidocarb depletion from cattle liver and mechanism of retention in isolated bovine hepatocytes. Analyst 12: 2549-2552.
- Feldman, BF., Zinkl,JG.,Jain,NC(2000): Schalm's Veterinary hematology. Ed: 5, P: 159,Lippincott Williams and Wilkins,London.
- Hailat,Na., Lafi,SQ., Al-Darraji,AM., Al-Ani-FK. (1997):Equine babesiosis associated with strenuous exercise: clinical and pathological studies in Jordan.Vet Parasitol. 69:1-2,1-8.
- Hashemi Fesharaki,R.(1991):Ovine and Caprine babesiosis in Iran:treatment with Imidocarb. Vet Rec.129:384-388.
- Kelly,PJ., Mathewman,LA., Brouqui,P., Raoult-D. (1998): Lack of susceptibility of ehrlichia canis to imidocarb dipropionate in vitro. South Afric Vet Assoc. 1998, 62:2,55-56.
- Luo,Jianxun., Lu,Wenshun., Yin -Hong., Lu-Wwnxing., Zhang-Qicai., Dou-Huifang., Luo-JX., Lu-WS.,Yin-H.,LU-WX.,Zhang-QC., Dou-HF. (1996): Therapeutic evaluation of imidocarb and primaquine phosphate to Theileria sergenti against infection in cattle. Chin J Vet Sci Technol. 26:5 ,37-38.
- Matton,P., Melckebede-H-Van.,Van-Melckebeke-H.(1990): Bovine borreliosis: comparison of simple methods for detection of the spirochaete in the blood. Trop An Health prod. 22:3,147-152.
- Nafstad,I., Grave-K.(1985):Treatment against

گلوبولهای سفید از روز پس از ایجاد آلودگی در کلیه گروههای مشاهده می شود که این تغییرات در گروه مشاهد بدون طحال و طحال دار در روزهای بعد نیز ادامه می یابد به گونه ای که در گروه مشاهد بدون طحال به پایین ترین حد حود یعنی ۲۰۰۰ گلوبول سفید در هر میکرولیتر و در مشاهدهای طحال دار به ۱۰۰۰ سلول در هر میکرولیتر می رسد که آن رامی توان ناشی از ضایعات بافتی این انگل بدانیم. بازیا اوویس در بافت های گوناگون بدن از جمله کبد، کلیه، اپی کارد، ریه، مغزو ندولهال لنفاوی ضایعات نکروتیک ایجاد می نماید (۱). اما پس از مصرف دیمینازن روند کاهش گلوبول سفید متوقف شده و تعداد آنها کم کم به حد طبیعی بازمی گردد. کاهش اولیه لنفوسيت هارامی توان ناشی از استرس بیماری بدانیم و کاهش بعدی نوتروفیلهای افزایش نسبی لنفوسيت هارامی توان به دلیل ضایعات شدید بافتی بدانیم که به علت مرگ سریع دام در گروه مشاهد بدن فرصت پاسخ گویی مناسب را به آن ندارد (۶) که البته بادرمان به موقع با هردو داروروند تغییرات بافتی در حیوانات درمان شده متوقف می شود و بدن فرصت پاسخ گویی مناسب را خواهد داشت. که این مطلب اهمیت شمارش تفکیکی گلوبولهای سفید را در تشخیص سیر بیماری یا بهبودی از آن نشان می دهد و می توان به عنوان یک شاخص پیشگوی مطرح باشد.

قطع یا عدم حضور هموگلوبینوری یکی از مهمترین نشانه های درمان است زیرا که در گروه درمان با دیمینازن در طی درمان هیچ گاه هموگلوبینوری که در گروه مشاهد آلوده وجود داشت مشاهده نشد.

در بررسی حاضر عود مجدد بیماری (تب و افرایش تعداد انگل در خون) به هنگام درمان با ایمیدوکارب مشاهده شد که با نتایج تحقیقات دیگر محققین مطابقت دارد. در تحقیقات آنها نیز آمده است که به علت عدم حذف کامل انگل پس از مصرف دارو عود مجدد بیماری مشاهده می شود (۱۰، ۱۴). دکتر هاشمی فشارکی در سال ۱۹۹۱ ترکیب ایمیدوکارب را جهت بازیوز گوسفند و بزمورد توجه قرار داده و آن را به عنوان یک داروی کیمپرو فیلاکسی توصیه می کند (۸). اما از دیمینازن می توان به عنوان درمان قطعی بازیا اوویس استفاده کرد زیرا که عود مجدد بیماری مشاهده نشود کلیه علائم حادث شده نیز بهبود یافتد.

Babesiosis with diminazene (Berenil Veterinary R Hoechst). Norsk- Veterinaertidsskrift. 97:5,358.

- Habbir,Ahmed., Ali-FA., Ahmed-S. (1995): Babesiosis in cross bred cattle(*Bos indicus XBos Taurus*)and buffaloes (*Bubalus bubalis*).Punjab- University J Zool.10:33-37.
- Silvey -Re.(1994): Babesiosis in a foal. Vet Rec.139: 17,428.