

بررسی سرولوژیکی آلوگی ویروس آنفلوانزا مرغی تحت تیپ H_9N_2 در جمعیت انسانی منطقه شهرکرد

عبدالکریم زمانی مقدم^۱* بابک امراء^۲ ادريس شیروانی^۳

(۱) بخش بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

(۲) گروه ریه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان- ایران.

(۳) گروه مدیریت کنترل کیفی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، تهران- ایران.

(دریافت مقاله: ۲۰ فروردین ماه ۱۳۸۷، پنیرش نهایی: ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۷)

چکیده

ویروس های خانواده ارتومیکسوسوپریده (ویروس های آنفلوانزا) عامل عمدی ای در ایجاد بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسی در انسان به شمارمی روند. با وجودی که عامل ایجاد بیماری آنفلوانزا مرغی در جمعیت طیور ایران تحت تیپ H_9N_2 می باشد تاکنون میزان آلوگی به تحت تیپ H_9N_2 آنفلوانزا در جامعه انسانی مطالعه نشده بود. در این تحقیق به بررسی سرولوژیکی آلوگی ویروس آنفلوانزا مرغی تحت تیپ H_9N_2 در گروه های مختلف انسانی پرداخته شده است. تعداد ۳۳۴ نمونه سرم خون شامل ۱۳۶ نمونه سرم بیماران با عوارض تنفسی بستره در بیمارستان، ۱۳۰ نمونه سرم بیماران بدون عوارض تنفسی بستره در بیمارستان، ۴۲ نمونه سرم مرغداران و کارورزان رشتہ دامپزشکی و افراد مرتبط با حرفة دامپزشکی جمع آوری گردید. عبارتنی بادی های ضد ویروس آنفلوانزا به وسیله دوازمايش الایزا و HI سنجیده شد. در آزمایش الایزا ۵۹/۱ درصد از بیماران بیمارستانی، ۸۸/۱ درصد از مرغداران و کارگران مرغداری ها و ۸۰/۷ درصد از کارورزان و افراد مرتبط با حرفة دامپزشکی از نظر آلوگی به ویروس آنفلوانزا تیپ A مشبت بودند. در آزمایش HI ۱۷/۶ درصد از بیماران با عوارض تنفسی بستره در بیمارستان، ۱۱/۵ درصد از بیماران بدون عوارض تنفسی بستره در بیمارستان، ۵۴/۸ درصد از مرغداران و کارگران مرغداری ها، ۸/۳۰ درصد از کارورزان و افراد مرتبط با حرفة دامپزشکی از نظر آلوگی به ویروس آنفلوانزا $H9N2$ A مشبت بودند. این گروه ها بوسیله آزمون T باهم مقایسه شدند ($p < 0.05$). نتایج این مطالعه حاکی از آلوگی گروه های مختلف جمعیت انسانی با تحت تیپ H_9N_2 ویروس آنفلوانزا بود که این آلوگی در مرغداران و کارگران مرغداری ها بیشتر نشان داده شده است.

واژه های کلیدی: آنفلوانزا مرغی، تحت تیپ H_9N_2 ، جمعیت انسانی، شهرکرد.

ویروس حاوی سویه های انسانی تیپ می باشد و آنفلوانزا ویروس حاوی ویروس تیپ انسانی و حیوانی است. تغییرات آنتی ژنی به طور مداوم در گروه چپ و در مقیاس کمتر در تیپ روى می دهد در حالی که تیپ از لحاظ آنتی ژنی پایدار است. آنفلوانزا C کمترین اهمیت را دارد ولی تیپ A می تواند در ایدمی های گسترد که پاندمی نامیده می شوند قاره ها و سراسر جهان را در نورده (۱،۲،۴،۶،۷). تاکنون در تیپ ۱۶A نوع HA و ۹ نوع NA شناسایی شده است، که از ترکیب این ۱۶ نوع HA و ۹ نوع NA تحت تیپ های مختلف بوجود می آید. در عفونت های انسانی، سه تحت تیپ (HA₁H₃T₁) و دو تحت تیپ (N₁, N₂) NA تحت تیپ هایی بودند که بیشتر جدا شده اند. تحت تیپ های H₅, H₆, H₇, H₉ تحت تیپ های قابل انتقال ویروس آنفلوانزا پرندگان به انسان می باشند که تحت تیپ های H₅, H₇, H₉ دارای بیماری زایی شدید و تحت تیپ H₉ دارای بیماری زایی خفیف است. ویروس های H_9N_2 علاوه بر ایران از کشورهای دیگر جهان از جمله، آمریکا، آلمان، ایتالیا، کره و چین از مکیان و بوقلمون جدا شده است. گزارش هایی مبنی به ابتلاء انسان به تحت تیپ H_9N_2 وجود دارد (۵،۶). برخی مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان حاکی از آلوگی سرمی انسان به خصوص افراد مرتبط با طیور در گیری با ویروس آنفلوانزا طیور تحت تیپ H_9N_2 می باشند (۳،۸). با توجه به این که تحت تیپ H_9N_2 عامل ایجاد بیماری آنفلوانزا مرغی در جمعیت طیور ایران در چند سال اخیر بوده و مطالعه ای در راستای بررسی میزان آلوگی جامعه

مقدمه

ویروس های خانواده ارتومیکسوسوپریده (ویروس های آنفلوانزا) عامل عده ای در ایجاد بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسی جمعیت انسانی به شمارمی روند و همه گیری های آن ها ایدمی های جهانی ایجاد می کند. آنفلوانزا در سطح جهان در قرن اخیر باعث میلیون ها مرگ شده است. ویروس آنفلوانزا تیپ از لحاظ آنتی ژنی به شدت متغیر بوده و مسئول اکثر موارد ایدمی آنفلوانزا می باشد (۱). در همه گیری بین سال های ۱۹۱۸- ۱۹۱۹ حدود ۲۰ میلیون انسان در اثر بیماری آنفلوانزا تلف گردیدند و به دنبال این همه گیری شدید سال های ۱۹۱۸- ۱۹۱۹ مطالعات روی این بیماری بیشتر و سریع تر شده است (۴). همچنین بیماری های ناشی از ویروس های این خانواده در سایر گونه ها بخصوص پرندگان از نظر اقتصادی بسیار با اهمیت بوده و علاوه بر خسارات مستقیم ناشی از خود بیماری، کنترل، پیشگیری و ریشه کنی آن بسیار پرهزینه است (۲).

ویروس آنفلوانزا متعلق به خانواده ارتومیکسوسوپریده می باشد. در حال حاضر ویروس های این خانواده بر اساس نوکلئو پسیده های چهار تیپ A, B, C و تو گوتونیوس تقسیم بندی می شوند. سه تیپ A, B, C از نظر الگوهای ایدمیولوژیک بیماری در انسان، تفاوت های قابل توجهی دارند. جنس آنفلوانزا ویروس A حاوی سویه های انسانی و حیوانی تیپ است آنفلوانزا



بادی‌های ضدآنفلوانزای تیپ A در نمونه‌های سرم اخذ شده از گروه‌های مختلف جمعیت انسانی شامل بیماران بسترهای در بیمارستان (با عوارض و بدون عوارض تنفسی)، مرغداران و کارگران مرغداری‌ها، کارورزان و افراد دامپزشکی.

جدول ۱- مقایسه موارد مثبت آزمایش HI در گروه‌های مختلف شغلی.

گروه‌ها	نمونه	تعداد	مشیت	در گروه	درصد مشیت از کل نمونه‌ها
بیماران با عوارض تنفسی	۱۳۶	۲۴	۱۷/۶	۷/۱	۷/۱
بیماران بدون عوارض تنفسی	۱۳۰	۱۵	۱۱/۵	۴/۴	۴/۴
مرغداران و کارگران مرغداری‌ها	۴۲	۲۳	۵۴/۸	۶/۸	۶/۸
کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی	۲۶	۸	۳۰/۸	۴	۴
جمع	۳۳۴	۷۵	-	-	۲۱

جدول ۲- مقایسه موارد مثبت آزمایش HI در گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی شده بر اساس جنس.* کارگران مرغداری‌ها همگی مرد بوده و در این تقسیم‌بندی لحاظ نشده.

گروه‌ها	نمونه	تعداد	مشیت	در گروه	درصد مشیت کل
بیماران مرد با عوارض تنفسی	۷۰	۱۵	۲۱/۴	۵/۱	۵/۱
بیماران مرد بدون عوارض تنفسی	۶۸	۹	۱۳/۲	۳/۰۸	۳/۰۸
بیماران زن با عوارض تنفسی	۶۶	۹	۱۳/۶	۳/۰۸	۳/۰۸
بیماران زن بدون عوارض تنفسی*	۶۲	۶	۹/۶	۲/۰۵	۲/۰۵
کارورزان مرد	۱۶	۳	۱۸/۷	۱/۰۲	۱/۰۲
کارورزان زن	۱۰	۵	۵۰	۱/۷	۱/۷
جمع مرد	۱۵۴	۲۷	-	۹/۲	۹/۲
جمع زن	۱۳۸	۲۰	-	۶/۸	۶/۸
جمع کل	۲۹۲	۴۷	-	۱۶	۱۶

جدول ۳- وضعیت تیترهای مثبت آزمایش HI در گروه‌های مختلف.

گروه‌ها	در آزمایش HI	موارد دارای تیتر HI	معدل	تعداد و درصد					
بیماران بیمارستانی	(٪۳۹/۲)	(٪۳۸/۵)	(٪۲۴)	(٪۶۱/۵)	(٪۶۱/۵)	(٪۲۴)	(٪۳۸/۵)	(٪۱۵)	(٪۳۸/۵)
مرغداران	(٪۲۳)	(٪۲۳)	(٪۷)	(٪۳۰/۵)	(٪۳۰/۵)	(٪۷)	(٪۲۳)	(٪۱۵)	(٪۳۰/۵)
کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی	(٪۸)	(٪۸)	(٪۱)	(٪۷۵/۶)	(٪۷۵/۶)	(٪۱)	(٪۱۲/۵)	(٪۱)	(٪۷۵/۶)

جدول ۴- بررسی آلدگی به ویروس آنفلوانزای A توسط آزمایش الایزا.

گروه‌ها	نمونه	تعداد نمونه	مشیت	درصد مشیت
بیماران بیمارستانی	۲۲	۱۳	۵۹/۱	۵۹/۱
مرغداران	۴۲	۳۷	۸۸/۱	۸۸/۱
کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی	۲۶	۲۱	۸۰/۷	۸۰/۷
جمع	۹۰	۷۱	۷۸/۹	۷۸/۹

انسانی به خصوص افراد مرتبط با طیور در کشور نشده است. در این تحقیق به بررسی سرلوژیکی آلدگی ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H_9N_2 در چهارگروه جمعیتی انسانی شامل افراد با عوارض تنفسی بسترهای در بیمارستان، افراد بدون عوارض تنفسی بسترهای در بیمارستان، کارگران مرغداری‌ها و دانشجویان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی در منطقه شهرکرد پرداخته‌می‌شود.

مواد و روش کار

تعداد ۳۳۴ نمونه سرم خون انسانی جمع‌آوری گردید که شامل نمونه سرم خون بیماران بسترهای در بیمارستان با عوارض تنفسی، ۱۳۰ نمونه سرم خون بیماران بسترهای در بیمارستان بدون عوارض تنفسی، ۴۲ نمونه خون کارگران مرغداری و ۲۶ نمونه خون دانشجویان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی در بیمارستان، پس از مطالعه پرونده‌های بیماران بسترهای در بیمارستان هاجر شهرکرد بیماران با عوارض تنفسی و همچنین بیماران بدون عوارض تنفسی مشخص شده و از آن‌ها خون‌گیری به عمل آمد، سپس با مراجعت به آزمایشگاه بیمارستان حدود یک میلی لیتری به آزمایشگاه سرولوژی دانشکده دامپزشکی اپندورف ۱/۵ میلی لیتری به آزمایشگاه سرولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد جهت جستجوی آنتی‌بادی ضدآنفلوانزابه روش‌های الایزا و HI منتقل می‌شد و در مورد نظر در لوله‌های اپندورف ۱/۵ میلی لیتری به آزمایشگاه سرولوژی پس از گرفتن خون مرغداری و دانشجویان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی پس از گرفتن خون افراد، خون‌ها با سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شده سرم آن‌ها جدا و پس از تیمار در میان ۵۵ درجه سانتی‌گراد به مدت نیم ساعت از آن‌ها در آزمایش‌های الایزا و HI استفاده گردید. در آزمایش HI از آنتی‌زن تحت تیپ H_9N_2 تهیه شده از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و در آزمایش الایزا کیت الایزا تشخیص آنتی‌بادی علیه ویروس آنفلوانزای تیپ A طراحی شده در آزمایشگاه با استفاده از پلیت‌های باند شده با آنتی‌زن تیپ A ویروس آنفلوانزا تولید شرکت KPL آلمان (کیت تجاری تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد تیپ A ویروس آنفلوانزا در طیور) و کونژوگه انسانی استفاده شد که در طول موج ۴۵۰ نانومتر قرائت گردید. نتایج حاصل در گروه‌های مختلف با آزمون T آنالیز گردید.

نتایج

تیتر سرمی آنتی‌بادی‌های ضدآنفلوانزای مرغی تحت تیپ H_9N_2 در نمونه‌های سرم اخذ شده از گروه‌های جمعیت انسانی شامل بیماران با عوارض تنفسی بسترهای در بیمارستان، بیماران بدون عوارض تنفسی بسترهای در بیمارستان، مرغداران و کارگران مرغداری‌ها و کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی توسط آزمایش HI سنجیده شد. در این تحقیق نمونه‌های دارای تیتر HI بالاتر از ۱/۸ به عنوان نمونه‌های مثبت در نظر گرفته شدند. نتایج حاصله در جداول ۱، ۲، ۳، ۴ نشان داده است. تیتر سرمی آنتی

مرغی در کشور ایران آنتی بادی های ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ N_2 رادر سرم خون جوجه های گوشته، تخمگذار و مادر به روش HI شناسایی کردند (۱۰). Eick و همکاران در سال ۱۹۹۷ میلادی تیتر آنتی بادی های ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ N_2 را رادر سرم خون تعادی از کارگران مرغداری ها در هنگ کنگ به روش خنثی سازی میکرو سنجیدند که ۴۹ درصد (۲۴۹ نفر) از افراد مورد آزمایش از نظر آلودگی به این تحت تیپ مثبت گزارش شدند. Guo و همکاران در مطالعه ای در سال ۱۹۹۹ در چین به بررسی سرولوژیکی جمعیت انسانی، طیور خوک های روش در جین پرداختند که بر اساس این مطالعه حدود ۱۹ درصد سرم افراد در جمعیت انسانی مورد مطالعه حاوی آنتی بادی های ضد ویروس آنفلوانزا تحت تیپ N_2 بودند (۷). در مطالعه ای Cheng و همکاران در سال ۲۰۰۲ در منطقه شنزن هنگ کنگ آلودگی سرمی با ویروس آنفلوانزا تحت تیپ N_2 رادر جمعیت انسانی و طیور صنعتی تحت آزمایش با آزمایشات HI و خنثی سازی به ترتیب ۷۶ و ۲۶ درصد تخمین زدند (۳). Li و همکاران در سال ۲۰۰۴ در منطقه گوانزو چین درصد آلودگی سرمی با این ویروس را در گروهی از کارگران مرغداری ها و طیور تحت مطالعه به ترتیب ۱۲/۸ و ۱/۵ درصد گزارش کردند (۸).

با توجه به نتایجی که در این تحقیق بدست آمده، در آزمایش HI مرغداران و کارگران مرغداری ها گروهی هستند که نسبت به دیگر گروه ها تیتر آنتی بادی ضد ویروس آنفلوانزا در آن ها بیشتر است علت این امر شاید برخورد و روپارویی بیشتر این گروه با جمعیت طیور باشد که باعث افزایش تیتر آنتی بادی های ضد آنفلوانزا مرغی تحت تیپ N_2 (که به وسیله آزمایش HI سنجیده شده است) در آن ها نسبت به سایرین شده است. در آزمایش ایزامیزان عیار آنتی بادی علیه آنفلوانزا A در مرغداران و کارگرهای مرغداری های بیشتر از کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی و بیماران بستری در بیمارستان است و همچنین عیار این آنتی بادی ها در کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی بیشتر از بیماران بیمارستانی می باشد. شاید علت این اختلاف را بتوان این گونه توجیه کرد که علی رغم این که افراد این گروه ها از نظر برخورد با نوع تحت تیپ آنفلوانزا A به جز تحت تیپ N_2 در شرایط یکسانی هستند ولی مرغداران نسبت به کارورزان و بیماران بیمارستانی به مراتب برخورد بیشتری با طیور داشته اند و چنین وضعیتی را کارورزان نسبت به بیماران بستری در بیمارستان دارند.

به طور کلی نتایج این مطالعه حاکی از آلودگی سرولوژیکی جمعیت انسانی تحت مطالعه با تحت تیپ N_2 ویروس آنفلوانزا است که این آلودگی در افرادی که برخورد بیشتری با طیور دارند (مرغداران و کارگران مرغداری ها) بیشتر می باشد.

تشکر و قدردانی

از زحمات استادی گرامی دکتر محمدرضا محظویه، دکتر مجتبی بنیادیان و مهندس عبدالرسول صفر پور، خانم مهندس علیخانی، کارکنان

مربط با حرفه دامپزشکی توسط آزمایش الیزاسنجیده شد، نتایج حاصل در جدول ۴ نشان داده شده است.

نتایج HI گروه های مختلف جمعیت انسانی توسط آزمون T دوبه دو با هم مقایسه شدند که نتایج آزمون T به شرح زیر می باشد.

گروه اول (بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان) و گروه دوم (بیماران بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان) دارای اختلاف معنی دار نیستند ($p > 0.05$). گروه اول (بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان) و گروه سوم (مرغداران و کارگران مرغداری ها) دارای اختلاف معنی دار هستند ($p < 0.05$) گروه اول (بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان) و گروه چهارم (کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی) دارای اختلاف معنی دار هستند ($p < 0.05$).

گروه دوم (بیماران بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان) و گروه سوم (مرغداران و کارگران مرغداری ها) دارای اختلاف معنی دار هستند ($p < 0.05$). گروه دوم (بیماران بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان) و گروه چهارم (کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی) دارای اختلاف معنی دار هستند ($p < 0.05$).

گروه سوم (مرغداران و کارگران مرغداری ها) و چهارم (کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی) که دارای اختلاف معنی دار هستند ($p < 0.05$).

گروه پنجم (بیماران مرد بستری در بیمارستان) و گروه ششم (بیماران زن بستری در بیمارستان) دارای اختلاف معنی دار نیستند ($p > 0.05$). گروه هفتم (کارورزهای مرد و مردهای مرتبط با حرفه دامپزشکی) و گروه هشتم (کارورزهای زن و زن های مرتبط با حرفه دامپزشکی) دارای اختلاف معنی دار نمی باشند ($p > 0.05$).

در آزمون T به عمل آمده بین چهار گروه سنی نوزاد، زیر ۲۰ سال، ۲۰-۴۰ سال و بالای ۴۰ سال اختلاف معنی دار نمی باشد ($p > 0.05$).

نتایج الیزای سه گروه جمعیت انسانی شامل بیماران بستری در بیمارستان، مرغداران و کارگران مرغداری ها، کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی توسط آزمون T دوبه دو با هم مقایسه شدند که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد.

گروه اول شامل بیماران بستری در بیمارستان و گروه دوم شامل مرغداران و کارگران مرغداری ها دارای اختلاف معنی دار هستند ($p < 0.05$). گروه اول شامل بیماران بستری در بیمارستان و گروه سوم شامل کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی دارای اختلاف معنی دار هستند ($p < 0.05$). گروه دوم شامل مرغداران و کارگران مرغداری ها و گروه سوم شامل کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی دارای اختلاف معنی دار هستند ($p < 0.05$).

بحث

بررسی آلودگی سرمی گونه های مختلف از جمله انسان با ویروس آنفلوانزا تحت تیپ N_2 در نقاط گوناگون دنیا صورت گرفته است. Vasfi Marandi و همکاران در سال ۱۳۷۷ به دنبال شیوع بیماری آنفلوانزای



References

1. Brooks, G. F., Carroll, K. C., Butel, J. S., Mors, S. A. (2007) Jawetz, Melnick and Alderberg's Medical Microbiology. (24thed.) The McGraw. Hill. New York, USA.
2. Calnek, B. W. (2006) Diseases of poultry. Iowa State University Press, Iowa, USA.
3. Cheng, X., Liu, J., He, J., Shan, F. (2002) Virological and serological surveys for H₉N₂ subtype of influenza A virus in chickens and men in Shenzhen city. Chin. J. Exp. Clin. Virol. 16:319-21.
4. Goldman, L. (2004) Cecil Text Book of Medicine. (22thed.) Saunders. Philadelphia, USA.
5. Guo, Y. J. (1999) Discovery of man infected by influenza virus. Chin. J. EXP. Clin. Virol. 13: 105-108.
6. Jordan, F. T. W. (2008) Poultry diseases. (6thed.) W. B. Sanders. London, UK.
7. Kinpe, D. M., Mohowley, P. (2007) Fields Virology. Lippincot williams and wilkins. Philadelphia, USA.
8. Li, C., Zhou, X., Li, M. (2004) Discoveries of avian influenza A(H₉ N₂) virus in chickens and men infected by H₉N₂ virus in Guangzhou area. Chin. J. Exp. Clin. Virol. 18:213-4.
9. Nicholson, K. G. (2003) Influenza. Lancet. 362:1733-1745.
10. Vasfi Marandi, M., Bozorgmehri Fard, M. H. (2002) Isolation of H₉N₂ subtype of avian influenza viruses during outbreak in chickens in Iran. Iran-Biomed. 6:13-17.

آزمایشگاه سرولوژی و بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد و مدیریت و کارکنان مرغداری صنعتی سامان تشرکمی گردد.

SEROLOGICAL STUDY ON H₉N₂ AVIAN INFLUENZA INFECTION OF HUMAN HABITANCE IN SHAHREKORD AREA

Zamani Moghaddam, A.K.^{1*}, Amra, B.², Shirvani, E.³

¹Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord-Iran.

²Lung Group, Medical science University of Isfahan, Isfahan-Iran.

³Department of Quality Control Management, Razi Institute, Karaj-Iran.

(Received 8 April 2008 , Accepted 28 Februar 2009)

Abstract:

Orthomixoviridae family viruses (Influenza viruses) are major cause of death in human with respiratory diseases. Although avian influenza in Iranian chickens are associated with H₉N₂ subtype, there was not any study for H₉N₂ human infection as yet. This investigation conducted to serological study of H₉N₂ avian influenza infection in different human groups. The number of 334 blood sera including 136 serum samples of hospitalized patients with respiratory complications, 130 sera of hospitalized patients without respiratory complications, 42 sera of farmers and poultry workers and 26 sera of students and related ones to veterinary profession were collected. The influenza virus antibody titres were measured by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and hemagglutination inhibition (HI) tests. 59.1% of hospitalized patients, 88.1% of farmers and poultry workers, 80.7% of students and related ones to veterinary profession were positive to influenza virus type A contamination by using ELISA test. In HI test, 17.6% of hospitalized patients with respiratory complications, 54.8% of farmers and poultry workers, 30.8% of students and related ones to veterinary profession were positive for H₉N₂ subtype of avian influenza type A. These groups were compared one by one by T test ($p < 0.05$). The results indicated that different groups of humans were infected with H₉N₂ avian influenza virus whence farmers and poultry workers were shown more infection.

Key words: avian influenza, H₉N₂ subtype, human habitance, Shahrekord.

*Corresponding author's email: fathie@vetmed.ut.ac.ir, Tel: 021-61117128, Fax: 021-66933222

