

## بررسی فعالیت تخدمانی متعاقب اولین زایش در گاوها شیری هلشتاین

بهنام رستمی<sup>۱</sup> امیر نیاسری نسلجی<sup>۲\*</sup> مهدی وجگانی<sup>۲</sup> داراب نیک جوم مقانی<sup>۲</sup> حمید امانلو<sup>۱</sup>

(۱) گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان- ایران.

(۲) گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

(دریافت مقاله: ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ ، پذیرش نهایی: ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰)

### چکیده

**زمینه مطالعه:** آنستروس پس از زایش در گاوها شکم اول نسبت به گاوها چندشکم زا شدیدتر است. **هدف:** هدف مطالعه حاضر بررسی فعالیت تخدمانی در این گاوها با استفاده از اولتراسونوگرافی و تغییرات روزانه پروژسترون بود. **روش کار:** مطالعه روی ۷ راس دام سالم انجام شد. خون گیری و سونوگرافی روزانه، از روز ۶ تا سومین تخمک گذاری پس از زایش، انجام شد. نتایج: فولیکول های تخدمانی با قطر  $\geq 10\text{ mm}$  حاصل از اولین موج فولیکولی، در فاصله  $1/5 \pm 1/48$  روز پس از زایمان در تمام دام ها مشاهده شد. اولین فولیکول غالب پس از زایش در هیچ یک از دام ها تخمک گذاری نکرد. هیچ یک از دام ها قبل از روز ۲۰ پس از زایش تخمک گذاری نکردند. تفاوتی در قطر و میزان رشد فولیکول تخمک گذار قبل از اولین، دومین و سومین تخمک گذاری پس از زایش مشاهده نشد ( $p > 0.05$ ). فاصله زایش تا اولین تخمک گذاری  $1/6 \pm 48/89$  روز محاسبه گردید. میانگین قطر جسم زردا اولین (۱۸/۸  $\pm 0/94\text{ mm}$ ) نسبت به دومین سیکل فحلی ( $24 \pm 0/89\text{ mm}$ ) کوچکتر بود ( $p < 0.05$ ). میانگین غلظت پروژسترون در اولین ( $2 \pm 0/24\text{ ng/mL}$ ) در مقایسه با دومین سیکل ( $3/6 \pm 0/36\text{ ng/mL}$ ) ( $p < 0.05$ ). نتیجه گیری نهایی: بطور خلاصه، طولانی بودن فاصله زایش تا اولین تخمک گذاری در گاوها شیری شکم اول در اثر عدم تخمک گذاری و تحلیل فولیکول غالب اولین موج فولیکولی پس از زایش بوده و بدیل تاخیر یا عدم تشکیل این فولیکول نمی باشد.

**واژه های کلیدی:** آنستروس پس از زایش، گاوها شیری شکم اول، اولتراسونوگرافی، پروژسترون.

مهم در تلقیح به هنگام گاوها به شماره می رود (۲۳). گاوها یکه در فاصله ۸-

۴ هفته اول پس از زایش تخمک گذار نامیده می شوند (۱۲). این پدیده بیشتر در آنستروس یا غیر تخمک گذار نامیده می شوند (۱۲). با این پدیده بیشتر در گاوها شکم اول در مقایسه با گاوها چندشکم زارخ می دهد (۸، ۱۲، ۲۳). با در نظر گرفتن کاهش روزافزون باروری در گاوها شیری پر تولید و اهمیت آبستن شدن دام در زمان مناسب، درک صحیح از الگوی فعالیت تخدمان ها در دوره پس از زایش، می تواند در شناسایی عوامل موثر در شروع فعالیت زود هنگام تخدمان ها موثر باشد. بر اساس آخرین اطلاعات پیرامون فعالیت تخدمانی پس از زایش در گاوها شیری شکم اول، اطلاعات روزانه و دقیقی از زمان تشکیل فولیکول غالب تخمک گذار و غیر تخمک گذار در طول ۲ چرخه فحلی پس از زایش موجود نمی باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی دقیق فعالیت تخدمانی در گاوها شکم اول با استفاده از اولتراسونوگرافی و اندازه گیری تغییرات غلظت پروژسترون، بصورت روزانه، بوده است.

### مواد و روش کار

مکان انجام پژوهش و دام های مورد مطالعه: مطالعه حاضر در گله شیری موسسه تحقیقات دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با عرض چهارمایی  $398/35^{\circ}$  شمالی و طول جغرافیایی  $51/2638^{\circ}$  شرقی و با حداقل ارتفاع  $1049\text{ m}$  از سطح دریا صورت پذیرفت. مطالعه بر روی گاوها شکم اول که در فاصله بهمن ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹ زایمان کرده بودند انجام شد. دام هایی وارد مطالعه شدند که فاقد مشکلات پیرامون زایش نظیر جفت

### مقدمه

در طول دهه های گذشته پیشرفت های زیستی کی که به منظور افزایش تولید شیر حاصل شد، موجب کاهش کارآئی تولید مثلی در گاوها شیری پر تولید شده است (۱، ۲). در صنعت گاو شیری به منظور افزایش بازده اقتصادی گله لازم است تا هر گاو در هر سال یک گوساله تولید کند. برای رسیدن به این هدف فاصله بین دو زایش باید در فاصله ۱۲ تا ۱۳ ماه صورت پذیرد تا تولید یک گوساله به ازای هر گاو در هر سال محقق گردد. در چنین شرایطی گاو باید در عرض ۳ ماه پس از زایمان مجدد آبستن شود. برای رسیدن به این هدف لازم است تا تخدمان هادر عرض چند هفته اول پس از زایش فعالیت سیکلیک خود را شروع کنند. مطالعات متعددی نشان داده اند که یکی از دلایل عدم کاهش کارآئی تولید مثل گاوها شیری تاخیر در شروع فعالیت تخدمان ها در پس از زایش می باشد، این تاخیر منجر به افزایش فاصله زایش تا آبستن شدن دام خواهد شد (۳، ۴، ۵، ۶). اگر تخدمان گاو هرچه سریعتر فعالیت چرخه ای خود را از سر گیرد و بیش از رسیدن زمان تلقیح چند چرخه فحلی داشته باشد، احتمال باروری گاو در زمان نخستین تلقیح بیشتر می شود. در غیر این صورت میزان باروری دام ممکن است کاهش یابد. در واقع شروع سریعتر فعالیت تخدمانی پس از زایش برای افزایش کارآئی تولید مثلی گاو شیری دارای اهمیت فراوان است. بطور یکه تاخیر در از سر گیری فعالیت تخدمانی پس از زایش یک مانع



در فاصله  $1/48 \pm 5/11$  روز پس از زایمان در تمام دامها مشاهده شد. در هیچیک از دامها اولین فولیکول غالب ناشی از اولین موج فولیکولی پس از زایمان تخمک گذاری نکرد. اولین تخمک گذاری پس از زایش در دام شماره ۶۳۵ در فوپولیکول غالب ناشی از دومین موج فولیکولی، در دادم شماره ۶۳۲ و در فوپولیکول غالب ناشی از سومین موج فولیکولی، در دادم شماره ۶۳۸ و در فوپولیکول غالب ناشی از چهارمین موج فولیکولی و در دامهای شماره ۶۴۰ و در فوپولیکول غالب ناشی از پنجمین موج فولیکولی پس از زایمان به وقوع پیوست (تصویر ۱). هیچکدام از دامها قبیل از روز  $2^{\circ}$  پس از زایش تخمک گذاری نکردن (جدول ۱). تفاوتی در حداکثر قطر فولیکول تخمک گذار قبل از اولین ( $16/2 \pm 1/24$  mm)، دومین ( $16/0 \pm 0/51$  mm) و سومین ( $15/9 \pm 0/78$  mm) تخمک گذاری پس از زایش مشاهده نشد ( $p > 0/05$ ). همچنین تفاوتی در میزان رشد فولیکول تخمک گذار در اولین ( $1/51$  mm/day) و سومین ( $1/32$  mm/day) و دومین ( $1/18$  mm/day) در میزان تخمک گذاری پس از زایش مشاهده نشد ( $p > 0/05$ ). فاصله زایش تا اولین، دومین و سومین تخمک گذاری به ترتیب  $8/9 \pm 1/6$ ،  $3/3 \pm 3/55$  و  $4/8 \pm 1/6$  روز بود (جدول ۱). فاصله بین اولین تادومین تخمک گذاری  $\pm 3/32$  روز، پس از زایش با فاصله بین دومین تا سومین تخمک گذاری  $\pm 0/84$  روز، پس از زایش تفاوت معنی دار نداشت (جدول ۱). متعاقب اولین تخمک گذاری در صد گاوها دارای سیکل کوتاه ( $7/85$  روز) بصورت معنی داری از درصد گاوها دارای سیکل نرمال ( $3/0$ ) و طولانی ( $14/3$ ) بیشتر بود ( $p < 0/05$ ، جدول ۱). قطر جسم زرد اولین سیکل فحلی ( $0/94$  mm) نسبت به دومین سیکل فحلی ( $0/89$  mm)  $24 \pm 0/24$  ng/mL کوچکتر بود ( $p < 0/05$ ) در مقایسه با دومین سیکل ( $3/6 \pm 0/36$  ng/mL) کمتر بود ( $p < 0/05$ ، جدول ۲). میانگین غلظت پروژستررون در اولین سیکل ( $4-5$  mm) همراه بود. روز شروع موج فولیکولی به صورت گذشته نگر روز ظهرور فولیکول های  $4-5$  mm در روی تخدمان در نظر گرفته شد. همچنین فولیکول غالب به صورت تخمک گذار و غیر تخمک گذار تعريف شد.

**آنالیز آماری:** میانگین فاصله زمانی از زایمان تا اولین، دومین و سومین تخمک گذاری برای محاسبه در نظر گرفته شد. طول عمر جسم زرد بر مبنای تعداد روزها از روز تخمک گذاری تاریزی که میزان پروژستررون پلاسمایی میزان قابل توجهی نسبت به روز قلی کاهش نشان می دهد و این کاهش به صورت معنی دار ادامه یابد در نظر گرفته شد. میانگین غلظت پروژستررون در طول سیکل فحلی از افزایش ابتدایی مقدار این هورمون تا بازگشت به مقدار پایه ( $0/2$  ng/mL) در نظر گرفته شد. اختلاف در اندازه فولیکول تخمک گذار و میزان رشد این فولیکول محاسبه شد. تعداد امواج فولیکولی در طول زمان مطالعه و فاصله از زایمان تا اولین، دومین و سومین تخمک گذاری ثبت شد. طول عمر جسم زرد، غلظت پروژستررون در طول هر سیکل، فاصله از اولین تادومین تا تخمک گذاری (معادل طول اولین سیکل پس از زایش) و فاصله از دومین تا سومین تخمک گذاری (معادل طول دومین سیکل پس از زایش) با استفاده از GLM دستور SAS/STAT افزار آماری مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

مانندگی و سخت زایی بودند. همچنین دامهایی که مشکلات و بیماری هایی نظیر آندومتریت بالینی، ورم پستان بالینی، لنگش و مشکلات گوارشی بودند از مطالعه حذف شدند و در نهایت مطالعه برروی ۷ راس دام انجام شد. دامهای آزمایشی از شرایط غذیه ای و مدیریتی یکسان برخوردار بوده و جیره غذایی دامهای بر اساس معیارهای توصیه شده NRC تنظیم گردید. بر اساس سه بار دوشش در روز میانگین شیر تولیدی دامهای مورد مطالعه در طول دو ماه اول پس از زایش  $8/4 \pm 6/2$  kg بود. خون گیری و اندازه گیری پروژستررون: نمونه های خون وربدی از طریق وربدی به صورت روزانه از روز  $6^{\circ}$  پس از زایش تا زمان سومین تخمک گذاری پس از زایش جمع آوری گردید. نمونه های خون اخذ شده بلایاصله به مدت  $20^{\circ}$  دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  $4000$  دور در دقیقه قرار گرفتند و نمونه های سرم حاصله تازمان آنالیز هورمونی در دمای  $0/4^{\circ}$  C- نگه داری شدند. مقادیر سرمی پروژستررون با استفاده از روش رادیوایمونوآسی بترتیب با حساسیت، ضرایب تغییرات بین و داخل آزمایشی،  $0/2 \pm 0/6$  ng/mL و  $7/4 \pm 10/6$  ng/mL اندازه گیری شد.

**سونوگرافی تخدمان:** ساختارهای تخدمانی (فولیکول و جسم زرد) بصورت روزانه از روز  $6^{\circ}$  پس از زایش تاروز تشخیص سومین تخمک گذاری (Honda HS-1500; Japan) پس از زایش با استفاده از دستگاه سونوگرافی (Honda HS-1500; Japan) مجهز به ترانس迪وسر راست رودهای با فرکانس  $7/5$  MHz انجام شد. روز تخمک گذاری، روز محو شدن ناگهانی بزرگترین فولیکول در نظر گرفته شد که متعاقبا با تشکیل جسم زرد و افزایش مقادیر پروژستررون پلاسما همراه بود. روز شروع موج فولیکولی به صورت گذشته نگر روز ظهرور فولیکول های  $4-5$  mm در روی تخدمان در نظر گرفته شد. همچنین فولیکول غالب به صورت تخمک گذار و غیر تخمک گذار تعريف شد.


**آنالیز آماری:** میانگین فاصله زمانی از زایمان تا اولین، دومین و سومین تخمک گذاری برای محاسبه در نظر گرفته شد. طول عمر جسم زرد بر مبنای تعداد روزها از روز تخمک گذاری تاریزی که میزان پروژستررون پلاسمایی میزان قابل توجهی نسبت به روز قلی کاهش نشان می دهد و این کاهش به صورت معنی دار ادامه یابد در نظر گرفته شد. میانگین غلظت پروژستررون در طول سیکل فحلی از افزایش ابتدایی مقدار این هورمون تا بازگشت به مقدار پایه ( $0/2$  ng/mL) در نظر گرفته شد. اختلاف در اندازه فولیکول تخمک گذار و میزان رشد این فولیکول محاسبه شد. تعداد امواج فولیکولی در طول زمان مطالعه و فاصله از زایمان تا اولین، دومین و سومین تخمک گذاری ثبت شد. طول عمر جسم زرد، غلظت پروژستررون در طول هر سیکل، فاصله از اولین تادومین تا تخمک گذاری (معادل طول اولین سیکل پس از زایش) و فاصله از دومین تا سومین تخمک گذاری (معادل طول دومین سیکل پس از زایش) با استفاده از GLM دستور SAS/STAT افزار آماری مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

## نتایج

فولیکول های تخدمانی با قطر  $10$  mm حاصل از اولین موج فولیکولی،

## بحث

هدف این مطالعه بررسی فعالیت تخدمانی در گاوها شیری شکم اول بود. در این مطالعه فولیکول های تخدمانی با اندازه  $10$  mm در فاصله  $11/5 \pm 1/48$  روز پس از زایش در تمام گاوها مشاهده شد. آغاز موج فولیکولی در فاصله  $7-5$  روز پس از زایش در پاسخ به افزایش مقادیر



تصویر ۱- نمودار فعالیت سیکلیک تخدمانی گاوها شیری هشتاین شکم اول در دوره پس از زایش. —●— اولین موج تخمک گذار —■— دومین موج تخمک گذار  
—▲— جسم زرد —○— موج غیر تخمک گذار ······ پروژسترون

گاوها شیری مورد بررسی قرار گرفته و سه الگوی متفاوت گزارش شده است. (الف): تخمک گذاری اولین فولیکول غالب، (ب): تحلیل اولین فولیکول غالب و به دنبال آن تخمک گذاری در یکی از موج های فولیکولی متعاقب موج اول، (ج): کیستیک شدن اولین فولیکول غالب (۷). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در تمام گاوها آزمایشی فولیکول غالب اولین موج فولیکولی تخمک گذاری نکرده و تحلیل رفت. متعاقباً، اولین

پلاسمایی FSH ایجاد شده و منجر به تشکیل اولین فولیکول غالب در حدود ۱۱ روز پس از زایش می شود (۲۲، ۲۴، ۲۵) که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فولیکول غالب حاصل از اولین موج فولیکولی پس از زایش در هیچیک از گاوها تخمک گذاری نکرد. همچنین هیچیک از گاوها قبل از روز ۲۰ پس از زایش تخمک گذاری نکردند. پیامرد شد فولیکولی در اولین موج فولیکولی پس از زایش در




جدول ۱- شاخص‌های فعالیت تخدمانی در دوره پس از زایش در گاوهاش شیری شکم اول. اطلاعات بصورت میانگین  $\pm$  خطای معیار و فراوانی گزارش شده است. AB اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده اند، دارای اختلاف آماری معنی دار هستند ( $p < 0.05$ ). (p)

|                 |  |
|-----------------|--|
| $48/1 \pm 6/89$ | فاصله زایش تا اولین تخمک‌گذاری (day)                   |
| $62/3 \pm 5/35$ | فاصله زایش تا دومین تخمک‌گذاری (day)                   |
| $85/0 \pm 5/42$ | فاصله زایش تا سومین تخمک‌گذاری (day)                   |
| $(+) \cdot$     | فراوانی تخمک‌گذاری متعاقب اولین موج فولیکولی (%)       |
| $(-) \cdot$     | فراوانی تخمک‌گذاری تاریخ پس از زایش (%)                |
| $7/1 \pm 0/40$  | تعداد امواج فولیکولی در فاصله زایش تا سومین تخمک‌گذاری |
| $16/0 \pm 3/22$ | فاصله اولین تا دومین تخمک‌گذاری پس از زایش (day)       |
| $22/6 \pm 0/84$ | فاصله دومین تا سومین تخمک‌گذاری پس از زایش (day)       |
| $6/85/7^A$      | طول سیکل اول پس از زایش:                               |
| $6/85/7^B$      | تعداد گاوها دارای سیکل کوتاه ( $< 16$ day)             |
| $6/14/3^B$      | تعداد گاوها دارای سیکل نرمال (day ۱۸-۲۴)               |
|                 | تعداد گاوها دارای سیکل بلند ( $> 24$ day)              |

فراوانی سیکل‌های کوتاه مدت به میزان ۵۴٪ در اولین سیکل پس از زایش گزارش شده است (۹). از بین رفتون زودرس جسم زرد در دام‌های با جسم زرد کوتاه به دلیل پایین بودن مقادیر استرادریول قبل از تخمک‌گذاری و تشکیل زودهنگام گیرنده‌های اکسی توسین در رحم می‌باشد (۱۷) که این نیز به نوبه خود سبب افزایش تولید پروستاگلاندین  $\pm$  به عنوان فاکتور از بین برندۀ جسم زرد خواهد شد (۱۷، ۲۹). پروژسترون می‌تواند در تشکیل سیکل‌های منظم فحلی در گاوهاش پس از زایش مؤثر باشد. بدین منظور پروژستازنهای برای القاء سیکل فحلی در گاوهاش پس از زایش مورد استفاده قرار گرفته‌اند (۱۵، ۱۸، ۲۷). اثر فیزیولوژیک پروژسترون آبستنی همچنان تا ۱۵ روز پس از زایش باقی است (۲۵). با توجه به اهمیت حضور سیکل فحلی با طول طبیعی، مشاهده شد اگر فولیکول غالب تخمک‌گذار قبل از روز ۱۰ پس از زایش در روی تخدمان تشکیل شود طول سیکل فحلی متعاقب اولین تخمک‌گذاری، طبیعی (۱۸-۲۴ روز) با طولانی تر ( $\geq 25$  روز) خواهد بود. بر عکس در صورتیکه فولیکول غالب تخمک‌گذار بعد از روز ۲۰ پس از زایش بر روی تخدمان مشاهده شود سیکل ها عمده‌تا کوتاه مدت (۱۳-۱۶ روز) خواهد بود (۲۵). این مشاهده‌ها با نتایج مطالعه حاضر نیز همخوانی دارد بطوریکه با توجه به عدم تخمک‌گذاری هیچیک از گاوها قبل از روز ۲۰ پس از زایش، درنتیجه در هیچیک از دام‌های طول سیکل متعاقب اولین تخمک‌گذاری نرمал نبود. تنها گاو شماره ۶۳۲ که در روز ۲۱ پس از زایش تا تخمک‌گذاری کرد دارای سیکل طولانی بود. هرچه فاصله زایش تا تخمک‌گذاری بیشتر باشد، طول دوره عدم حضور پروژسترون بیشتر شده و احتمال کوتاه بودن طول اولین سیکل پس از زایش بیشتر خواهد شد.

گاوهاش شکم اول چون کماکان در حال رشد هستند بنابراین بیشتر



تصویر ۱- نمودار فعالیت سیکلیک تخدمانی گاوهاش شیری هشتادین شکم اول در دوره پس از زایش. — اولین موج تخمک‌گذار ■ دومین موج تخمک‌گذار ▲ سومین موج تخمک‌گذار ○ موج غیر تخمک‌گذار ..... پروژسترون — جسم زرد

جدول ۲- اندازه، طول عمر و عملکرد جسم زرد (غله‌لت پروژسترون) حاصل از اولین و دومین تخمک‌گذاری پس از زایش در گاوهاش شیری هشتادین شکم اول در دوره میانگین  $\pm$  خطای معیار گزارش شده است. AB در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده اند، دارای اختلاف آماری معنی دار هستند ( $p < 0.05$ ). (p)

| سیکل | اندازه جسم زرد (mm) | طول عمر جسم زرد (day) | غلله‌لت پروژسترون (ng/mL) |
|------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| اول  | $18/8 \pm 0/94^A$   | $12/0 \pm 2/66^A$     | $2/0 \pm 0/24^A$          |
| دوم  | $24/0 \pm 0/89^B$   | $18/0 \pm 0/31^A$     | $3/6 \pm 0/36^B$          |

تخمک‌گذاری در موج‌های دوم تا پنجم فولیکولی بوقوع پیوست. در نتیجه علت فاصله طولانی زایش تا اولین تخمک‌گذاری در گاوهاش شکم اول رامی توان به تاخیر در تشکیل موج‌های تخمک‌گذار نسبت داد. فاصله زایش تا اولین تخمک‌گذاری در مطالعه حاضر  $48/1 \pm 6/89$  روز محاسبه گردید که مشابه مطالعات قبلی است که  $43/4 \pm 5/3$  روز (۱۸) و  $37$  روز (۱۶) را گزارش کرده‌اند.

در مطالعه حاضر میانگین غله‌لت پروژسترون در اولین سیکل در مقایسه با دومین سیکل پس از زایش کمتر بود. این یافته با نتایج مطالعه قبلی که در آن نیز پروژسترون سیکل اول ( $3/1 \pm 1/2$  ng/mL) در مقایسه با سیکل دوم ( $4/7 \pm 0/8$  ng/mL) کمتر بوده است همخوانی دارد (۲۲). در مطالعه حاضر در  $85/7$ ٪ کاوها اولین جسم زرد پس از زایش طول عمری کوتاه ( $\geq 13$  روز) داشت و هیچیک از گاوها با طول زاده زدن باعث افزایش حفاظتی دارند. در نتیجه فاصله بین دو تخمک‌گذاری اول و دوم پس از زایش حدوداً هفت‌تاهی کوتاهتر از فاصله بین دو تخمک‌گذاری دوم و سوم پس از زایش بود که با نتایج مطالعه قبلی که در آن نیز طول سیکل اول پس از زایش ( $15 \pm 7$  روز) کوتاه‌تر از طول دومین سیکل پس از زایش ( $21 \pm 1$  روز) بود همخوانی دارد (۲۲). سیکل‌های کوتاه مدت در اثر افزایش رفتون زودرس جسم زرد در گاوهاش پس از زایش به فراوانی مشاهده می‌شود (۴، ۱۰، ۲۱).

## References

1. Moore, K., Thatcher, W.W. (2006) Major advances associated with reproduction in dairy cattle. *J. Dairy Sci.* 89:1254-1266.
2. Lucy, M.C. (2001) Reproductive loss in high-producing dairy cattle: where will it end? *J. Dairy Sci.* 84:1277-1293.
3. Lamming, G.E., Darwash, A.O. (1998) The use of milk progesterone profiles to characterize components of subfertility in milked dairy cows. *Anim. Reprod. Sci.* 52:175-190.
4. Shrestha, H.K., Nakao, T., Suzuki, T., Higaki, T., Akita, M. (2004) Effects of abnormal ovarian cycles during pre-service period postpartum on subsequent reproductive performance of high-producing Holstein cows. *Theriogenology.* 61:1559-1571.
5. Kawashima, C., Kaneko, E., Montoya, C.A., Matsui, M., Yamagishi, N., Matsunaga, N. (2006) Relationship between the first ovulation within three weeks postpartum and subsequent ovarian cycles and fertility in high producing dairy cows. *J. Reprod. Dev.* 52:479-486.
6. Petersson, K.J., Gustafsson, H., Strandberg, E., Berglund, B. (2006) Atypical progesterone profiles and fertility in swedish dairy cows. *J. Dairy Sci.* 89: 2529-2538.
7. Beam, S.W., Butler, W.R. (1997) Energy balance and ovarian follicle development prior to the first ovulation postpartum in dairy cows receiving three levels of dietary fat. *Biol. Reprod.* 56: 132-142.
8. Cerri, R.L., Santos, J.E.P., Juchem, S.O., Galvão, K.N., Chebel, R.C. (2004) Timed artificial insemination with estradiol cypionate or insemination at estrus in high-producing dairy cows. *J. Dairy Sci.* 87: 3704-3715.
9. Eger, S., Shemesh, M., Schindler, H., Amir, S., Foote, R. H. (1988) Characterization of short luteal cycles in the early post-partum period and their relation to reproductive performance of dairy cows. *Anim. Reprod. Sci.* 16: 215-224.
10. Garverick, H.A., Zollers, W.G., Smith, M.F. (1992) Mechanisms associated with corpus luteum lifespan

تحت تاثیر بالانس منفی انرژی قرار می‌گیرند به طوریکه این گاوها در مقایسه با گاوهای چند شکم زاده‌یک هفتاه قبل از زایش (۲۰، ۲۸) پس از زایش (۲۸) مقادیر خونی اسیدهای چرب غیر اشباع بالاتر داشتند. فاصله زایش تا اولین تخمک‌گذاری و اولین تلقيق در گاوهای شکم اول ( $8\pm 4/88$  روز /  $52/8\pm 4$  روز) در مقایسه با گاوهای چند شکم زا ( $99/9\pm 13/7$  روز و  $19/0\pm 6/3$  روز) ( $p < 0.05$ ) کمتر بود (۲۰). افزایش مقادیر اسیدهای چرب غیر اشباع و اجسام کتونی قبل از زایمان با کاهش عملکرد اینمنی دستگاه تناسلی و افزایش بیماری‌های رحمی در ارتباط بوده است (۱۳)، که هردو این موارد تخمک‌گذاری پس از زایش را تحت تاثیر قرار میدهند (۲۶). به علاوه گاوهای شکم اول مشکلات رحمی بیشتری دارند که می‌تواند از سرگیری فعالیت تخدمانی را تحت تاثیر قرار دهد (۱۱). گاوهای دارای عفونت رحمی دارای فولیکول‌های غالبی بودند که میزان رشد کمتری داشتند (۲۶). بنابراین گاوهای شکم اول حساسیت بیشتری به مشکلات متابولیکی داشته که این نیز به نوبه خود سلامت رحم را تحت تاثیر قرار داده و همراه با تاخیر در از سرگیری فعالیت تخدمان در دوره پس از زایش خواهد بود. به طور خلاصه نتایج بررسی حاضرنشان داد که طولانی بودن فاصله زایش تا اولین تخمک‌گذاری در گاوهای شکم اول می‌تواند در اثر عدم تخمک‌گذاری فولیکول غالب اولین موج فولیکولی بوده و به دلیل عدم تشکیل این فولیکول پس از زایش نمی‌باشد.

## تشکر و قدردانی

این کار تحقیقاتی با امکانات قطب علمی تحقیقات دام‌های بومی ایران و همکاری موسسه تحقیقات دانشکده دامپرورشی انجام شده است. نویسنده‌گان کمال تشکر خود را از تمام پرسنل موسسه تحقیقات اعلام می‌دارند.

- in animals having normal or subnormal luteal function. *Anim. Reprod. Sci.* 28:111-124.
11. Goshen, T., Shpigel, N.Y. (2006) Evaluation of intrauterine antibiotic treatment of clinical metritis and retained fetal membranes in dairy cows. *Theriogenology.* 66: 2210-2218.
12. Gümen, A., Guenther, J.N., Wiltbank, M.C. (2003) Follicular size and response to ovsynch versus detection of estrus in anovular and ovular lactating dairy cows. *J. Dairy Sci.* 86: 3184-3194.
13. Hammon, D.S., Evjen, I.M., Dhiman, T.R., Goff, J.P., Walters, J.L. (2006) Neutrophil function and energy



- status in Holstein cows with uterine health disorders. *Vet. Immunol. Immunopathol.* 113: 21-29.
14. Hunter, M.G. (1991) Characteristics and causes of the inadequate corpus luteum. *J. Reprod. Fertil.* 43:91-99.
15. Kyle, S.D., Callahan, C.J., Allrich, R.D. (1992) Effect of progesterone on the expression of estrus at first post partum ovulation in dairy cattle. *J. Dairy Sci.* 75:1456-1460.
16. Lucy, M.C., Staples, C.R., Thatcher, W.W., Erickson, P.S., Cleale, R.M., Firkins, J.L., et al. (1992) Influence of diet composition, dry matter intake, milk production and fertility in dairy cows. *Anim. Prod.* 54: 323-331.
17. Mann, G.E., Lamming, G.E. (2000) The role of sub-optimal preovulatory oestradiol secretion in the etiology of premature luteolysis during the short oestrous cycle in the cow. *Anim. Reprod. Sci.* 64: 171-180.
18. McDougall, S., Burke, C.R., MacMillan, K.L., Williamson, N.B. (1995) Patterns of follicular development during periods of anovulation in pasture-fed dairy cows after calving. *Res. Vet. Sci.* 58: 212-216.
19. Mee, M.O., Stevenson, J.S., Minton, J.E. (1991) First postpartum luteal function in dairy cows after ovulation induced by progestogen and gonadotropin releasing hormone. *J. Dairy Sci.* 74:1573-1581.
20. Meikle, A., Kulcsar, M., Chilliard, Y., Febel, H., Delavaud, C., Cavestany, D., et al. (2004) Effects of parity and body condition at parturition on endocrine and reproductive parameters of the cow. *Reproduction.* 127:727-737.
21. Odde, K.G., Ward, H.S., Kiracofe, G.H., McKee, R.M., Kittok., R.J. (1980) Short estrous cycles and associated serum progesterone levels in beef cows. *Theriogenology.* 14:105-112.
22. Rajamahendran, R., Taylor, C. (1990) Characterization of ovarian activity in postpartum dairy cows using ultrasound imaging and progesterone profiles. *Anim. Reprod. Sci.* 22:171-180.
23. Rhodes, F.M., McDougall, S., Burke, C.R., Verkerk, G.A., Macmillan, K.L. (2003) Treatment of cows with an extended postpartum anestrous interval. *J. Dairy Sci.* 86: 1876-1894.
24. Savio, J.D., Boland, M.P., Hynes, N., Roche, J.F. (1990) Resumption of follicular activity in the early post-partum period of dairy cows. *J. Reprod. Fertil.* 88: 569-579.
25. Savio, J.D., Boland, M.P., Roche, J.F. (1990) Development of dominant follicles and length of ovarian cycles in post-partum dairy cows. *J. Reprod. Fertil.* 88: 581-591.
26. Sheldon, I.M., Noakes, D.E., Rycroft, A.N., Pfeiffer, D.U., Dobson, H. (2002) Influence of uterine bacterial contamination after parturition on ovarian dominant follicle selection and follicle growth and function in cattle. *Reproduction.* 123:837-845.
27. Stevenson, J.S., Pursely, R. (1994) Resumption of follicular activity and interval to post partum ovulation after exogenous progestins. *J. Dairy Sci.* 77: 725-734.
28. Wathes, D.C., Cheng, Z., Bourne, N., Taylor, V.J., Coffey, M.P., Brosterstone, S. (2007) Differences between primiparous and multiparous dairy cows in the inter-relationships between metabolic traits, milk yield and body condition score in the periparturient period. *Dom. Anim. Endocrinol.* 33: 203-225.
29. Zollers, W.G., Garverick, H.A., Smith, M.F. (1989) Oxytocin-induced release of prostaglandin F<sub>2</sub> $\alpha$  in postpartum beef cows: comparison of short versus normal luteal phases. *Biol. Reprod.* 41: 262-267.

## Postpartum ovarian activity in primiparous Holstein dairy cows

Rostami, B.<sup>1</sup>, Niasari-Naslaji, A.<sup>2\*</sup>, Vojgani, M.<sup>2</sup>, Nikjou-Mamaghani, D.<sup>2</sup>, Amanlou, H.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan- Iran.*

<sup>2</sup>*Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran.*

(Received 1 August 2011 , Accepted 9 November 2011)

**Abstract:**

**BACKGROUND:** Postpartum anestrus is a major problem in primiparous dairy cows.

**OBJECTIVES:** The objective of this study was to investigate postpartum ovarian activity in primiparous Holstein dairy cows. **METHODS:** Seven primiparous Holstein dairy cows were monitored for ovarian activity using a combination of ultrasound examination and alteration in progesterone concentrations. Daily blood sampling and ultrasound examination were conducted starting from day 6 until the third ovulation postpartum. **RESULTS:** First wave dominant follicles ( $\geq 10$  mm in diameter) were detected on day  $11.5 \pm 1.48$  postpartum. This follicle did not ovulate in any of the experimental cows. Moreover, none of the cows ovulated within 20 days postpartum. There was no difference in the follicular growth rate and the diameter of ovulatory follicles between the first, the second and the third ovulations postpartum ( $p > 0.05$ ). Interval from calving to the first postpartum ovulation was  $48.1 \pm 6.89$  days. Mean diameter of corpus luteum and progesterone concentrations of the first cycle ( $18.8 \pm 0.94$  mm and  $2.0 \pm 0.24$  ng/mL) were significantly less than those of the second cycle ( $24.0 \pm 0.89$  mm and  $3.6 \pm 0.36$  ng/mL;  $p < 0.05$ ). **CONCLUSIONS:** In conclusion, increased interval from parturition to the first ovulation is not due to the delayed or lack of the first wave dominant follicle formation after parturition; but is due to the regression of this follicle.

**Key words:** postpartum anestrus, primiparous dairy cows, ultrasonography, progesterone.

**Figure Legends and Table Captions**

**Figure 1.** Postpartum ovarian activity in primiparous Holstein dairy cows. ● The first follicular wave  
 ■ The second follicular wave ▲ The third follicular wave ○ Unovulated follicular wave  
 ..... Progesterone — Corpus luteum

**Table 1.** Postpartum ovarian activity in primiparous Holstein dairy cows. Data were presented as mean $\pm$ SEM and frequencies as (%). AB values within subjects with different superscripts show significant difference ( $p < 0.05$ ).

**Table 2.** Diameter, lifespan and function (progesterone concentration) of corpus luteum from the first and the second postpartum ovulation in primiparous Holstein dairy cows. For each column, AB values of the subjects with different superscripts show significant difference ( $p < 0.05$ ).



\*Corresponding author's email: niasarinaslajamir@gmail.com, Tel: 021-61117136, Fax: 021-66933222  
[www.SID.ir](http://www.SID.ir)