

شجره‌شناسی ویروس آنفلوآنزای پرندگان H₉N₂ جدا شده از گله‌های گوشتی ایران بر اساس ژن پلی‌مراز PB1

آرش قلیان چی لنگرودی^{۱*} و حید کریمی^۲ مسعود هاشم زاده^۳ امید مددگار^۱ بهار نیری فسایی^۱ آزاده شجاعی استبرق^۴

(۱) گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۳) موسسه تحقیقات واکنس و سرم سازی رازی کرج، کرج - ایران.

(۴) بخش کنترل کیفیت واکنس، انستیتو پاستور ایران، کرج - ایران.

(دریافت مقاله: ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۱، پذیرش نهایی: ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۱)

چکیده

زمینه مطالعه: آنفلوآنزای پرندگان H₉N₂ برای اولین بار از بوقلمون در سال ۱۹۶۶ در ایالات متحده جدا و سپس در اروپا و آسیا انزوتیک گردید. این ویروس برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۷۷ در جوجه‌های گوشتی استان قزوین جدا سازی گردید و هم‌اکنون در کشور اندمیک است. پروتئین پلی‌مراز PB1 یکی از پروتئین‌های این ویروس است که نقش مهمی در حدت و تعیین محدوده میزبان ایفا می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی شجره‌شناسی بر اساس ژن پلی‌مراز ۱ (PB1) ویروس آنفلوآنزای H₉N₂ جدا شده از گله‌های گوشتی در ایران طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ بود. **روش کار:** در این مطالعه قطعه‌ای از ژن PB1 چهار جدایه H₉N₂ جدا شده از گله‌های گوشتی طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ تکثیر و توالی‌یابی گردید. سپس نتایج حاصله با سایر جدایه‌های اخذ شده از بانک ژن مورد تجزیه و تحلیل و مطالعات شجره‌شناسی قرار گرفت. **نتایج:** بر اساس مطالعات شجره‌شناسی، جدایه‌های H₉N₂ در ایران دو گروه جداگانه تشکیل دادند و گروه ویروس‌های حاضر در کشور در گروه جدید خاور میانه و هند قرار گرفتند. بر اساس توالی اسید آمینه، تغییراتی در سطح آنها مشابه جدایه‌های عادت یافته به موش و انسان مشاهده شد که این نگرانی را از افزایش تمایل جدایه‌های کشور به میزبان پستاندار برمی‌انگیزد. **نتیجه‌گیری نهایی:** نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ژن PB1 ویروسی آنفلوآنزای پرندگان H₉N₂ در طی چرخش ویروسی در سال‌های متمادی در کشور ثابت باقی نمانده است.

واژه‌های کلیدی: آنفلوآنزای پرندگان، پلی‌مراز ۱، H₉N₂، مطالعه شجره‌شناسی، ایران.

اسیدهای آمینه دو پروتئین PB1 و PB2 بسیار نزدیک به هم می‌باشند (۵). مقایسه ویروس‌های بازآرایی شده در مطالعات صورت گرفته بر روی حیوانات نشان داده است که حدت ویروس آنفلوآنزا ممکن است با ترکیب‌هایی متفاوت از ژن‌های پلی‌مراز و نوکلئوپروتئین افزایش یا کاهش یابد (۵، ۱۳). در اواسط تیرماه سال ۱۳۷۷ این تحت تیپ خود را در مرغداری‌های اطراف تهران و قزوین بصورت بیماری ناشناخته نشان داد (۱۷). Bozorgmehri و Vasfi-Marandi در سال ۱۳۷۷ با ارسال ویروس جدا سازی شده به آزمایشگاه و بریج انگلستان برای اولین بار آن را شناسایی و تحت عنوان A/Chicken/ZMT-101/98 نامگذاری نمودند (۱۷). تاکنون مطالعه‌ای بر روی ژن PB1 ویروس H₉N₂ در ایران با توجه به چرخش ویروس‌های مختلف در کشور، پاساژ فراوان ویروس در مزارع و همچنین استفاده از واکسیناسیون جهت کنترل بیماری جهت بررسی تغییرات احتمالی صورت نگرفته بود. هدف از این مطالعه بررسی شجره‌شناسی بر اساس ژن پلی‌مراز ۱ (PB1) ویروس آنفلوآنزای H₉N₂ جدا شده از گله‌های گوشتی در کشور طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ می‌باشد.

مواد و روش کار

نمونه و جداسازی: در این مطالعه چهار نمونه ویروس آنفلوآنزای

مقدمه

آنفلوآنزای پرندگان از مهمترین بیماری‌های ویروسی پرندگان می‌باشد و ویروس آن در خانواده ارتومیکسوویریده قرار دارد. این خانواده دارای پنج جنس به نام‌های آنفلوآنزای A، B، C، توگو تو ویروس و آیزا ویروس است که گاهی اصطلاحاً آن را آنفلوآنزای D نیز می‌نامند (۵). ژنوم ویروس آنفلوآنزا ده نوع پروتئین مختلف را رمزگذاری می‌نماید. هشت پروتئین (PB2، PA، PB1، HA، NA، M2، M1، NP) سازنده ساختمان ویرونی و دو پروتئین (NS2، NS1) غیر ساختمانی می‌باشند (۱۳). ویروس‌های آنفلوآنزای A به طور طبیعی گستره متنوعی از گونه‌های پرندگان، انسان و پستانداران دیگر شامل خوک و اسب را آلوده می‌کنند (۵). ویروس‌های آنفلوآنزای پرندگان به دو دسته کلی ویروس‌های بسیار بیماریزا (HPAI) و آنفلوآنزای بسیار بیماریزا (Highly Pathogenic Avian Influenza) و آنفلوآنزای غیر حاد طیور (Non-Highly Pathogenic Avian Influenza (NHPAI)) تقسیم می‌شوند که دسته اخیر خود به چهار گروه بیماریزا، بیماریزای ملایم، کم بیماریزا و غیر بیماریزا تقسیم می‌گردد (۹). سه قطعه از بزرگترین قطعات ژنومی مولکول RNA پروتئین‌های PB1، PB2، PA را کد می‌کنند (۵). دو پروتئین PB1 و PB2 بازی و پروتئین PA اسیدی می‌باشند. تعداد



نتایج

پس از ویرایش توالی‌ها، از نوکلئوتید ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ در مطالعات مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه ژن *PBI* جدایه‌های ایران با ویروس پروتوتایپ تحت تیپ H9N2 در هیچکدام از چهار جدایه این تحقیق، در ناحیه موردنظر اضافه شدن (Insertion) یا حذف (Deletion) مشاهده نمی‌شود. مطالعات شجره‌شناسی ژن *PBI* جدایه‌های کشور با ۳۳ جدایه دیگر در دنیا بر اساس مدل NJ نشان داد که جدایه‌های آنفلوانزای پرندگان H9N2 ایران در دو گروه متفاوت با توجه به سال جداسازی قرار می‌گیرند (تصویر ۱). درصد شباهت ژن *PBI* ویروس‌های مورد مطالعه با گروه (۸۹-۷۹) (G1) و (۸۶-۹۰) (G9) و (۸۹-۷۹) (Y-439) پایین بوده است. جدایه‌های اخیر کشور (TH85, TH81, TH90) درصد بالایی از تشابه را با جدایه‌های (Pakistan/UDL-01/2005 H9N2) (۹۶٪) و (H7N3) (Karachi/NARC-100/2004) (۹۷٪) نشان می‌دهند. در این مطالعه تغییرات موقعیت‌های مهم اسید آمینه‌ای (۲۴۷، ۱۸۷، ۱۵۷، ۵۴، ۳۹ بر اساس نظام شماره گذاری اسید آمینه‌ای مرجع تحت تیپ H3 که در اختصاصیت میزبان نقش و در محدوده توالی یابی این مطالعه قرار داشته، مورد بررسی قرار گرفتند.

بحث

با توجه به شیوع آنفلوانزای پرندگان H9N2 در ایران در سال ۱۳۷۷ و گذشت ۱۳ سال از شیوع بیماری در کشور، مطالعه‌ای بر روی ژن پلی‌مرز (PBI) که از عوامل مهم در بیماری‌زایی ویروس است، طراحی گردید. در مطالعه‌ای که توسط Fereydouni در سال ۱۳۸۳ بر روی پرندگان آبی مهاجر ایران صورت گرفت علاوه بر ویروس تحت تیپ H9N2، سایر تحت تیپ‌های H10N7، H8N4، H7N3، H3N8 و H10N7 نیز جدا سازی گردید (۴). همچنین نخستین بار در کشور ژنوم ویروس H5N1 در بهمن ماه ۱۳۸۴ که سبب مرگ ۱۳۵ قودر بندرانزلی شد، مورد تأیید قرار گرفت. در دی ماه ۱۳۸۶ نیز دومین گزارش رسمی از تشخیص H5N1 توسط سازمان دامپزشکی کشور (روستای درزی نقیب در بابلسر) اعلام گشت (۱۸). با توجه به چرخش تحت تیپ‌های مختلف ویروس آنفلوانزا در ایران، در این طرح چهار جدایه ویروسی در طول سال‌های شیوع این بیماری از مزارع گوشتی کشور (استان‌های تهران و قزوین) جدا گردیده بود، انتخاب و قسمتی از ژن *PBI* (طول ۱۰۰۰ نوکلئوتید) توالی‌یابی گردید و مطالعه شجره‌شناسی بر روی آنها انجام گرفت. دودمان‌های تحت تیپ H9N2 به دو دودمان آمریکای شمالی و آسیایی-اروپایی تقسیم می‌شوند و دودمان اخیر نیز خود به سه زیرشاخه G1، G9 و Y439 تقسیم بندی می‌شود. اگر چه زیر شاخه‌ای مختلفی از اردک (ST-DK1 و ST-DK2) و جدایه‌های جنوب شرقی نیز اخیراً در تقسیم بندی اضافه گردیده‌اند (۲). در مطالعه شجره‌شناسی حاضر جدایه‌های ایران در با توجه به زمان‌های جدا سازی در دو

H9N2 مورد بررسی قرار گرفتند. سه نمونه مربوط به سال‌های قبل از بخش ویروس‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که در مطالعات قبلی مورد استفاده قرار گرفته بودند اخذ گردید. جهت تهیه نمونه سال ۱۳۹۰ تعدادی نمونه بافتی شامل نای، ریه و روده از گله‌های گوشتی مشکوک و تحت نظر و تأیید سازمان دامپزشکی کشور از استان قزوین جهت جداسازی ویروس مورد استفاده قرار گرفت. نمونه در کیسه آلانئوتیک تخم مرغ جنین دار نه روزه کشت و پس از استخراج مایع آلانئوتیک بوسیله آزمون‌های استاندارد تأیید گردید (۳).


استخراج RNA: چهار نمونه ویروسی در این مرحله از کیت ستونی استخراج (RNA (Bioneer, South Korea) مطابق روش ارائه شده بوسیله شرکت سازنده استفاده گردید. RNA استخراج شده در 70°C تا زمان استفاده ذخیره سازی گردید (۲۰).

واکنش نسخه برداری معکوس و آزمون زنجیره‌ای پلی‌مرز (PCR)-RT: از کیت دو مرحله‌ای شرکت (Vivantis, Malaysia) جهت واکنش نسخه برداری معکوس و آزمون زنجیره‌ای پلی‌مرز (RT-PCR) استفاده شد. آغازگر اختصاصی uni-12 (5' AGC AAA AGC AGG 3') جهت واکنش نسخه برداری معکوس استفاده گردید. جهت بدست آوردن قطعه مورد نظر از یک جفت آغازگر استفاده گردید.

آغازگرهای مورد استفاده در واکنش دارای توالی‌های TATTCGCTCAGGGAGCGAAAGCAGGCA Bm-PA-1: و (TRAACATGCCCATCATCAT) *PBI*-1262R بودند. شرایط دمایی و زمانی ترمال سایکلر جهت انجام واکنش شامل مراحل ذیل بود: یک سیکل واسرشت اولیه 95°C ۳۵ دقیقه، (واسرشت اولیه 95°C ۴۵ ثانیه، اتصال 55°C ، ۳۵ ثانیه، تکثیر 70°C ، ۷۰ ثانیه) و یک سیکل تکثیر نهایی 10°C ، ۷۲ دقیقه (۷).

مطالعات بیوانفورماتیک: در این طرح جهت تعیین توالی، نمونه‌ها جهت خالص سازی، تعیین مقدار و توالی‌یابی به شرکت South Korea Bioneer، ارسال گردید. جهت ویرایش و بازسازی توالی‌های تعیین شده از نرم افزار MEGA5 استفاده و جهت تعیین توالی اسید آمینه‌ای مربوط به هر یک از سکانس‌های نوکلئوتیدی نیز از CLC Bio Main workbench (۵/۵) استفاده گردید. جهت مطالعه شجره‌شناسی و بررسی تکامل مولکولی نرم افزار MEGA5 با استفاده از مدل Neighbor-Joining با آزمون ریشه‌ای (Boot Strap) ۱۰۰۰ تکرار به کار گرفته شد. در مطالعه شجره‌شناسی از جدایه‌های مرجع، نمایندگان شاخه‌های مختلف ویروس (G1, G9, Y-280, Y439, SD-1, SD-2)، جدایه‌های کشورهای همسایه و همچنین دو جدایه ایرانی H9N2 (۳۳) (جدایه) پس از استخراج از بانک ژن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۱۲).
ثبت ژن: توالی‌های بدست آمده در پایگاه جهانی GenBank ثبت گردید و شماره‌های دسترسی JQ314408.1 تا JQ314411.1 به آن اختصاص یافت.





تصویر ۱. درخت مربوط به مطالعات شجره‌شناسی جدایه‌های ویروس آنفلوآنزای پرندگان H9N2 از جوجه‌های گوشتی طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ بر اساس ژن *PBI* (نوکلئوتید ۱۰۰-۱۲۰۰). درخت فوق با نرم‌افزار MEGA5 با روش Neighbor-Joining و آزمون ریشه‌ای ۱۰۰۰ تکرار ترسیم شده است. جدایه‌های مورد بررسی در این مطالعه با دایره توپر مشکی مشخص گردیده است.

پاکستان، هند و جدایه‌های جدید کشور عربستان قرار می‌گیرند. ما این گروه را بر اساس آخرین مطالعه‌های انجام شده، با نام Middle-East and Indian sub-continental مشخص کردیم (تصویر ۱). بر اساس مطالعات قبلی جدایه‌های H9N2 ایران بر اساس ژن‌های سطحی (هماگلوترینین و نورآمینیداز) و ماتریکس در گروه G1 قرار گرفته‌اند (۶) و (اطلاعات منتشر نشده). محققین مختلف جدایه‌ی H9N2 جدا شده از پاراکیت را منشأ

گروه مختلف قرار گرفتند (تصویر ۱). گروه اول مربوط به جداسازی سال‌های ۱۹۹۸ (TH77 و 11T) بوده که جدایه‌های H9 کشور امارت (۲۰۰۰) و جدایه‌های H7 کشور پاکستان در سال ۱۹۹۵ واقع شده‌اند. این جدایه دارای یک گره مشترک با نماینده گروه ST-DK1 بوده که معرف جدایه‌های H9 با منشأ پرندگان آبی می‌باشد. گروه دوم ویروس‌های H9N2 در سال ۲۰۰۲ در ایران بر اساس ژن *PBI* در کنار جدایه‌های کشور



بررسی در این تحقیق در این موقعیت اسید آمینه آرژنین قرار دارد که در جدایه‌های آنفلوآنزای پرندگان در انسان و جدایه‌های تیپ آ (A) انسانی مشاهده گردیده است.

بررسی‌ها بر روی جدایه‌های آنفلوآنزای پرندگان H9N2 در ایران نشان می‌دهد که از لحاظ مولکولی، جدایه‌های کشور در سطح ژنومی دارای تغییراتی می‌باشند که تمایل به میزبان پستاندار و انسان داشته و این تهدید را متصور می‌کند که می‌توانند بعنوان یک ویروس مشترک خود را مطرح نمایند. بنابراین پایش منظم ویروس‌های H9N2 در کشور با توجه به چرخش آن در مزارع صنعتی و بازار پرندگان زنده باید مورد توجه قرار گیرد و این امر با توجه به حضور تحت تیپ‌های متفاوت ذکر شده بیش از حد حیاتی می‌گردد. همچنین با توجه به مشترک شدن سویه‌های در حال چرخش بین سه کشور پاکستان، هند و ایران لازم می‌باشد که توجه بیشتری بر روی موارد قرنطینه‌ای مرزی صورت پذیرد تا از احتمال ورود تحت تیپ جدید مانند H7 به کشور جلوگیری شود.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از زحمات کلیه کارشناسان بخش میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران (مهندس غفاری، مهندس اشرافی و آقای اسدی) جهت همکاری در این مطالعه تحقیقاتی تقدیر و تشکر می‌گردد.

References

1. Aamir, U.B., Wernery, U., Ilyushina, N., Webster, R.G. (2007) Characterization of avian H9N2 influenza viruses from United Arab Emirates 2000 to 2003. *Virology*. 361: 45-55.
2. Banks, J.S.E., Harris, P.A, Alexander, D.J. (2000) Phylogenetic analysis of influenza A viruses of H9 haemagglutinin subtype. *Avian Pathol*. 29: 353-360.
3. Capua, I., Alexander, D.J. (2009) *Avian Influenza and Newcastle Disease: A Field and Laboratory Guide*, Springer-Verlag, Milan, Italy.
4. Fereidouni, S.R., Aghakhan, M., Werner, O., Starick, E., Bozorhmehrifard, M.H. (2005) Isolation and identification of avian influenza viruses from migratory birds in Iran. *Vet. Rec*. 157: 526.
5. Fields, B.N., Knipe, D.M., Howley, P.M. (2007) *Fields virology*, (5th ed.). Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, USA.

ژنتیکی جدایه‌های ایران می‌دانستند (۱۰). همچنین براساس ژن غیر ساختاری (NS)، جدایه‌های H9N2 ایران، شاخه‌ای ناشناخته همراه با گروه H7 ایتالیایی تشکیل داده بودند (۱۵). Pazani و همکاران در سال ۲۰۱۱ با مطالعه ژن PB2 جدایه ویروس آنفلوآنزا که از جوجه‌های تجاری در استان تهران طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ جدا شده بود، اعلام نمود که همه جدایه‌ها در دودمان اروپائی - آسیایی قرار می‌گیرند که می‌توان آن را به دو گروه از سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ و سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ تقسیم کرد (۱۹). با توجه به حضور H7 در کشور پاکستان در سال‌های ۱۹۹۴-۱۹۹۵ در قبل از همه‌گیری ایران در سال ۱۹۹۸، نقش ویروس بازآرایی شده (اخذ ژن *PBI* از منشا غیر از گروه G1) در آغاز همه‌گیری در کشور محتمل بنظر می‌رسد. مطالعات متفاوت شجره‌شناسی براساس ژن *PBI* بر روی ویروس آنفلوآنزای پرندگان H9N2 انجام گرفته است. جدایه‌های H9N2 از گله‌های تخم‌گذار در کشور کره جنوبی براساس ژن *PBI* در گروه شبه کره‌ای قرار گرفتند (۱۱). Tosh و همکاران در سال ۲۰۰۸ با مطالعه بر روی جدایه‌های H9N2 در هند اعلام داشتند که این جدایه‌ها در گروهی جداگانه که تاکنون گزارش نگردیده، قرار می‌گیرند و احتمال بازآرایی جدایه‌ها را اعلام نمودند (۲۲). که نتایج این مطالعه نیز بیانگر حضور شاخه‌ای جدید براساس ژن *PBI* در کشور، منطقه خاورمیانه و هند است. در تحقیقی مشابه توسط Amir و همکاران در سال ۲۰۰۰ چنین نتیجه‌گیری شده است که جدایه‌های امارات متحده عربی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ همراه با جدایه‌های ایران در گروه G1 قرار دارند (۱) که نتایج این تحقیق با آن متفاوت است بطوری که مطالعات Iqbal و همکاران در سال ۲۰۰۹ نشان دهنده این است که جدایه‌های اولیه ایران (H1T و TH77) در گروه G1 قرار نگرفته‌اند و نتیجه گروه تحقیقاتی اماراتی را نقض می‌نماید (۸). در مورد موقعیت‌های مهم اسید آمینه‌ای که در این مطالعه تعیین توالی شده، تغییرات جهش یافته جالبی مشاهده گردیده است. Li و همکاران در سال ۲۰۰۵ با بررسی جدایه‌های H9N2 که قابلیت تکثیر در موش را داشتند دریافتند که اسید آمینه شماره ۱۵۷ در جدایه‌هایی که قادر به تکثیر در موش نبودند در این محل ایزولوسین (I) بوده و در مقابل در جدایه‌هایی با قابلیت تکثیر در میزبان موش به اسید آمینه‌های ترئونین / آلانین (T/A) تبدیل گردیده بود (۱۴). در این بررسی هم این اسید آمینه در کل جدایه‌ها از نوع A بوده است. در مطالعه Wu و همکاران در سال ۲۰۰۹ بر روی جدایه‌هایی از H9N2 که به موش عادت یافته بودند (آلانین به ترئونین در شماره ۳۹)، (پرولین به لیزین در شماره ۱۸۷) و (گلوتامین به آرژنین در شماره ۲۴۷) تغییر یافته بودند (۲۱). در اسید آمینه شماره ۳۹ (در دو جدایه مورد مطالعه TH81، TH85) نیز این تغییر مشهود بود. اسید آمینه شماره ۵۴ یکی دیگر از اسیدهای آمینه‌ای است که در مطالعه Naffakh و همکاران در سال ۲۰۰۰ در زمینه مقایسه پروتئین پلی‌مراز آنفلوآنزای پرندگان و انسانی مورد توجه قرار گرفت. که در جدایه‌های پرندگان در این موقعیت اسید آمینه لیزین موجود می‌باشد (۱۶) در جدایه‌های مورد



6. Ghalyanchi Langeroudi, A., Karimi, V., Kheiri, M.T., Fard, M.H.B., Mahboudi, F., Barin, A., et al. (2008) Nucleotide and amino acid sequence analysis of hemagglutinin protein in cleavage site region of H9N2 isolated from broilers in Tehran province during 1998-2007. *J. Anim. Vet. Adv.* 7: 529-534.
7. Hoffmann, E., Stech, J., Guan, Y., Webster, R.G., Perez, D.R. (2001) Universal primer set for the full-length amplification of all influenza A viruses. *Arch. Virol.* 146: 2275-2289.
8. Iqbal, M., Yaqub, T., Reddy, K., McCauley, J.W. (2009) Novel genotypes of H9N2 influenza A viruses isolated from poultry in Pakistan containing NS genes similar to highly pathogenic H7N3 and H5N1 viruses. *PLoS ONE.* 4: 5788.
9. Jordan, F.T.W., Pattison, M. (2001) *Poultry Diseases* (5th ed.). Elsevier Health Sciences Press. Philadelphia, USA.
10. Karimi, V., Fard, M.H.B., Shahbazzadeh, D., Esmaelizad, M., Pourbakhsh, S.A. (2004) Sequence analysis and phylogenetic study of hemagglutinin gene of H9N2 subtype of avian influenza virus isolated during 1998-2002 In Iran. *Iranian J. Biol.* 8:167-172.
11. Kim, J.A., Cho, S.H., Kim, H.S., Seo, S.H. (2006) H9N2 influenza viruses isolated from poultry in Korean live bird markets continuously evolve and cause the severe clinical signs in layers. *Vet. Microbiol.* 118: 169-176.
12. Kumar, S., Nei, M., Dudley, J., Tamura, K. (2008) MEGA: a biologist-centric software for evolutionary analysis of DNA and protein sequences. *Brief. Bioinform.* 9: 299-306.
13. Lee, C.W., Saif, Y.M. (2009) Avian influenza virus. *Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis.* 32: 301-310.
14. Li, C., Yu, K., Tian, G., Yu, D., Liu, L., Jing, B., et al. (2005) Evolution of H9N2 influenza viruses from domestic poultry in Mainland China. *Virology.* 340: 70-83.
15. Majidzadeh, K., Soleimanidor, M., Estabragh, A.S., Barin, A., Langeroudi, A.G. (2011) Phylogenetic study on nonstructural (NS) gene of H9N2 isolated from broilers in Iran during 1998-2007. *Pak. J. Biol. Sci.* 14: 838-843.
16. Naffakh, N., Massin, P., Escriou, N., Crescenzo-Chaigne, B., van der Werf, S. (2000) Genetic analysis of the compatibility between polymerase proteins from human and avian strains of influenza A viruses. *J. Gen. Virol.* 81: 1283-1291.
17. Nili, H., Asasi, K. (2003) Avian influenza (H9N2) outbreak in Iran. *Avian Dis.* 47: 828-831.
18. OIE (2006) *FAO/OIE/WHO Consultation on Avian Influenza and Human Health: Risk Reduction Measures in Producing, Marketing, and Living with Animals in Asia: Meeting Report.* OIE publication Center. Paris, France. p.12.
19. Pazani, J., Karimi, V., Bozorgmehri Fard, M., Ghalyanchi Langeroudi, A., Barin, A. (2011) Phylogenetic analysis of PB2 gene of H9N2 subtype of avian influenza viruses isolated from commercial chickens in Tehran province of Iran during 1998-2001. *Iran. J. Vet. Res.* 12: 324-331.
20. Sambrook, J., Russell, D.W. (2006) *The Condensed Protocols from Molecular Cloning: a Laboratory Manual* (3rd ed.). Cold Spring Harbor Laboratory Press. New York, USA.
21. Tosh, C., Nagarajan, S., Behera, P., Rajukumar, K., Purohit, K., Kamal, R.P., et al. (2008) Genetic analysis of H9N2 avian influenza viruses isolated from India. *Arch. Virol.* 153: 1433-1439.
22. Wu, R., Zhang, H., Yang, K., Liang, W., Xiong, Z., Liu, Z., et al. (2009) Multiple amino acid substitutions are involved in the adaptation of H9N2 avian influenza virus to mice. *Vet. Microbiol.* 138:85-91.



Phylogenetic study on Iranian Avian influenza H9N2 isolates

Ghalyanchi Langeroudi, A.^{1*}, Karimi, V.², Hashemzadeh, M.³, Madadgar, O.¹, Naiery Fasaei, B.¹,
Shojaee Estabragh, A.⁴

¹Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran.

²Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran.

³Department of Research & Production of Veterinary and Poultry Vaccines, Razi Vaccine and Serum
Research Institute, Karaj-Iran.

⁴Department of Quality Control, Pasteur Institute of Iran, Karaj- Iran.

(Received 16 June 2012 , Accepted 4 September 2012)

Abstract:

BACKGROUND: Avian Influenza (AI) H9N2 subtype was first reported to have infected turkeys in the United States in 1966 and has been enzootic in Eurasia. In Iran, the H9N2 virus was first isolated from broiler chickens in 1998 in Ghazvin Province and it is the most prevalent subtype of influenza virus in poultry industry in Iran at the present time. The PB1 protein of influenza A viruses is an important host range and virus virulence determinant. **OBJECTIVES:** The purpose of this study was phylogenetic analysis of the PB1 gene of H9N2 AI virus isolated from broiler flocks in Iran during the period 1998-2011. **METHODS:** In this study, PB1 genes of 4 H9N2 isolates isolated from commercial chicken farms of Iran during the period 1998 to 2011 were partially amplified, sequenced and their amino acid sequences were assigned. The sequences were analyzed and phylogenetic study was done by comparing them to some deposited sequences of PB1 genes in GenBank. **RESULTS:** According to phylogenetic study on PB1 gene, two different groups can be distinguished among these Iranian H9N2 isolates. The current H9N2 circulating viruses in Iran are located in a new cluster of Middle East and India. The H9N2 isolates that are based on analysis of amino acid sequences of Iranian H9N2 isolates have some substitutions that are found in human and mouse adapted isolates. It seems that H9N2 isolates may show a trend to infect mammalian hosts. **CONCLUSIONS:** The available evidence indicates that PB1 genes of H9N2 influenza virus circulating in Iran have not been well conserved during the past years.

Key words: avian influenza, H9N2, PB1, phylogenetic study, Iran.

Figures Legends and Table Captions

Figure 1. The phylogenetic tree of H9N2 avian influenza virus isolates of broiler chickens during the period 1998 to 2012 based on genes, PB1 (nucleotides 100-1200). The phylogenetic tree with the Neighbor-Joining method and test software MEGA5 Bootstrap root 1000 replicates is plotted. Isolates investigated in this study are determined by solid black circle.