

## تأثیر روغن‌های انسانی حاصل از اورگانو و آنزیم بتا- گلوکاناز بر عملکرد و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه‌ی جو

دامون غفرانی طبری<sup>۱</sup> محمد رضارضوانی<sup>\*۲</sup> محمد جواد ضمیری<sup>۲</sup> محمد دادپسند<sup>۲</sup>

(۱) دانش آموخته تغذیه دام دانشگاه شیراز، شیراز - ایران

(۲) بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز - ایران

(دریافت مقاله: ۲ اسفند ماه ۱۳۹۱ ، پذیرش نهایی: ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۲)

### چکیده

**زمینه مطالعه:** روغن‌های انسانی ترکیبات خدمیکروبی مناسبی هستند، اما در شرایط تغذیه‌ای با محیطی نامطلوب اثری بیشتری دارند؛ همچنین، روغن‌های انسانی تولید داخل کشور قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند. **هدف:** هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر افزودن دوروغن انسانی ارگواستیم ( $5\text{g/kg}$ ، وارداتی) و آنتی‌بیوفین ( $1\text{g/kg}$ ، ایرانی) بر عملکرد تولید و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه جو، بدون یاداری آنزیم بتا- گلوکاناز ( $0.05\text{g/kg}$ ) بود. **روش کار:** در ابتدای هفت‌هه دوم پرورش،  $192\text{ g}$  جوجه‌های گوشتی (مخلط هر دو جنس)، به شش تیمار (هر تیمار شامل چهار تکرار و هر تکرار شامل هشت جوجه بود) در قالب آزمایش فاکتوریل ( $3 \times 2$  سطح روغن انسانی  $\times$  سطح آنزیم) برپایه طرح کاملاً تصادفی، گروه‌بندی شدند. **نتایج:** افزودن روغن‌های انسانی ارگواستیم و یا آنتی‌بیوفین به جیره‌های برپایه جو، سبب بهبود معنی داری ( $p < 0.05$ ) در ضریب تبدیل خوارک در کل دوره ( $1/94$  در برابر  $2/06$  و وزن نهایی بدن  $1786/75$  در برابر  $1591/37\text{ g}$  برای هر پرنده) و گوارش پذیری مواد آلبومین ( $2/72$  در برابر  $10/05\%$ ) شد، ولی تفاوتی بین این جیره‌هادر حضور یا غایب بتا- گلوکاناز نیز بین دوروغن انسانی دیده نشد. **نتیجه‌گیری نهایی:** نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که افزودن روغن‌های انسانی به جیره‌های برپایه جو، حتی بدون آنزیم، می‌تواند سبب کاهش اثرات ضد تغذیه‌ای جو و بهبود عملکرد شود. همچنین، با توجه به نبود تفاوت بین روغن‌های انسانی در این پژوهش و از طرفی، کمیاب و پرهزینه بودن روغن‌های انسانی خارجی، استفاده از روغن‌های انسانی مشابه تولید کشور در سطح به کار رفته، قابل توصیه هستند.

**واژه‌های کلیدی:** روغن انسانی، آنزیم بتا- گلوکاناز، جوجه گوشتی، عملکرد، گوارش پذیری مواد مغذی

اسید، سبب تولید آمینواسید آروماتیک فنیل آلانین می‌شود، محصولاتی که سینامیک اسید و پی کوماریک (p-coumaric acid) اسید با ساختمان ترانس هستند. در میان ترکیبات فنیل پروپان، مهمترین ترکیبات یوجنول، ترانس سینامالدهاید، کاپساسین و پپرین هستند (۱۱). افزودن ترکیبات داروینی گیاهی به رژیم غذایی پرندگان، میکروفلور روده‌های آنان را تعدیل می‌کند و برخی از روغن‌ها و عصاره‌های گیاهی اثر ضد عفونی کنندگی و ضد میکروبی ( $24, 25$ ) دارند. روغن‌های انسانی با داشتن فعالیت بالای ضد میکروبی می‌توانند به جیره‌ی پرندگان اضافه شوند (۲۶، ۲۷). مکانیسم اصلی ضد میکروبی روغن‌های انسانی به دلیل هیدرو فویک بودن آنها است که می‌توانند به داخل غشاء میکروب‌های نافوذ کنند و ساختار غشاء را از هم پیشند و سبب نشت یونی شوند. همچنین، تولید آمین‌های بیوژنیک به وسیله‌ی میکروب‌ها کاهش می‌یابد و مانع مسمومیت پرندگه می‌شوند. همچنین، از دست رفتن اسیدهای آمینه محدود کنندگه در نتیجه تولید آمین‌های بیوژنیک ناشی از فعالیت میکروبی (مانند کاداورین معطر Aromatic) و ترکیبات خالص آنها به عنوان بخشی از راهبرد تغذیه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است.

### مقدمه

شکی نیست که آنتی‌بیوتیک‌های محرك رشد به عنوان مکمل‌های غذایی، نقش مهمی در رشد و سلامت پرندگان ایفا می‌کنند، اما به علت مقاوم شدن برخی باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها و تجمع آنتی‌بیوتیک در گوش و دیگر بافت‌های قابل مصرف برای انسان، یافتن جایگزین مناسب برای آنتی‌بیوتیک‌ها امری ضروری است. به طوری که این نگرانی‌ها موجب منع شدن کاربرد محرك‌های رشد آنتی‌بیوتیکی (Antibiotic Growth Promoters) در تغذیه حیوانات اهلی، در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ شده است. جایگزین‌های مختلفی از جمله پروپیوتیک‌ها، پری‌بیوتیک‌ها، سیمیبیوتیک‌ها، مانان ایگوساکاریدها و اسیدهای آلی، برای آنتی‌بیوتیک‌ها به کار گرفته شده‌اند (۳۲). در همین راستا، کارآیی افزودنی‌های تجاری جدید از گیاهان، شامل عصاره گیاهان و ترکیبات خالص آنها به عنوان بخشی از راهبرد تغذیه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است.

روغن‌های انسانی (Essential oils) شامل دو ترکیب ترپن‌ها و فنیل پروپان‌ها هستند، که به ترتیب از مسیرهای موالونیک (Mevalonic) و شیکیمیک (Shikimic) تولید می‌شوند. تیمول و کارواکرول به عنوان مونوتربنوتیک‌ها یا ایزوپرمنوییدها طبقه‌بندی می‌شوند. مسیر شیکیمیک



یافتنند. پرنده‌های ۶ گروه ۳۲ قطعه‌ای تقسیم شدند که هر گروه شامل ۴ تکرار و هر قفس دارای ۸ پرنده بود. در این پژوهش از آنزیم خالص ۲۰۰۰ beta-Glucanase units per g. (برای جیره‌های دارای Rovabio Excel, Adisseo France SAS, with جو، استفاده شد.

تمامی جیره‌ها از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند. نیازهای غذایی برپایه جداول NRC در سال ۱۹۹۴ تعیین و جیره‌نویسی با نرم افزار UFFDA انجام شد (جدول ۱). جوجه‌های در سراسر دوره آزمایش به طور آزاد به آب و خوراک دسترسی داشتند و شرایط محیطی برای تمام گروه‌ها یکسان بود. خوراک در قالب جیره‌های آغازین (۲۱-۰ روزگی)، دارای ۳۰٪ جو) و رشد ۲۲-۳۵ روزگی، دارای ۴۰٪ جو) در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. جوجه‌ها در پایان هر هفته و پس از ۵-۶ ساعت گرسنگی توزین شدند. مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه نیز به طور هفتگی ثبت و ضرب تبدیل خوراک محاسبه شد.

برای اندازه‌گیری گوارش پذیری مواد مغذی، نمونه‌ها از پیش‌سکوم (حد فاصل بین زایده‌ی مکل، Meckel's diverticulum) و ۲ cm قبل از محل اتصال روده‌های کور پرنده‌های کشتار شده در پایان دوره برداشته شدند و تا زمان اندازه‌گیری پروتئین خام، چربی خام و ماده‌ی آلی (براساس ماده‌ی خشک) منجمد شدند (۷)؛ برای اندازه‌گیری نشانگر، در AA ۶۷۰ (Shimadzu, Model Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) محصول شرکت مرک (Merck) آلمان به عنوان نشانگر غیرقابل هضم و جذب، ۳ روز پیش از کشتار، به میزان ۳٪ به تمامی جیره‌ها اضافه شد. از فرمول‌های زیر برای محاسبه گوارش پذیری مواد (جیره N/جیره Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)(پیش‌سکومی/Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)×۱۰۰= گوارش پذیری پروتئین (جیره EE/جیره Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)(پیش‌سکومی/Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)×۱۰۰= گوارش پذیری جویا (جیره OM/پیش‌سکومی)(پیش‌سکومی/Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)×۱۰۰= گوارش پذیری مواد آلی.

مغذی استفاده شد (۲۸)؛ که N: نیتروژن، EE: عصاره‌ی اتری (چربی خام)، OM: مواد آلی هستند.

به منظور تعیین کل میکروگانیسم‌های هوایی Counts, TAC (Plate Count)، از روش شمارش صفحه‌ای استاندارد (Total Aerobic Plate Count)، محیط کشت Aerobic و مقدار آزرقت‌های (Aerobic Plate Count Agar)، آنemonه‌های به دست آمده از ایلیوم استفاده شد. در پایان آزمایش، داده‌های این روش GLM نرم افزار SAS ۹/۰۰۴ در سال ۲۰۰۴ تجزیه شدند و مقایسه میانگین‌های آزمون دانکن انجام شد.

## نتایج

آثار اصلی و برهم‌کنش روغن‌های انسانی و آنزیم بتا-گلوکاتاز بر

استفاده از مواد ضد میکروبی زمانی سودمند خواهد بود که از مواد خوراکی با گوارش پذیری کم استفاده شود و یازمانی که دستگاه گوارش پرنده دچار چالش میکروبی یا بیماری عفونی شده باشد (۱۸). جودارای مقادیر بالایی از پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای (Polysaccharides) محلول در آب است. شناسایی بتا-گلوکاتاز ها به عنوان عوامل اصلی ضد تغذیه‌ای در جو که سبب کاهش رشد، افزایش ضربیب تبدیل (۴)، افزایش ویسکوزیته دستگاه گوارش (۳۰) و چسبندگی مدفوع و در نتیجه کاهش گوارش پذیری (۲۷) در جوجه‌ها می‌شوند، موجب افزایش به کارگیری آنزیم بتا-گلوکاتاز شده است. فعالیت ضد تغذیه‌ای پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در آب در پرندگان به افزایش میکروفلورایی مضر دستگاه گوارش وابسته است؛ از این رو افزودن آنتی‌بیوتیک‌ها به جیره‌های حاوی پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای، سبب افزایش ارزش تغذیه‌ای آنها می‌شود (۶). به عبارت دیگر فعالیت زیستی آنزیم‌های بتا-گلوکاتاز و پنتوزاناز در جیره‌های دارای جویا گندم با استفاده از آنتی‌بیوتیک افزایش می‌یابد (۸). واضح است که کنترل میکروفلورایی دستگاه گوارش می‌تواند بر عملکرد پرندگان تأثیر مثبت داشته باشد. در این راستا، افزودنی‌های خوراکی دارای فعالیت ضد میکروبی، جایگزین مناسبی برای آنتی‌بیوتیک‌ها هستند (۲۳).

تازه‌چندی پیش‌روغن‌های انسانی ساخت کشورهای اروپایی (به ویژه آلمان و انگلستان) در کشور مصرف می‌شوند؛ ولی به علت تحریم کشور در واردات این محصول، این فرآورده‌های طبیعی سیار کم‌یاب و گران شده‌اند؛ از این رو، پژوهشگران ایرانی اقدام به تولید نمونه‌های مشابه از این محصول با قیمت پایین تر کرده‌اند؛ از طرفی، استفاده از روغن‌های انسانی شاید بتواند نیاز به استفاده از آنزیم‌ها که اکثر اراداتی هستند را نیز برطرف کند. بنابراین، هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دو روغن-Stim, Meriden Animal Health Limited (Oregon، دارای ۸۵٪ تیمول و کارواکرول از گیاه پونه کوهی)، ساخت کشور انگلستان و مشابه ایرانی آن به نام آنتی‌بیوفین (Antibiophin)، محصول شرکت پارس ایمن دارو دارای حداقل ۷۳٪ تیمول و کارواکرول از گیاه آویشن) بر عملکرد تولید و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه‌ی جوبا و بدون آنزیم بتا-گلوکاتاز بود.

## مواد و روش کار

این پژوهش برروری ۱۹۹۲ جوجه یک روزه‌ی کاب-۵۰۰ (مخلوط هر دو جنس) در قالب آزمایش فاکتوریل ۳×۲ با دو سطح آنزیم (صفرا ۰/۰۵g/kg و ۳ سطح روغن انسانی (صفرا ۰/۵g/kg، برای ارگواستیم یا ۱ برای آنتی‌بیوفین) برپایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در هفته اول، جوجه‌ها با جیره یکسان تغذیه شدند و از هفته دوم آزمایش به صورت تصادفی به قفس‌های آزمایشی (تورهای سیمی به ابعاد ۱×۱m) انتقال

قابل ملاحظه‌ای بین دو روغن انسانی ارگواستیم و آنتی‌بیوفین از نظر افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل وزن بدن در انتهای دوره مشاهده نشد. اثر اصلی روغن‌های انسانی بر بهبود گوارش پذیری پروتئین خام، چربی خام و مواد آلی معنی دار بود ( $p < 0.05$ ), در صورتی که اثر اصلی آنزیم، تنها سبب بهبود معنی دار گوارش پذیری چربی خام شد (جدول ۳). این در حالی است که برهمکنش عوامل موربد بررسی نیز، تنها بر گوارش پذیری چربی معنی دار و بر گوارش پذیری پروتئین خام نزدیک به معنی داری ( $p = 0.06$ ) بود. نکته قابل توجه در اینجا این است که گوارش پذیری چربی در جیره دارای آنتی‌بیوفین همراه با آنزیم به طور معنی داری از ارگواستیم به همراه آنزیم، بهتر بود. در این پژوهش، جمعیت میکروبی چربی درستگاه گوارش نیز بررسی شد که اثر جیره‌های آزمایشی بر جمعیت کل میکروب‌های هوایی معنی داری نبود (جدول ۳). اثر اصلی روغن‌های انسانی بر فراسنجه‌های لاشه معنی دار نبود (جدول ۴)، در حالی که اثر اصلی آنزیم سبب افزایش قابل توجه در صد وزنی لашه و کاهش درصد وزن پانکراس شد ( $p < 0.05$ ). برهمکنش جیره‌های آزمایشی بر فراسنجه‌های لاشه معنی دار نبود.

### بحث

پس از ممنوع شدن استفاده از ترکیبات آنتی‌بیوتیکی در صنعت تغذیه‌ی پرندگان، روغن‌های انسانی به عنوان جایگزین آنها در جیره‌های پرندگان به کار می‌روند. هر چند، این افزودنی‌ها زمانی اثر مطلوب‌تری خواهند داشت که جیره یا شرایط محیطی در حالت بهینه نباشد. اثر جیره‌های آزمایشی در دوره آغازین برویژگی‌های عملکرد تولید معنی دار نبود؛ که می‌تواند به علت پایین بودن سن جوجه‌ها و عادت نکردن آنها به جیره‌های آزمایشی باشد. اما با افزایش سن جوجه‌ها اثر تیمارهای آزمایشی واضح تر بود (جدول ۲). به طور کلی در این پژوهش تیمار شاهد کمترین عملکرد را نسبت به سایر تیمارها از نظر عملکرد تولید و گوارش پذیری مواد مغذی داشت که به نظر می‌رسد بتا-گلوکان‌های موجود در جوبا ایجاد گران روی بالا در درستگاه گوارش از مخلوط شدن آنزیم‌های گوارشی با محتويات درستگاه گوارش جلوگیری کرده و همچنین سطح تماس مواد مغذی با پزه‌های روده را کاهش می‌دهند. از این‌رو، هضم و جذب مواد مغذی و کارآئی استفاده از خوراک کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند دلیلی بر این رخداد در تیمار شاهد باشد. Botsoglou و همکاران در سال ۲۰۰۲ و Jamroz و همکاران در سال ۲۰۰۵ گزارش کردند که افزودن روغن‌های انسانی به جیره‌های جوجه‌های گوشتشی، اثر معنی داری بر عملکرد رشد ندارد (۹، ۱۷). به علاوه، Hernandez و همکاران در سال ۲۰۰۴ گزارش کردند که افزودن مخلوط روغن‌های انسانی اثر معنی داری بر وزن بدن، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک ندارد (۱۵). این نتایج برخلاف یافته‌های پژوهش حاضر است؛ البته آزمایش‌های مذکور، با جیره‌های بر پایه ذرت-کنجاله سویا

جدول ۱. اجزا و ترکیبات جیره‌ی پایه (%).<sup>(\*)</sup> در هر کیلوگرم مکمل وجود دارد: ۶۰۰۰ IU ویتامین آ، ۳۰۰۰ واحد بین الملل ویتامین دی، ۲۱۱ IU ویتامین ای، ۵۰۰ mg ویتامین ای، ۲۰۴ mg ویتامین کا، ۱۵ mg ویتامین کا، ۱۳۰ mg کولین، ۵۰ mg فولیک، ۴۸ mg نیاسین، ۱۷ mg اسید پنتونیک، ۳۵ mg آهن، ۶ mg ریبوفلافین، ۲۳ mg تیامین، ۲۰ mg پیریدوکسین، ۲۲ mg آهن، ۶ mg مس، ۵۳ mg آنژن، ۱۲ mg سلسیوم، ۰۵ mg مید، ۰۴۶ mg کربالت، ۰۰۰ mg سلیوم.

آغازین (۰ تا ۲۱ روز) (۳۵ روز)	اجزای جیره	جیره‌ی پایه (%)
۴۰	جو	۲۰
۲۲/۰۲	ذرت	۲۶/۹۴
۲۸/۲۶	کنجاله‌ی سویا (%)	۳۴/۴۵
۶/۵۱	روغن سویا	۴/۹۰
۱/۴۳	سنگ‌آهک (CaCO <sub>3</sub> )	۱/۲۳
۰/۹۰	دایکلسانیم-فسفات	۱/۳۱
۰/۳۰	نمک طعام	۰/۴۰
۰/۲۵	مکمل ویتامینی (*)	۰/۲۵
۰/۲۵	مکمل کانی‌ها (*)	۰/۲۵
۰/۰۷	دی‌آل-متیونین	۰/۱۶
مواد مغذی محاسبه شده در جیره (as fed)		
۳۰۰	انرژی قابل متabolیسم kcal/kg	۲۹۰۰
۱۸/۷۵	پروتئین (%)	۲۰/۸۴
۰/۸۴	کلکسیم (%)	۰/۹۱
۰/۳۳	فسفور قابل دسترس (%)	۰/۴۱
۰/۱۴	سدیم (%)	۰/۱۸
۱/۱۷	آرژینین (%)	۱/۳۴
۰/۹۷	لیزین (%)	۱/۱۱
۰/۶۸	متیونین+سیستین (%)	۰/۸۲
۰/۶۹	تریپونین (%)	۰/۷۸
۰/۲۷	تریپیتووفان (%)	۰/۳۱

عملکرد تولید در جدول ۲ نشان داده شده است. افزودن روغن انسانی ارگواستیم یا آنتی‌بیوفین و آنزیم به تنهایی در دوره آغازین، بر افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل نسبت به تیمار شاهد معنی دار نبود (جدول ۲)؛ در این دوره برهمکنش بین عوامل معنی دار نبود. اما، در دوره‌ی رشد، برهمکنش روغن‌های انسانی و آنزیم در مقایسه با جیره شاهد، بر افزایش وزن روزانه بدن معنی داری بود ( $p < 0.05$ ). همچنین اثر افزودن آنتی‌بیوفین در مقایسه با ارگواستیم بر افزایش وزن روزانه معنی دار بود ( $p < 0.05$ )، اما زمانی که این دو مکمل در حضور آنزیم مقایسه شدند، تفاوت معنی داری بین آنها دیده نشد. به طور کلی برهمکنش عوامل در دوره‌ی رشد، بر مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل در مقایسه با تیمار شاهد معنی دار بود ( $p < 0.05$ ). در کل دوره، برهمکنش عوامل بر ضریب تبدیل خوراک و وزن بدن در انتهای دوره معنی دار بود ( $p < 0.05$ )، اما بین روغن‌های انسانی و آنزیم تفاوت معنی داری دیده نشد. اثر تمام جیره‌های آزمایشی به جز جیره دارای ارگواستیم و جیره آنتی‌بیوفین به همراه آنزیم، در مقایسه با جیره شاهد بر بهبود افزایش وزن روزانه بدن، معنی دار بود ( $p < 0.05$ ). به طور کلی تفاوت



جدول ۲. مقایسه اثر دو روند انسانی و آنژیم بتا- گلوکاتاز بر عملکرد جوجه های گوشتشی در دوره های مختلف میانگین هایی که در هر ستون بند و وزه (های) همانند ندارند، تفاوت آماری معنی داری دارند ( $p < 0.05$ ). FCR: ضریب تبدیل خوراک، ADG: افزایش وزن روزانه (g)، BW: وزن بدنه (g). O<sup>(۱)</sup>: روند انسانی ارگواستیم، A<sup>(۲)</sup>: روند انسانی آنتی بیوفین. (\*) انحراف استاندارد میانگین.

روز ۲۱ - ۷										آثار اصلی
BW <sup>(۰)</sup>	FCR	ADG	DFI	FCR	ADG	DFI	FCR <sup>(۰)</sup>	ADG <sup>(۰)</sup>	DFI <sup>(۰)</sup>	
روند انسانی (g/kg)										.
۱۵۹۱/۳۷ <sup>b</sup>	۲/۰۶ <sup>a</sup>	۳۳/۶۷	۶۸/۶۵ <sup>b</sup>	۲/۵۹ <sup>a</sup>	۵۰/۰۶ <sup>b</sup>	۱۲۲/۶۲	۱/۷۰	۳۶/۶۱	۶۲/۲۲	.
۱۶۴۳/۰۴ <sup>b</sup>	۱/۹۹ <sup>ab</sup>	۳۶/۱۷	۷۳/۷۵ <sup>a</sup>	۲/۲۱ <sup>b</sup>	۶۰/۰۲ <sup>a</sup>	۱۲۱/۸۸	۱/۷۲	۳۶/۴۸	۶۲/۷۷	O <sup>(۱)</sup>
۱۷۸۶/۷۵ <sup>a</sup>	۱/۹۴ <sup>b</sup>	۳۶/۵۷	۷۱/۳۸ <sup>ab</sup>	۲/۱۲ <sup>b</sup>	۶۳/۰۲ <sup>a</sup>	۱۱۹/۱۶	۱/۷۲	۳۶/۵۹	۶۳/۰۳	A <sup>(۲)</sup>
۴۳/۸۷	۰/۰۳	۱/۰۴	۱/۱۱	۰/۰۱	۱/۰۳	۲/۱۶	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۵۸	SEM
<۰/۰۱۵	۰/۰۴۱	۰/۱۲۵	۰/۰۴۷	۰/۰۱۰	<۰/۰۰۱	۰/۰۵۰	۰/۰۷۷۳	۰/۰۹۸۹	۰/۰۶۱۲	p-value
آنژیم (g/kg)										.
۱۵۴۰/۸۱ <sup>b</sup>	۲/۰۳	۳۴/۹۴	۷۰/۳۸	۲/۴۳ <sup>a</sup>	۵۱/۷۲ <sup>b</sup>	۱۲۱/۶۵	۱/۷۱	۳۶/۲۷	۶۲/۱۵	.
۱۸۰۶/۶۱ <sup>a</sup>	۱/۹۶	۳۶/۰۱	۷۱/۶۸	۲/۱۸ <sup>b</sup>	۶۴/۰۲ <sup>a</sup>	۱۲۰/۷۹	۱/۷۱	۳۶/۸۵	۶۳/۱۹	۰/۰۵
۳۵/۸۲	۰/۰۲	۰/۸۵	۰/۹۱	۰/۰۸	۱/۰۸	۱/۷۶	۰/۰۱	۰/۰۵۷	۰/۰۴۷	SEM
<۰/۰۰۱	۰/۰۷۳	۰/۳۸۹	۰/۳۲۸	۰/۰۴۹	<۰/۰۰۱	۰/۰۷۳۲	۱/۰۰۰	۰/۰۴۹۲	۰/۰۱۳۹	p-value
برهم کنش										.
۱۳۹۵/۸۳ <sup>b</sup>	۲/۱۷ <sup>a</sup>	۳۰/۹۰ <sup>b</sup>	۶۶/۳۰ <sup>b</sup>	۳/۰۴ <sup>a</sup>	۴۱/۱۳ <sup>e</sup>	۱۲۷/۱۴ <sup>ab</sup>	۱/۷۰	۳۶/۲۱	۶۱/۴۰	روند × آنژیم.
۱۷۲۰/۰۵ <sup>a</sup>	۱/۹۹ <sup>b</sup>	۳۵/۳۶ <sup>ab</sup>	۷۰/۵۷ <sup>ab</sup>	۲/۱۹ <sup>b</sup>	۵۳/۰۴ <sup>d</sup>	۱۱۵/۰۴ <sup>c</sup>	۱/۷۲	۳۵/۷۵	۶۱/۴۱	O <sup>(۱)</sup> × آنژیم.
۱۷۸۶/۴۲ <sup>a</sup>	۱/۹۳ <sup>b</sup>	۳۸/۵۶ <sup>a</sup>	۷۴/۱۷ <sup>a</sup>	۲/۰۵ <sup>b</sup>	۶۰/۰۷۷ <sup>bc</sup>	۱۲۹/۰۲ <sup>abc</sup>	۱/۷۳	۳۶/۸۶	۶۳/۶۶	A <sup>(۲)</sup> × آنژیم.
۱۸۳۶/۰۹ <sup>a</sup>	۱/۹۵ <sup>b</sup>	۳۶/۴۳ <sup>a</sup>	۷۱/۰۰ <sup>ab</sup>	۲/۰۳ <sup>b</sup>	۵۸/۰۹۹ <sup>c</sup>	۱۱۸/۰۱ <sup>bc</sup>	۱/۷۰	۳۷/۰۲	۶۳/۰۴	روند × آنژیم.
۱۷۹۵/۰۶ <sup>a</sup>	۱/۹۸ <sup>b</sup>	۳۶/۹۹ <sup>a</sup>	۷۵/۴۶ <sup>a</sup>	۲/۰۲ <sup>b</sup>	۶۷/۰۳۹ <sup>a</sup>	۱۲۸/۰۲ <sup>a</sup>	۱/۷۳	۳۷/۲۱	۶۴/۱۴	O <sup>(۱)</sup> × آنژیم.
۱۷۸۷/۰۸ <sup>a</sup>	۱/۹۶ <sup>b</sup>	۳۴/۵۸ <sup>ab</sup>	۶۸/۶۵ <sup>b</sup>	۲/۰۱ <sup>b</sup>	۶۶/۰۶۹ <sup>ab</sup>	۱۱۶/۰۳ <sup>c</sup>	۱/۷۱	۳۶/۳۲	۶۲/۴۱	A <sup>(۲)</sup> × آنژیم.
۴۴/۴۶	۰/۰۲	۰/۷۳	۰/۸۶	۰/۰۸	۱/۰۵	۱/۵۲	۰/۰۱	۰/۰۳۷	۰/۰۳۶	SEM
<۰/۰۰۳	۰/۰۱۵	۰/۰۱۶	۰/۰۰۵	۰/۰۰۲	۰/۰۰۸	۰/۰۰۴	۰/۰۹۲۸	۰/۰۶۰۷	۰/۰۶۸	p-value

### استفاده کرد.

افزودن آنژیم بتا- گلوکاتاز به جیره های برپایه ای جو سبب بهبود قابل توجهی ( $p < 0.05$ ) در ضریب تبدیل در انتهای دوره و وزن پایانی پرندگان شد. این نتایج با یافته های Gracia و همکاران در سال ۲۰۰۳ سازگار است (۱۲). مقایسه اثر دو انسانی روند ارگواستیم و آنتی بیوفین در حضور آنژیم بتا- گلوکاتاز حاکی از بهبود ضریب تبدیل در انتهای دوره و وزن پایانی پرندگان در مقایسه با جیره شاهد بود (جدول ۱)؛ اما مقایسه جیره های دارای روند انسانی به اسنسی به همراه یا بدون آنژیم، نشان از عدم تأثیر معنی دار آنژیم در این نوع جیره ها بود، که بر این اساس می توان نتیجه گرفت، در صورت مصرف روند انسانی در جیره ها نیست، زیرا جو، نیازی به افزودن آنژیم بتا- گلوکاتاز به این نوع جیره ها نیست، زیرا روند های انسانی به علت داشتن خاصیت ضد میکروبی و افزایش تولید و کار آئی آنژیم های درون زاد، به ویژه لیپاز از طریق بهبود گوارش پذیری چربی (۲۲)، می توانند بازدهی استفاده از جو را بهبود بخشنند. تا زمان

انجام شده بودند؛ ولی در پژوهش حاضر به علت استفاده از جو که دارای مواد ضد تغذیه ای است و دستگاه گوارش جوجه هارابه چالش می کشاند، آثار واضحی از این افزودنی های گیاهی مشاهده شد. آثار مثبت روند های انسانی بر عملکرد رشد، به وسیله محققین دیگر گزارش شده است (۱۹، ۲۰). همچنین، Alciceck و همکاران در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که افزودن مخلوطی از روند های انسانی در مقایسه با تیمارهای دارای پرو بیوتیک و اسیدهای آلی، سبب بهبود افزایش وزن بدنه و ضریب تبدیل خوراک در جوجه های گوشتشی شد (۳). Lee و همکاران در سال ۲۰۰۳ (جیره ۲۰۰ mg/kg) گزارش کردند که استفاده از ترکیب تیمول و کارواکرول (۲۰۰ mg/kg) سبب کاهش مصرف خوراک، و کاهش وزن بدنه در انتهای دوره شد. هرچند، در پژوهش حاضر، روند های انسانی ارگواستیم و آنتی بیوفین (دارای تیمول و کارواکرول) سبب بهبود این خصوصیات در پرندگان مشاهده شد؛ در این پژوهش تفاوت قابل توجهی بین دوروغن انسانی مشاهده شد؛ که بیانگر این است که می توان از نمونه مشابه ساخت کشور نیز

جدول ۴. مقایسه اثر دوروغن انسانی و آنزیم بتا-گلوكاتاز بر فرستجه‌های لاشه در جوجه‌های گوشتی.<sup>(۱)</sup> از وزن زنده، <sup>(۲)</sup> از وزن لاشه. R: روغن انسانی ارگواستیم. A: روغن انسانی آنتی‌بیوفین. <sup>(۳)</sup> انحراف استاندارد از میانگین.

				آثار اصلی
				روغن انسانی (g/kg)
۲/۲۳	.۰/۱۰	.۰/۳۹	۶۳/۸۳	.
۲/۵۹	.۰/۱۱	.۰/۴۶	۷۱/۳۴	(-/۵)O <sup>(۴)</sup>
۲/۳۹	.۰/۱۳	.۰/۲۸	۶۶/۸۱	(۱)A <sup>(۵)</sup>
.۰/۲۳	.۰/۰۱	.۰/۰۲	۲/۵۴	SEM <sup>(۶)</sup>
.۰/۵۶۸	.۰/۳۴۴	.۰/۷۶۰	.۰/۱۳۸	p-value
				آنژیم (g/kg)
۲/۱۶	.۰/۱۳	.۰/۴۲ <sup>a</sup>	۶۳/۹۷ <sup>b</sup>	.
۲/۶۴	.۰/۱۰	.۰/۳۳ <sup>b</sup>	۷۰/۶۸ <sup>a</sup>	.۰/۰۵
.۰/۱۹	.۰/۰۱	.۰/۰۲	۲/۰۷	SEM
.۰/۰۹۹	.۰/۰۹۲	.۰/۰۰۷	.۰/۰۳۴	p-value
				برهم‌کنش
۲/۱۱	.۰/۰۹	.۰/۴۶	۶۰/۰۲	روغن × آنزیم.
۲/۲۵	.۰/۱۵	.۰/۴۲	۷۱/۲۹	آنژیم × O
۲/۱۴	.۰/۱۵	.۰/۳۹	۶۴/۵۹	آنژیم × A
۲/۳۵	.۰/۱۰	.۰/۳۴	۶۷/۶۳	روغن × .۰/۰۵ آنزیم.
۲/۹۲	.۰/۰۸	.۰/۳۱	۷۱/۳۸	آنژیم .۰/۰۵ × O
۲/۶۴	.۰/۱۱	.۰/۳۷	۷۳/۰۳	آنژیم .۰/۰۵ × A
.۰/۱۳	.۰/۰۰	.۰/۰۱	۱/۶۹	SEM
.۰/۸۱۷	.۰/۳۱۴	.۰/۲۲۴	.۰/۲۵۰	p-value

شاهد معنی دار بود؛ که هماهنگ با یافته‌های Hernandez و همکاران در سال ۲۰۰۴<sup>(۱۵)</sup> و برخلاف یافته‌های Jamroz و همکاران در سال ۲۰۰۳<sup>(۱۶)</sup> است. علت آن رامی توان اثر روغن‌های انسانی بر افزایش کارآیی لیپاز پانکراس و افزایش تراوش‌های صفرایی دانست<sup>(۲۲)</sup>. به طور کلی مواد خوارکی مانند جوبه علت افزایش ویسکوزیتی مواد غذایی و بارمیکروبی مضر در دستگاه گوارش، سبب کاهش گوارش‌پذیری مواد مغذی به ویژه چربی خام به علت دکتریوگاه شدن نمک‌های صفرایی و کاهش امولسیون چربی در دستگاه گوارش، سبب می‌شوند<sup>(۶)</sup>; به همین دلیل، استفاده از آنزیم و روغن‌های انسانی، سبب بهبود قابل توجهی در گوارش‌پذیری چربی خام شد.

افزودن آنزیم به تنهایی سبب کاهش درصد وزن نسبی پانکراس شد<sup>(۵)</sup> (p<۰/۰۵)، که می‌توان آنرا به عمل پانکراس در گوارش مواد غذایی مربوط دانست. زیرا پانکراس نقش مهمی در تولید و آزادسازی آنزیم‌های گوارشی در بخش آغازین روده‌ی باریک بر عهده دارد؛ زمانی که جیره حاوی مواد ضدتفعیله‌ای (مانند بتا-گلوكان‌های جو) باشد، پانکراس مجبور به فعالیت بیشتر جهت تولید آنزیم برای شکستن پیوندهای شیمیایی در این پلی‌ساکارید است، در نتیجه دچار هایپرتروفی می‌شود.

جدول ۳. مقایسه اثر دوروغن انسانی و آنزیم بتا-گلوكاتاز بر گوارش‌پذیری مواد مغذی و جمعیت میکروبی اینثوم در جوجه‌های گوشتی. میانگین هایی که در هرستون بندواژه (های) همانند دارند، تفاوت آماری معنی داری ندارند (p>۰/۰۵). پرگه‌های تشکیل شده، <sup>(۲)</sup>R: روغن انسانی ارگواستیم. A: روغن انسانی آنتی‌بیوفین. آنحراف استاندارد از میانگین.

آثار اصلی	پروتئین خام (%)	چربی خام (%)	مواد آلی (%)	جمعیت میکروبی (Log cfu.)	روغن انسانی (g/kg)
					آنژیم (g/kg)
۷/۷۳	۷۴/۱ <sup>b</sup>	۷۵/۸۸ <sup>c</sup>	۷۷/۳۸ <sup>b</sup>	.	.
۷/۷۷	۸۵/۲۷ <sup>a</sup>	۸۱/۹۹ <sup>b</sup>	۸۶/۰۹ <sup>a</sup>	(۰/۵)O <sup>(۴)</sup>	.
۷/۶۷	۸۳/۴۸ <sup>a</sup>	۸۷/۰۰ <sup>a</sup>	۸۶/۰۸ <sup>a</sup>	(۱)A <sup>(۵)</sup>	.
.۰/۲۴	۲/۲۲	۱/۲۹	۱/۵۱	SEM <sup>(۶)</sup>	.
.۰/۹۵۹	.۰/۰۰۶	<.۰/۰۱	.۰/۰۰۰۸	p-value	آنژیم (g/kg)
					.
۷/۷۸	۷۹/۸۴	۷۸/۴۹ <sup>b</sup>	۸۳/۲۳	.	.
۷/۶۷	۸۳/۰۶	۸۴/۷۶ <sup>a</sup>	۸۳/۱۳	.۰/۰۵	.
.۰/۲۰	۱/۸۹	۱/۰۵	۱/۲۳	SEM	.
.۰/۷۰۹	.۰/۱۳۳	.۰/۰۰۰۵	.۰/۹۵۶	p-value	برهم‌کنش
					.
۸/۱۰	۷۲/۳۴ <sup>c</sup>	۶۶/۷۳ <sup>c</sup>	۷۴/۵۳ <sup>c</sup>	روغن × آنزیم.	.
۷/۶۷	۸۴/۳۱ <sup>ab</sup>	۸۸/۳۳ <sup>ab</sup>	۸۸/۷۰ <sup>a</sup>	آنژیم × O	.
۷/۵۷	۷۹/۷۷ <sup>ab</sup>	۸۵/۳۹ <sup>ab</sup>	۸۶/۴۷ <sup>ab</sup>	آنژیم × A	.
۷/۳۷	۷۵/۷۸ <sup>bc</sup>	۸۵/۰۳ <sup>ab</sup>	۸۰/۲۳ <sup>bc</sup>	روغن × .۰/۰۵ آنزیم.	.
۷/۸۷	۸۶/۲۲ <sup>ab</sup>	۸۰/۶۵ <sup>b</sup>	۸۳/۴۸ <sup>ab</sup>	.۰/۰۵ × O	.
۷/۷۱	۸۷/۰۹ <sup>a</sup>	۸۸/۶۰ <sup>a</sup>	۸۵/۶۹ <sup>ab</sup>	.۰/۰۵ × A	.
.۰/۱۳	۱/۶۴	۱/۶۱	۱/۲۴	SEM	.
.۰/۳۳۵	.۰/۵۱۵	<.۰/۰۱	.۰/۰۶۰	p-value	.

نگارش این مقاله، پژوهشی در خصوص مصرف همزمان روغن‌های انسانی و آنزیم بتا-گلوكاتاز گزارش نشده است، از این‌رو نمی‌توان این یافته‌هارا باتایاچ سایر محققین مقایسه کرد. به تازگی Amerah و همکاران در سال ۲۰۱۲، گزارش کرده‌اند که مصرف همزمان روغن انسانی و آنزیم زایلاناز در جوجه‌های گوشتی در زمانی که به صورت آزمایشی به سالمونلا مبتلا شده بودند، سبب بهبود وزن بدن و ضریب تبدیل خوارک در انتهای دوره‌ی آزمایش شد (p<۰/۰۵)، اما بر مصرف خوارک اثر معنی داری نداشت. همچنان افزودن زایلاناز در مقایسه با روغن‌های انسانی سبب بهبود معنی دار وزن بدن و بازدهی غذایی شد<sup>(۵)</sup>. پژوهش‌های انجام شده در خصوص اثر روغن‌های انسانی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی کم، و نتایج آنها بسیار متفاوت است؛ که به نظر می‌رسد ریشه در ترکیبات متفاوت موجود در انسانس‌های روغنی مورد استفاده، شرایط محیط پرورشی و جیره‌های مورد استفاده داشته باشد؛ زیرا روغن‌های انسانی نیز همانند آنتی‌بیوتیک‌ها، در شرایط محیطی نامساعد و استفاده از جیره‌های نامطلوب، روغن‌های انسانی مفیدتر واقع می‌شوند<sup>(۶)</sup>. اثر جیره‌های آزمایشی بر گوارش‌پذیری مواد مغذی در مقایسه با گروه



## References

- Acamovic, T., Brooker, J.D. (2005) Biochemistry of plant metabolites and their effects in animals. *Proc Nutr. Soc.* 64: 403-412.
- Aguilera, J.F., Prieto, E., Molina, E. Lachica, M. (1988) A micromethod for routine determination of chromic oxide in nutrition studies. *Analysis.* 16: 454-457.
- Alciceck, A., Bozkurt, M., Cabuk, M. (2003) The effect of mixture of herbal essential oils, and organic acid or a prebiotics on broiler performance. *S. Afr J Anim Sci.* 34: 217-222.
- Almirall, M., Francesch, M., Perez-Vendrell, A.M., Brufau, J., Esteve-Garcia E. (1995) The differences in intestinal viscosity produced by barley and  $\beta$ -glucanase alter digesta enzyme activities and ileal nutrient digestibilities more in broiler chickens than in cocks. *J Nutr.* 125: 947-955.
- Amerah, A.M., Mathis, G., Hofacre, C.L. (2012) Effect of xylanase and a blend of essential oils on performance and *Salmonella* colonization of broiler chickens challenged with *Salmonella heidelberg*. *Poult Sci.* 91: 943-947.
- Annison, G., Choct, M. (1991) Anti-nutritive activities of cereal non-starch polysaccharides in broiler diets and strategies minimizing their effects. *World's Poult Sci J.* 47: 222-242.
- AOAC. (1995) Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA.
- Bedford, M.R., Morgan, A.J. (1996) The use of enzymes in poultry diets. *World's Poult Sci J.* 52: 61-68.
- Botsoglou, N.A., Florou-Paner, P., Christaki, E., Fletouris, D.J. Spais, A.B. (2002) Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. *Br Poult Sci.* 43: 223-230.
- Cowan, M.M. (1999) Plant products as antimicrobial products. *Clin Microbiol Rev.* 12: 564-582.
- Croduk, M., Ceylan, M., Dede, N., Tel, O.Y. (2008) Effects of novel feed additives on performance, carcass traits and *E. coli*, aerobic bacteria and yeast

افزودن آنزیم بتا-گلوكاتاز به این جیره‌ها می‌تواند پرکاری پانکراس را کاهش دهد و مانع افزایش اندازه آن شود. در پژوهش حاضر اثر جیره بر جمعیت کل میکروب‌های هوایی دستگاه گوارش معنی دار نبود. این یافته با نتایج Croduk و همکاران در سال ۲۰۰۸ هماهنگ است، که گزارش کردند شمارکلی فرم‌ها و کل میکروب‌های هوایی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتشی تحت تأثیر روغن‌های انسانی قرار نگرفتند (۱۱). اما از سوی Jang و همکاران در سال ۲۰۰۷ نشان دادند که روغن‌های انسانی سبب کاهش جمعیت *E.coli* شدند؛ اما بر جمعیت *Lactobacilli* و *Salmonella* تأثیری نداشتند (۱۸). برخی از افزودنی‌های خوراکی دارای منشا گیاهی، مستقیم و یا غیرمستقیم، اثر شایانی بر میکروفلور دستگاه گوارش می‌گذارند (۱۰)؛ هرچند پرنده‌های دار مقایسه با دیگر گونه‌های جانوری بهره‌ی تغذیه‌ای بسیار اندکی از جمعیت میکروبی روده، دارند. فعالیت ضد میکروبی به عنوان یکی از سودمندترین آثار روغن‌های انسانی در پرورش حیوانات است؛ اگرچه ساز و کار دقیق ضد میکروبی آنها به طور کامل آشکار نشده است. بررسی‌های فراوان بروون تنی (*In vitro*) نشان دادند که روغن‌های انسانی دارای تیمول، کارواکرول و غیره، فعالیت ضد میکروبی علیه *typhimurium*, *Clostridium perfringens* و *E. coli* دارند (۱۳، ۱۴). فعالیت ضد میکروبی روغن‌های انسانی، ناشی از ویژگی چربی دوستی (Lipophilic property) و نفوذ آنها به غشای باکتریایی است، که سبب تراویش محتويات غشاء اسلول به محیط بیرون می‌شود (۱۴). به دیگر سخن، به نظر می‌رسد که آثار بروون تنی و بروون تنی (*In vivo*) روغن‌های انسانی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، هماهنگی ندارند؛ هرچند، روغن‌های انسانی به طور کلی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی شناخته شده‌اند.

در نهایت از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزودن روغن‌های انسانی به جیره‌ی برپایه جو، بدون استفاده از آنزیم بتا-گلوكاتاز، می‌تواند آثار ضد تغذیه‌ای جو را کاهش و عملکرد تولید را بهبود دهد. همچنین، با توجه به کمیاب و پرهزینه بودن روغن‌های انسانی خارجی، استفاده از ترکیبات مشابه ساخت کشور، قابل توصیه می‌باشدند.

## تشکر و قددانی

از معاونت تحصیلات تكمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به خاطر پرداخت کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد آقای دامون غفرانی و شرکت راد آرد پارس به دلیل کمک در فراهم آوردن مواد مورد نیاز در این پژوهش، سپاسگزاری می‌شود.

- counts in broilers. Arch Geflügelk. 72: 61-67.
12. Gracia, M.I., Latorre, M.A., Garci'a, M., La'zaro, R., Mateos, G.G. (2003) Heat processing of barley and enzyme supplementation of diets for broilers. Poult Sci. 82: 1281-1291.
13. Hammer, K.A., Carson, C.F., Riley, T.V. (1999) Antimicrobial activity of essential oils and other plants extracts. J Appl Microbiol. 86: 985-990.
14. Helander, I.M., Alakomi, H.L., Latva-Kala, K., Mattila-Sandholm, T., Pol, I., Smid, E.J., et al. (1998) Characterization of the action of selected essential oil components on gram-negative bacteria. J Agric Food Chem. 46: 3590-3595.
15. Hernández, F., Madrid, J., Garcia, V., Orengo, J. Megias, M.D. (2004) Influence of two plant extracts on broiler performance, digestibility, and digestive organ size. Poult Sci. 83: 169-174.
16. Jamroz, D., Orda, J., Kamel, C., Wiliczkiewicz, A., Wertelecki, T. Skorupinska, J. (2003) The influence of phytogenic extracts on performance, nutrient digestibility, carcass characteristics, and gut microbial status in broiler chickens. J Anim Feed Sci. 12: 583-596.
17. Jamroz, D., Wiliczkiewicz, A., Werteleski, T., Orda, J., Skorupinska, J. (2005) Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. Br Poult Sci. 46: 485-493.
18. Jang, I.S., Ko, Y.H., Kang, S.Y. Lee, C.Y. (2007) Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal micro flora population in broiler chickens. Anim Feed Sci Techol. 134: 304-315.
19. Kamel, C. (2001) Tracing Modes of Action and the Roles of Plant Extracts in Non-Ruminants. Recent Adv. in Anim. Nut. Nottingham University Press. Nottingham, UK.
20. Langhout, P. (2000) New additives for broiler chickens. World Poult. 16: 22-27.
21. Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Yeom K.H. Beynen, A.C. (2003) Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens. J Appl Poult Res. 12: 394-399.
22. Lee, K.W., Everts, H. Beynen, A.C. (2004a) Essential oils in broiler nutrition. Int Poult Sci. 3: 738-752.
23. Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Vanderkuilen, J., Lemmens, A.G., Frehner, M., et al. (2004b) Growth performance, intestinal viscosity, fat digestibility and plasma cholesterol in broiler chickens fed a rye-containing diet without or with essential oil components. Int Poult Sci. 3: 613-618.
24. Mourey, A. Canillac, N. (2002) Anti-*Listeria monocytogenes* activity of essential oils components of conifers. Food Control. 13: 289-292.
25. Rota, C., Carraminana, J.J., Burillo, J., Herrera, A. (2004) In vitro antimicrobial activity of essential oils from aromatic plants against selected foodborne pathogens. J Food Prot. 67: 1252-1256.
26. Rouault, M. (2010) Strategies for combining natural growth promoters and antibiotics. Poult Int. 49: 36-37.
27. Salih, M.E., Classen, H.L., Campbell, G.L. (1991) Response of chickens fed on hull-less barley to dietary  $\beta$ -glucanase at different ages. Anim Feed Sci Technol. 33: 139-149.
28. Scott, M.L., Nesheim, M.C., Young, R.J. (1976) Nutrition of the Chicken. (2<sup>nd</sup> ed.). Ithaca, NY. USA.
29. Wenk, C. (2006) Are herbs, botanicals and other related substances adequate replacements for antimicrobial growth promoters?. In: Antimicrobial Growth Promoters. Barug, D., de Jong, J., Kies, A. K., Verstegen, M.W.A., (eds.). Wageningen Academic Publishers, The Netherlands. p. 329-340.
30. White, W.B., Bird, H.R., Sunde, M.L., Marlett J.A., Prentice, N.A. Burger, W.C. (1983) Viscosity of  $\beta$ -D-glucan as a factor in the enzymatic improvement of barley for chicks. Poult Sci. 62: 853-862.
31. Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C., Kroismayr, A. (2008) Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. J Anim Sci. 86: 140-148.
32. Yang, Y., Iji, P.A., Choct, M. (2009) Dietary modulation of gut micro flora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. World's Poult Sci J. 65: 97-114.



# The effect of oregano and thyme based essential oils and $\beta$ -glucanase on performance and nutrients digestibility in broiler chicks fed barley-based diets

Ghofrani Tabari, D.<sup>1</sup>, Rezvani, M.R.<sup>2\*</sup>, Zamiri, M.J.<sup>2</sup>, Dadpasand, M.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Graduated from the College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz-Iran

<sup>2</sup>Department of Animal Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz-Iran

(Received 20 February 2013 , Accepted 12 June 2013)

## Abstract:

**BACKGROUND:** Essential oils (EO) are antimicrobial compounds, but may be beneficial under unfavorable nutritional and environmental conditions. Essential oils produced in Iran are of comparable quality to imported ones. **OBJECTIVES:** The aim of this study was to compare the effects of Orego-Stim (Essential oil based on Oregano; 0.5 g/kg; imported) and Anti-Biophin (Essential oil based on Thyme; 1 g/kg; local) essential oils on performance and precaecal digestibility of nutrients in broiler chicks fed barley-corn based diets with and without  $\beta$ -glucanase (0.05 g/kg). **METHODS:** At the beginning of the second week of rearing period, 192 chicks of mixed sex were allotted into six groups of four replicates with eight chicks per replicate according to a  $2\times 3$  factorial experiment arranged as a completely randomized design. **RESULTS:** Inclusion of Orego-Stim or Anti-Biophin in barley based diets caused a significant ( $p<0.05$ ) improvement in total feed conversion, final body weight and nutrients digestibility, without a significant effect of  $\beta$ -glucanase addition to the diets. The type of essential oils (imported vs. local) did not affect the measured characteristics. **CONCLUSIONS:** Feeding broiler chicks with barley based diets, supplemented with essential oils, decreased the anti-nutritional effects of barley grains in these diets and improved broiler performance, without the need to supplement the barley-based diets with  $\beta$ -glucanase. Because of the lack of any significant difference between the imported and locally-produced essential oils, and the higher cost and scarcity of the imported EO, domestic products such as Anti-Biophin at recommended levels can replace the imported ones.

**Key words:** broiler chicks, essential oils,  $\beta$ -glucanase, nutrients digestibility, performance

## Figure Legends and Table Captions

**Table 1.** Ingredients and nutrients composition of basal diet (%). Supplied per kilogram of diet: vitamin A, 6,000 IU; vitamin D, 3,000 IU; vitamin E, 50.21 IU; vitamin B12, 0.03mg; vitamin K, 2.04 mg; biotin, 0.15 mg; choline, 1,300.5 mg; folic acid, 1.47 mg; niacin, 48.99 mg; pantothenicacid, 13.35 mg; riboflavin, 6.4 mg; thiamine, 2.23 mg; pyridoxine, 3.20 mg; Cu, 12.63 mg; Fe, 22.6 mg; Mn, 108.53mg; Zn, 108.03 mg; Co, 0.46 mg; I, 0.8 mg; and Se, 0.39 mg.

**Table 2.** Comparison of the effect of two essential oils and  $\beta$ -glucanase on performance in broiler chicks at different age periods. Means with different superscripts within each column are significantly different ( $p<0.05$ ).

**Table 3.** Comparison of the effect of two essential oils and  $\beta$ -glucanase on nutrients digestibility and microflora population in the ileum of broiler chicks. Means with different superscripts within each column are significantly different ( $p<0.05$ ).

**Table 4.** Comparison of the effect of two essential oils and  $\beta$ -glucanase on carcass traits in broiler chicks.

\*Corresponding author's email: Rezvani@shirazu.ac.ir, Tel: 0711-6138300, Fax: 0711-2286073