

بررسی نقش گیرنده سروتونرژیک $\text{HT}_4\text{-CA}3$ هیپوکمپ شکمی بر حافظه هیجانی موش‌های صحرایی در مدل ماز بعلاوه شکل مرتفع

امین چاروسایی^{۱*} و هاب باباپور^۱ محمد رضا زرین‌دست^۲ محمد ناصحی^۳

(۱) گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

(۲) مرکز ملی مطالعات اعیاد ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

(۳) مرکز تحقیقات علوم شناختی و اعصاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

(دریافت مقاله: ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، پذیرش نهایی: ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷)

چکیده

زمینه مطالعه: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد گیرنده‌های سروتونرژیک هیپوکمپ نقش بسیار مهمی در شکل گیری حافظه هیجانی دارند، لذا لازم است نقش تمامی گیرنده‌های سروتونرژیک هیپوکمپ در شکل گیری حافظه هیجانی به صورت مجزا و با استفاده از مدل‌های رفتاری مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. **هدف:** هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش گیرنده سروتونرژیک $\text{HT}_4\text{-CA}3$ هیپوکمپ شکمی بر حافظه هیجانی موش‌های صحرایی بود. **روش کار:** ۱۰۲ سر موش صحرایی به صورت تصادفی به ۱۶ گروه ۷ تایی تقسیم شدند. به کمک دستگاه استریوتاکسی دو کانول راهنمایی هیپوکمپ شکمی چپ و راست قرار داده شد. در زمان آزمون رفتاری و پس از تزریق سالین، آگونیست و/یا آنتاگونیست گیرنده $\text{HT}_4\text{-CA}3$ ، از دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع برای سنجش حافظه هیجانی استفاده شد. **نتایج:** تزریق پیش از آزمون آگونیست و/یا آنتاگونیست گیرنده $\text{HT}_4\text{-CA}3$ (RS 67333 ; $1/2 \mu\text{g}/\text{rat}$) و آنتاگونیست گیرنده $\text{HT}_4\text{-CA}3$ (RS 23597 ; $1/2 \mu\text{g}/\text{rat}$) در ناحیه CA3 هیپوکمپ شکمی، هر دو باعث افزایش OAT% و OAE% شدند، در حالیکه تنها RS 23597 باعث کاهش معنی‌دار CAF شد که نشان دهنده اختلال در شکل گیری حافظه است. همچنین تزریق دوز مشابه از هر دو دارو ($1/2 \mu\text{g}/\text{rat}$) پیش از آزمون مجدد، باعث افزایش OAE% و OAT% شد که نشان دهنده ممانعت از به یادآوری حافظه شکل گرفته در روز نخست است. **نتیجه گیری:** نتایج این مطالعه نشان داد که در زمان مواجهه با شرایط استرس‌زا و بروز هیجانات، گیرنده سروتونرژیک $\text{HT}_4\text{-CA}3$ هیپوکمپ نقش مهمی در روند شکل گیری و به یادآوری حافظه دارد.

واژه‌های کلیدی: گیرنده HT_4 ، هیپوکمپ شکمی، موش صحرایی، ماز بعلاوه شکل مرتفع

هیپوکمپ شکمی می‌فرستند (۱۰، ۵)، و ثابت شده است که آکسون‌های سروتونرژیک بیشترین تراکم را در ناحیه CA3 هیپوکمپ دارند، در حالیکه به ترتیب در نواحی شکنجه دندانه‌دار و CA1 با تراکم کمتری دیده می‌شوند (۹، ۱۳).

گیرنده‌های سروتونرژیک بر اساس ویژگی‌های فارماکولوژیک، توالی اسیدهای آمینه، سازماندهی ژئی و مسیرهای جفت شدن با پیامبر ثانویه به هفت گروه اصلی (۵-۷-HT₁-HT₂-HT₃-HT₄-HT₅-HT₆-HT₇) تقسیم‌بندی می‌شوند (۴). تاکنون مشخص شده که گیرنده‌های HT_4 و HT_5 نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند (۴). از بین گیرنده‌های سروتونرژیک، گیرنده HT_4 در تمام نواحی هیپوکمپ بیان می‌شود، اعتقاد بر این است که گیرنده HT_4 نقش مهمی در یادگیری و حافظه دارد. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که فعالیت گیرنده HT_4 باعث بهبود عملکرد شناختی در شماری از آزمون‌های رفتاری می‌شود (۳)، در آزمون احترازی غیرفعال (Passive avoidance)، تزریق پس از آموزش آنتاگونیست‌های گیرنده HT_4 (SDZ 20.5557 و GR 125487) باعث بروز فراموشی در موش شده است، در حالیکه آگونیست‌های گیرنده HT_4 BIMU^۱ و BIMU^۸ از بروز فراموشی جلوگیری کرده‌اند (۸). همچنین

مقدمه

حافظه‌ای که به واسطه برانگیزش هیجانات شکل می‌گیرد معمولاً بهتر از حافظه واقایع معمولی به خاطر می‌آید (۷). این پدیده می‌تواند در به یادآوری منابع بالقوه خطر و پرهیز از آن‌ها مفید باشد. مطالعات علوم اعصاب نشان داده‌اند که اثر هیجانات بر حافظه در بی‌فعالیت و تعامل آمیگدال و هیپوکمپ رخ می‌دهد (۳۰، ۲۸، ۲۵). هیپوکمپ یکی از ساختارهای مهم مغز و بخشی از سیستم لیمبیک است که به همراه ساختارهای مجاور خود یعنی آمیگدال و قشر انتوربیال نقش اساسی در سطح هوشیاری، مسیریابی، حافظه فضایی و حافظه واقایعی دارد (۳۱). همچنین شواهد گستردۀای وجود دارد که نشان می‌دهد هیپوکمپ نقش بسیار مهمی در ذخیره حافظه مربوط به رویدادهای هیجانی دارد (۲۳، ۶)، و حالت‌های هیجانی مثل ترس و حالت احتراز می‌توانند با تقویت و یا تضعیف شکل گیری حافظه تنظیم شوند (۱۴).

پیشنهاد شده است که نوروترنسミترهایی نظری نوراپی نفرین و سروتونین در کدگذاری حافظه هیجانی دخالت دارند (۱۸). جسم سلولی نورون‌های سروتونرژیک به طور عمده در هسته رافه، واقع در ساقه مغز، قرار دارند و آکسون‌های خود را تقریباً به تمام نواحی مغز و بخصوص



نظر به حجم $1\text{ml} \times 0.3$ در هر طرف و در طی مدت ۶۰ ثانیه تزریق شد، تا در طی این مدت، محلول دارویی به خوبی در بافت ناحیه CA^۳ منتشر شده و از بازگشت دارو به بیرون از کانول جلوگیری شود. در طول زمان تزریق به حیوان اجازه داده می‌شد تا آزادانه روى میز کار حرکت کند، این کار استرس زمان تزریق را به حداقل می‌رساند (۲۲).

دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع و روشن انجام آزمون رفتاری: از جمله دستگاه‌هایی که برای سنجش حافظه هیجانی استفاده می‌شود ماز بعلاوه شکل مرتفع است (۲). دستگاه EPM از جنس چوب و دارای چهار بازو و به شکل بعلاوه (+) است. ابعاد بازوها بار و بسته $50 \times 10 \text{ cm}$ است که به یک محدوده مرکزی $10 \times 10 \text{ cm}$ متصل‌اند. در دو طرف و انتهای بازوها بسته دیوارهایی به ارتفاع 40 cm قرار دارند. برای جلوگیری از سقوط موش‌ها از بالای ماز، در دو طرف و انتهای بازوهای باز لبه‌هایی به ارتفاع 1 cm قرار دارند. باز به وسیله پایه‌هایی در ارتفاع 50 cm از سطح زمین قرار می‌گیرد. محل قرارگیری ماز اتفاقی مجزاً و عایق صدا است که روشنایی آن به وسیله یک لامپ $W = 60$ که در ارتفاع 120 cm از مرکز ماز قرار دارد، تأمین می‌شود (۱). در طی آزمون هر موش در مرکز ماز و رو به یکی از بازوها بار قرار داده شده و در مدت زمان پنج دقیقه‌ای که حیوان به طور آزادانه در قسمت‌های مختلف ماز حرکت می‌کرد چهار پارامتر؛ تعداد ورود به بازوها بار (Open arms entry; OAE)، مدت زمان حضور حیوان در بازوها بار (Close arms entry; CAE)، مدت زمان حضور حیوان در بازوها (Open arms time; OAT) و مدت زمان حضور حیوان وارد بازوی مذکور (Close arms time; CAT) بدستگاه مشاهده اندازه‌گیری می‌شود. سپس برای هر حیوان درصد زمان حضور در بازوی بار (%) و درصد ورود به بازوی بار (OAE%) به کمک فرمول‌های زیر محاسبه می‌شود:

$$\%OAT = OAT/(OAT+CAT) \times 100$$

$$\%OAE = OAE/(OAE+CAE) \times 100$$

افزایش معنی دار این دو پارامتر نشان دهنده تخریب حافظه هیجانی موش‌ها می‌باشد. در این تحقیق جمیت بررسی حافظه هیجانی، تمامی آزمون‌های رفتاری به صورت آزمون/آزمون مجدد انجام شد. جمیت بررسی اثرات داروها بر فرآیند کسب حافظه، تزریق پیش از آزمون (روز اول) صورت گرفت (۲۶) و جمیت بررسی اثرات داروها بر روند به یادآوری خاطرات، تزریق پیش از آزمون مجدد (روز دوم) انجام شد (۲۷).

بافت شناسی: برای بررسی صحت کانول گذاری و تزریق پس از هر آزمایش، موش‌ها به وسیله محلول دی‌اکتیل اتر عمیقاً بیهوش شده و در هر دو ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی مقدار $1\text{ml} \times 0.3$ از محلول متیلن بلو ۱٪ تزریق شد. سپس به کمک گیوتین سر موش‌ها جدا شده و مغز آن‌ها از داخل جمجمه خارج می‌شد و به سرعت به یک ظرف درب‌دار محتوی محلول فرمالین بافری ۱۰٪ منتقل می‌شد. پس از گذشت پنج روز به

نشان داده است که تزریق پیش از آزمون RS^{۲۳۵۹۷} و RS^{۶۷۳۳۳}-۱۹۰ به ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی موش، هر دو باعث تخریب حافظه در مدل رفتاری صفحه سوراخ‌دار (Hole board) شده‌اند (۲۱). با در نظر گرفتن شواهد فوق، وجهت مطالعه نقش برانگیختگی هیجانات در شرایط اضطراب‌زا بر حافظه موش‌های صحرایی؛ هدف از این تحقیق بررسی نقش گیرنده سروتونرژیک μ -HT^۵ ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی در کسب و به یادآوری حافظه در مدل رفتاری ماز بعلاوه شکل مرتفع (Elevated plus-maze; EPM) می‌باشد.

مواد و روش کار

حیوانات: در این مطالعه تجربی از موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با سن ۱۲ هفته و وزن تقریبی $220 - 240 \text{ gr}$ استفاده شد. موش‌ها از مرکز علوم جیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (تهران- ایران) خریداری شدند. اتاق جیوانات دارای شرایط محیطی استاندارد (دما کنترل شده $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $45 - 55\%$) و دووهای ۱۲ ساعته روشنایی/اتاریکی (روشنایی از ساعت هفت صبح) بود. غذای فشرده شده مخصوص موش صحرایی و آب تصفیه شده شهر در تمام مدت نگهداری، بجز زمان جراحی و به هنگام آزمون رفتاری، در اختیار موش‌ها قرار می‌گرفت.

داروها: داروهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند عبارت بودند از، RS^{۶۷۳۳۳} (آگونوست انتخابی گیرنده μ -HT^۵) و RS^{۲۳۵۹۷} (آناتاگونوست انتخابی گیرنده μ -HT^۵) ساخت شرکت تاکریس (Tocris) (Bioscience, Bristol, UK) هر دو دارو قبل از استفاده در هر آزمایش، در سرم فیزیولوژی 0.9% استریل حل می‌شند (۲۰).

روش جراحی و کانول گذاری در ناحیه CA^۳: هیپوکمپ شکمی: در ابتدا هر موش وزن شده و با تزریق درون صفاقی کتابمین هیدروکلراید ($mg/50 \text{ kg}$) و زایلزین (4 mg/kg) بیهوش شده و در دستگاه استریوتاکسی قرار داده می‌شود. سپس بر اساس اطلس Paxinos و Watson در سال ۲۰۰۹، دو کانول با گیج (Gauge) ۲۲ به طول 13 cm به صورت دو طرفه و بالاتر از محل تزریق قرار داده می‌شود (۲۴). مختصات ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی عبارت است از: AP= -۴/۵، DV= -۷/۶ و MI= +۵/۲. کانول‌ها به کمک سیمان دندانپزشکی در جای خود محکم شده و جمیت جلوگیری از انسداد کانول‌ها دو سیم استریل مسی در داخل آن‌ها قرار داده می‌شود. بعد از اتمام جراحی، پنج تا هفت روز به حیوان استراحت داده می‌شود تا استریس و آسیب بافتی احتمالی ناشی از جراحی بر طرف شود.

تزریق درون مغزی دارو: تزریق درون مغزی دارو به وسیله میکروسرنگ همیلتون با حجم $1\text{ml} \times 2$ انجام شد. میکروسرنگ به کمک یک کتدان تیوب نمره چهار به سرسوزن دندانپزشکی گیج ۲۷ به طول 14 mm بلندتر از کانول راهنمای متصل شد تا 1 mm فاصله بین انتهای کانول راهنمای CA^۳ جبران شود. در زمان تزریق، محلول دارویی مورد

(Kolmogorov-smirnov) نرمال بودن توزیع داده‌ها و همگن بودن واریانس گروه‌ها بررسی شد. پس از مشخص شدن نرمال بودن داده‌ها، برای مقایسه اثرات دوزهای مختلف دارو با گروه شم (سالین) از آنالیز ANOVA with Repeated measures یک طرفه با اندازه‌گیری مکرر (Repeated measures) استفاده شد. تمام مقادیر داده‌ها به صورت mean \pm SEM (standard error of the mean) در نظر گرفته شد. رسم نمودارها به کمک نرم‌افزار Sigma plot p \leq 0.05 در نظر گرفته شد. رسم نمودارها به کمک نرم‌افزار Sigma plot نسخه ۱۰ انجام شد.

نتایج

اثرات تزریق پیش از آزمون RS^{۶۷۳۳۳} در ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی بر حافظه هیجانی موش‌های صحرایی: تجزیه و تحلیل آماری نتایج این آزمایش به کمک آنالیز واریانس اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تزریق پیش از آزمون RS^{۶۷۳۳۳} باعث افزایش معنی دار OAT% {درون گروهی: (۱، ۲۴)=۲/۹۱، P $>$ ۰.۰۵} F^{۳، ۲۴}: بین گروهی: [۱، ۲۴]=۳۴/۷، p \leq ۰.۰۰۱] F^{۳، ۲۴}: بین درون گروهی: [۱، ۲۴]=۸/۲، p \leq ۰.۰۰۱] F^{۳، ۲۴}: تصویر (۱) و OAE% {درون گروهی: [۱، ۲۴]=۰/۰۵، p \leq ۰.۰۳} F^{۳، ۲۴}: بین گروهی: [۱، ۲۴]=۳/۴۷، p \leq ۰.۰۵} F^{۳، ۲۴}: بین درون گروهی: [۱، ۲۴]=۴/۰۲، p $>$ ۰.۰۵] F^{۳، ۲۴}: بین گروهی: [۱، ۲۴]=۱/۹۶، p $<$ ۰.۰۵} F^{۳، ۲۴}: ایجاد نکرده است.

اثرات تزریق پیش از آزمون مجدد RS^{۶۷۳۳۳} در ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی بر حافظه هیجانی موش‌های صحرایی: تجزیه و تحلیل آماری نتایج این آزمایش به کمک آنالیز واریانس اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تزریق پیش از آزمون مجدد RS^{۶۷۳۳۳} باعث افزایش معنی دار OAT% {درون گروهی: (۱، ۲۴)=۳/۴۸، p \leq ۰.۰۵} F^{۳، ۲۴}: بین گروهی: [۱، ۲۴]=۵/۴۵، p \leq ۰.۰۵] F^{۳، ۲۴}: تصویر (۳) و OAE% {درون گروهی: [۱، ۲۴]=۲/۵۸، p $>$ ۰.۰۵} F^{۳، ۲۴}: بین گروهی: [۱، ۲۴]=۶/۲۳، p \leq ۰.۰۵} F^{۳، ۲۴}: بین درون گروهی: [۱، ۲۴]=۱/۶ F^{۳، ۲۴}: تصویر (۴) شده است ولی تغییر معنی داری در CAE درون گروهی: [۱، ۲۴]=۰/۰۳۶، p $>$ ۰.۰۵] F^{۳، ۲۴}: بین گروهی: [۱، ۲۴]=۱/۱۵ F^{۳، ۲۴}: بین درون گروهی: [۱، ۲۴]=۰/۰۵} F^{۳، ۲۴}: ایجاد نکرده است.

اثرات تزریق پیش از آزمون RS^{۲۳۵۹۷}-۱۹۰ در ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی بر حافظه هیجانی موش‌های صحرایی: تجزیه و تحلیل آماری نتایج این آزمایش به کمک آنالیز واریانس اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تزریق پیش از آزمون RS^{۲۳۵۹۷}-۱۹۰ باعث افزایش معنی دار OAT% {درون گروهی: [۱، ۲۴]=۲۰/۴۹، p \leq ۰.۰۰۱} F^{۳، ۲۴}: بین گروهی: [۱، ۲۴]=۴۶/۰۸، p \leq ۰.۰۰۱] F^{۳، ۲۴}: بین درون گروهی:

Campden, Vibroslice MAV^{۵۲} (Instrument, UK) برش‌های مغزی به ضخامت ۳۰ μ m تهیه شده و محل عبور کانول‌ها و ناحیه تزریق دارو به کمک میکروسکوپ بیناکولا ر Paxinos و Watson مورد بررسی قرار می‌گرفت.

تیمارهای دارویی و آزمایش‌های انجام شده: در این پژوهش چهار آزمایش انجام شد.

آزمایش (۱) بررسی اثر تزریق پیش از آزمون RS^{۶۷۳۳۳} در ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی بر شکل گیری حافظه هیجانی موش‌های صحرایی: چهار گروه موش در این آزمایش استفاده شد. گروه اول سالین و سه گروه باقیمانده مقادیر مختلف ۰/۰۱۲ و ۰/۰۱۲ μ g/rat (RS^{۶۷۳۳۳}) را به صورت درون مغزی داخل هیپوکمپ شکمی دریافت کردند. پنج دقیقه پس از تزریق از موش‌ها تست حافظه به عمل آمد و ۲۴ ساعت بعد تست حافظه بدون تزریق دارو تکرار شد.


آزمایش (۲) بررسی اثر تزریق پیش از آزمون مجدد RS^{۶۷۳۳۳} در ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی بر به یادآوری حافظه هیجانی موش‌های صحرایی: چهار گروه موش در این آزمایش استفاده شد. گروه اول سالین و سه گروه باقیمانده مقادیر مختلف ۰/۰۱۲ و ۰/۰۱۲ μ g/rat (RS^{۶۷۳۳۳}) را به صورت درون مغزی داخل هیپوکمپ شکمی دریافت کردند. روز اول آزمون رفتاری انجام شد تا حافظه هیجانی شکل بگیرد. ۲۴ ساعت بعد مقادیر مختلف دارو تزریق شده و پنج دقیقه پس از تزریق از موش‌ها تست حافظه به عمل آمد.

آزمایش (۳) بررسی اثر تزریق پیش از آزمون RS^{۲۳۵۹۷}-۱۹۰ در ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی بر شکل گیری حافظه هیجانی موش‌های صحرایی: چهار گروه موش در این آزمایش استفاده شد. گروه اول سالین و سه گروه باقیمانده مقادیر مختلف ۰/۰۱۲ و ۰/۰۱۲ μ g/rat (RS^{۲۳۵۹۷}-۱۹۰) را به صورت درون مغزی داخل هیپوکمپ شکمی دریافت کردند. پنج دقیقه پس از تزریق از موش‌ها تست حافظه به عمل آمد و ۲۴ ساعت بعد تست حافظه بدون تزریق دارو تکرار شد.


آزمایش (۴) بررسی اثر تزریق پیش از آزمون مجدد RS^{۲۳۵۹۷}-۱۹۰ در ناحیه CA^۳ هیپوکمپ شکمی بر به یادآوری حافظه هیجانی موش‌های صحرایی: چهار گروه موش در این آزمایش استفاده شد. گروه اول سالین و سه گروه باقیمانده مقادیر مختلف ۰/۰۱۲ و ۰/۰۱۲ μ g/rat (RS^{۲۳۵۹۷}-۱۹۰) را به صورت درون مغزی داخل هیپوکمپ شکمی دریافت کردند. روز اول آزمون رفتاری انجام شد تا حافظه هیجانی شکل بگیرد. ۲۴ ساعت بعد مقادیر مختلف دارو تزریق شده و پنج دقیقه پس از تزریق از موش‌ها تست حافظه به عمل آمد.

تجزیه و تحلیل آماری: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ انجام شد. با استفاده از تست کولموگوروف-امیرنوف






تصویر ۲. اثر تزریق پیش از آزمون RS67333 در ناحیه CA۳ بر OAE%. نشان دهنده سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون (روز اول) می باشد.



تصویر ۱. اثر تزريق پیش از آزمون RS67333 در ناحیه CA3 بر OAT%^{***} و نشان دهنده سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون (روز اول) می باشد.




تصویر ۴. اثر تغییر پیش از آزمون مجدد RS67333 در ناحیه CA3 بر OAE.
نباشد. $p < 0.05$. دهنده سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون مجدد (روز دوم) می باشد.

نکرده است. ایجاد F بین درون گروهی: $=V/82$ ، $(1, 24)$; F بین گروهی: $=0/5$ ، $(p, 24)$; F درون گروهی: $=0/05$ ، $(p, 24)$ ؛ $\{F\}_{(3)}^{(3)}$ ؛ $\{F\}_{(3)}^{(3)}$ تصوری^۸ شده است ولی تغییر معنی داری در CAE

پخت


نتایج آزمایش دو و چهار نشان داد که به ترتیب تزریق پیش از آزمون مجدد RS۶۷۳۳ و RS۲۳۵۹۷ به ناحیه CA۳ هیبوکمپ شکمی باعث افزایش معنی دار OAT % و OAE % نسبت به روز آزمون شده است، که نشان دهنده اختلال در به یادآوری خاطرات ناشی از تزریق این داروهاست. در تزریق پیش از آزمون RS۶۷۳۳ و RS۲۳۵۹۷ به RS۲۳۵۹۷ در آزمایش های یک و سه نیز هر دو دارو باعث اختلال در کسب ترتیب در آزمایش های در حالیکه تنها RS۲۳۵۹۷ بطور معنی دار باعث حافظه شده اند، در فعالیت های رت ها شده است و RS۶۷۳۳ تغییری در فعالیت کاهش فعالیت حرکتی رت ها شده است.




تصویر ۳. اثر تزییق پیش از آزمون مجدد RS₆₇₃₃ بر CA₃ در ناحیه OAT%. نشان دهنده سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون مجدد (روز دوم) می باشد.

درین گروهی: $F(3, ۲۴) = ۱/۵۳$, $p < .۰۵$ ٪ OAE (تصویر ۵) و درون گروهی: $F(۳, ۲۴) = ۱/۵۳$, $p < .۰۵$ ٪ CAE (تصویر ۶)، و کاهش معنی دار CAE (دون گروهی: $F(۳, ۲۴) = ۳/۸۸$, $p < .۰۵$ ٪)؛ بین گروهی: $F(۳, ۲۴) = ۶/۲۴$, $p < .۰۵$ ٪؛ بین گروهی: $F(۳, ۲۴) = ۱۱/۴۷$, $p < .۰۵$ ٪)؛ نسبت به سالین روز آزمون درین گروهی: $F(۳, ۲۴) = ۰/۰۹۶$, $p < .۰۵$ ٪ شده است.


اثرات تزریق پیش از آزمون مجدد RS23597 در ناحیه CA3 همیوکمپ شکمی بر حافظه هیجانی موش‌های صحرایی: تجزیه و تحلیل آماری نتایج این آزمایش به کمک آنالیز واریانس اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تزریق پیش از آزمون مجدد RS23597 باعث افزایش معنی‌دار OAT% {درون گروهی: $F[3, 24] = 21/0.00$ ؛ بین گروهی: $p \leq 0.05$ }، (تصویر ۷) و OAE% {درون گروهی: $F[3, 24] = 6/0.05$ ؛ بین گروهی: $p \leq 0.05$ }، (تصویر ۸) می‌باشد.




تصویر ۶. اثر تزریق پیش از آزمون ۱۹۰-RS۲۳۵۹۷ در ناحیه CA۳ بر OAE%. نشان دهنده سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون (روز اول) p<۰.۰۵ می باشد.



تصویر ۵. اثر تزریق پیش از آزمون ۱۹۰-RS۲۳۵۹۷ در ناحیه CA۳ بر OAT%. نشان دهنده سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون (روز اول) p<۰.۰۰۱*** می باشد.



تصویر ۸. اثر تزریق پیش از آزمون مجدد ۱۹۰-RS۲۳۵۹۷ در ناحیه CA۳ بر OAT%. نشان دهنده سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون مجدد (روز دوم) p<۰.۰۱*** می باشد.



تصویر ۷. اثر تزریق پیش از آزمون مجدد ۱۹۰-RS۲۳۵۹۷ در ناحیه CA۳ بر OAT%. نشان دهنده سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون (روز اول) p<۰.۰۰۱*** و سطح اختلاف معنی دار نسبت به سالین روز آزمون (روز دوم) می باشد.

سطح فعالیت حرکتی حیوان تأثیری ندارد (۲۰). شواهد نشان می دهند که تزریق سیستمیک آگونیست ها و آنتاگونیست های گیرنده_٤-HT-۵ نیز در تنظیم حافظه نقش دارند. در مطالعه ای، تزریق درون صفاقی RSE۶۷۳۳ باعث تسهیل هر دو حافظه کوتاه مدت و بلند مدت شده است (۱۷). همچنین در مطالعه ای دیگر تزریق درون صفاقی RSE۲۴۵۴۸۷ و SDZ۲۰۵۵۵۷ (آنتاگونیست های گیرنده_٤-HT) باعث اختلال در حافظه اخترازی غیرفعال شده اند (۸).

گیرنده های_٤-HT-۵ در نواحی از مغز نظیر؛ هیپوکمپ، آمیگدال و عقده های قاعده ایی قرار دارند (۱۹)، که تمرکز این گیرنده ها در این نواحی، با شواهدی که حاکی از اهمیت نقش آن ها در تنظیم حافظه است همخوانی دارد (۱۱، ۱۶)، اثرات سودمند فعالیت گیرنده_٤-HT-۵ ممکن است به واسطه انتشار استیل کولین در قشر مخ تسهیل شود. فرآیند دیگری که منسوب به گیرنده_٤-HT-۵ است مربوط به متابولیسم پروتئین پیش ساز آمیلوئید SAAPα می باشد. در واقع گیرنده های_٤-HT-۵ باعث افزایش ساخت

حرکتی ایجاد نکرده است.

در مطالعه ای که پیشتر نقش گیرنده_٤-HT-۵ را در فعالیت حرکتی موش های صحرایی مورد بررسی قرار داده است، نشان داده شده که RSE۲۳۵۹۷ باعث کاهش فعالیت حرکتی موش ها می شود، که این نتایج با یافته های این پژوهش مطابقت دارد. اما بر خلاف نتایج مطالعه مذکور که نشان داده است_٥ (آگونیست گیرنده_٤-HT MeOT) باعث افزایش فعالیت حرکتی شده است، آگونیست مورد استفاده در این پژوهش

یعنی RSE۶۷۳۳ تغییری در فعالیت حرکتی ایجاد نکرده است (۲۹).

Nasehi و همکاران در سال ۲۰۱۵ نشان دادند که در مدل رفتاری صفحه سوراخ دار، تزریق پیش از آزمون RSE۲۳۵۹۷ و RSE۶۷۳۳ به ناحیه CA۳ هیپوکمپ شکمی موش، هر دو باعث تخریب حافظه شده اند، Nasehi در حالیکه تعییری در فعالیت حرکتی حیوان ایجاد نکردند (۲۱). همچنین نشان داد که تزریق پیش از آزمون این دارو به ناحیه CA۱ هیپوکمپ پشتی باعث اختلال در کسب حافظه در موش می شود، ولی بر



References

- Ahmadi, H., Nasehi, M., Rostami, P., Zarrindast, M.R. (2013) Involvement of the nucleus accumbens shell dopaminergic system in prelimbic NMDA-induced anxiolytic-like behaviors. *Neuropharmacology*. 71: 112-123.
- Bertoglio, L.J., Joca, S.R.L., Guimarães, F.S. (2006) Further evidence that anxiety and memory are regionally dissociated within the hippocampus. *Behav Brain Res.* 175: 183-188.
- Bockaert, J., Claeyen, S., Compan, V., Dumuis, A. (2004) 5-HT4 receptors. *Curr Drug Targets CNS Neurol Disord.* 3: 39-51.
- Buhot, M.C., Wolff, M., Segu, L. (2004) Serotonin. In: *From messengers to molecules: Memories are made of these*. Riedel, G., Platt, B. (eds.). (1st ed.) Springer Science & Business Media. New York, NY USA. p. 125-142.
- Charnay, Y., Léger, L. (2010) Brain serotonergic circuitries. *Dialogues Clin Neurosci.* 12: 471-487.
- Chegini, H.R., Nasehi, M., Zarrindast, M.R. (2014) Differential role of the basolateral amygdala 5-HT3 and 5-HT4 serotonin receptors upon ACPA-induced anxiolytic-like behaviors and emotional memory deficit in mice. *Behav Brain Res.* 261: 114-126.
- Christianson, S.A. (1992) Remembering emotional events: Potential mechanisms. In: *The Handbook of Emotion and Memory: Research and Theory*. Christianson, S.A.(ed.). (1st ed.) Lawrence Erlbaum Associates. Hillsdale, NJ, USA. p. 307-340.
- Galeotti, N., Ghelardini, C., Bartolini, A. (1998) Role of 5-HT4 receptors in the mouse passive avoidance test. *J Pharmacol Exp Ther.* 286: 1115-1121.
- Hensler, J.G. (2006) Serotonergic modulation of the limbic system. *Neurosci Biobehav Rev.* 30: 203-214.
- Lechin, F., van der Dijks, B., Lechin, M.E. (2002) *Neurocircuitry and Neuroautonomic Disorders: Reviews and Therapeutic Strategies*. (1st ed.) Karger Medical and Scientific Publishers. Basel, Switzerland. p. 3-4.

می‌شوند، که یک پپتید محافظ نورونی (Neuroprotective peptide) است و رشد نورون‌ها و افزایش عملکرد حافظه را تسهیل می‌کند و همچنین از مسمومیت سولوی ناشی از انتقال عصبی بیش از اندازه در سیستم گلوتاماتریک که باعث تضعیف رفتار شناختی می‌گردد جلوگیری می‌کند. (۱۲)

در پژوهش حاضر RS67333 و RS23597، هر دو باعث تخریب حافظه شده‌اند. اثرات همسوی این دو دارو در تعدادی از مطالعات پیشین نیز مشاهده شده است (۱۵). گیرنده‌های ۵-HT₅ علاوه بر فعالیت طبیعی خود، یک فعالیت ساختاری مستقل از لیگاند نیز دارند، حتی اگر این عملکرد در سطح محدودی باشد. این فعالیت تفاوت بین انتظارات و مشاهدات اثرات ناشی از عملکرد آگونیست و آنتاگونیست گیرنده ۵-HT₅ را توضیح می‌دهد. در این شرایط انتظار می‌رود برخی آگونیست‌ها اثرات نسبتاً آرام و یا آنتاگونیستی مربوط به میزان فعالیت مستقل از لیگاند از خود نشان دهند (۲۱).

یافته‌های این تحقیق نشان داد که آگونیست و آنتاگونیست گیرنده ۵-HT₅ هر دو باعث اختلال در روند شکل گیری و به یادآوری حافظه شده‌اند. اثرات مشابه آگونیست و آنتاگونیست این گیرنده احتمالاً در نتیجه فعالیت مستقل از لیگاند آگونیست آن است.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از آقای وحید صبوری و سایر همکاران ایشان در پژوهشکده علوم شناختی که مارادر اجرای این طرح یاری نمودند تقدیر و تشکر می‌نماییم.

- Lezoualc'h, F., Berthouze, M. (2006) 5-HT3 and 5-HT4 receptors as targets for drug discovery for dementia. In: *The Serotonin Receptors. From Molecular Pharmacology to Human Therapeutic*. Roth, B.L.(ed.). (1st ed.) Humana Press Inc. Totowa, NJ, USA. p. 459-479.
- Lezoualc'h, F., Robert, S.J. (2003) The serotonin 5-HT4 receptor and the amyloid precursor protein processing. *Exp Gerontol.* 38: 159-166.
- Mamounas, L.A., Mullen, C.A., O'hearn, E., Molliver, M.E. (1991) Dual serotonergic projections to forebrain in the rat: Morphologically distinct 5-HT axon terminals exhibit differential vulnerability to neurotoxic amphetamine derivatives. *J Comp Neurol.* 314: 558-586.
- McGaugh, J.L. (2004) Memory reconsolidation hypothesis revived but restrained: theoretical

- comment on Biedenkapp and Rudy (2004) *Behav Neurosci.* 5: 1140-1142.
15. Mendez-David, I., David, D.J., Darzet, F., Wu, M.V., Kerdine-Römer, S., Gardier, A.M., Hen, R. (2014) Rapid anxiolytic effects of a 5-HT4 receptor agonist are mediated by a neurogenesis-independent mechanism. *Neuropsychopharmacology.* 39: 1366-1378.
 16. Meneses, A. (2003) A pharmacological analysis of an associative learning task: 5-HT1 to 5-HT7 receptor subtypes function on a Pavlovian/instrumental autoshaped memory. *Learn Memory.* 10: 363-372.
 17. Meneses, A. (2007) Stimulation of 5-HT 1A, 5-HT 1B, 5-HT 2A/2C, 5-HT 3 and 5-HT 4 receptors or 5-HT uptake inhibition: short-and long-term memory. *Behav Brain Res.* 184: 81-90.
 18. Meneses, A., Liy-Salmeron, G. (2012) Serotonin and emotion, learning and memory. *Rev Neurosci.* 23: 543-553.
 19. Mengod, G., Vilaró, M.T., Cortés, R., López-Giménez, J.F., Raurich, A., Palacios, J.M. (2006) Chemical neuroanatomy of 5-HT receptor subtypes in the mammalian brain. In: *The Serotonin Receptors. From Molecular Pharmacology to Human Therapeutic.* Roth, B.L. (ed.). (1st ed.) Humana Press Inc. Totowa, NJ, USA. p. 319-364.
 20. Nasehi, M. (2014) The modulatory effect of CA1 5HT 4 receptors on memory acquisition deficit induced by harmaline. *JPS.* 5: 61-71.
 21. Nasehi, M., Kafi, F., Khakpaei, F., Zarrindast, M.R. (2015) Involvement of the serotonergic system of the ventral hippocampus (CA3) on amnesia induced by ACPA in mice. *Behav Brain Res.* 286: 356-363.
 22. Naseri, M.H., Hesami-Tackallou, S., Torabi-Nami, M., Zarrindast, M.R., Nasehi, M. (2014) Involvement of the CA1 GABA_A receptors in MK-801-induced anxiolytic-like effects: an isobologram analysis. *Behav Pharmacol.* 25: 197-205.
 23. Pavlides, C., Watanabe, Y., McEwen, B.S. (1993) Effects of glucocorticoids on hippocampal long-term potentiation. *Hippocampus.* 3: 183-192.
 24. Paxinos, G., Watson, C. (2009) *The rat brain in stereotaxic coordinate.* (1st ed.) Elsevier, academic Press. San Diego, CA, USA. p. 113.
 25. Richardson, M.P., Strange, B.A., Dolan, R.J. (2004) Encoding of emotional memories depends on amygdala and hippocampus and their interactions. *Nat Neurosci.* 7: 278-285.
 26. Stern, C., Carobrez, A., Bertoglio, L. (2008) Aversive learning as a mechanism for lack of repeated anxiolytic-like effect in the elevated plus-maze. *Pharmacol Biochem Be.* 90: 545-550.
 27. Stern, C., Do Monte, F., Gazarini, L., Carobrez, A., Bertoglio, L. (2010) Activity in prelimbic cortex is required for adjusting the anxiety response level during the elevated plus-maze re-test. *Neuroscience.* 170: 214-222.
 28. Strange, B., Dolan, R. (2004) β -Adrenergic modulation of emotional memory-evoked human amygdala and hippocampal responses. *Proc Natl Acad Sci USA.* 101: 11454-11458.
 29. Takahashi, H., Takada, Y., Urano, T., Takada, A. (2002) 5-HT4 receptors in the hippocampus modulate rat locomotor activity. *Hippocampus.* 12: 304-310.
 30. Tsoory, M., Vouimba, R., Akirav, I., Kavushansky, A., Avital, A., Richter-Levin, G. (2007) Amygdala modulation of memory-related processes in the hippocampus: potential relevance to PTSD. *Prog Brain Res.* 167: 35-51.
 31. Xiong, H. (2008) Hippocampus and spatial memory. In: *Neuroimmune Pharmacology.* Ikezu, T. and Gendelman, H. (eds.). (1st ed.) Springer Science & Business Media. New York, NY, USA. p. 55-64.



The Role of Ventral Hippocampal (CA3) 5-HT₄ Receptor in Rats Emotional Memory in Elevated Plus-Maze Task

Charousaei, A.^{1*}, Babapour, V.¹, Zarrindast, M. R.², Nasehi, M.³

¹Division of Physiology, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran, Iran

²Iranian National Center for Addiction Studies, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³Cognitive and Neuroscience Research Center (CNRC), Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

(Received 9 April 2018, Accepted 17 July 2018)

Abstract:

BACKGROUND: Many studies have demonstrated the important role of hippocampal serotonergic receptors in the emotional memory formation. Therefore, it is necessary to investigate the possible role of hippocampal serotonergic receptors in emotional memory formation in several animal model tasks. **OBJECTIVES:** The aim of this study was to investigate the possible role of ventral hippocampal (CA3) 5-HT₄ receptors in emotional memory formation of rats in elevated plus-maze task. **METHODS:** 102 male Wistar rats were divided to 16 groups (n=7), randomly. Two guide cannulae were implanted bilaterally, into the left and right hippocampi, using stereotaxic apparatus. At the test time and following the injections of saline, 5-HT₄ receptor's agonist and/or antagonist, the elevated plus-maze was used for evaluation of the emotional memory. **RESULTS:** A pre-test intra-CA3 injection of competitive agonist (RS67333; 1.2 µg/rat) and competitive antagonist (RS23597-190; 1.2 µg/rat) of 5-HT₄ receptor, increased OAT% and OAE% by themselves while only the RS23597-190 decreased the closed arm entries, indicating that these drugs impaired the memory formation. Also, a pre-retest intra-CA3 injection of RS67333 and RS23597-190 (1.2 µg/rat) increased OAT% and OAE% by themselves, indicating that these drugs prevented the recall of the memories that formed on first day. **CONCLUSIONS:** The results revealed that the hippocampal 5-HT₄ serotonergic receptor have an important role in memory formation and memory recall, at the time of emotional arousal and stressful situations.

Keyword: 5-HT₄ receptor, Ventral hippocampus, Rat, Emotional memory, Elevated plus-maze

Figure Legends and Table Captions

Graph 1. The effect of pre-test intra-CA3 injection of RS67333 on OAT%. **p≤0.01 compared with saline-treated (1st day) rats.

Graph 2. The effect of pre-test intra-CA3 injection of RS67333 on OAE%. *p≤0.05 compared with saline-treated (1st day) rats.

Graph 3. The effect of pre-retest intra-CA3 injection of RS67333 on OAT%. *p≤0.05 compared with saline-treated (2nd day) rats.

Graph 4. The effect of pre-retest intra-CA3 injection of RS67333 on OAE%. *p≤0.05 compared with saline-treated (2nd day) rats.

Graph 5. The effect of pre-test intra-CA3 injection of RS23597-190 on OAT%. ***p≤0.001 compared with saline-treated (1st day) rats.

Graph 6. The effect of pre-test intra-CA3 injection of RS23597-190 on OAE%. *p≤0.05 compared with saline-treated (1st day) rats.

Graph 7. The effect of pre-retest intra-CA3 injection of RS23597-190 on OAT%. ***p≤0.001 compared with saline-treated (2nd day), and **p≤0.01 compared with saline-treated (1st day) rats.

Graph 8. The effect of pre-retest intra-CA3 injection of RS23597-190 on OAE%. **p≤0.01 compared with saline-treated (2nd day) rats.

*Corresponding author's email: aminz55@yahoo.com, Tel: 026-34208318, Fax: 021-66933222