

محمدامین سلطانی پور<sup>۱</sup> و پرویز باباخانلو<sup>۲</sup>

e-mail: masoltanipoor@yahoo.com

### چکیده

بررسی اکولوژیک گیاهان انسانس دار استان هرمزگان از سال ۱۳۷۴ به مدت دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان انجام شد. با استفاده از منابع موجود و افراد آگاه و مطلع نسبت به جمع‌آوری گیاهان انسانس دار استان اقدام و اطلاعاتی از قبیل نام فارسی، نام محلی، نام علمی، نام خانواده، محل پراکنش، وضعیت رویشگاه، ارتفاع از سطح دریا، اقلیم، متوسط بارندگی سالانه و درجه حرارت متوسط محل رویش و گیاهان همراه برای کلیه گیاهان یادداشت گردید. در پایان بررسی در مجموع ۱۱۳ گونه مربوط به ۷۰ جنس و ۳۱ خانواده شناسایی گردید که تعداد ۸۰ گونه بومی استان و تعداد ۷۹ گونه دارای استفاده‌های درمانی رایج و سنتی بودند. این گیاهان در مناطق مختلف ساحلی، استپی گرم شمال و ارتفاعات و کوههای بالنسبة بلند استان از ارتفاع ۱۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا در اقلیم‌های مختلف گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی و گرم و خشک، با متوسط بارندگی ۱۵۰-۳۰۰ میلیمتر و درجه حرارت متوسط ۲۷/۵ - ۱۷/۵ درجه سانتیگراد پراکنش دارند. تعداد ۲۶ گونه از گیاهان انسانس دار استان به شکل درخت، ۹ گونه حالت درختچه‌ای، ۲۴ گونه حالت بوته‌ای و ۵۴ گونه به شکل علفی دیده می‌شوند. تعداد ۳۱ گونه از این گیاهان از گونه‌های دارویی پر مصرف در بین مردم هستند، تعداد ۱۵ گونه در منابع به آنها اشاره نشده یا کمتر به آنها اشاره شده است و تعداد ۱۲ گونه به صورت سنتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان صادر می‌شود.

واژه‌های کلیدی: اکولوژی، گیاهان انسانس دار، استان هرمزگان

### مقدمه

آیند (رضایی و جایمند، ۱۳۸۰). انسانهای و ترکیبیهای آنها به طور مستقل در صنایع مختلف مصارف زیادی دارند. به علت مصارف زیاد انسانهای روز به روز صنعت استخراج این مواد گسترش یافته است، به طوری که سالانه بیش از ۲۰ میلیون کیلوگرم انواع انسانس از گیاهان استخراج می‌نمایند. از آنجائی که انسانهایی که از طریق مصنوعی تهیه می‌شوند از لحاظ مرغوبیت و لطافت با انسانهایی که منشاء طبیعی دارند قابل قیاس نیستند، بنابراین توجه خیلی زیادی به گیاهان انسانس دار شده است (رضایی و جایمند، ۱۳۸۰). این بررسی با هدف دستیابی مستقیم به نمونه‌های هرباریومی و شناسایی شده گیاهان انسانس دار استان، دستیابی به اطلاعات کامل در زمینه

انسانهای طبقه‌ای از روغن‌های گیاهی هستند که از مخلوط ترکیبیهای شیمیایی آلی فرار، سنگین و چرب تشکیل یافته‌اند و مسئول بوی خوش یا مزه در گیاه می‌باشند. در گیاهان تیره نعنایان روغن‌های فرار در تارهای ترشح کننده، در تیره فلفل در سلولهای پارانشیم، در تیره چتریان در لوله‌های روغنی، در تیره های کاج و مركبات در مجراهای لیزیژن و شیزوژن و در تیره گلسرخ در گلبرگها وجود دارند. دانشمندان معتقدند که این مواد در اثر تجزیه شدن لایه‌های رزینی شده دیواره سلولی و یا در اثر هیدرولیز بعضی از گلیکوزیدهای مشخصی بوجود

و منابع موجود گیاهان را شناسایی و جهت تأثیر نهایی به بخش گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انتقال یافت. برای کلیه گیاهان نام علمی، نام فارسی، نام خانواده، مشخصات اقلیمی همراه با سایر مشخصات فوق ثبت و نوشته شد. برای ثبت مشخصات دارویی گیاهان علاوه بر اطلاعات محلی از کتابهای گیاهان دارویی (زرگری، ۷۰-۱۳۶۴)، معارف گیاهی (میرحیدر، ۱۳۷۳)، گیاهان دارویی سنتی ایران (امین، ۱۳۷۰) و پژوهشکی سنتی مردم ایران (افشار، ۱۳۷۰) استفاده گردید. تعیین اقلیم مناطق پراکنش گیاهان با استفاده از نقشه‌های هماقیم جاماب به مقیاس یک میلیونیم بر اساس روش دو مارتین انجام شده است. همچنین متوسط بارندگی سالانه و درجه حرارت متوسط آنها نیز بر اساس نقشه‌های خطوط هم باران و هم دما به همین مقیاس تهیه شد.

## نتایج

در این بررسی ۱۱۳ گونه اسانس دار از استان هرمزگان شناسایی شد که ۸۰ گونه به صورت بومی در استان رویش دارند. در جدول ۱ نام فارسی، نام محلی، نام علمی، نام خانواده و فرم رویشی آنها نشان داده شده است. تعداد ۷۹ گونه دارای مصارف درمانی سنتی هستند. گیاهان اسانس دار استان مربوط به ۷۰ جنس و ۳۱ خانواده بودند که بیشترین تعداد گونه‌ها به ترتیب در خانواده‌های Labiateae با ۲۷ گونه، Compositae با ۱۵ گونه و Umbelliferae با ۱۴ گونه و در جنس‌های Salvia و Citrus با ۷ گونه و Anthemis و Nepeta با ۵ گونه قرار دارند. ۱۶ خانواده دارای یک گونه، ۴ خانواده دارای دو گونه، ۴ خانواده دارای سه گونه، ۳ خانواده دارای چهار گونه و یک خانواده به ترتیب دارای نه، چهارده، پانزده و بیست و هفت گونه می‌باشند (جدول ۲). ۳۳ گونه اسانس دار استان غیربومی بوده که از سالیان پیش در استان کاشته شده و می‌شوند (جدول ۳). همچنین تعداد ۲۶ گونه از گیاهان اسانس دار استان به فرم درخت، ۹ گونه حالت

گیاهان اسانس دار مورد مصرف و چگونگی مصارف آنها، بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیک گونه‌ها، برنامه ریزی جهت شناسایی ترکیبیهای شیمیایی، کشت، پرورش و اهلی کردن آنها و در نهایت ارزیابی ذخایر صورت گرفت.

در استان هرمزگان بیش از ۹۳۵ گونه گیاهی پراکنش دارد که شامل رویشهای دریایی، ساحلی، بوته زارهای استپی و پوشش کوهستانهای مرتفع می‌باشد و تعداد ۲۹۲ گونه دارویی هستند (سلطانی‌پور، ۱۳۷۸). مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع طرح ملی شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار ایران را به اجرا درآورده و در راستای آن مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها بررسیهایی انجام داده‌اند. در استان کرمان تعداد ۱۳۰ گونه اسانس دار و معطر (صابرآملی، ۱۳۸۰)، در استان مازندران تعداد ۳۶ گونه مهم اسانس دار از خانواده نعناع (قلیچ نیا، ۱۳۷۷)، در منطقه قمصر کاشان تعداد ۱۵ گونه بارز اسانس دار (بتولی، ۱۳۸۰)، در مناطق شمالی و شرق استان خوزستان تعداد ده گونه مهم اسانس دار (هویزه، ۱۳۸۰)، در استان تهران ویژگیهای اکولوژیک همچون محل پراکنش، ارتفاع سطح دریا، جهت شبیه، جنس خاک، حوزه آبخیز، تیپ، گونه‌های همراه و نقشه پراکنش چهارده گونه اسانس دار (نجف پورنوایی، ۱۳۷۹) و در استان کردستان چهار جنس گیاه اسانس دار معرفی و از نظر اکولوژی بررسی شده‌اند و عوامل محدوده کننده اکولوژیکی آنها را بر شمرده‌اند (حسنی، ۱۳۸۰).

## مواد و روشها

روش بررسی بدین صورت بود که از طریق مسافت به مناطق مختلف استان و مراجعه به افراد آگاه و مطلع و با کمک راهنمایان محلی گیاهان اسانس دار هر منطقه جمع‌آوری و جهت شناسایی به هر باریوم مرکز منتقل شد. اطلاعاتی از قبل نام محلی، مشخصات رویشگاه، گیاهان همراه، ارتفاع از سطح دریا و محل جمع‌آوری نیز برای هر کدام از گونه‌ها یادداشت گردید. با استفاده از هر باریوم

گیاهان از گونه های دارویی پر مصرف در بین مردم هستند (جدول ۵)، تعداد ۱۶ گونه در منابع به آنها اشاره نشده یا کمتر به آنها اشاره شده است (جدول ۶)، ضمن آنکه تعداد ۱۲ گونه به صورت سنتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان صادر می شود (جدول ۷). مشخصات اقلیمی و رویشگاهی چون اقلیم، درجه حرارت، بارندگی، ارتفاع از سطح دریا، محل رویش و گیاهان همراه این گیاهان در جدول ۸ نشان داده شده است.

درختچه‌ای، ۲۴ گونه حالت بوته‌ای و ۵۴ گونه به فرم علفی دیده می‌شوند. برگ، ساقه، گل، میوه، بذر، ریشه، شیرابه و صمع اندام های مورد مصرف گیاهان دارویی هستند. به طور کلی اندام مورد مصرف در ۴۷ گونه برگ، ۶ گونه ساقه، ۸ گونه ریشه، ۱۳ گونه گل، ۱۳ گونه میوه، ۶۳ گونه بذر، ۴ گونه صمع، ۴ گونه ساقه زیرزمینی، ۸ گونه اندام های هوایی و ۱۰ گونه کلیه قسمتهای گیاه می‌باشد. ترکیبیهای شیمیایی تعداد ۴۱ گونه از این گیاهان تاکنون شناسایی شده است که ترکیبیهای شاخص آنها در جدول ۴ نشان داده شده است. تعداد ۳۱ گونه از این

جدول ۱ - اسمای علمی، خانواده، فارسی، محلی و فرم رویشی گیاهان اسانس دار بومی استان هرمزگان

اسم علمی	خانواده	اسم محلی	اسم فارسی	فرم
Achillea eriophora	Compositae	نوعی بومادران	بنجراشک، سرزدو	علفی
Achillea wilhelmsii	Compositae	بومادران	سربرزه، سرزرد	علفی
Adianthum capillus-veneris	Adianthaceae	پرسیاوش	لوکمی، گیس پری، سهلنگ	علفی
Anthemis austro-iranica	Compositae	-	-	علفی
Anthemis mirheydari	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anthemis odontesephana	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anthemis psuedocotula	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anthemis rhodocentra	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anvillea garciniifolia	Compositae	سندازی	-	بوته‌ای
Artemisia aucheri	Compositae	نوعی درمنه	دریم کوهی	بوته‌ای
Artemisia scoparia	Compositae	نوعی درمنه	سلیکو، مولنگ، ام اید	بوته‌ای
Artemisia sieberi	Compositae	درمنه	دریم، دریمن	بوته‌ای
Asphodelus tenuifolius	Liliaceae	-	پی ماوک، نازوک، موکل	علفی
Bunium persicum	Umbelliferae	زیره	زیره	علفی
Capsella bursa-pasteris	Cruciferae	کسیه کشیش	-	علفی
Cassia italica	Caesalpinaeae	ستا	-	بوته‌ای
Cleome brachycarpa	Capparidaceae	نوعی علف مار	روزگردش، بلپا، گلزاری، گله پار	علفی
Cleome oxypetala	Capparidaceae	نوعی علف مار	روزگردش، بلپا	علفی
Cleome delichtostyla	Capparidaceae	نوعی علف مار	روزگردش	علفی
Cleome quinquevervia	Capparidaceae	نوعی علف مار	روزگردش	علفی
Cymbopogon olivieri	Gramineae	ناگرد	ناغرد، ماده، زغیر، پاشام	بوته‌ای
Cynodon dactylon	Gramineae	مرغ	مور، مرغ	علفی
Cyperus rotundus	Cyperaceae	اویارسلام	-	علفی
Dalbergia sissoo	Papilionaceae	شیشم	چک	درخت
Descurainia Sophia	Cruciferae	خاکشیر	اسفندمحمدی، گوزری، گازیر	علفی
Dionysia revoluta	Primulaceae	-	می بیل، بزیاس، بوغیس، گارک	علفی
Ducrosia anethifolia	Umbelliferae	مشک بو	کهکز	علفی
Eruca sativa	Compositae	منداب	انگره، انگر، پترک، خیل، هنگ	بوته‌ای
Ferula assa-foetida	Umbelliferae	آنغزه	پرزا، تهره	علفی
Francoeuria undulata	Compositae	کک گریز	شاهتره	علفی
Fumaria parviflora	Fumariaceae	شاهتره	توسو، تی تیسکو، کرتس	درختچه
Gailonia aucheri	Rubiaceae	-	سوژنو	علفی
Geranium rotundifolium	Geraniaceae	-	اوشن استکو	بوته‌ای
Gontscharovia popovii	Labiatae	-	-	

اسم علمی	خانواده	اسم فارسی	اسم محلی	فرم
<i>Haplophyllum canaliculatum</i>	Rutaceae	ساراگنا ، گناوه	علفی	
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	Rutaceae	ساراگنا، سرو، هدو، گناوه	علفی	
<i>Juniperus excelsa</i>	Cupressaceae	اورس، گزکوه، هورس	درخت	ارس
<i>Lagoecia cuminoides</i>	Umbelliferae	-	علفی	بانگو
<i>Lallamantia royleana</i>	Labiatae	-	علفی	اسطخردوس
<i>Lavandula stricta</i>	Labiatae	بابونک	علفی	اسطخردوس
<i>Matricaria recutita</i>	Compositae	پونه	بوته ای	بابونه
<i>Mentha longifolia</i>	Labiatae	پودن، پودنه، پده	بوته ای	اسطخردوس
<i>Mentha mozaffarianii</i>	Labiatae	پودن کوهی	بوته ای	پونه کوهی
<i>Nepeta bracteata</i>	Labiatae	-	علفی	نوعی پونه
<i>Nepeta cataria</i>	Labiatae	-	علفی	نوعی پونه سا
<i>Nepeta depauperata</i>	Labiatae	-	علفی	نوعی پونه سا
<i>Nepeta glomerulosa</i>	Labiatae	-	علفی	نوعی پونه سا
<i>Nepeta ispahanica</i>	Labiatae	-	علفی	نوعی پونه سا
<i>Ochradenus aucheri</i>	Resedaceae	شمع	بوته ای	-
<i>Olea ferruginea</i>	Oleaceae	زیتون کوهی، هبر	درخت	زیتون
<i>Perovskia artemisioides</i>	Labiatae	-	علفی	برازمیل
<i>Pimpinella affinis</i>	Umbelliferae	-	علفی	-
<i>Pimpinella barbata</i>	Umbelliferae	-	علفی	-
<i>Pimpinella eriocarpa</i>	Umbelliferae	-	بوته ای	-
<i>Pistacia atlantica</i>	Anacardiaceae	بنه، گن، تاراش، گل به، برکو	درخت	بنه
<i>Pistacia khinjuk</i>	Anacardiaceae	کسور، کسوردنگ، کوهنگ	درخت	خنجک
<i>Platychaete aucheri</i>	Compositae	بوئنگ	بوته ای	-
<i>Pycnocycla aucherana</i>	Umbelliferae	سگ دندان	بوته ای	-
<i>Pycnocycla bashagardiana</i>	Umbelliferae	سگ دندان	بوته ای	-
<i>Pycnocycla nodiflora</i>	Umbelliferae	سگ دندان	بوته ای	-
<i>Reseda aucheri</i>	Resedaceae	گرروز، دون اشترو	علفی	ورث
<i>Salvia aegyptiaca</i>	Labiatae	شرتی، برهی، دون سیاه	علفی	مریم گلی
<i>Salvia compressa</i>	Labiatae	مرمرشک	علفی	نوعی مریم گلی
<i>Salvia macilenta</i>	Labiatae	-	علفی	نوعی مریم گلی
<i>Salvia macrosiphon</i>	Labiatae	-	بوته ای	نوعی مریم گلی
<i>Salvia mirzayani</i>	Labiatae	-	بوته ای	نوعی مریم گلی
<i>Salvia santolinifolia</i>	Labiatae	مور تلخ، مورپرزو، شیرغم	بوته ای	نوعی مریم گلی
<i>Salvia sharifii</i>	Labiatae	-	علفی	نوعی مریم گلی
<i>Stachys inflata</i>	Labiatae	بروز، بروج، بیرینز، مرمرشک	بوته ای	پولک
<i>Teucrium orientale</i>	Labiatae	مورخری	علفی	نوعی مریم نخودی
<i>Teucrium polium</i>	Labiatae	گل ماش	علفی	مریم نخودی
<i>Teucrium scordium</i>	Labiatae	کلپوره، کریشک، کلپورغ	علفی	نوعی مریم نخودی
<i>Teucrium stocksianum</i>	Labiatae	-	علفی	نوعی مریم نخودی
<i>Tribulus terresteris</i>	Zygophyllaceae	کریشک آزاد، کریشک کوهی	علفی	خارخشک
<i>Vitex agnous- castus</i>	Verbenaceae	خارخشک، نالوک، گل زردخواری	بوته ای	پنج انگشت
<i>Vitex negundo</i>	Verbenaceae	بنگله، بنگلا	درختچه	نوعی پنج انگشت
<i>Vitex trifolia</i>	Verbenaceae	بنگلا	درختچه	نوعی پنج انگشت
<i>Zataria multiflora</i>	Labiatae	فلفل خری، گهچ، بامپلوساخت	درختچه	آویشن شیرازی
<i>Zumeria majdae</i>	Labiatae	آبشم، ایگن، اوشن، ازگند	بوته ای	مورخوش
<i>Ziziphora tenuir</i>	Labiatae	مورخوش	بوته ای	کاکوتی
		کاکوتی، گل مشکر، هاردانگشت	علفی	

جدول ۲ - خانواده‌های مختلف گیاهان اسانس دار استان به همراه تعداد جنس و گونه آنها

خانواده	جنس	گونه	خانواده	جنس	گونه	خانواده	جنس	گونه
Labiatae	۱۲	۲۷	Gramineae	۲	۲	Cyperaceae	۱	۱
Compositae	۸	۱۵	Papilionaceae	۲	۲	Elaeagnaceae	۱	۱
Umbelliferae	۱۰	۱۴	Resedaceae	۲	۲	Rubiaceae	۱	۱
Rutaceae	۲	۹	Caesalpinaeae	۱	۲	Adianthaceae	۱	۱
Myrtaceae	۴	۴	Cupressaceae	۱	۱	Fumariaceae	۱	۱
Oleaceae	۲	۴	Musaceae	۱	۱	Primulaceae	۱	۱
Capparidaceae	۱	۴	Meliaceae	۱	۱	Geraniaceae	۱	۱
Cruciferae	۳	۳	Lythraceae	۱	۱	Zygophyllaceae	۱	۱
Anacardiaceae	۲	۳	Vitaceae	۱	۱	Rosaceae	۱	۱
Liliaceae	۲	۳	Bignoniaceae	۱	۱	Palmae	۱	۱
Verbenaceae	۱	۳						

جدول ۳ - گیاهان اسانس دار کاشته شده استان هرمزگان

نام خانواده	نام علمی	ردیف	نام خانواده	نام علمی	ردیف
Lythraceae	<i>Lawsonia inermis</i>	۱۸	Liliaceae	<i>Allium cepa</i>	۱
Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i>	۱۹	Liliaceae	<i>Allium sativum</i>	۲
Meliaceae	<i>Melia indica</i>	۲۰	Umbelliferae	<i>Anethum graveolans</i>	۳
Bignoniaceae	<i>Millingtonia hortensis</i>	۲۱	Caesalpinaeae	<i>Cassia fistula</i>	۴
Musaceae	<i>Musa sapientum</i>	۲۲	Rutaceae	<i>Citrus aurantifolia</i>	۵
Myrtaceae	<i>Myrtus communis</i>	۲۳	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i>	۶
Labiatae	<i>Ocimum basilicum</i>	۲۴	Rutaceae	<i>Citrus limetoides</i>	۷
Labiatae	<i>Ocimum sanctum</i>	۲۵	Rutaceae	<i>Citrus limon</i>	۸
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	۲۶	Rutaceae	<i>Citrus paradisi</i>	۹
Umbelliferae	<i>Petroselinum crispum</i>	۲۷	Rutaceae	<i>Citrus reticulata</i>	۱۰
Palmae	<i>Phoenix dactylifera</i>	۲۸	Rutaceae	<i>Citrus sinensis</i>	۱۱
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i>	۲۹	Umbelliferae	<i>Coriandrum sativum</i>	۱۲
Rosaceae	<i>Rosa damascena</i>	۳۰	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolius</i>	۱۳
Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i>	۳۱	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	۱۴
Papilionaceae	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	۳۲	Umbelliferae	<i>Foeniculum vulgare</i>	۱۵
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	۳۳	Oleaceae	<i>Jasminum azoricum</i>	۱۶
			Oleaceae	<i>Jasminum sambac</i>	۱۷

#### جدول ۴ - ترکیب‌های شاخص برخی از گیاهان اسانس دار استان هرمزگان

گونه	ترکیبات شاخص	گونه	ترکیبات شاخص
<i>Achillea wilhelmsii</i>	کامفور، سیتول، بورنول، میرنول	<i>Matricaria recutita</i>	آلفا بیزابولول، ترانس فارنسول، گوایازولن، پتانسیس فارنزن
<i>Anethum graveolans</i>	آلفافلاندرن، لیمونن، پاراسیمین	<i>Mentha longifolia</i>	پیپریتون، سیتول، پیپریتون
<i>Artemisia scoparia</i>	گاماترپین، لیمونن، اوژنول، پاراسیمین	<i>Mentha mozaaffarianii</i>	پیپریتون، پیپریتون اکسید، لینالول، تیمول
<i>Artemisia sieberi</i>	کامفور، سیتول، آلفاپین، کامفن	<i>Myrtus communis</i>	سیتول، آلفاپین، لینالول، لیمونن، لینالیل استات
<i>Bunium persicum</i>	گاماترپین، کومینیل آلدید، لیمونن+سیتول	<i>Nepeta ispahanica</i>	سیتول، نپالاکتون، لینالول، آلفاپیشول
<i>Citrus aurantium</i>	لینالول، اوژنول، آلفافارنزنول، تی کادینول	<i>Ocimum basilicum</i>	لینالول، اوژنول، آلفافارنزنول، استراژون
<i>Citrus limon</i>	لیمونن، گاماترپین، پاراسیمین	<i>Ocimum sanctum</i>	اوژنول، بتاپیزاولن، گاماپیزاولن، استراژون
<i>Citrus paradisi</i>	لیمونن، گاماترپین، نرون	<i>Petroselinum crispum</i>	بتافلاندرن، مریستیسین، متاتری ان، آلفاپین
<i>Citrus reticulata</i>	لیمونن، گاماترپین، پاراسیمین	<i>Pistacia atlantica</i>	آلفاپین، گاماکایین، بتاپین، بتاکاریوفیلن
<i>Citrus sinensis</i>	لیمونن، میرسن، لینالیل استات	<i>Rosa damascena</i>	فیل اتیل الکل، ژرانیول، سیترونولو، ان نونا دکان
<i>Coriandrum sativum</i>	لینالول، گاماکرپین، آلفاپین، ڈانیل استات	<i>Salvia mirzayanii</i>	لینالول، لینالیل استات، سیتول، ترپنیل استات
<i>Cymbopogon olivieri</i>	پیپریتون، دی هیدرواسیمین، آلفا کادینول، المول	<i>Salvia santolinifolia</i>	آلفاپین، بتاپین، بتاکوبین، هگزون ۱-ال، لیمونن
<i>Dalbergia sisso</i>	نرویدول، بیزابولن	<i>Teucrium polium</i>	کوبنول، گاما ایدسمول، آلفامورولن، آلفامورولول
<i>Ducrosia anethifolia</i>	دکانال، ترادکانال، کریزانتنیل استات	<i>Teucrium stocksianum</i>	سیتول، آلفاپین، سایپین، بتاپین، بتافارنزن و بیریدوفلورول، بتاکاریوفیلن، ترپنول، سایپین
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	ترانس اتیل سینمات، فنیل اتیل الکل	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	آلفاپین، کامفن، ترپنیل استات، دی ترپنیک الکل
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	سیتول، پاراسیمین، اسپاتولول، وبریدوفلورول	<i>Vitex agnous-castus</i>	کارواکرول، ارتوسیمین، دودکان، گاماکرپین
<i>Ferula assa-foetida</i>	ترانس پروپنیل اس بوتیل دی سولفید، سیس اسیمین، ترانس اسیمین	<i>Vitex negundo</i>	لینالول، کامفن، ترپنیل استات، دی ترپنیک الکل
<i>Foeniculum vulgare</i>	ترانس آنتول، فنکون، لیمونن	<i>Vitex trifolia</i>	کارواکرول، ارتوسیمین، دودکان، گاماکرپین
<i>Geranium rotundifolium</i>	آلفاکرپینیل استات، پولگون	<i>Zataria multiflora</i>	لینالول، کامفن، ترپنیل استات، دی ترپنیک الکل
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	لیمونن، آلفاپین	<i>Zhumeria majdae</i>	کارواکرول، ارتوسیمین، دودکان، گاماکرپین

#### جدول ۵ - گیاهان اسانس دار پر مصرف استان هرمزگان

نام علمی	نام خانواده	نام علمی	نام خانواده
<i>Achillea eriophora</i>	Compositae	<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae
<i>Achillea wilhelmsii</i>	Compositae	<i>Otostegia persica</i>	Labiatae
<i>Adianthum capillus-veneris</i>	Adianthaceae	<i>Phoenix dactylifera</i>	Palmae
<i>Artemisia aucheri</i>	Compositae	<i>Pistacia atlantica</i>	Anacardiaceae
<i>Artemisia scoparia</i>	Compositae	<i>Salvia aegyptiaca</i>	Labiatae
<i>Artemisia sieberi</i>	Compositae	<i>Salvia mirzayanii</i>	Labiatae
<i>Cassia italica</i>	Caesalpiniaceae	<i>Salvia sharifi</i>	Labiatae
<i>Cymbopogon olivieri</i>	Gramineae	<i>Teucrium orientale</i>	Labiatae
<i>Dionysia revoluta</i>	Primulaceae	<i>Teucrium polium</i>	Labiatae
<i>Ferula assa-foetida</i>	Umbelliferae	<i>Teucrium stocksianum</i>	Labiatae
<i>Gailonia aucheri</i>	Rubiaceae	<i>Tribulus terresteris</i>	Zygophyllaceae
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	Rutaceae	<i>Trigonella foenum- graecum</i>	Papilionaceae
<i>Juniperus excelsa</i>	Cupressaceae	<i>Zataria multiflora</i>	Labiatae
<i>Lavandula stricta</i>	Labiatae	<i>Zhumeria majdae</i>	Labiatae
<i>Matricaria recutita</i>	Compositae	<i>Ziziphora tenuir</i>	Labiatae
<i>Mentha longifolia</i>	Labiatae		

جدول ۶ - گیاهان اسانس دار استان هرمزگان که در منابع به آنها اشاره نشده یا کمتر اشاره شده

نام علمی	نام خانواده	نام علمی	نام خانواده
<i>Cleome quinquenervia</i>	Capparidaceae	<i>Mentha mozaffariani</i>	Labiatae
<i>Dionysia revoluta</i>	Primulaceae	<i>Ochradenus aucheri</i>	Resedaceae
<i>Ducrosia anethifolia</i>	Umbelliferae	<i>Olea ferruginea</i>	Oleaceae
<i>Francoeuria undulata</i>	Compositae	<i>Pycnocycla aucherana</i>	Umbelliferae
<i>Gailonia aucheri</i>	Rubiaceae	<i>Reseda aucheri</i>	Resedaceae
<i>Gontscharovia popovii</i>	Labiatae	<i>Salvia mirzayanii</i>	Labiatae
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	Rutaceae	<i>Salvia sharifii</i>	Labiatae
<i>Lavandula stricta</i>	Labiatae	<i>Teucrium orientale</i>	Labiatae

جدول ۷ - گیاهان اسانس دار استان که به صورت سنتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان صادر می شود

نام علمی	نام خانواده	نام علمی	نام خانواده
<i>Achillea wilhelmsii</i>	Compositae	<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae
<i>Artemisia aucheri</i>	Compositae	<i>Pistacia atlantica</i>	Anacardiaceae
<i>Cassia italica</i>	Caesalpinaeae	<i>Salvia mirzayanii</i>	Labiatae
<i>Ferula assa-foetida</i>	Umbelliferae	<i>Teucrium polium</i>	Labiatae
<i>Lavandula stricta</i>	Labiatae	<i>Zataria multiflora</i>	Labiatae
<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae	<i>Zumeria majdae</i>	Labiatae

جدول ۸ - برخی مشخصات اقلیمی و رویشگاهی گیاهان اسانس دار استان هرمزگان

گیاهان همراه	دما	ارتفاع	اقلیم	محل رویش	نام علمی
<i>Amygdalus scoparia</i>	۱۷/۰-۲۲/۵	۲۰۰-۳۰۰	گرم و نیمه خشک، گرم	همگ، باغ چنار، رودخانه، دم	<i>Achillea eriophora</i>
<i>Juniperus excelsa</i>		۹۰۰-۲۲۵۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	تنگ باستان، کوه چاهشنبه	
<i>Daphne mucronata</i>			گرم و نیمه خشک	گاویندی	
<i>Artemisia aucheri</i>	۲۰-۲۵	۱۵۰-۲۵۰	گرم و نیمه خشک	پشاگرد، کوشاه احمدی، کوه باز،	<i>Achillea wilhelmsii</i>
<i>Platychaete aucheri</i>		۱۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	کوه انو، کوه چاه شنبه	
<i>Anthemis sp.</i>			گرم و نیمه خشک	همگ، باغ چنار، رودخانه، دم	
<i>Mentha longifolia</i>	۱۷/۰-۲۰	۱۵۰-۲۵۰	گرم و نیمه خشک	تنگ باستان، کوه چاهشنبه	<i>Adianthus capillus-veneris</i>
<i>Samolus valerandi</i>			گرم و خشک بیابانی	گاویندی	
<i>Zataria multiflora</i>			گرم و خشک بیابانی		
<i>Leptadenia pyrotechnica</i>	۲۲/۰-۲۷/۵	۱۵۰-۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۰۰-۱۰۰۰ حاجی آباد، بندرلنگه، گاویندی	<i>Anthemis austro-iranica</i>
<i>Gymnocarpus decander</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Cymbopogon olivieri</i>			بیابانی		
<i>Convolvulus sp.</i>	۲۲/۰-۲۵	۲۰۰-۲۵۰	گرم و نیمه خشک	قطب آباد	<i>Anthemis mirheydari</i>
<i>Cymbopogon olivieri</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Gymnocarpus decander</i>			گرم و نیمه خشک	کوه گنو	<i>Anthemis odontesephana</i>
<i>Juniperus excelsa</i>	۲۲/۰-۲۵	۱۵۰-۲۰۰	گرم و نیمه خشک	بندرعباس، میناب	<i>Anthemis psuedocotula</i>
<i>Daphne mucronata</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Ebenus stellata</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Acacia oerfota</i>	۲۵-۲۷/۵	۱۵۰-۲۰۰	گرم و نیمه خشک	بندرعباس، میناب	<i>Anthemis rhodocentra</i>
<i>Acacia ehrenbergiana</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Euphorbia larica</i>			گرم و نیمه خشک	۵۰-۱۳۰۰ حاجی آباد، سرچاهان، سرخون، سیاهو	<i>Anvillea garcinii</i>
<i>Hammada salicornica</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Acacia ehrenbergiana</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Euphorbia larica</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Cymbopogon olivieri</i>			گرم و نیمه خشک		
<i>Leptadenia pyrotechnica</i>	۲۲/۰-۲۷/۵	۱۵۰-۲۵۰	گرم و نیمه خشک		
<i>Salvia santolinifolia</i>			بیابانی		

ادامه جدول -۸

<i>Artemisia aucheri</i>	حاجی آباد، صالح آباد، علی آباد	۸۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۵۰-۳۰۰	۲۲/۵	<i>Ebenus stellata</i>
<i>Artemisia scoparia</i>	گاویندی، کوه گنو	۱۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Olea ferruginea</i>
<i>Artemisia sieberi</i>	حاجی آباد، صالح آباد، علی آباد	۸۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۵۰-۳۰۰	۲۲/۵	<i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Asphodelus tenuifolius</i>	بندرعباس، بندرلنگه، بستک، گاویندی، بشاگرد	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک، بیابانی	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Francoeuria undulata</i>
<i>Bunium persicum</i>	کوه درگن و محراب، کوه گنو، کوه باخ چنار احمدی	۱۹۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Prosopis cineraria</i>
<i>Capsella bursa-pasteris</i>	رودخانه (روستای آب تاریک)	۵۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Cleome brachycarpa</i>
<i>Cassia italica</i>	بندرعباس، بندرلنگه، بستک، گاویندی، بشاگرد	۱۰-۱۲۰۰	گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Acantholimon sp.</i>
<i>Cleome brachycarpa</i>	قشم، هرمز، جاسک، ابو موسی	۱۰-۵۰	گرم و خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Ebenus stellata</i>
<i>Cleome oxypetala</i>	بندرلنگه، سرچاهان	۱۲۰-۷۵۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Convolvulus sp.</i>
<i>Cleome delichostyla</i>	بستک، بندرخمیر، قشم، هرمز	۱۰-۸۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Aerva persica</i>
<i>Cleome quinquenervia</i>	سرچاهان	۷۵۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵	<i>Taverniera sparteae</i>
<i>Cymbopogon olivieri</i>	بستک، بندرلنگه، حاجی آباد، روdan، گاویندی	۱۰-۱۰۰۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Rumex vesicarius</i>
<i>Cynodon dactylon</i>	بندرعباس، بندرلنگه، بستک، گاویندی، بشاگرد	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Cyperus rotundus</i>	روdan، بندرعباس، بندرلنگه، بستک، گاویندی، حاجی آباد	۱۰-۱۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۰-۲۷/۵	<i>Convolvulus sp.</i>
<i>Dalbergia sisso</i>	چکدان بشاگرد	۹۰۰-۱۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۵	<i>Ephedra pachyclada</i>
<i>Descurainia sophia</i>	فارغان، حاجی آباد، احمدی	۸۰۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۵۰-۳۰۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Bromus tectorum</i>
<i>Dionysia revoluta</i>	کوه گنو، کوه پردي بستک	۲۰۰۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Matricaria recutita</i>
<i>Ducrosia anethifolia</i>	بندرعباس، بستک، حاجی آباد، بندر خمیر، گاویندی	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Erodium cicutarium</i>
<i>Eruca sativa</i>	بندرعباس، میتاب، بندرلنگه، بندر خمیر، قشم، هرمز	۰-۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۵-۲۷/۵	<i>Heliotropium bacciferum</i>
<i>Ferula foetida</i>	کوههای تنگ زاغ، گنو، پردي، چاهشنبه، بشاگرد	۱۸۰۰-۲۰۰۰	گرم و خشک	۲۰۰-۳۰۰	۱۷/۵-۲۲/۵	<i>Acacia oerfota</i>
						<i>Cornulaca monocaantha</i>
						<i>Gymnocarpus decander</i>
						<i>Anvillea garcinii</i>
						<i>Cymbopogon olivieri</i>
						<i>Astragalus arbusculinus</i>
						<i>Acanthophyllum bracteatum</i>
						<i>Periploca aphylla</i>
						<i>Hammada salicornica</i>
						<i>Acacia ehrenbergiana</i>
						<i>Euphorbia larica</i>
						<i>Anvillea garcinii</i>
						<i>Leptadenia pyrotechnica</i>
						<i>Cymbopogon olivieri</i>
						<i>Leptadenia pyrotechnica</i>
						<i>Gymnocarpus decander</i>
						<i>Salvia santolinifolia</i>
						<i>Chloris virgata</i>
						<i>Dactyloctenium sp.</i>
						<i>Amaranthus graecizans</i>
						<i>Cynodon dactylon</i>
						<i>Dactyloctenium sp.</i>
						<i>Amaranthus graecizans</i>
						<i>Rhazia stricta</i>
						<i>Nannorhops ritchieana</i>
						<i>Dodonea viscosa</i>
						<i>Alhagi persarum</i>
						<i>Anagallis arvensis</i>
						<i>Rumex vesicarius</i>
						<i>Daphne mucronata</i>
						<i>Convolvulus spinosus</i>
						<i>Amygdalus scoparia</i>
						<i>Hammada salicornica</i>
						<i>Zygophyllum qatarense</i>
						<i>Alhagi persarum</i>
						<i>Taverniera glabra</i>
						<i>Acacia oerfota</i>
						<i>Acacia tortilis</i>
						<i>Artemisia aucheri</i>
						<i>Otostegia persica</i>
						<i>Platychaete aucheri</i>

<i>Francoeuria undulata</i>	بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد، رودان، گاویندی	۱۰-۱۷۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Centaurea bruguierana</i> <i>Cymbopogon olivieri</i> <i>Platychaete aucheri</i>
<i>Fumaria parviflora</i>	بستک، پوراحمدی، گاویندی	۱۰۰-۸۰۰	گرم و خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Francoeuria undulata</i> <i>Plantago sp.</i> <i>Stipa capensis</i>
<i>Gailonia aucheri</i>	بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد، رودان، بشادرگ	۱۰۰-۱۵۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Gymnocarpus decander</i> <i>Anvillea garcinii</i> <i>Cymbopogon olivieri</i>
<i>Geranium rotundifolium</i>	بندرلنگه، بندرخمیر، گاویندی	۱۰-۲۰۰	گرم و خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۵-۲۷/۵	<i>Salvia aegyptiaca</i> <i>Erodium sp.</i> <i>Anagallis arvensis</i>
<i>Gontscharovia popovii</i>	کوه بخون	۲۰۰۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Ebenus stellata</i> <i>Platychaete aucheri</i> <i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Haplophyllum canaliculatum</i>	بستک، باورد بندرلنگه	۵۰-۵۰۰	گرم و خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Convolvulus spinosus</i> <i>Cymbopogon olivieri</i> <i>Artemisia aucheri</i>
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	بندرعباس، میناب، گاویندی، آب گرم گنو	۱۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۰/۵-۲۷/۵	<i>Amygdalus scoparia</i> <i>Teucrium stocksianum</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Juniperus excelsa</i>	کوههای تنگ زاغ، گتو، پرده، باغ چنان، بشادرگ	۱۷۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰	۱۷/۵-۲۰	<i>Daphne mucronata</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Lagoecia cuminoides</i>	رودان، میناب	۵۰-۲۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۵-۲۷/۵	<i>Taverniera sparteae</i> <i>Acacia ehrenbergiana</i> <i>Acacia oerfota</i>
<i>Lallemandia royleana</i>	کوههای تنگ زاغ، گتو	۱۵۰۰-۱۶۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵	<i>Pistacia atlantica</i> <i>Amygdalus scoparia</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Lavandula stricta</i>	بندرعباس، کوه گنو، ایسین	۵۰-۳۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۵-۲۷/۵	<i>Tephrosia persica</i> <i>Otostegia persica</i> <i>Convolvulus sp.</i>
<i>Matricaria recutita</i>	گاویندی، زیارت‌علی، احمدی، گاویست	۵۰۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۵	<i>Anthemis sp.</i> <i>Anagallis arvensis</i> <i>Cynodon dactylon</i>
<i>Mentha longifolia</i>	رودان، حاجی آباد، سیرپویه، بیدویه	۱۰۰-۱۵۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی	۲۰۰-۳۰۰	۲۰-۲۵	<i>Anagallis arvensis</i> <i>Adianthum capillus-veneris</i> <i>Nerium indicum</i> <i>Mentha longifolia</i> <i>Anagallis arvensis</i> <i>Haplophyllum sp.</i> <i>Olea ferruginea</i> <i>Juniperus excelsa</i> <i>Daphne mucronata</i> <i>Juniperus excelsa</i>
<i>Mentha mozzaffarianii</i>	سیاهو، قطب آباد، دم تنگ، سیعخران	۵۰۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Convolvulus spinosus</i> <i>Ebenus stellata</i> <i>Ebenus stellata</i> <i>Olea ferruginea</i> <i>Amygdalus scoparia</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Ebenus stellata</i> <i>Juniperus excelsa</i>
<i>Nepeta bracteata</i>	کوه باغ چنان احمدی	۲۴۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	
<i>Nepeta cataria</i>	کوه بخون	۱۴۰۰-۱۶۵۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	
<i>Nepeta depauperata</i>	کوههای گنو، بخون	۲۴۰۰-۳۰۱۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	
<i>Nepeta glomerulosa</i>	کوه باغ چنان احمدی، کوه بخون	۲۴۰۰-۳۰۱۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	

## ادامه جدول -۸

<i>Nepeta ispanonica</i>	رودان، قطب آباد	۶۵۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Amygdalus scoparia</i> <i>Anvillea garcini</i> <i>Pteropyrum aucheri</i> <i>Periploca aphylla</i> <i>Astragalus sp.</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Acer monspessulanum</i> <i>Pistacia atlantica</i> <i>Amygdalus scoparia</i> <i>Forsskaea tennacissima</i> <i>Ochradenus aucheri</i> <i>Echinops sp.</i> <i>Gailonia aucheri</i> <i>Convolvulus sp.</i> <i>Helianthemum lippii</i>
<i>Ochradenus aucheri</i>	آب گرم گنو، بشاگرد، جاسک، سیاهو	۵۰-۱۵۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	
<i>Olea ferruginea</i>	کوههای تنگ زاغ، گنو، پردي، باغ چنار، بشاگرد، همای	۱۹۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۱۷/۵-۲۲/۵	
<i>Perovskia artemisioides</i>	حاجی آباد	۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۵۰-۳۰۰	۲۲/۵	
<i>Pimpinella affinis</i>	بارگاه	۶۵۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	
<i>Pimpinella barbata</i>	رودان، بشاگرد، حاجی آباد، سرخون	۱۲۰-۱۴۵۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	
<i>Pimpinella eriocarpa</i>	گنو، گاویندی، روдан، قطب آباد	۶۵۰-۱۹۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۱۷/۵-۲۷/۵	
<i>Pistacia atlantica</i>	کوههای شب، گاری، گنو، پردي، بشاگرد، چاهشنبه	۵۰۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۱۷/۵-۲۲/۵	
<i>Pistacia khinjuk</i>	کوههای شب، گاری، گنو، پردي، باع چنار، چاهشنبه	۳۰۰-۲۲۰۰	گرم و خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۱۷/۵-۲۲/۵	<i>Periploca aphylla</i> <i>Amygdalus scoparia</i> <i>Astragalus sp.</i>
<i>Platychaete aucheri</i>	کوه گنو، کوه سرزه، کوه دق فینو، بندرعباس، بشاگرد، سیاهو، رودان، حاجی آباد، احمدی، سرچاهان	۸۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Gymnocarpus decander</i> <i>Anvillea garcini</i> <i>Leptadenia pyrotechnica</i>
<i>Pycnocyclus aucherana</i>	حاجی آباد، مسافر آباد، احمدی، گهره، سرچاهان	۵۰۰-۹۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵	
<i>Pycnocyclus bashagardiana</i>	خمینی شهر بشاگرد	۱۱۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۵	
<i>Pycnocyclus nodiflora</i>	گهره، سرچاهان	۸۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵	
<i>Reseda aucheri</i>	بندرعباس، بستک، سیاهو، بندرلنگه	۱۰-۱۲۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	
<i>Salvia aegyptiaca</i>	بندرعباس، بستک، بشاگرد	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۰/۵-۲۷/۵	
<i>Salvia compressa</i>	گهره	۸۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵	<i>Anvillea garcini</i> <i>Platychaete aucheri</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Salvia macilenta</i>	بشاگرد، گنو، رودان	۵۰۰-۱۳۶۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۵	<i>Zygophyllum atriplicoides</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Salvia macrosiphon</i>	بندرعباس، بشاگرد، سیاهو، رودان	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Platychaete aucheri</i> <i>Periploca aphylla</i> <i>Rumex vesicarius</i> <i>Artemisia aucheri</i>
<i>Salvia mirzayani</i>	کوههای تنگ زاغ، گنو، پردي، گاویست، چاهشنبه	۹۰۰-۱۸۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵	<i>Gymnocarpus decander</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Francoeuria undulata</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Blepharis persica</i>
<i>Salvia santolinifolia</i>	کوه گنو، رودان، بشاگرد، سرچاهان	۵۰-۸۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Helianthemum lippii</i>
<i>Salvia sharpii</i>	حاجی آباد، سرچاهان، کوههای	۱۵۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۵۰	۲۰-۲۲/۵	

		گنو، پرده	بیابانی، گرم و نیمه خشک		<i>Platychaete aucheri</i> <i>Ephedra pachyclada</i>
<i>Stachys inflata</i>		کوههای تنگ زاغ، گنو، پرده، گاویست، چاهشنبه ۱۰۰۰-۲۶۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰ ۱۷/۵-۲۲/۵	<i>Amygdalus scoparia</i> <i>Ebenus stellata</i> <i>Daphne mucronata</i>
<i>Teucrium orientale</i>		کوه چاهشنبه، کوه گاویست ۳۵۰-۱۷۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰ ۲۰-۲۵	<i>Platychaete aucheri</i> <i>Teucrium polium</i> <i>Salvia sharifii</i>
<i>Teucrium polium</i>	حاجی آباد، سیاهو، دم تنگ، کوه گنو ۵۰-۱۸۰۰	گرم و نیمه خشک و بیابانی، گرم و نیمه خشک، گرم و خشک	بیابانی ۱۵۰-۳۰۰ ۲۲/۵-۲۵		<i>Francoeuria undulata</i> <i>Platychaete aucheri</i> <i>Anvillea garcinii</i>
<i>Teucrium scordium</i>	باغ چنار کوشاه احمدی ۲۱۰۰-۲۲۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰ ۱۷/۵-۲۰		<i>Mentha longifolia</i> <i>Adianthus capillus-veneris</i> <i>Samolus valerandi</i>
<i>Teucrium stocksianum</i>	کوههای گنو، پرده، گاویست، چاهشنبه، حاجی آباد، گهره ۸۰۰-۲۰۰۰	گرم و نیمه خشک	بیابانی ۱۵۰-۲۰۰ ۲۲/۵-۲۵		<i>Platychaete aucheri</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Stachys inflate</i>
<i>Tribulus terresteris</i>	بندر عباس، جاسک، بندر خمیر ۱۰-۱۵۰	گرم و نیمه خشک	بیابانی ۱۵۰-۲۰۰ ۲۵-۲۷/۵		<i>Tephrosia persica</i> <i>Euphorbia larica</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Phragmites australis</i> <i>Saccharum sp.</i> <i>Nerium indicum</i>
<i>Vitex agnus-castus</i>	سرخون، سیاهو ۵۰-۵۰۰	گرم و نیمه خشک	بیابانی ۱۵۰-۲۵۰ ۲۲/۵-۲۵		<i>Phragmites australis</i> <i>Saccharum sp.</i> <i>Nerium indicum</i> <i>Phragmites australis</i> <i>Saccharum sp.</i> <i>Nerium indicum</i>
<i>Vitex negundo</i>	سیاهو، ایسین، رودان، قطب آباد ۵۰۰-۷۰۰	گرم و نیمه خشک	بیابانی ۱۵۰-۲۵۰ ۲۲/۵-۲۷/۵		<i>Artemisia aucheri</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Convolvulus spinosus</i>
<i>Vitex trifolia</i>	زیارت‌الله ۵۰۰	گرم و خشک بیابانی	۲۰۰ ۲۵-۲۷/۵		<i>Ebenus stellata</i> <i>Convolvulus sp.</i> <i>Gymnocarpus decander</i>
<i>Zataria multiflora</i>	حاجی آباد، فارغان، بوخون، بشاغرد، گاویندی ۷۰۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک	بیابانی، گرم و نیمه خشک ۲۰۰-۳۰۰ ۱۷/۵-۲۲/۵		<i>Platychaete aucheri</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Zhumeria majdae</i>	کوه گنو، قطب آباد، تنگ زاغ ۲۵۰-۱۲۵۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۰۰ ۲۲/۵-۲۵		
<i>Ziziphora tenuir</i>	کوه گنو، قطب آباد، حاجی آباد ۵۰۰-۲۵۰۰	گرم و نیمه خشک	بیابانی، گرم و نیمه خشک ۲۰۰-۳۰۰ ۲۲/۵-۲۵		

### وضعیت رویشگاهی، گیاهان اسانس دار استان را می‌توان

- به صورت زیر تقسیم کرد:
- گیاهان اسانس دار که در مناطق کوهستانی استان رویش دارند و شامل ۲۲ گونه هستند. این گیاهان بر روی خاکهای رسوبی، کم عمق با بافت سبک، درز و شکاف صخره‌ها، کوههای سنگی و صخره‌ای مشاهده می‌شوند.
  - گیاهان اسانس دار که در دشت‌های پهناور، تپه‌ها و دامنه کوهها رویش دارند و شامل ۲۰ گونه می‌باشند.

گیاهان اسانس دار استان هرمزگان در مناطق مختلف ساحلی، استپی گرم شمال و ارتفاعات و کوههای بالنسبة بلند استان از ارتفاع ۱۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا در اقلیم‌های مختلف گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی و گرم و خشک، متوسط بارندگی ۱۵۰-۳۰۰ میلیمتر، درجه حرارت متوسط ۲۷/۵-۲۷/۵ درجه سانتیگراد پراکنش دارند. از نقطه نظر

### بحث

شناسایی و بررسی اکولوژیک  
گیاهان اسانس دار استان هرمزگان

گیاهان اسفند تا اردیبهشت ماه بوده، ضمن آنکه برخی از آنها در طول سال نیز مورد مصرف واقع می شوند.  
بررسیهای انجام شده نشان داد که تا کنون هیچ گونه مطالعه‌ای که اختصاص به گیاهان اسانس دار استان هرمزگان داشته باشد انجام نشده است، اما زرگری در کتاب گیاهان دارویی تعداد ۴۳ گونه، میرحیدر در کتاب معارف گیاهی تعداد ۲۴ گونه، امین در کتاب گیاهان دارویی ستی ایران تعداد ۳۱ گونه، افشار در کتاب پزشکی ستی مردم ایران به تعداد ۲۴ گونه و نامدار و همکاران ۲۲ گونه اسانس دار از مناطق مختلف استان اشاره کرده‌اند.

#### منابع مورد استفاده

- افشار، ا. ۱۳۷۰. پزشکی ستی مردم ایران. انتشارات هما، تهران، صفحه ۹۴۲.
- امین، غ. ۱۳۷۰. گیاهان دارویی ستی ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انتشارات فرهنگ، تهران، ۲۳۰ صفحه.
- بتوی، ح. ۱۳۸۰. بررسی ویژگیهای اکولوژیک گیاهان اسانس دار قمصر کاشان. همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۴-۲۶ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع، تهران.
- حسni، ج. ۱۳۸۰. شناسایی و بررسی اکولوژیک چهار جنس گیاه اسانس دار استان کردستان. همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۴-۲۶ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع، تهران.
- رضایی، م.ب. و جایمند، ک. ۱۳۸۰. اسانس و دستگاههای اسانس گیری. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر، ۹، ۱-۱۶۱.
- زرگری، ع. ۱۳۶۴-۷۰. گیاهان دارویی. جلد ۱-۵، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- سلطانی‌پور، م. ا. ۱۳۸۰. جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان هرمزگان، همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۴-۲۶ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع، تهران.
- صابرآملی، س. ۱۳۸۰. معرفی برخی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان کرمان. همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۴-۲۶ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع، تهران.

۳- گیاهان اسانس دار که در آبراهه‌ها، کنار چشمه‌ها، جوی‌های آب و مناطق مرطوب وجود دارند و شامل ۵ گونه هستند.

۴- گیاهان اسانس دار که بر روی تپه‌های شنی ساحلی و حاشیه‌های کم ارتفاع رویش دارند (۱ گونه).

۵- گیاهان اسانس دار که هم در دشت‌های پهناور، تپه‌ها و دامنه کوهها و هم در مناطق کوهستانی رویش دارند و شامل ۲۵ گونه می باشند.

۶- گیاهان اسانس دار که هم بر روی تپه‌های شنی ساحلی و حاشیه‌های کم ارتفاع و هم در دشت‌های پهناور، تپه‌ها و دامنه کوهها رویش دارند و شامل ۲ گونه می باشند.

۷- گیاهان اسانس دار که هم در دشت‌های پهناور و هم در اراضی شور و نسبتاً شور رویش دارند (۱ گونه).

۸- گیاهان اسانس دار که هم در دشت‌های پهناور و دامنه کوهها و هم آبراهه‌ها رویش دارند و شامل ۲ گونه می باشند.

۹- گیاهان اسانس دار که هم بر روی تپه‌های شنی ساحلی و هم آبراهه‌ها رویش دارند (۱ گونه).

۱۰- گیاهان اسانس دار که هم روی تپه‌های شنی ساحلی، هم در مناطق کوهستانی و هم در اراضی شور و نسبتاً شور رویش دارند (۱ گونه).

در میان گیاهان اسانس دار، گونه‌های

*Pistacia atlantica*, *Ochradenus aucheri*, *Artemisia sieberi*, *Cymbopogon olivieri*, *Gailonia aucheri*, *Pistacia khinjuk*, *Platychaete aucheri*, *Pycnocycla aucherana*, *Pycnocycla bashagardiana*, *Pycnocycla nodiflora*, *Salvia santolinifolia*

تشکیل تیپ می دهند.

بیشترین اندام مورد مصرف برگ می باشد. اندام های مورد مصرف به طور مستقیم و غیر مستقیم به صورت تازه یا خشک شده مصرف می شوند. عمل خشک شدن در هوای آزاد و در زیر سایه انجام می گردد. نحوه مصرف بیشتر به صورت جوشانده، دمکرده یا به صورت چاشنی می باشد. مناسبترین زمان جمع‌آوری اندام‌های اکثر این

- نجف پورنوایی، م.، ۱۳۷۹. بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار شامل جنس های *Mentha*, *Thymus*, *Nepeta* در استان تهران. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر، ۵: ۲۵-۱.
- هویزه، ح.، ۱۳۸۰. بررسی پراکنش و خصوصیات رویشگاهی گیاهان اسانس دار استان خوزستان. همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۶-۲۴ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران.
- قلیچ نیا، ح.، ۱۳۷۷. بررسی پراکنش و اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان مازندران. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۶۷ صفحه.
- میرحیدر، ح.، ۱۳۷۳. معارف گیاهی. جلد ۱-۷، دفتر نشر فرهنگ اسلام، تهران.
- نامدار، م.، سمسار، م. و مجتبایی، م.، ۱۳۴۶. دولپه ای های جدا گلبرگ. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۶۱۹ صفحه.
- نامدار، م.، سمسار، م. و مجتبایی، م.، ۱۳۴۷. دولپه ای های پیوسته گلبرگ. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۴۱۹ صفحه.

## Introduction and Ecological Investigation of Aromatic Plants of Hormozgan Province

**M.A. Soltanipoor<sup>1</sup> and P. Babakhanlou<sup>2</sup>**

1- Academic member of Hormozgan Agricultural and Natural Resource Research Center,

e-mail: masoltanipoor@yahoo.com

2- Academic member of Research Institute of Forests and Rangelands

### **Abstract**

This investigation was carried out for Introducing of aromatic plants of Hormozgan Province during 1995-1998. Aromatic plants were recognized based on different references and native people. These species were collected by traveling to the various parts of Hormozgan province and noted some information about species such as Persian, local, scientific and family names, geographical distribution, habitat, altitude, companion species, average annual rainfall and temperature. The 113 species were determined that belonged to 70 genus and 31 families. From these, 26 were trees, 9 shrub, 24 bushes and 54 herbaceous. Meanwhile 80 species were native, 31 species were often used by people in province's rural areas. 15 species were not found in references as a medicinal herb and 12 species are exported to Arabic countries. These plants grow at coastal to mountainous areas of Hormozgan Province from 10-3000 m above sea level in a warm and dry climate. Meanwhile mean annual rainfall average and temperature are 150-300 mm and 17.5-27.5 degree centigrade respectively.

**Key words:** Ecology, Aromatic plants, Hormozgan Province.