

مطالعه تنوع در برخی از صفات زراعی و آناتومیکی در توده‌های محلی سیاه دانه خراسان

مهدى فراوانی^۱، سید علیرضا رضوى^۱ و محمد فارسى^۲

e-mail:faravani@yahoo.com

- دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بیست و هشت توده سیاهدانه از نقاط مختلف خراسان در طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۷۶ جمع آوری و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت گردیدند. در طی فصل رشد یادداشت برداری از صفات مختلف مورفولوژیکی انجام گردید و جهت بررسی آناتومیکی تعداد دستجات آوندی، اقطار آوندهای چوب و آبکش و صفات مختلف زراعی نمونه برداری صورت گرفت. توده‌های سیاهدانه از نظر ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، تعداد انشعباهای ساق، وزن کپسول، تعداد روزنه، تعداد دستجات آوندی و اقطار آوند چوب-آبکش تفاوت معنی‌دار ($P < 0.05$) داشتند. اما، از نظر شاخص برداشت، تعداد دانه در کپسول و وزن تک بوته درسطح ۵٪ تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت. از میان صفات مورد بررسی، عملکرد بیولوژیکی، HI و تعداد انشعباب ساقه با $R^2 = 0.977$ تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود. شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی بیشترین توارث پذیری و بازده ژنتیکی را داشتند و بنابراین در گرینش و اصلاح نباتات بایستی مد نظر قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: سیاهدانه، صفات زراعی، توده‌های محلی

ارقام با خصوصیات کمی و کیفی برتر بر خوردار است
(فراوانی و فارسی، ۱۳۷۸).

مقدمه

سیاهدانه با نام علمی *Nigella sativa* از خانواده آلاله بوده و پوشیده از کرکهای ظریف با برگهای منقسم به تقسیمات باریک و نخی شکل و گلهایش منفرد و به رنگ سفید که در بیشتر نواحی اروپا، آسیا و از جمله ایران در منطقه اراک به صورت طبیعی می‌روید، همچنین به صورت پرورشی در خراسان و اصفهان کشت می‌گردد. سیاهدانه دارای ۴۰-۳۰ درصد روغن، ۱/۵-۰/۵ درصد اسانس، قندهای مختلف، مواد صمغی، آلبومینوئیدی، نیزلین، پروتئین ۲۰/۸۵ درصد، اسیدهای چرب، اسید آمینه و آلکالوئیدها می‌باشد (میر حیدر، ۱۳۷۳) و (Rathee et al., 1978). شناخت کافی از سیتوژنتیک گیاه و نحوه انتقال صفات و چگونگی ارتباط و همبستگی ساده و چندگانه صفات از اهمیت به سزاوی در انتخاب

این آزمایش طی سالهای ۱۳۷۶-۷۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان انجام شد. در سال اول ۲۸ توده از نقاط مختلف خراسان جمع آوری شد و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در طی مراحل رشد نمونه برداری جهت بررسیهای گیاه شناسی صورت گرفت و بر روی ۳۰ بوته صفات مختلف مورفولوژیکی اندازه گیری شد. جهت بررسی تعداد روزنه و دستجات آوندی از اپیدرم برگ و مقطع برداری و رنگ آمیزی مضاعف، کارمن زاجی و آبی متیل استفاده شد (هوشیار، ۱۳۶۸). جهت بررسی

عملکرد دانه نیز در توده‌های مختلف داری تفاوت‌های معنی‌داری در سطح یک درصد بود، به طوری که ۱۲/۹۸ تا ۴۲ گرم دانه در متر مربع متغیر بوده و تعداد انشعبابهای ساقه، ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیکی با عملکرد دانه همبستگی مشتبی داشته، همچنین این رابطه با تعداد روزنه مثبت بوده است (جدولهای ۱ و ۲).

همچنین میان توده‌های مختلف، اختلاف معنی‌داری از نظر عملکرد بیولوژیکی در سطح احتمال یک درصد وجود داشت (جدول ۱). تغییرات عملکرد بیولوژیکی از ۲۷/۴۱ تا ۶۶/۶۵ گرم در متر مربع بوده و صفات ارتفاع بوته و وزن هزار دانه با عملکرد بیولوژیکی همبستگی مشتبی و معنی‌دار ($P < 0.05$) داشته و این رابطه همبستگی در صفات شاخص برداشت و تعداد روزنه منفی بوده است. بالاترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی $= 0.849$ می‌باشد.

توده‌ها از نظر وزن هزار دانه نیز اختلاف معنی‌دار ($P < 0.01$) داشتند (جدول ۱) و دامنه وزن هزار دانه در توده‌های مورد بررسی از ۱۱/۶۲۵ تا ۲/۸۵ گرم تغییر نموده و همبستگی مشتبی و معنی‌داری ($P < 0.01$) با صفات عملکرد بیولوژیکی، تعداد انشعبابهای ساقه، تعداد و وزن کپسول نشان داد (جدول ۲).

آناتومیکی ابتدا از هر جمعیت به تعداد ۱۰۰ بذر انتخاب و پس از جوانه زنی بذرها ۲۰ ریشه چه ۱/۵ تا ۲ سانتیمتری را از هر جمعیت انتخاب نموده و با کلشی سین، هیدروکسی کینولین و آلفا برموفتالین تیماردهی شدند. جهت تثیت میتوz از ترکیب یک قسمت اسید استیک خالص و سه قسمت الكل اتیلیک خالص استفاده شد.

نتایج

بر اساس مشاهدات سیتوژنتیکی گونه *Nigella sativa* دیپلولئید و دارای ۲۴ عدد کروموزوم ریز و درشت می‌باشد ($2n=2x=24$).

تجزیه واریانس نشان داده که تفاوت معنی‌داری را میان ۲۸ توده سیاهدانه مورد بررسی از نظر ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، تعداد انشعبابهای ساقه، تعداد دانه در کپسول، وزن هرگیاه، تعداد روزنه، تعداد دستجات آوندی، قطر آوند چوب - آبکش، عملکرد بیولوژیکی و دانه تفاوت معنی‌داری نشان داد. اما از نظر شاخص برداشت، تعداد دانه در کپسول و وزن گیاه اختلاف معنی‌داری مشاهد نگردید (جدول ۱).

جدول ۱- تجزیه واریانس چهارده صفت در توده‌های محلی سیاهدانه خراسان

متابغ تغییر آزادی ارتفاع بوته (سانتیمتر)	درجه	عملکرد بیولوژیکی (گرم در متر مربع)	وزن هزاردانه (گرم)	شناخت برداشت	آشنایی انشعبابهای ساقه	آشنایی کپسول	آشنایی در هر کپسول	آشنایی در روزنه	آشنایی در قطر آوند	آشنایی دستجات آبکش	آشنایی آوندی (میکرون)	میانگین مربعات	
												تعداد	تعداد
تکرار	۳	۷۱/۹۸۲ns	۶۵۶۲/۲۰۲**	۰/۲۶ns	۳۵/۲۸۷**	۰/۴۳۸ns	۰/۰۲۴۸*	۳/۵۳۸*	۱۰/۶۹۴**	۷۳۵۳**	۹۷/۶۷۶**	۷/۳۴۵**	۲۸/۴۲۶**
تیمار	۲۷	۲۷۴/۵۱۹**	۱۱۰۹۲/۰۹۵**	۰/۳۶۲**	۳/۸۲۰**	۱۷/۸۶۴۹ns	۱/۰۱ns	۰/۲۲۱**	۳/۸۲۰**	۳۱/۳۶۲**	۴/۲۷۶۰**	۵/۱۲۸ns	۱۷/۱۹۱**
خطا	۸۱	۱۱۶۵/۷۵۲	۰/۱۱۹	۷/۸	۱۰/۵۶۲	۱/۲۷۸	۰/۰۸۱	۰/۹۷۵	۴/۳۸۸	۱/۶۷۸	۱۵/۵۷۹	۰/۸۳۵	۲/۴۵۷
کل	۱۱۱	۲۲/۵	۱۴/۹۱	۲۱/۰۲	۱۵/۹۲	۲۱/۷۵	۲۲/۳۹	۲۳/۳۹	۱۵/۹۲	۲۱/۰۲	۲۱/۱۹	۱۴/۳۳	۸/۸۴
ضریب	۹/۵۲	۲۲/۵	۱۴/۹۱	۲۱/۰۲	۲۱/۷۵	۲۱/۰۲	۲۲/۳۹	۲۳/۳۹	۲۳/۳۹	۲۱/۰۲	۲۱/۱۹	۱۴/۳۳	۸/۸۴
تغییرات	۱۲/۹۲	۱۸/۳۴	۳۹/۸۰	۳۹/۸۰	۳۹/۸۰	۳۹/۸۰	۳۹/۸۰	۳۹/۸۰	۳۹/۸۰	۳۹/۸۰	۳۹/۸۰	۱۹/۹۲	۱۳/۶۹
(CV%)													

*، ** و ns به ترتیب بیانگر معنی‌دار شدن در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد و عدم معنی‌دار شدن را در سطح ۵ درصد می‌باشد.

جدول ۲- بررسی همبستگی چهارده صفت در توده‌های محلی سیا هدانه خراسان

*** و NS به ترتیب بیانگر معنی دار شدن در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد و عدم معنی دار شدن را در سطح ۵ درصد می‌باشد.

ارتفاع بوته نیز در میان توده‌ها متفاوت ($P < 0.05$) بود و میزان آن از $220/2$ تا $33/55$ سانتیمتر متغیر بود. همبستگی مشت و معنی‌داری ($P < 0.05$) نیز بین این صفت با عملکرد بیولوژیکی، تعداد انشعابهای ساق، تعداد و وزن کپسول در بوته وجود داشت (جدولهای ۱ و ۲). توده‌های مورد بررسی از نظر صفات آناتومیکی نیز اختلافای نشان دادند. تعداد روزنه از 6 تا 15 عدد متفاوت بود و همبستگی آن با قطر آوند چوبی و آبکش مشت بود. تعداد دستجات آوندی از $13/5$ تا $23/25$ متفاوت بود و با افزایش عمر گیاه و قطر ساقه مقادیر قطر آوندی نیز افزایش یافت.

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه کلاستر 28 توده را می‌توان به 7 گروه بر حسب خویشاوندی بیشتر تقسیم نمود.

دامنه تغییرات شاخص برداشت در بین تودهها ۱۵/۵۱ تا ۲۴ بوده که اختلاف تودهها از نظر این صفت معنی دار نبوده است (جدول ۱).

میان توده‌ها در سطح ۵٪ از نظر تعداد دانه در کپسول و وزن بوته اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید، ولی اختلاف توده‌ها برای صفات تعداد کپسول در بوته ۲/۹ تا ۶/۶ عدد و وزن کپسول ۰/۶ تا ۰/۷ معنی‌دار بود (جدول ۱).

تودههای مختلف سیاهدانه دارای تعداد انشعبابهای متفاوتی ($P < 0.01$) بوده (جدول ۱) و همبستگی این صفت با ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، دانه در کپسول، تعداد کپسول، وزن کپسول و وزن بوته مثبت و معنی‌دار ($P < 0.05$) بود (جدول ۲).

سهم معنی‌داری از تغییرات متغیرهای وابسته را به خود اختصاص داده اند (جدول ۱).

$$y = 163559 + 0.1794x^1 + 1/13187x^2 - 2/12545x^3$$

x^3 = وزن هزاردانه

x^2 = شاخص برداشت

بررسی رگرسیون صفات نشان داد که فقط سه صفت عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و وزن هزاردانه معادله رگرسیونی عملکرد دانه (جدول ۳) :

x^1 = عملکرد بیولوژیکی

جدول ۳- صفات وارد شده در معادله عملکرد دانه به روش رگرسیون جلو روند

T	خطای استاندارد	ضریب رگرسیون	صفت وارد
۲۹/۸۸۹	۰/۰۰۶۰۰۳	۰/۱۷۹۴۲۹	عملکرد بیولوژیکی
۷/۵۴۶	۰/۱۵۰۰۰۳	۱/۱۳۱۸۷۷	شاخص برداشت
-۲/۵۴۵	۰/۸۳۵۱۹۵	-۲/۱۲۵۴۴۸	وزن هزاردانه

بحث

سپاسگزاری

از مسئولان محترم مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی خراسان و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و جانب آفای دکتر سعید خاوری خراسانی تقدیر و تشکر می‌گردد.

منابع مورد استفاده

- فراوانی، م.، فارسی، م.، ۱۳۷۸. بررسی خصوصیات زراعی و بعضی از صفات سیتوژنتیکی و تنوع ژنتیکی در توده‌های سیاهدانه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزی.
- میرحیدر، ح.، ۱۳۷۳. معارف گیاهی، کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماریها. جلد ۵، نشر فرهنگ اسلامی، ۵۲۷ صفحه.
- هوشیار، آ.، ۱۳۶۸. روش‌های آزمایشگاهی در گیاهشناسی. انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۵۷ صفحه.
- Rathee, P.S., Mishara, Sh. and Kaushal, R., 1987. Activity of essential oil, fixed oil and saponifiable matter of *Nigella sativa* L., Indian Journal of Pharmacy, Sci. 44: 8-10.

صفات عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، قطرآوند آبکش و تعداد روزن دارای بالاترین میزان توارث پذیری بوده که این خود به علت اختلاف کم تغییرات ژنتیکی و فنتیپی می‌باشد و یا به دلیل تاثیر پذیری پایین نسبت به شرایط محیطی می‌باشد و می‌توانند به عنوان صفات قابل قبول برای انتخاب در نظر گرفته شوند. صفات شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی دارای همبستگی بالا با عملکرد دانه و بیشترین پراکنش را در میان کلیه صفات مورد بررسی داشته است که این امر دلیلی بر صحت انتخاب مناسب این صفات می‌باشد. به طورکلی از میان کلیه صفات بیشترین ضریب تغییرات فنتیپی مربوط به وزن خشک بوته ۵۰/۳۹۳۵ که یک صفت مورفو‌بیولوژیکی است و کمترین ضریب تغییرات فنتیپی مربوط به صفت ارتفاع بوته ۱۲/۹۲ و بیشترین ضریب تغییرات ژنتیکی مربوط به صفت عملکرد بیولوژیکی ۳۲/۸۲۹۶ و کمترین آن مربوط به تعداد کپسول در بوته ۳/۸۴۸۹ می‌باشد. این امر توجیه کننده این است که "حتماً" می‌بایست اختلاف معنی‌دار بالایی بین عملکرد ژنتیپ‌های مختلف در توده‌های سیاهدانه وجود داشته باشد.

Study of Variation in Some Agronomic and Anatomic Characters of *Nigella sativa* Landraces in Khorasan

M. Faravani¹, A.R. Razavi¹ and M. Farsi²

1- Khorasan Agricultural & Natural Resources Research Center, P.O.Box: 91735-488, Mashhad, Iran
e-mail:faravani@yahoo.com

2- Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Abstract

The 28 landraces of *Nigella sativa* were collected from Khorasan province in 1997-1999 and cultivated in the randomized complete blocks design. Morphological and anatomic characters were analyzed during the plant growth and other agronomic characters were measured after harvesting. Significant differences ($P<0.01$) were observed in plant height, weight of 1000 kernel, seed yield, number of stem branches, vascular bundles, weight of capsule and xylem and phloem diameter were significant at $P<0.01$. Only biological yield, harvest index (HI) and stem branches with $R^2=0.977$ confirmed the seed yield variation. Biological yield, HI and stem branches had maximum inheritability and genetic efficiency.

Key words: *Nigella sativa*, agronomic, anatomic, variation.