

تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (*Mentha piperita L.*) بر توان هوایی و زمان رسیدن به آستانه بیهوایی در مردان ورزشکار

مرتضی دشتی^۱، محمدعلی آذربایجانی^{*}^۲ و محمدباقر رضایی^۳

۱- کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

۲- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

۳- دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

*نویسنده مسئول پست الکترونیک: ali.azarbayjani@gmail.com

تاریخ پذیرش: اسفند ۸۶

تاریخ اصلاح نهایی: اسفند ۸۶

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۸۶

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (*Mentha piperita L.*) بر توان هوایی و زمان رسیدن به آستانه بیهوایی مردان ورزشکار طراحی و اجرا شد. بدین منظور ۲۰ ورزشکار مرد (با میانگین سنی ۲۰ ± 4 سال، قد ۱۷۵ ± 5 سانتی متر، وزن $۶۸\pm 4/2$ کیلوگرم و $\text{VO}_{2\text{max}}^{3/4} = ۴۳/۲۱\pm 3$ میلی لیتر برای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه ۱۰ نفری تجربی (استنشاق اسانس الکلی نعناع) و گروه کنترل (استنشاق ترکیب آب و الکل) تقسیم شدند. ابتدا آزمودنیهای گروه تجربی به مدت ۳۰ دقیقه ترکیبی از اسانس نعناع و الکل سفید را استنشاق کردند. سپس از آنها آزمون کانکانی و بعد از یک استراحت ۱۵ دقیقه‌ای، آزمون بروس گرفته شد. گروه کنترل نیز در شرایط مشابه تمرین نمودند، با این تفاوت که ترکیب آب و الکل را استنشاق نمودند. برای مقایسه عملکرد هوایی و بیهوایی آزمودنیها در پیش آزمون از آزمون t برای گروههای مستقل و برای بررسی تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک طرفه استفاده شد. سطح معنی داری برای تمام مراحل محاسباتی ($P \leq 0.05$) در نظر گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد استنشاق اسانس الکلی نعناع با غالظتها مختلف موجب افزایش معنی دار در توان هوایی ($p \leq 0.013$) و افزایش معنی دار در زمان رسیدن به آستانه بیهوایی شد ($p \leq 0.012$). تفاوت معنی داری در زمان مشابه در عملکرد جسمانی گروه کنترل مشاهده نشد. بهبود مشاهده شده در عملکرد جسمانی متعاقب استنشاق اسانس الکلی نعناع ممکن است به دلیل افزایش در حجم و ظرفیت ریوی و افزایش کارایی تنفسی و تحریک سیستم عصبی سمپاتیکی باشد. براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، ورزشکاران می‌توانند برای توسعه عملکرد جسمانی از استنشاق اسانس نعناع استفاده نمایند.

واژه‌های کلیدی: توان هوایی، زمان رسیدن به آستانه بیهوایی، مردان ورزشکار، اسانس نعناع.

اما بر تعداد شوت آزاد بسکتبال اثر معنی‌داری ندارد (Wright *et al.*, 1997). در مطالعات اخیر تأثیر استنشاق ترکیبی‌های معطر طبیعی استخراج شده از گیاه نعناع بر Burton, عملکرد و توانایی افراد بررسی شده است (Burton, 1993)، ولی به دلیل تفاوت‌های روش شناختی نتایج مطالعات انجام شده در این حیطه متناقض است. از طرف دیگر، در خصوص تأثیر این ترکیبها بر عملکرد جسمانی کمبود اطلاعات محسوس است. به همین دلیل، مطالعه حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال که آیا استنشاق انسانس نعناع می‌تواند عاملی برای افزایش توان و کاهش خستگی در ورزشکاران شود؟ و یا اینکه تأثیر استنشاق انسانس نعناع بر توان هوایی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوایی ورزشکار مرد چگونه است؟ طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها آزمودنیها

تعداد ۲۰ نفر از ورزشکاران مرد ۱۶ تا ۲۴ سال شهر ایلام به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه‌ها، لیست کلیه ورزشکاران ۱۶ تا ۲۴ سال شهر ایلام تهیه شد. سپس اسامی ورزشکاران شماره‌گذاری گردید. پس از قرعه‌کشی بین شماره‌های موجود ۲۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. به گونه‌ای که شناس انتخاب برای هر یک برابر بود. پس از انتخاب آزمودنیها طی جلسه‌ای اهداف و روش پژوهش به تفصیل توضیح داده شد و آزمودنیها فرم رضایت‌نامه کتبی را امضاء نمودند. لازم به یادآوری است که کلیه آزمودنیها در زمان پژوهش سالم بوده و تحت درمان دارویی نبودند. ویژگی‌های عمومی آزمودنیها در جدول ۱ ارائه شده است.

مقدمه

موفقیت و پیروزی در رقابت‌ها و فعالیتهای ورزشی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله تمرين و ویژگی‌های ژنتیک باشد. تغذیه مناسب و استفاده از مواد نیروزای مجاز از جمله عوامل دیگری است که می‌تواند کارایی و عملکرد (Performance) افراد را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، استفاده از مکمل‌های کراتین، کربوهیدرات و بی‌کربنات سدیم موجب بهبود عملکرد ورزشکاران سرعتی می‌شود، یا استفاده از کافئین ممکن است باعث افزایش کارایی ورزشکاران استقامتی گردد (جی‌مون، ۱۳۸۰).

استفاده از ترکیبی‌های معطر طبیعی (Atheroleum) یکی از روشهایی است که می‌تواند به عنوان یک ماده نیروزا (Ergogenic) جهت افزایش توانایی و عملکرد افراد مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات اخیر در این مورد نشان داده که این ترکیبها تأثیرهای متفاوتی بر عملکرد سیستمهای فیزیولوژیک دارد. برای مثال، مensus شدن مجرای تنفسی و افزایش عملکرد ریه‌ها پس از استنشاق انسانس نعناع گزارش شده است (Raudenbush, 2000). همچنین محركی جهت افزایش انرژی برای ورزشکاران و غیر ورزشکاران در طول تمرين باشد. به عبارت دیگر، انسان نعناع ممکن است به عنوان یک ماده نیروزا در نظر گرفته شود (Burton, 1993). تحقیق دیگری نشان داده که استنشاق انسانس اسطوخودوس موجب کاهش تنفس و آرامش عضلانی قبل از مسابقه می‌شود (Buckle, 1998). در پژوهش دیگری گزارش شده، استنشاق انسانس نعناع باعث افزایش سرعت دوندگان در دو ۴۰۰ متر، افزایش قدرت پنجه دست و افزایش تعداد دراز و نشست می‌شود.

جدول ۱- مشخصات عمومی آزمودنیها

مشخصات عمومی	مقدار
* سن	۲۰±۴ سال
قد	۱۷۵±۵ سانتی متر
وزن	۶۸±۴/۲ کیلوگرم
حداکثر اکسیژن مصرفی	۴۳/۲۱±۳/۴۳ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه

* اطلاعات براساس میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده است.

اسانس مورد استفاده و روش اسانس‌گیری

مقدار ۵۰۰ گرم برگ تازه گیاه نعناع فلفلی (*Mentha L. pipertia*) به صورت دست‌کاشت از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور)، در اوایل سال ۸۲ جمع‌آوری شد. سپس به روش تقطیر با بخار آب به مدت یک ساعت اسانس‌گیری بعمل آمد. اسانس این گیاه در حالت تازه بی‌رنگ و دارای طعم و بوی تندی است، ولی به مرور زمان رنگ زرد مایل به سبز پیدا می‌کند و طعم و بوی آن در صورت رقیق شدن مطبوع می‌گردد. در آب به مقدار بسیار کم حل می‌شود.

تجزیه با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)

از کروماتوگراف گازی مدل GC 9-Ashimadzu دتکتور FID (یونیزاپیون با شعله هیدروژن) و داده‌پرداز Chromatopac C-R3A استفاده شد. ستون دستگاه از نوع DB-5 (که ستونی غیرقطبی است) به طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر و ضخامت لایه فاز ساکن برابر ۰/۰۲۵ میکرون بود. برنامه حرارتی ستون DB-5 دو مرحله‌ای استفاده شده است، در مرحله اول از ۷۰ درجه سانتی‌گراد تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت افزایش دمای ۱/۵ درجه سانتی‌گراد در دقیقه انجام گردید و در مرحله دوم از ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت افزایش دمای ۲ درجه سانتی‌گراد در دقیقه انجام گردید.

طرح پژوهش

با توجه به ماهیت پژوهش و کنترل عوامل اثرگذار محیطی بر نتایج و جهت بدست آوردن اثر خالص اسانس الكلی نعناع بر عملکرد جسمانی، ابتدا حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیها بر اساس آزمون بروس تعديل شده مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. با استفاده از داده‌های بدست آمده از این آزمون، آزمودنیها در دو گروه ده نفری (گروه تجربی و گروه کنترل) قرار داده شدند. به طوری که پاسخهای پیش‌آزمون توان هوازی ($VO_{2 \text{ max}}$) گروه تجربی و کنترل یکسان بود ($t = 0/20, df=18, p \leq 0/469$) و نشان می‌دهد تفاوت معنی‌دار بین دو گروه وجود نداشته و دو گروه دارای میانگین و واریانس یکسانی می‌باشند. در واقع، این اطلاعات نشان دهنده همگنی گروهها می‌باشد. گروه تجربی، اسانس الكلی نعناع را هنگام فعالیت استنشاق نمودند و گروه کنترل در شرایط مشابه از دارونما که در این مطالعه اتانول و آب مقطر بود استنشاق کردند. با توجه به اینکه اسانس نعناع دارای ترکیب‌های معطر طبیعی است و از غلظت بالایی برخوردار است، استنشاق این اسانس ممکن است باعث سردرد، سرگیجه و سوزش در ناحیه بینی گردد. به همین دلیل جهت رقیق نمودن اسانس از اتانول (۹۸ درصد) استفاده گردید (شوالیه، ۱۳۶۵).

شناسایی طیف به کمک شاخصهای بازداری آنها با تزریق هیدروکربونهای نرمال (C7-C25) تحت شرایط یکسان، یا تزریق اسانس و توسط برنامه رایانه‌ای نوشته شده به زبان Basic محاسبه گردیده‌اند. بنابراین مقایسه آنها با مقادیری که در منابع مختلف منتشر گردیده و نیز با استفاده از طیف‌های جرمی ترکیب‌های استاندارد و استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانه ترپن‌وییدها در رایانه دستگاه GC/MS تأیید شده است. محتوا و غلظت ترکیب‌های موجود در اسانس نعناع مورد استفاده در این مطالعه، در جدول ۲ ارائه شده است.

تجزیه با دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS)

دستگاه کروماتوگراف گازی مدل Varian-3400 متصل شده به دستگاه طیف‌سنج جرمی II، با سیستم تله یونی و با انرژی یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت بود. ستون مورد استفاده، مانند ستون بکار برده شده در دستگاه GC بود. درجه حرارت ۴۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت افزایش ۴ درجه سانتی‌گراد در دقیقه، درجه حرارت محفظه تزریق ۲۶۰ درجه سانتی‌گراد و دمای ترانسفر لاین ۲۷۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم گردید.

جدول ۲- تجزیه شیمیایی اسانس *Mentha pipertia L*

ردیف	نام ترکیب	شاخص بازداری	درصد (%)
۱	tricyclene	۹۲۸	۰/۶
۲	verbanone	۹۶۶	۱/۷
۳	sabinene	۹۷۷	۳/۳
۴	p-cymene	۱۰۲۲	۱۰/۳
۵	γ-terpinene	۱۰۵۸	۰/۵
۶	n-octanol	۱۰۹۲	۰/۷
۷	isopulegol	۱۱۴۵	۱۷/۶
۸	menthone	۱۱۵۵	۲۲/۷
۹	isomenthone	۱۱۶۳	۲۲/۰
۱۰	isopinocampheol	۱۱۸۱	۰/۵
۱۱	cis-carveol	۱۲۳۰	۱۸/۰
۱۲	isobornyl acetate	۱۲۸۷	۰/۷
۱۳	Z-caryophyllene	۱۴۰۸	۰/۷
۱۴	n-dodecanol	۱۴۷۱	۰/۵
۱۵	n-hexadecanol	۱۸۹۰	

کاروئول (۱۸/۰٪) و پارا-سیمن (۱۰/۳٪) بوده که در مجموع ۹۰/۷٪ درصد از کل اسانس را تشکیل می‌دادند.

اطلاعات جدول ۲ نشان می‌دهد ترکیب‌های اصلی اسانس نعناع فلفلی مورد استفاده در این پژوهش، شامل ستون -ایزو-متون (۲۲/۱٪)، ایزو-پولکول (۱۷/۶٪)، سیس-

اقدامات انجام شده در دوره اول به صورت یکسان در دوره دوم و سوم نیز انجام شد.

تعیین اثر مخلوط آب مقطر و اتانول در گروه کنترل
جهت جلوگیری از اثر سوءگیری (Bias) آزمودنیها، از طرح یک سو کور استفاده شد. به همین دلیل، کلیه اقدامات انجام شده برای گروه تجربی به طور یکسان برای گروه کنترل نیز تکرار گردید. تنها تفاوت بین دو گروه، جایگزین کردن آب مقطر به جای اسانس نعناع در گروه کنترل بود. به عبارت دیگر در گروه کنترل در هر سه دوره، ترکیبی از آب مقطر و اتانول را استنشاق کردند (دوره اول: یک میلی لیتر آب مقطر و ۲ میلی لیتر الكل سفید، دوره دوم: ۲ میلی لیتر آب مقطر و ۴ میلی لیتر الكل سفید، دوره سوم: ۳ میلی لیتر آب مقطر و ۶ میلی لیتر الكل سفید).

سنجهش عملکرد جسمانی

آستانه بی هوایی به شدتی از فعالیت بدنی اطلاق می شود که سیستم هوایی قادر به تأمین انرژی برای بازسازی ATP نمی باشد (Floria & Mareev, 1993).

هرچه زمان رسیدن به این آستانه بیشتر باشد نشان دهنده آمادگی فرد می باشد، زیرا می تواند با شدت بیشتری فعالیت نماید و از سیستم هوایی برای تأمین انرژی استفاده نماید. از آنجائی که ضربان قلب رابطه بسیار تنگاتنگی با شدت تمرين دارد، در این آزمون شدت دویلن به صورت مرحله ای افزایش می یابد. زمانی که ضربان قلب آزمودنی به سطح بالا رسید دستگاه به صورت خودکار فعالیت را قطع می کند. زمان بدست آمده بر مبنای دقیقه، نشان دهنده زمان رسیدن به آستانه بی هوایی می باشد. زمان رسیدن به آستانه بی هوایی آزمودنیها با استفاده از آزمون کانکانی و روی نوار گردن الکترونیکی مدل 1200 HC مارک تکنوجیم ساخت کشور

تعیین اثر ترکیب اسانس نعناع و اتانول در گروه تجربی جهت یافتن اثر استنشاق غلظتهاي مختلف اسانس الکلى نعناع، آزمودنیهاي گروه تجربی طی سه دوره غلظتهاي مختلف اسانس نعناع و اتانول را در شرایط یکسان استنشاق کردند (به ازای هر واحد اسانس نعناع، ۲ واحد اتانول ۹۸٪).

دوره اول (اسانس نعناع = ۱ میلی لیتر، اتانول = ۲ میلی لیتر)
در این مرحله که یک هفته پس از انجام پیش آزمون برگزار شد، آزمودنیهاي گروه تجربی (به صورت تک تک) به مدت ۳۰ دقیقه در اتاقی به مساحت ۱۲ متر مربع حضور یافته و ترکیبهاي معطر اسانس نعناع و اتانول را استنشاق کردند. در این دوره میزان اسانس نعناع، یک میلی لیتر و میزان اتانول، ۲ میلی لیتر تعیین شد که به وسیله دستگاه پمپ کننده در فضای اتاق پمپ شد. دستگاه پمپ کننده در هر دقیقه ۱۵ لیتر هوای حاوی ترکیبهاي معطر اسانس نعناع و اتانول را به فضای اتاق پمپ می نمود. به عبارت دیگر، هر آزمودنی در محیطی قرار می گرفت که ۴۵۰ لیتر هوای حاوی ترکیبهاي معطر در آن پمپ شده بود. از طریق فن کوچکی که در داخل اتاق نصب شده بود، هوای حاوی ترکیبهاي معطر به صورت تقریباً یکسان در فضای اتاق پراکنده می شد. پس از پایان مدت زمان ۳۰ دقیقه ای، آزمودنی از اتاق آزمایش خارج شده و به مدت ۲ دقیقه با حرکات کششی ساده و یکنواخت بدن خود را گرم نمود. ابتدا از هر آزمودنی، آزمون کانکانی گرفته شد. سپس آزمودنی، ۱۵ دقیقه استراحت کرده و پس از این مرحله از وی آزمون بروس گرفته شد.

در دوره دوم از ترکیب ۲ میلی لیتر اسانس نعناع و ۴ میلی لیتر اتانول و در دوره سوم از ترکیب ۳ میلی لیتر اسانس نعناع و ۶ میلی لیتر اتانول استفاده شد. کلیه

One-way analysis of variance for repeated measures) استفاده شد. در صورت مشاهده تفاوت معنی دار در مراحل مختلف اندازه گیری، جهت مشخص نمودن محل تفاوت از آزمون تعقیبی شفه (Scheffe's post-hoc) استفاده شد. سطح معنی داری برای تمام مراحل محاسباتی $P \leq 0.05$ در نظر گرفته شد.

نتایج


اولین یافته بدست آمده نشان داد استنشاق غلظتهاي مختلف انسانس الكلی نعناع موجب افزایش معنی دار در توان هوایی می شود ($F_{3,27} = 4/32, P \leq 0.013$). با توجه به محاسبه انجام شده توان آزمون ۸۱٪ بود که با توجه به رنج استاندارد، این آزمون از توان قابل قبولی برخوردار است. همچنین میزان تأثیر استنشاق انسانس الكلی نعناع بر توان هوایی ۳۲٪ بود که نشان دهنده اثر متوسط این عامل بر توان هوایی می باشد. آزمون شفه نشان داد منشأ تفاوتهاي مشاهده شده، بین مقادير بدست آمده در توان هوایی پیش آزمون با مقادير بدست آمده پس از استنشاق ۱ میلی لیتر انسانس ($P \leq 0.039$) و ۲ میلی لیتر انسانس ($P \leq 0.023$) می باشد. در حالی که استنشاق ۳ میلی لیتر انسانس تأثیری بر عملکرد هوایی نداشت ($P \leq 0.052$). در شرایط مشابه، تفاوت معنی داری در توان هوایی گروه کترول دیده نشد ($F_{3,27} = 0/474, P \leq 0.474$). جهت درک بهتر، تغییرات توان هوایی در شکل ۱ ارائه شده است.

ایتالیا، مورد سنجش قرار گرفت. این آزمون، اکسیژن مصرفی آزمودنی در آستانه بی هوایی و زمان رسیدن به آستانه بی هوایی را مورد سنجش قرار می دهد. زمان رسیدن به آستانه بی هوایی در دقیقه محاسبه می شود (بوم گارتner و جکسون، ۱۳۷۶).

توان هوایی یا حداکثر اکسیژن مصرفی ($\text{VO}_2 \text{ max}$) نیز توسط آزمون تعديل شده برووس روی نوار گردان اندازه گیری شد. هر یک از آزمودنیها روی نوار گردان با استفاده از دستور العمل برووس تا سرحد خستگی دویدند. سرعت نوار گردان در آغاز آزمون ۱/۶ کیلومتر در ساعت و شیب ۱۰٪ بود که هر سه دقیقه بر سرعت و شیب دستگاه افروده می شد. حداکثر اکسیژن مصرفی، یکی از بهترین روش‌های اندازه گیری استقامت قلبی، تنفسی و آمادگی هوایی ورزشکاران است. به طور کلی، حداکثر اکسیژن مصرفی در رابطه با وزن بدن و به صورت میلی لیتر اکسیژن به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه ($\text{ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) بیان می شود .(McInnis & Balady, 1994)

مدل آماری

در این پژوهش برای طبقه‌بندی و ترتیب داده‌ها از آمار توصیفی، برای بررسی میانگین پیش آزمونهای گروه تجربی و کنترل از آزمون t ، برای گروه‌های مستقل و برای بررسی تأثیر استنشاق غلظتهاي مختلف انسانس الكلی نعناع (گروه تجربی) و دارونما (گروه کنترل) از تحلیل یک طرفه واریانس با اندازه گیریهای مکرر



شکل ۱- توان هوایی آزمودنیهای گروه تجربی و کنترل


اطلاعات براساس میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده است.

*، تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل

**، تفاوت معنی دار نسبت به پیش آزمون

مشاهده شده، بین مقادیر بدست آمده در زمان رسیدن به آستانه بی هوایی پیش آزمون با مقادیر بدست آمده پس از استنشاق ۱ میلی لیتر اسانس ($P \leq 0/006$) و ۲ میلی لیتر اسانس ($P \leq 0/001$) می باشد. در حالی که استنشاق ۳ میلی لیتر اسانس تأثیری بر زمان رسیدن به آستانه بی هوایی نداشت ($P \leq 0/16$). در شرایط مشابه تفاوت معنی داری در زمان رسیدن به آستانه بی هوایی گروه کنترل دیده نشد رسیدن به آستانه بی هوایی (۲/۰۲۷، $P \leq 0/134$). جهت درک بهتر تغییرات زمان رسیدن به آستانه بی هوایی شکل ۲ ارائه شده است.

یافته دیگر این مطالعه نشان داد استنشاق غلظتهاي مختلف اسانس الكلی نعناع موجب افزایش معنی دار در زمان رسیدن به آستانه بی هوایی می شود ($F_{3,27}=4/43$, $P \leq 0/012$). با توجه به محاسبه انجام شده توان آزمون ۸۲٪ بود که با توجه به رنج استاندارد، این آزمون از توان قابل قبولی برخوردار است. همچنین میزان تأثیر استنشاق اسانس الكلی نعناع بر زمان رسیدن به آستانه بی هوایی ۳۳٪ بود که نشان دهنده اثر متوسط این عامل بر زمان رسیدن به آستانه بی هوایی می باشد. آزمون شفه نشان داد منشأ تفاوتهاي بی هوایی می باشد.



شکل ۲- زمان رسیدن به آستانه بی هوایی در گروه تجربی و کنترل

اطلاعات براساس میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده است.

*، تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل

**، تفاوت معنی دار نسبت به پیش آزمون

بحث

بنابراین شرکت‌کنندگان روی وظیفه محوله تمرکز کرده و بدین صورت عملکرد آنان بهبود می‌یابد.

در این راستا Bedi و همکاران (۱۹۸۸) و Signorile و همکاران (۱۹۹۲) با استنشاق سالبوتامول اثرات نیروزایی مشاهده کردند که منجر به افزایش زمان دویدن در یک فعالیت بدنی زیر بیشینه شد.

علاوه بر این، هنوز مشخص نیست کدام مکانیسم در جریان آرومترایپی بر متابولیسم بدنی تأثیر به سزایی دارد. در یک فعالیت بدنی که کمتر از ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامد، چربی بدن را نمی‌توان با توجه به نسبت تبادل تنفسی در هنگام فعالیت بدنی مشاهده شده منبعی برای تأمین انرژی دانست. زمانی که نسبت تبادل تنفسی هنگام فعالیت بدنی مشاهده شده ۰/۹۰ است، تنها ۰/۳۳ از چربیها در روند تولید انرژی شرکت می‌کنند. در حالی که در نسبت تبادل تنفسی ۰/۹۵، ۰/۱۷٪ چربی در مسیر سوخت و سازی می‌باشد، ممکن است ترکیب‌های معطر زمانی تأثیر سودمند داشته باشند که سوخت چربیها ممکن اصلی تولید انرژی بدن باشد. مدت زمان تمرین نیز ممکن است روی نتایج تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه Welker و همکاران (۱۹۹۸) نیز تأثیر معنی‌داری از آرومترایپی روی عملکرد ورزشی بدست نیاوردن، Simpson و همکاران پیشنهاد می‌کنند مدت زمان تمرین در هر جلسه باید تا ۱۲۰ دقیقه رسانده شود و شدت تمرین پایین آورده شود، در این صورت ممکن است تأثیر آرومترایپی بر عملکرد ورزشی نمایان گردد (Simpson *et al.*, 2001).

حقوقان معتقدند ترکیب‌های معطر می‌توانند عملکرد جسمانی را هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهند و اسانس نعناع باعث افزایش تمرکز

اسانس نعناع از جمله ترکیب‌های معطر طبیعی است که در آرامسازی سیستم عصبی مرکزی و درمان اختلالات تنفسی کاربرد دارد (باقرزاده، ۱۳۷۷). ترکیب‌های این اسانس باعث کاهش استرس ذهنی، خستگی و سبک‌بالی (low Spirits) می‌شود. اسانس نعناع خاصیت میکروب‌کشی داشته و در درمان عفونتها کاربرد دارد. همچنین اسانس نعناع محرك و نیروبخش بوده و در آرامسازی عضلانی مؤثر است (Knasko, 1992).

یافته‌های این مطالعه نشان داد استنشاق اسانس الکلی نعناع موجب افزایش معنی‌دار توان هوایی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوایی می‌شود. البته یافته دیگر مطالعه حاضر، تأثیر افتراقی غلط است اسانس الکلی نعناع را بر عملکرد نشان داد به‌گونه‌ای که استنشاق ۳ میلی‌لیتر بر عملکرد جسمانی تأثیر نداشت. با مقایسه نتایج بدست آمده از گروه کنترل که در شرایط مشابه انجام شد، عدم تأثیر معنی‌دار استنشاق دارونما (ترکیب آب و اتانول) بر عملکرد جسمانی، تأثیر خالص و واقعی استنشاق اسانس الکلی نعناع بر عملکرد جسمانی را مشخص نمود.

یافته‌های این پژوهش با یافته‌های Burton (۱۹۹۳)، Raudenbush و همکاران (۲۰۰۱) و Barker و همکاران (۲۰۰۳) همخوانی دارد، ولی با نتایج Welker و همکاران Goubault (۱۹۹۹)، Grimes (۱۹۹۸)، Buckle (۱۹۹۸) و همکاران (۲۰۰۱)، همخوانی ندارد. در عصر حاضر زمانی که صدمه‌های ثانیه تعیین کننده پیروزی یا باخت یک ورزشکار هستند؛ ورزشکاران نیز به دنبال راههایی برای بهبود اجرای عملکرد خود می‌باشند. حقوقان معتقدند که بوی نعناع ممکن است محركی برای توجه و تمرکز باشد،

دخالت در انقباض عضلات صاف برونشی حادث می‌گردد (Wright *et al.*, 1997). انسان نعناع باعث کاهش پراکندگی پتانسیل عمل و جریان یافتن کلسیم می‌شود و این همان اثر متول است. محققان فرض می‌کنند متول همان مکانیسمی که روی عضلات صاف ایلیوم دارد، در مورد عضلات صاف برونشی نیز داشته و از جریان یافتن کلسیم ممانعت بعمل می‌آورد. از طرفی، متول علاوه بر اثر بر عضلات صاف روی اعصاب حسی نیز تأثیر گذاشته و از این طریق دارای یک عملکرد دو طرفه است. با این حال، هیچ شاهدی مبنی بر اثر مستقیم متول بر عضلات صاف برونشی وجود ندارد (Swandulla, *et al.*, 1986).

برخی از محققان معتقدند که عوامل بسیاری نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص اثر استنشاق انسان مواد معطر بر عملکرد جسمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی از این عوامل، مدت زمان فعالیت می‌باشد. هنگامی که مدت زمان فعالیت کوتاه باشد ترکیب‌های معطر تأثیر معنی‌داری را نشان نخواهد داد (Simpson *et al.*, 2001).

با توجه به اینکه اثر متول بر بدن انسان هنوز کاملاً مشهود نیست، امامحققان اعلام کرده‌اند که استنشاق مخلوط بخارهای معطر، شامل متول قطر داخلی مجرای هوایی را در داوطلبانی که از سرماخوردگی شایع رنج می‌برند بهبود داد (Cohen & Dressler, 1982).

Raudenbush معتقد است استنشاق انسان نعناع تأثیر معنی‌داری بر ارزیابی‌های فیزیولوژیکی دستگاه تنفسی ندارد و در بعضی مطالعات از طریق افزایش انگیزه داوطلبان باعث بهبود عملکرد می‌گردد. با توجه

و بنابراین بهبود عملکرد می‌شود. یکی دیگر از مکانیسمهای احتمالی در رابطه با تأثیر متفاوت ترکیب‌های معطر این است که مثلاً عطر نعناع به طور معنی‌داری عملکرد در تکالیفی که نیاز به حفظ آگاهی هستند را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. دیگر محققان معتقدند که شاید محرکهای شنیداری و بویایی هنگام تمرین بازخوردهای ناخوشایند از عوامل محیطی و مرکزی به سیستم عصبی مرکزی را بلوك کرده و به فرد اجازه می‌دهد در هنگام دویدن احساس آرامش کند. فرضیه فیلتر کردن انتخابی ادرار و فرضیه باریک شدن توجه که توسط Broadbent (1958) ارائه شد، ممکن است توجیه کننده این ارتباط باشد. Marteniuk (1976) در تفسیر توجه انتخابی سیستم عصبی مرکزی اشاره نمود زمانی که محرکهای خوشایند شناوری یا بویایی از طریق مسیرهای اعصاب آوران (حسی) به مغز می‌رسند، محرکهای ناخوشایند ناشی از عوامل مرکزی یا موضعی در دیگر مسیرهای آوران تا حدودی مهار می‌شوند. اما در پژوهش حاضر شاید به دلیل شدت بالا و متعاقب آن مدت کوتاه اجرای تمرین فرصت تأثیر محرک بویایی در بدن بدست نیامده باشد.

انسان نعناع اثر آرامبخشی بر عضلات صاف در محیط مصنوعی و آزمایشگاهی خارج از بدن انسان دارد. هنوز مشخص نیست تحت چه شرایطی نعناع این اثر آرام بخشی را به طور کامل در بدن انسان بجا می‌گذارد (Lis-Balchin, 1997).

تحقیقات نشان داده که در یک محیط مصنوعی و آزمایشگاهی متول سبب آرام‌سازی معنی‌داری در عضلات برونشی می‌شود. همچنین متول باعث گشاد شدن نایشهای در موشها می‌گردد و این اثر از طریق

یکی دیگر از دلایل ممکن، روش استعمال اسانس می‌باشد. اینکه آزمودنی در هنگام انجام فعالیت بدنی اسانس را استنشاق کند یا مدت زمان مشخصی قبل از شروع فعالیت با هم متفاوت بوده و اثرهای مختلفی به جا خواهد گذاشت. زیرا اگر آزمودنی مدت زمانی قبل از شروع فعالیت بدنی اسانس را استنشاق کند، ممکن است محرك بویایی مدت زمان بیشتری فرصت داشته باشد تا بر عوامل فیزیولوژیک تأثیر گذارد. اما هنوز دقیقاً مشخص نیست کدام روش اثر بهینه‌ای بر اجرای فعالیت بدنی داشته باشد. در کل نتایج مطالعه حاضر نشان داد استنشاق اسانس الكلی نعناع موجب بهبود عملکرد جسمانی می‌شود. با وجود اینکه مکانیسم اصلی این تغییرات به طور کامل مشخص نیست، ولی ممکن است بهبود عملکرد جسمانی در اثر افزایش در حجم و ظرفیت ریوی، توسعه کارآیی تنفس، افزایش میزان جذب اکسیژن توسط کیسه‌های هوایی، افزایش اکسیداسیون اسید لاتکیک، کاهش استرس و هیجان و افزایش آرامش باشد.

نتایج این مطالعه نشان داد استنشاق اسانس الكلی نعناع موجب افزایش توان هوایی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوایی می‌شود. از آنجائی‌که استفاده از این اسانس مجاز می‌باشد و تأثیر جسمانی سوء ندارد، بنابراین براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه به ورزشکاران توصیه می‌شود از اثر نیروزایی این ماده برای بهبود عملکرد جسمانی استفاده نمایند. از طرف دیگر، با توجه به عوامل مختلف مؤثر بر اثر درمانی اسانس نعناع مثل نوع و غلظت اسانس و نوع، مدت و شدت فعالیت بدنی بر عملکرد جسمانی نیاز به انجام مطالعات بیشتر در مورد

به اینکه جمعی از محققان معتقدند ترکیب‌های معطر بر فیزیولوژی انسان تأثیرگذار می‌باشد، Raudenbush به این نکته اشاره کرد که اگر عملکرد ورزشکار در حد بیشینه باشد حضور ترکیب‌های معطر تأثیر اندکی بر اندازه‌های فیزیولوژیکی دارد (Raudenbush, 2000). اثرهای متفاوتی که در رابطه با تأثیر اسانس نعناع بدست می‌آید به گونه‌های متفاوت نسبت دارد، زیرا درصد مواد تشکیل دهنده اصلی اسانس در گونه‌های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، در یک گونه نعناع ایزومنتون و سپس ایزومنتول با ۲۲٪ و ۰٪ ۲۲٪ بیشترین درصد مواد مؤثره را به خود اختصاص داده‌اند؛ که باعث بوجود آمدن تفاوت معنی‌دار در توان هوایی بیشینه شد. در حالی‌که در گونه *Mentha piperita* که در مطالعه حاضر از اسانس آن استفاده شد نئو-ایزوپولگول استات با ۴۱٪ و سپس ترانس‌دی‌هیدروکاروون با ۳۹٪ بیشترین درصد ماده مؤثره را به خود اختصاص داده بودند. اختلاف دیگری که ممکن است باعث ایجاد تفاوتها در نتایج شده باشد زمان برداشت گیاه جهت اسانس‌گیری می‌باشد، زیرا این دسته از گیاهان در زمانهای متفاوت از زمان رویش دارای درصدهای مختلفی از مواد مؤثره می‌باشند. مثلاً اگر گیاه در زمان گلدهی برداشت شده باشد درصد کاروون آن بیشتر و اگر قبل از گلدهی برداشت گردد درصد متول آن بیشتر خواهد بود. غلطت اسانس مورد استفاده نیز ممکن است بر نتایج اثرگذار باشد. زیرا هر چه درصد الكل موجود در اسانس کمتر باشد میزان فرار بودن ترکیب نیز کمتر خواهد بود.

- Grimes, M., 1999. Helping behavior commitments in the presence of odors: Vanilla, Lavender and no odors. Hypertext Paper, Georgia Southern University. (Available: <http://clearinghouse.mwsc.edu/manuscripts/>).
- Knasko, S.C., 1992. Ambient odors effect on creativity, mood and perceived health. Oxford Journals of Life Science, Chemical Senses, 17(1): 27-35.
- Lis-Balchin, M., 1997. Essential oils and aromatherapy: Their modern role in inhaling. Journal of the Royal Society of Health, 117: 324-339.
- Marteniuk, R.G., 1976. Information processing in motor Skills. Rinehart and Winston, New York, USA.
- McInnis, K. and Balady, G., 1994. Comparison of submaximal exercise responses using the Bruce VS modified Bruce protocol. Medicine Science in Sports and Exercise, 26: 103-107.
- Raudenbush, B., 2000. The effects of odors on objective and subjective measures of physical performance. The Aroma-Chology Review, 9(1): 1-5.
- Raudenbush, B., Corley, N. and Eppich, W., 2001. Enhancing athletic performance through the administration of Peppermint odor. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23: 156-160.
- Signorile, J.F., Kaplan, T.A. and Applegate, B., 1992. Effects of acute inhalation of the bronchodilator, albuterol, on power output. Medicine Science in Sports and Exercise, 24: 638-642.
- Simpson, W.F., Coady, R.C., Osowski, E.E. and Bode, D.S., 2001. The effect of aromatherapy on exercise performance. Perceptual Motor Skills, 88: 756-758.
- Swandulla, D., Schafer, K. and Lux, H.D., 1986. Calcium channel current inactivation is selectively modulated by menthol. Neurosci Letter, 68: 23-28.
- Welker, A., Quinn, K. and Otto, R.M., 1998. The effects of aroma treatment on submaximal exercise. Medicine Science in Sports and Exercise, 30: 1579-1581.
- Wright, C.E., Laude, E.A., Grattman, T.J. and Morice, A.H., 1997. Capsasine and Neurokinin A-induced broncho constriction in the anaesthetized guinea-pig: evidence for a direct action of menthol on isolated bronchial smooth muscle. British Journal of Pharmacology, 121: 1645-1650.

روشن شدن اثر خالص این هر ترکیب بر عملکرد جسمانی می باشد.

منابع مورد استفاده

- باقرزاده، ک.، ۱۳۷۷. بررسی اثر NPK بر روی میزان اسанс و ترکیبات فنلی آویشن (*Thymus daenensis*). پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- بوم گارتner، ت. و جکسون، آ.، ۱۳۷۶. سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنسازی. جلد اول و دوم، ترجمه: سپاسی، ح. و نوربخش، پ.، انتشارات سمت، تهران، ۸۸۶ صفحه.
- جی‌مون، ر.، ۱۳۸۰. مواد غذایی نیروزا و عملکرد ورزشی. ترجمه: فرج‌زاده موالو، ش.، انتشارات کمیته ملی المپیک، تهران، ۶۴ صفحه.
- شوالیه، آ.، ۱۳۶۵. دایرهالمعارف گیاهان دارویی. جلد اول، ترجمه زارع‌زاده، ع.، انتشارات وصال، بیزد، ۵۱۰ صفحه.
- Barker, S., Grayhem, P., Koon, J., Perkins, J., Whalen, A. and Raudenbush, B., 2003. Improved performance on clerical tasks associated with administration of peppermint odor. Perceptual Motor Skills, 97(3): 1007-1010.
- Bedi, J.F., Gong, H.J. and Horvath, S.M., 1988. Enhancement of exercise performance with inhaled albuterol. Sport Science, 13: 144-148.
- Broadbent, D.E., 1958. Perception and communication. Pergamon, New York, 338 p.
- Buckle, J., 1998. Clinical aromatherapy and touch: complementary therapies for nursing practice. Critical Care Nurse, 18: 54-61
- Burton, G., 1993. Alternative medicine the definitive guide. Phyllup, Future Medicine publishing, Washington, USA.
- Cohen, B.M. and Dressler, W.E., 1982. Acute aromatics inhalation modifies the airways. Effects of the common cold. Respiration, 43: 285-293.
- Floria, V.G. and Mareev, V., 1993. Anaerobic threshold: definition, physiology and methods of determination. Kardiologija, 33(5): 40-46.
- Goubault, C., Perault, M.C., Lelum, E. and Bouquet, S., 2001. Effects of inhaled salbutamol in exercising non-asthmatic athletes. Thorax, 56(9): 675-679.

The effect of alcoholic essential oil of *Mentha piperita* L. on aerobic power and the time to reach anaerobic threshold in athletes males

M. Dashti¹, M.A. Azarbijani^{*1} and M.B. Rezaee²

1- Islamic Azad University, Tehran Centeral Branch, Iran.

2- Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.

*Corresponding Author, E-mail: ali.azarbayjani@gmail.com

Recieved: April 2007

Revised: Februey 2008

Accepted: Februey 2008

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of inhaling alcoholic essential oil of *Mentha piperita* L. on aerobic power and the time to reach anaerobic threshold in athletes males. The subjects of this study were 20 athletes male (age: 20±4 years, height 175±5Cm, weight 68±4.2 Kg, VO₂ max 43.21±3.34 ml/kg.min). They were divided into two groups randomly, inhaling alcoholic essential n=10 and control group n=10. First, subjects of the experimental group inhaled essential oil *Mentha piperita* and Ethanol for 30 minutes. Then they were tested by Conconi test and immediately after 15 minutes rest they were tested by Bruce test. The subjects of control group were tested in similar way but they inhaled water and alcohol. For comparing aerobic and anaerobic performance data were analyzed by T test for independent groups, but for examining the effect of inhaling odors we used ANOVA test ($p<0.05$). The results showed inhaling essential oil of *Mentha piperita* with different concentrations can significantly increase aerobic power and anaerobic threshold ($p< 0.012$). These was no similar significant differences in physical performance in control group. The benefit of inhaling odors may due to increasing in lung volume and capacity and stimulation of simpatico system. We suggest athletes can use inhaling peppermint odor for developing physical performance.

Key words: Maximal oxygen uptake, anaerobic threshold, sports men, peppermint oil.