

## مقایسه اثر عصاره‌های آویشن (*Thymus vulgaris L.*) و سرخارگل (*Allium sativum L.*)، سیر (*Echinacea purpurea (L.) Moench.*) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتشی

زریر تیموری‌زاده<sup>۱</sup>، شعبان رحیمی<sup>۲\*</sup>، محمدامیر کریمی ترشیزی<sup>۳</sup> و رضا امیدی‌گی<sup>۴</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۲\*- نویسنده مسئول، دانشیار، گروه پرورش و مدیریت تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،

پست الکترونیک: Rahimi\_S@Modares.ac.ir

۳- استادیار، گروه پرورش و مدیریت تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۴- استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ پذیرش: آذر ۱۳۸۷

تاریخ اصلاح نهایی: آبان ۱۳۸۷

### چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه اثر سه نوع عصاره گیاهی و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین به عنوان بهبود دهنده‌های رشد مورد استفاده در صنعت طیور، بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتشی انجام شد. ۴۸۰ قطعه جوجه گوشتشی نر یک روزه به گروههای جیره پایه (کترل) و جیره پایه با ۱۵۰ ppm آنتی‌بیوتیک، ۱/۰ درصد عصاره آویشن بااغی (*Thymus vulgaris L.*), سرخارگل (*Allium sativum L.*)، سیر (*Echinacea purpurea (L.) Moench.*) و مخلوطی از عصاره‌ها با دوز مشابه تقسیم شدند. شمارش *E. coli* محتویات ایلنو-سکوم در گروه مخلوط عصاره‌ها به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود. به هر حال، اختلاف معنی‌داری در شمارش *E. coli* در مخلوط عصاره‌ها و دیگر گروهها بجز گروه کترل وجود نداشت. شمارش باکتریهای اسید لاتکیک در تیمار آویشن به‌طور معنی‌داری از دیگر گروهها بیشتر بود. وزن بورس فابریسیوس در تیمار سیر افزایش معنی‌داری را در مقایسه با سایر گروهها نشان داد، اما وزن طحال تحت تأثیر قرار نگرفت. پاسخ به افزایش حساسیت بازوفیل‌های پوستی (تزریق فیتوهماگلولتنین) و همچنین عیار پادتن بر علیه گلبلول قرمز گوسفند در دو دوره ۴۲ و ۴۲ روزگی در تیمار سرخارگل به‌طور معنی‌داری بالاتر بود ( $p < 0.05$ ). عیار پادتن بر علیه ویروس واکسن نیوکاسل در هر دو دوره ۳۶ و ۴۲ روزگی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت، اما تیمار سرخارگل به‌طور غیر معنی‌داری عیار پادتن بر علیه این ویروس را افزایش داد.

واژه‌های کلیدی: آویشن (*Thymus vulgaris L.*), سرخارگل (*Allium sativum L.*), سیر (*Echinacea purpurea (L.) Moench.*).

ویرجینیامايسین، میکروفلور، ایمنی.

## مقدمه

پرنده در مقابل عوامل بیماری‌زا کافی نیستند و در ضمن واکسنها خواص بهبود رشد ندارند. آویشن، سرخارگل و سیر از گیاهانی هستند که خواص ضد میکروبی و بهبود سیستم ایمنی دارند. گزارش کمی از کاربرد سرخارگل در دامپزشکی وجود دارد (O'Neill *et al.*, 2002) و گزارش زیادی در مورد استفاده از آن در صنعت طیور ثبت نشده است (Allen, 2003).

Rees و همکاران (۱۹۹۳) گزارش کردند که عصاره سیر در موقع مهار باکتریها، قادر به تشخیص میکروفلور مفید و انتروباکترهای مضر است. برای دوزهای مشابه سیر، مهار ۱۰ *E. coli* برابر بیشتر از مهاری بود که در لاكتوباسیلوس کازئی دیده می‌شد. دقیقاً مشخص نیست که چرا مهار تمایزی رخ می‌دهد، اما ممکن است به علت اختلاف در ترکیب غشاهای باکتریایی و اختلاف در نفوذپذیری آنها نسبت به آلیسین باشد (Miron *et al.*, 2000).

Wills (۱۹۵۶) گزارش کرد که عصاره سیر و آلیسین در مقابل تعدادی از انتروکوکوس‌های مقاوم به ونکومایسین، فعالیت باکتریواستاتیک نشان دادند. طبق گزارش Ferket و همکاران (۲۰۰۲) کاهش تعداد باکتریهای گرم مثبت فعال مانند لاكتوباسیلوس و بیفیدو-باکتریوم ممکن است حضور گونه‌های گرم منفی را در روده افزایش دهد. آنتی‌بیوتیکها در محیط دستگاه گوارش تعداد باکتریهای گرم مثبت را کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش تعداد باکتریهای گرم منفی مانند *E. coli* می‌شوند. در آزمایش‌های مختلف در بین گیاهان استفاده شده، اسانس گیاهان رزماری، مریمگلی و آویشن در مقابل سویه‌های *E. coli* بهترین اثر را از خود نشان دادند (Hammer *et al.*, 1998; Smith-Palmer *et al.*, 1999).

ترکیهای ضدبacterیایی نقش مهمی در بهبود تعادل میکروبی و فلور روده حیوانات دارند. با توجه به اینکه برخی از آنتی‌بیوتیکهای مورداستفاده در تولید طیور با مصرف درمانی انسانی مشترک هستند، امکان انتقال سویه‌های باکتری مقاوم به آنتی‌بیوتیک از طریق محصولات طیور به انسان وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود برخی آنتی‌بیوتیکهای درمانی در مورد انسان موثر واقع نشود و باقی‌ماندن آنتی‌بیوتیک در محصولات طیور، استفاده از این مکمل در جیره طیور را مورد تردید قرارداده است. گیاهان دارویی و عصاره‌های حاصل از آنها علاوه بر خواص ضد باکتریایی می‌توانند باعث رشد فلور مفید روده نیز شوند. افشار مازندران و همکاران (۱۳۸۰) گزارش کردند که استفاده از آنتی‌بیوتیکها موجب افزایش اندکی در pH محتويات روده شده و تولید اسیدهای چرب فرار را کاهش می‌دهند و در ضمن فلور بومی روده را نیز نابود می‌کنند و بدین ترتیب موجب افزایش حساسیت حیوان در برابر عوامل بیماری‌زا می‌شوند. در صنعت طیور بهبود سیستم ایمنی به دلایلی مانند شکست واکسیناسیون، بیماریهای تضعیف کننده سیستم ایمنی و مصرف نادرست آنتی‌بیوتیکها، حائز اهمیت است. از سوی دیگر انتخاب طیور برای رشد سریعتر تا حدودی باعث کاهش پاسخ ایمنی در آنها می‌شود (Qureshi & Havenstein, 1994). بنابراین نیاز به استفاده از گیاهان دارویی مانند سرخارگل (*Echinacea purpurea*), آویشن (*Allium sativum*) و سیر (*Thymus vulgaris* L.) که بتوانند هم سیستم ایمنی را تقویت نموده و هم اثر ضد میکروبی داشته باشند، احساس می‌شود. البته واکسنها خواص تحریک ایمنی دارند ولی به تنها‌ی برای حفاظت

محرك رشد، آنتیبیوتیک، داروی ضد کوکسیدیوز) تغذیه شدند. برای تیمارهای یک تا چهار عصاره‌های آویشن، سرخارگل، سیر و مخلوطی از عصاره‌ها با دوز ۰/۱ درصد مورد استفاده قرار گرفتند. در تیمار پنجم آنتیبیوتیک ویرجینیامايسین با دوز ۱۵۰ ppm به جireh غذایی اضافه و تیمار شاهد تیمار ششم در نظر گرفته شد. عصاره‌های فوق از شرکت دارویی زردبند در تهران خریداری شده و با رعایت کلیه دستورالعملهای این شرکت مصرف شدند.

#### تعیین میکروفلور روده

در سن ۳۸ روزگی یک پرنده از هر تکرار (۴ پرنده از هر تیمار) به طور تصادفی انتخاب و پس از کشتار به روش قطع نخاع، ۱ گرم مواد دفعی از محل ایلئو-سکوم آنها برداشته شد. برای تعیین CFU (Colony forming units) از روش شمارش قطره‌ای در محلول استریل PBS استفاده شد. یک گرم مدفوع تازه به ۹ml بافر PBS اضافه شد. بعد سری‌های رقت تهیه شد. شمارش باکتریهای اسید لакتیک در محیط کشت MRS آگار و شمارش *E. coli* در محیط کشت Mac Conkey آگار بعد از انکوبه کردن هوایی در دمای ۳۷°C به مدت ۲۴ ساعت انجام شد.

#### آزمایش سیستم ایمنی

در سن ۴۲ روزگی دو پرنده از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتنین از روش Corrier و Deloach (۱۹۹۰) استفاده شد. ابتدا پای راست پرنده با اتانول ۷۰ درصد تمیز شده و بعد ضخامت میان انگشت سوم و چهارم پنجه پا با استفاده از کولیس با دقیقه ۰/۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. ۰/۱ میلی‌لیتر محلول فیتوهماگلوتنین داخل پوست تزریق شد. بعد از ۲۴ ساعت محل تزریق دوباره

گیاهان غنی از فلاونوئیدها و ترکیبیهای ترپنی مانند شیرینیبان، مریم‌گلی و آویشن با افزایش فعالیت ویتامین C با اثر ضد باکتریایی خود موجب تقویت سیستم ایمنی در حیوانات می‌شوند (Samman & Cook, 1996).

پلی‌استیلن‌ها از ریشه گیاه سرخارگل در مقابل *E. coli* فعالیت باکتریوستاتیک نشان می‌دهند (Schulte et al., 1967). ترکیبیهای دارویی فعال سرخارگل شامل پلی‌ساکاریدها، گلیکوپروتئینها و مشتقان اسید کافئیک (اسید شیکوریک) و آلکامیدها، توانایی تعدیل و بهبود سیستم ایمنی را دارند (Bauer, 1989; Hobbes, 1989؛ Goel et al., 1984؛ Stimple et al., 1984). برای مثال ترکیبیهای پلی‌گلیکان که به طور غیراختصاصی فعالیت فاگوسیتها را تحريك می‌کنند، می‌توانند رشد کاندیدا آلبیکنس و لیستریا مونوستیوتزن را در موشها مهار کنند (Roesler et al., 1991). در این تحقیق بررسی مقایسه اثر سه نوع عصاره گیاهی و آنتیبیوتیک ویرجینیامايسین به عنوان بهبود دهنده‌های رشد، بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتشی سویه راس مورد آزمایش قرار گرفت.

#### مواد و روشها

این بررسی تجربی در مرغداری تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه گوشتشی یک روزه نر از سویه تجاری راس ۳۰۸ براساس طرح آزمایشی کاملاً تصادفی به شش تیمار تقسیم شدند که هر تیمار ۴ تکرار و هر تکرار مشتمل بر ۲۰ قطعه جوجه بود. جوجه‌های یک تیمار به عنوان شاهد در نظر گرفته شده و با جireh غذایی پایه (فاقد هر گونه

پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند در هر دو نوبت اول و دوم در بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری را نشان داد (جدول ۱،  $P<0.05$ ). تیمار سرخارگل بیشترین عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند را در هر دو نوبت داشت، اما این تیمار در نوبت اول با تیمارهای آویشن و سیر و در نوبت دوم با تیمار سیر اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. کمترین عیار پادتن در هر دو نوبت مربوط به تیمار شاهد بود، ولی این تیمار تفاوت معنی‌داری با تیمار ویرجینیامايسین نداشت.

کمترین تعداد کلونی *E. coli* در تیمار مخلوطی از عصاره‌ها مشاهد شد که تفاوت معنی‌داری با سایر عصاره‌ها و آنتیبیوتیک ویرجینیامايسین نداشت (جدول ۲)، اما نسبت به تیمار شاهد به طور معنی‌داری تعداد کلونی *E. coli* را کاهش داد ( $P<0.05$ ). بیشترین تعداد سرخارگل و آویشن مشاهده شد. بین این دو تیمار با تیمار مخلوط عصاره‌ها و سیر نیز اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، اما نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری را نشان داد ( $P<0.05$ ).

بیشترین پاسخ به افزایش حساسیت بازووفیل‌های پوستی (تریک فیتوهماگلوتین) در تیمار سرخارگل دیده شد (جدول ۲،  $P<0.05$ ). تیمار مخلوط عصاره‌ها پاسخ به تریک فیتوهماگلوتین بیشتری نسبت به سایر تیمارها بجز سرخارگل داشت. کمترین پاسخ در تیمار ویرجینیامايسین مشاهده شد.

بیشترین درصد وزن نسبی بورس فابریسیوس در تیمار سیر دیده شد ( $P<0.05$ ). در بین سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری از نظر درصد وزن نسبی بورس دیده نشد، ولی کمترین آن مربوط به تیمار ویرجینیامايسین بود (جدول ۲).

اندازه‌گیری و پاسخ به افزایش حساسیت بازووفیل‌های پوستی به‌وسیله اختلاف ضخامت پوست، قبل و ۲۴ ساعت بعد از تزریق تعیین شد.

همچنین در سن ۴۱ روزگی دو پرنده از هر تکرار انتخاب و وزن نسبی بورس فابریسیوس و طحال تعیین شد. تزریق ۰/۱ میلی‌لیتر گلبول قرمز گوسفند ۵ درصد در بافر فسفات، در روزهای ۲۱ و ۳۵ در عضله سینه انجام و ۶ روز بعد از آن یعنی در روزهای ۲۷ و ۴۱ روزگی، از جوجه‌ها خون‌گیری شد و بعد نمونه‌های سرم برای تعیین عیار پادتن جدا شدند. برای تعیین عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند از روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد (Peterson et al., 1999).

واکسن نیوکاسل (لاسوتا) در سن ۲۳ روزگی از طریق آب آشامیدنی به جوجه‌ها داده شد و دو هفتگه بعد از آن و در آخر دوره یعنی در روزهای ۳۶ و ۴۲ روزگی خون‌گیری انجام شد. عیار پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل با روش HI تعیین شد (Fu & Liu, 1997). میانگین عیار سه پرنده از هر تکرار محاسبه شد. داده‌های آزمایش با استفاده از روش ANOVA آنالیز شد. مقایسه میانگینها با آزمون Duncan انجام شد.

## نتایج

نتایج آزمایش در جدولهای ۱ و ۲ نشان داده شده است. عیار پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل در هر دو نوبت اول و دوم در بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری را نشان نداد ( $P>0.05$ ). ولی بیشترین عیار در نوبت اول مربوط به تیمار سرخارگل و در نوبت دوم مربوط به تیمار سیر بود. تیمار شاهد کمترین عیار پادتن علیه ویروس نیوکاسل را داشت (جدول ۱). عیار

نسبی طحال در بین تیمارهای آزمایشی  $(P < 0.05)$ .

درصد وزن نسبی طحال در بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری را نشان نداد، ولی بیشترین درصد وزن

جدول ۱- اثر افزودن ویرجینیامايسین و سه نوع عصاره گیاهی به چیره غذایی جوجه‌های گوشتی بر عیار پادتن تولید شده علیه ویروس واکسن نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند\*

تیمار		عيار پادتن عليه ویروس واکسن نیوکاسل		عيار پادتن عليه گلبول قرمز گوسفند
نوبت اول	نوبت دوم	نوبت اول	نوبت دوم	عيار پادتن عليه گلبول قرمز گوسفند
آویشن	۶/۷۵b	۴/۰۰abc	۲/۴۰	۳/۰۲
سرخارگل	۸/۲۵a	۵/۰۰a	۲/۵۷	۳/۲۰
سیر	۷/۵۰ab	۴/۷۵ab	۲/۶۰	۲/۹۲
مخلوط عصاره‌ها	۷/۰۰b	۳/۷۵bc	۲/۴۰	۲/۹۷
شاهد	۶/۵۰b	۳/۲۰c	۲/۰۷	۲/۸۲
ویرجینیامايسین	۶/۷۵b	۳/۷۵bc	۲/۱۲	۳/۱۷
SEM	۰/۱۹۸	۰/۱۸۹	۰/۰۸۸	۰/۰۸۸

\*: در هر ستون میانگینهای با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ( $P < 0.05$ ).

SEM = میانگین خطای استاندارد

جدول ۲- اثر افزودن ویرجینیامايسین و سه نوع عصاره گیاهی به چیره غذایی جوجه‌های گوشتی بر وزن نسبی اندامهای اینمنی، افزایش ضخامت پوست (پاسخ به تزریق فیتوهمماگلوتنین) و جمعیت میکروفلور روده

Lactic acid bacteria (log CFU/g)	E. coli (log CFU/g)	پاسخ به تزریق فیتوهمماگلوتنین (mm)	وزن نسبی اندامهای اینمنی*		تیمار
			طحال	بورس فابریسیوس	
۵/۹۵ <sup>a</sup>	۴/۴۰ <sup>b</sup>	۰/۰۳bc	۰/۱۲۵	۰/۲۰ <sup>b</sup>	آویشن
۶/۲۰ <sup>a</sup>	۴/۸۲ <sup>b</sup>	۰/۰۸۰ <sup>a</sup>	۰/۰۹۹	۰/۰۲ <sup>b</sup>	سرخارگل
۵/۴۷ <sup>ab</sup>	۵/۲۰ <sup>b</sup>	۰/۰۵۸ <sup>bc</sup>	۰/۱۳۳	۰/۰۲۷ <sup>a</sup>	سیر
۵/۸۲ <sup>a</sup>	۴/۳۲ <sup>b</sup>	۰/۰۷۴ <sup>ab</sup>	۰/۱۲۹	۰/۰۲۱ <sup>b</sup>	مخلوط عصاره‌ها
۴/۵۲ <sup>c</sup>	۷/۱۰ <sup>a</sup>	۰/۰۵۳ <sup>bc</sup>	۰/۱۱۳	۰/۰۲۲ <sup>b</sup>	شاهد
۴/۹۲ <sup>bc</sup>	۴/۴۲ <sup>b</sup>	۰/۰۴۳ <sup>c</sup>	۰/۱۱۳	۰/۰۱۹ <sup>b</sup>	ویرجینیامايسین
۰/۱۴۹	۰/۲۴۸	۰/۰۰۴۳	۰/۰۰۶	۰/۰۰۷	SEM

\*: (گرم در ۱۰۰ گرم وزن بدن). در هر ستون میانگینهای با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ( $P < 0.05$ ).

SEM = میانگین خطای استاندارد

## بحث

می‌شوند (Savag et al., 1996). از ترکیبی‌های پلی‌ساقاریدی سرخارگل می‌توان به اکیناسئین، اکیناکوزید و آکینولون اشاره کرد.

(Tschirch ۲۰۰۰) گزارش کرد که استفاده از کارواکرول (از مواد مؤثره آویشن) باعث تحریک رشد و تکثیر لاکتوباسیلوس‌ها می‌شود. در مطالعه Jamroz و همکاران (۲۰۰۵) استفاده از کارواکرول شمارش باکتری‌های اسید لاکتیک را افزایش داد. با توجه به نقش باکتری‌های نظیر لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدو باکترها در بهبود سیستم ایمنی و همچنین نقش آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین در مهار باکتری‌های گرم مثبت (نظیر لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدو باکترها) احتمال دارد کاهش سطوح پادتن سرم خون در گروه مصرف کننده آنتی‌بیوتیک بدلیل نقش ضد باکتریایی ویرجینیامايسین علیه باکتری‌های گرم مثبت باشد. همچنین گزارش شده که در هنگام استفاده آنتی‌بیوتیک در نتیجه کاهش بار میکروبی روده، تحریک ایمنی کاهش پیدا می‌کند. همان‌طور که اشاره شد عصاره‌های استفاده شده با مهار انتخابی خود رشد باکتری‌های مفید را افزایش می‌دهند (Humprey et al., 2002).

آزمایش سیستم ایمنی نشان داد که عصاره سرخارگل و سیر بیشترین نقش را در بهبود سیستم ایمنی دارند. با توجه به نقش مهم سرخارگل در افزایش ترشح ماکروفازها و لمفوسيت، بهبود پاسخ به تزریق فيتوهاماگلوتنين قابل انتظار بود (Stimple et al., 1984; Goel et al., 2002). در مطالعه‌ای تولید پادتن‌ها به خصوص IgG در موشهای تیمار شده با سرخارگل، بعد از چالش بهوسیله پادتن‌ها افزایش یافت. همچنین این گیاه با اثر ضد باکتریایی و ضد ویروسی که دارد، به طور غیرمستقیم سیستم ایمنی را بهبود می‌بخشد (Rehman et al., 2002).

این تحقیق نشان داد که تیمارهای دریافت‌کننده آویشن، سرخارگل، سیر، مخلوط عصاره‌ها و آنتی‌بیوتیک کمترین شمارش *E. coli* را داشته‌اند. در مطالعات Jang و همکاران (۲۰۰۶) شمارش اشرشیاکلی در مواد هضمی ایلنو-سکوم گروههایی که آنتی‌بیوتیک مصرف کرده بودند به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود. هیچ اختلافی در شمارش اشرشیاکلی بین گروههای آنتی‌بیوتیک و اسانس‌های فرار (در دو سطح ۲۵ ppm و ۵۰ ppm) نبود. در همین مطالعات شمارش لاکتوباسیلوس بهوسیله مکمل جیره اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک تحت تأثیر قرار نگرفت. به‌طور کلی افروزن اسانس‌های فرار باعث کاهش معنی‌دار جمعیت *E. coli* محتویات ایلنو-سکوم شد. در مطالعه‌ای با استفاده از ۱/۰ و ۰/۵ و ۰/۱ درصد مکمل آویشن در جیره مرغهای تخم‌گذار، گروه کنترل و گروه ۱ درصد آویشن، بالاترین شمارش *E. coli* را در مدفوع نشان دادند. گروه ۰/۱ درصد آویشن، کمترین شمارش Canan Bolukasi & Kuddusi Erhan, (2006) را داشت.

آویشن تعداد کلی فرمها را در مدفوع مرغها کاهش می‌دهد (Cross et al., 2002). افزایش شمارش باکتری‌های اسید لاکتیک در تیمار آویشن و سرخارگل می‌تواند به دلیل اثر ضدباکتریایی این دو گیاه باشد. عصاره‌های گیاهی رشد فلور مفید روده را تحریک کرده و در نتیجه حضور باکتری‌های گرم منفی مانند *E. coli* را کاهش می‌دهند. پلی ساکاریدها (از اجزای تشکیل‌دهنده عصاره سرخارگل) اثرهایی شبیه پربیوتیکها داشته و باعث افزایش تولید اسید لاکتیک و در نتیجه افزایش تکثیر باکتری‌های مفید در روده و کاهش حضور باکتری‌های گرم منفی مانند *E. coli* (Cross et al., 2002).

گرفته مشخص شده که گیاهان دارویی رشد اندامهای اینمی را تحریک می‌کنند (Hevener *et al.*, 1999; Takahashi *et al.*, 2000).

با توجه به فراهم بودن شرایط رشد و گستردگی و تنوع گیاهان دارویی در ایران و توسعه این صنعت در کشور و از سوی دیگر گرایش جامعه جهانی و کشور به مصرف فراورده‌های دامی عاری از بقاوی‌ترکیبی‌های شیمیایی، استفاده بیشتر از منابع گیاهی و ترکیبی‌های منابع طبیعی، تحقیقات گستردگ‌تر به منظور بکارگیری این گیاهان یا فراورده‌های حاصل از آنها در زمینه پرورش دام و طیور، می‌تواند مفید واقع شود. هر چند عصاره‌های استفاده شده در این مطالعه توانستند فلور میکروبی و سیستم اینمی را بهبود دهند، ولی لازم است جهت استفاده گستردگ عصاره‌های یاد شده در صنعت مرغداری کشور تحقیقات بیشتری به خصوص در زمینه میزان استفاده و گیاهان مختلف انجام گیرد.

### سپاسگزاری

از همکاری مدیریت محترم شرکت دارویی زردبند تهران و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی می‌شود.

### منابع مورد استفاده

- افشار مازندران، ن.، رجب، ا. و کیانی، م.، ۱۳۸۰. پروپیوتیک‌ها و کاربرد آنها در تغذیه دام و طیور. چاپ اول، انتشارات نوربخش، تهران، ۲۷۰ صفحه.

- Allen, P.C., 2003. Dietary supplementation with Echinacea and development of immunity to challenge infection with coccidian. Animal and Natural Resources Institute, 91:74-78.
- Bauer, R., 1996. Echinacea drugs, effects and active ingredients. Z. Aerztl. Fortbild (Jena), 90: 111-115.
- Canan Bolukbasi, S. and Kuddus Erhan, M., 2006.

1999). پلی‌ساقاریدهای گیاهی باعث بهبود ترشح پادتن‌ها می‌شوند (Nie & Zhang, 1999). اکیناسین، اکیناکوزید و آکینولون از پلی‌ساقاریدهای تشکیل دهنده سرخارگل هستند. Schranner و همکاران (۱۹۸۹) اثر یک داروی مركب حاوی *E. angustifolia* را بر سیستم اینمی هومورال جوجه‌های سالم و جوجه‌های دارای نقص اینمی بررسی کردند. داروی مركب پارامترهای اینمی هومورال را در هر دو گروه جوجه بهبود داد. تیمار سرخارگل بیشترین عیار پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل را در نوبت اول داشت. Allen و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که با تغذیه پودر ریشه سرخارگل در مدت دو هفته اول پرورش جوجه‌های گوشتی، رشد بهبود می‌یابد و این گیاه تا حدود معینی از جوجه‌های چالش داده شده (چالش با واکسن زنده کوکسیدیوز) در مقابل افت وزن و گسترش جراحات روده‌ای جلوگیری می‌کند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که ممکن است مکمل سرخارگل پاسخ اینمی به واکسن زنده را تقویت نموده و اثر تحریک اینمی را در حضور جمعیت کوکسیدیای طبیعی موجود در بست ایجاد کند. از سرخارگل در ارتباط با اشکال رایج ایمونوتراپی مانند واکسیناسیونها به منظور تقویت بیشتر پاسخ اینمی استفاده شده است (Keith, *et al.*, 2003). بیشتر بودن عیار در نوبت دوم می‌تواند به علت نقش مهم سیر در تقویت سیستم اینمی باشد. Lau و همکاران (۱۹۹۱) گزارش کردند که ترکیبی‌های سولفوره سیر خاصیت تعديلی سیستم اینمی دارند. عصاره سیر تکثیر لنفوسيتها و ماکروفازها را در موشها افزایش می‌دهد. گزارش شده که گیاه چینی Achyranthan به طور معنی‌داری شاخص بورس فابریسیوس را در جوجه‌های گوشتی ۲۸ روزه افزایش داد (Chen *et al.*, 2003). در تحقیقات صورت

- Jang, I.S., Ko, Y.H., Kang, S.Y. and Lee, C.Y., 2006. Effect of commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Animal and Feed Science Technology, 134: 304-315.
- Keith., I., Block, M.D., Mark, N. and Mead, M.S., 2003. Immune system effects of Echinacea, Ginseng and Astragalus: A Review. Integrative Cancer Therapies, 2(3): 247-267.
- Lau, B.H., Yamasaki, T. and Gridley, D.S., 1991. Garlic compounds modulate macrophage and T-lymphocyte functions. Molecular Biothechnic, 3: 103-107.
- Miron, T., Rabinkov, A., Mirelman, D., Wilchek, H. and Weiner, L., 2000. The mode of action of allicin: its ready permeability through phospholipids membranes may contribute to its biological activity. Biochemistry and Biophysics, 1463: 20-30.
- Nie, W. and Zhang, Y.X., 1999. Progress of the immunomodulating effect of polysaccharides and their mechanism. Chinese Pharmacology Bulletin, 15: 3-5.
- O'Neill, W., Mc-Kee, S. and Clark, A.F., 2002. Immunological and haematologic consequences of feeding a standardized Echinacea (*Echinacea angustifolia*) extract to healthy horses. Equine Journal Veterinary, 34: 222-227.
- Peterson, A.L., Qureshi, M.A., Ferket, P.R. and Fuller, J.C., 1999. Enhancement of cellular and humoral immunity in young broilers by the dietary supplementation of  $\beta$ -hydroxy-  $\beta$ -methylbutyrate. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 21(2): 307-330.
- Qureshi, M. and Havenstein, G.B., 1994. A comparison of the immune performance of 1991 commercial broiler with a broiler diets. Poultry Science, 73: 1805-1812.
- Rehman, J., Dillow, J.M., Carter, S.M., Chou, J. B., Le, B. and Maisel, A.S., 1999. Increased production of antigen-specific immunoglobulins G and M following *in vivo* treatment with the medicinal plants *Echinacea angustifolia* and *Hydrastis canadensis*. Immunology Letters, 68(12): 391-395.
- Ress, L.P., Minney, S.F., Plummer, N.T., Slater, J.H. and Skyrme, D.A., 1993. A quantitative assessment of the anti-microbial activity of garlic (*Allium sativum*). Journal Microbial Biotechnology, 9: 303-307.
- Roesler, J., Steinmuller, C. and Kinderlen, A., 1991. Application of purified polysaccharides from cell cultures of the plant *Echinacea purpurea* to mice mediates protection against systemic infections with *Listeria monocytogenes* and *Candida albicans*. International Journal of Immunopharmacology, 11(3): 27-38.
- Chen, H., Li, D.F., Chang, B.Y. and Gong, L.M., 2003. Effects of Chinese herbal polysaccharides on the immunity and growth performance of young broiler. Poultry Science, 82: 364-370.
- Corrier, D.E. and Deloach, J.R., 1990. Evaluation of cell mediated cutaneous basophil hypersensitivity in young chickens by an interdigital skin test. Poultry Science, 69: 403-408.
- Cross, D.E., Svoboda, K., Hillman, K., McDevitt, R. and Acamovic, T., 2002. Effects of *Thymus vulgaris* L. essential oil as an *in vivo* dietary supplement on chicken intestinal microflora. Proceedings of the 33rd International Symposium on Essential oils, Lisbon, Portugal. 3-7 September: page number.
- Ferket., P.R., Parks, C.W. and Grimes, J.L., 2002. Benefits of dietary antibiotic and mannanoligosaccharide supplementation for poultry. Multi-State Poultry Meeting, 14-16 May: page number.
- Fu, X.Q. and Liu Z.J., 1997. Microhemagglutination inhibition (HI) test. 97, In: Fu, X.Q. and Liu, Z.J., (eds.), Handbook of Poultry Diseases Detection. China Agriculture University Press, Beijingm, China, Total pages.
- Goel, V., Chang, C., Slama, J.V., Barton, R., Bauer, R., Gahler, R. and Basu, T.K., 2002. Alkylimides of *Echinacea purpurea* stimulate alveolar macrophage function in normal rats. International Journal of Immunopharmacology, 2(3) :381-387.
- Hammer, K.A., Carson, C.F. and Riley, T.V., 1999. Antimicrobial activity of essential oil and other plants extracts. Journal of Applied Microbiology, 86: 985-990.
- Hevener, W., Routh, P.A. and Almond, G.W., 1999. Effects of immune challenge on concentrations of serum insulin-like growth factor-1 and growth performance in pigs. Journal of Canadian Veterinary, 40: 782-786.
- Hobbes, C., 1989. The Echinacea Handbook. In =351-359: Miovich, M., (ed.). Eclectic Medical, Portland, Ore, 387p.
- Humphrey, B.D., Koutsos, E.A. and Klasing, K.C., 2002. Requirement and priorities of the immune system for nutrients. 69-77, In: Jacques, K.A. and Lyons, T.P. (Eds.). Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries. Proceeding of Alltech's 18th Annual Symposium, Total pages.
- Jamroz, D., Williczkiewicz, A., Wertelecki, T., Orda, J. and Skorupinska, J., 2005. Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. British Poultry Science, 46(4): 458-493.

- essences against five important food-borne pathogens. Letters in Food Microbiology, 26: 118-122.
- Stimple, M., Proksch, A., Wagner, H. and Lohmann-Matthes, M.L., 1984. Macrophage activation and induction of macrophage cytotoxicity by purified polysaccharide fractions from the plant *Echinacea purpurea*. Infection Immunology, 46: 845-849.
- Takahashi, K., Mashiko, T. and Akiba, Y., 2000. Effects of dietary concentration of xylitol on growth in male broiler chicks during immunological stress. Poultry Science, 79: 743-747.
- Tschirch, H., 2000. The use of natural plants extracts as production enhancers in modern animal rearing practices. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Wrocław, Zootechnika, XXV(376): 25-39.
- Wills, E., 1956. Enzyme inhibition by allicin, the active principle of garlic. Journal of Biochemistry, 63: 514-520.
- Samman, S. and Cook, N.C., 1996. Flavonoids-chemistry, metabolism, cardio protective effects, and dietary sources. Journal of Nutrition Biochemistry, 7: 66-76.
- Savage, T.F., Cotter, P.F. and Zakrzewska, E.I., 1996. The effect of feeding mannan oligosaccharide on immunoglobulins, plasma IgG and bile IgI, of Wrolstad MW male turkeys. Poultry Science, 75: 143.
- Schranner, I., Würdinger, M., Klumpp, N., Lösch, U. and Okpanyi S.N., 1989. Beeinflussung der aviären humoralen Immunreaktionen durch Infuex und *Echinacea angustifolia* extrakt. Journal of Veterinary Medicinal, 36: 353-364.
- Schulte, K.E., Rucker, G. and Perlick, J., 1967. The presence of polyacetylene compounds in *Echinacea purpurea* and *Echinacea angustifolia* DC. Arzneimittelforschung, 17: 825-829.
- Smith-Palmer., A. Stewart, J. and Fyfe, L., 1998. Antimicrobial properties of plant essential oil and

**The effects of *Thymus vulgaris* L., *Echinacea purpurea* (L.) Moench.,  
*Allium sativum* L. extracts and virginiamycin antibiotic on intestinal microflora  
population and immune system in Broilers**

**Z. Teymouri Zadeh<sup>1</sup>, SH. Rahimi<sup>2\*</sup>, M.A. Karimi Torshizi<sup>1</sup> and R. Omidbaigi<sup>3</sup>**

1- Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2\*- Corresponding author, Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, E-mail:  
Rahimi\_S@Modares.ac.ir

3- Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Received: July 2008

Revised: November 2008

Accepted: January 2009

**Abstract**

The present study was designed to evaluate comparison of the effects on the intestinal microflora population and immune system of broilers of three commercial herbal extracts and virginiamycin antibiotic. A total four hundred and eighty 1-day old male broiler chicks were assigned to the basal diet (control) and basal diet supplemented with 150 ppm virginiamycin, 0.1% extract of thyme (*Thymus vulgaris* L.), coneflower (*Echinacea purpurea* (L.) Moench.), garlic (*Allium sativum* L.) and blend of extracts with the same dose. The colony forming units of *Escherichia coli* in digesta of ileo-cecum in the blend group showed a significantly lower number compared with control group. However, there was no difference in *E. coli* counts between blend group and others except control. The lactic acid bacteria counts in the thyme group increased compared with other groups except coneflower ( $p<0.05$ ). Relative weights of immune organs (spleen and bursa of Fabricius) as two immune indexes were compared among different groups. Relative weight of bursa of Fabricius in the Garlic group showed a significantly increase compared with other groups, but relative weight of spleen was unaffected by treatments. Cutaneous basophils hypersensitivity response (to phytohemagglutinin injection) and antibody responses to sheep red blood cells were higher in coneflower group ( $p<0.05$ ). Antibody responses to Newcastle vaccine (Lasota) was unaffected by treatments but coneflower group improved antibody levels ( $p>0.05$ ).

**Key words:** *Thymus vulgaris* L., *Echinacea purpurea* (L.) Moench., *Allium sativum* L., virginiamycin, microflora, immune.