

تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی اسانس شوید (*Anethum graveolens L.*)

مهدى داداش پور^۱، ایرج رسولی^{۲*}، فاطمه سفیدکن^۳، مسعود تقیزاده^۴ و شکیبا درویش علیپور آستانه^۵

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران

۲- نویسنده مسئول، استاد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، پست الکترونیک: rasooli@shahed.ac.ir

۳- استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

۴- استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران

۵- دانشجوی دکتری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران

تاریخ پذیرش: دی ۱۳۸۹

تاریخ اصلاح نهایی: آذر ۱۳۸۹

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۸۹

چکیده

روغن‌های انسانی با خاصیت خوب آنتی اکسیدانی می‌توانند برای اهداف درمانی، تغذیه‌ای و نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به گستره مصرف فرآورده‌های گیاهان دارویی، لازم است جوانب مختلف این محصولات به جهت کاربردهای مفید و ضررها احتمالی آنها در سلامتی انسان مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی اسانس خالص شوید (*Anethum graveolens L.*) تازه و شوید تجاری مورد آزمایش قرار گرفت. نمای حساسیتی میکروگانیسم‌ها در برابر اسانس شوید براساس حساسترین به مقاومتین به ترتیب *E. coli* > *P. aeruginosa* > *C. albicans* > *S. aureus* بود. حداقل غلظت‌های مهارکنندگی (MIC) و کشنندگی (MBC) اسانس‌ها تعیین گردید. اسانس شوید خاصیت کشنندگی و مهارکنندگی میکروبی خوبی بجز در خصوص *Pseudomonas aeruginosa* نشان داد. خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس با روش بتا-کاروتین زدایی و رادیکال‌زدایی انجام و نتایج مقایسه‌ای آنها با آنتی اکسیدان‌های سنتیک BHT و BHA استاندارد انجام شد. بازدارندگی پراکسیداسیون لیپید به‌وسیله اسانس‌ها با قدرت آنتی اکسیدان‌های سنتیک قابل مقایسه بود. مقدار اسانس لازم برای ۵۰٪ رادیکال‌زدایی اسانس شوید تازه ۶/۷ $\mu\text{g}/\text{ml}$ با محتوای فنلی ۹۱/۶ μg و اسانس شوید تجاری برابر ۱۰/۵۳ $\mu\text{g}/\text{ml}$ با محتوای فنلی ۴/۳۴ μg بود. IC₅₀ روغن‌های انسانی شوید تازه و تجاری تأثیر سمیت سلولی بر سلول‌های خون محيطی به ترتیب ۷ $\mu\text{g}/\text{ml}$ و ۳۰/۴۲ $\mu\text{g}/\text{ml}$ و در خصوص سلول‌های سرطانی هلا برابر ۸/۵۱ $\mu\text{g}/\text{ml}$ و ۲۰/۵/۶۵ $\mu\text{g}/\text{ml}$ بود. بنابراین نتایج نشان می‌دهند که روغن‌های انسانی شوید با احتیاط و پس از تعیین دوز مورد مصرف قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: شوید (*Anethum graveolens L.*), ضد میکروبی، سیتو توکسیستی، آنتی اکسیدان، روغن‌های انسانی.

آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی آنها با روش‌های مختلف

آزمایشگاهی با هدف جایگزینی با مواد شیمیایی سنتیک در نگهداری مواد غذایی مورد توجه ویژه است. گیاهان

استخراج ترکیب‌های شیمیایی روغن‌های انسانی گونه‌های مختلف گیاهی و اثبات فعالیت‌های

مزمن این ترکیب‌ها نظیر تراتوژنی، جهش‌زایی و سرطان‌زایی بالقوه نیز مقالات کمی وجود دارد (Yang *et al.*, 1996). به رغم این‌که برخی از روغن‌های انسانی دارای اندکی اثر سمی حاد هستند، اما استفاده از روغن‌های انسانی در خیلی از کشورها تحت کنترل یا ضابطه‌مند نیست. با توجه به گسترش مصرف فرآورده‌های گیاهان دارویی در کشورمان لازم است که جوانب مختلف این محصولات به جهت کاربردهای مفید و احیاناً ضررهای آنها در سلامتی انسان مورد توجه قرار گیرد. ازین‌رو، مطالعه حاضر طراحی گردید و اسانس شوید در دو شکل خالص و تجاری آن مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها اسانس شوید

گیاه *Anethum graveolens* در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور اسانس‌گیری شد و اسانس تجاری شوید از منابع تولیدی داخل کشور (شرکت باریج اسانس) که در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد تهیه گردید.

سویه‌های میکروبی

میکروارگانیسم‌های مورد مطالعه به شرح زیر بودند: *E. coli* (ATCC25922), *S. aureus* (ATCC 25923), *P. aeruginosa* (ATCC8830), *C. albicans* (ATCC 5027).

بررسی اثر ضدمیکروبی

اثر ضدمیکروبی با روش *Yadegarinia* و همکاران (۲۰۰۶) انجام شد. برای مطالعه اثر ضدمیکروبی از دو روش انتشار (Diffusion test) و رقت (Dilution test) استفاده شد که از میان روش‌های انتشار از روش دیسک پلیت (Disk -plate method) و از میان روش‌های رقت از

معمول آشپزخانه، گونه‌ها و گیاهان آروماتیکی دارای فعالیت‌های ذکر شده، می‌توانند منابع قابل استفاده‌ای به این منظور باشند. گرچه تناظرها بی در مورد نتایج طیف فعالیت و پتانسیل‌های عصاره‌ها در گزارشها وجود دارد (Yang *et al.*, 1996; Deans & Ritchie, 1987) مطالعات قبلی نشان داده‌است که برگ شوید خطر سرطان را کاهش می‌دهد (Hartmans *et al.*, 1995). میزان روغن بذر شوید ۳/۵٪ است که ۶۰-۴۰٪ آن کاروون است، در حالی که در برگ‌های شوید، ۸-۴٪ روغن وجود دارد که مشتمل از ۴۰٪ کاروون، ۳۲٪ لیمونن و ۲۰٪ فلاندرین است (Hartmans *et al.*, 1995). مهمترین جزء اسانس شوید (*Anethum graveolens* d-کاروون یا (4S)-(+)-کاروون است که ترکیب مفیدی با بوی زیره سیاه/شوید بوده و توسط روش‌های شیمیایی و بیوتکنولوژیکی استخراج و خالص‌سازی می‌شود. این ماده در بذر زیره سیاه و نعنای هم جزء ترکیب‌های عمدۀ است (de Carvalho & da Fonseca, 2006). کاروون دارای فعالیت ضدمیکروبی و ضدقارچی است. طبق یک تحقیق در بلغارستان، بذرهای شوید (*Anethum graveolens*) پس از ۳۵ سال نگهداری، اسانس‌گیری شدند و اسانس آنها بر علیه قارچ *Aspergillus niger* (آسپرژیلوس نایجر) و مخمراهی (*Saccharomyces cerevisiae*) ساکارومایسیس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae) و کاندیدا آلبیکنس (*Candida albicans*) فعالیت ضدمیکروبی نشان دادند (Jirovetz *et al.*, 2003). برگ‌های شوید، بذر و روغن اسانسی آن می‌توانند فعالیت آنتی اکسیدانی خوبی را فراهم کنند (Delaquis *et al.*, 2002). روغن اسانسی شوید برای لنفوسيت‌های انسان سمی بوده‌اند (Lazutka *et al.*, 2001).

مراحل آزمایش از DMSO به عنوان شاهد مواد ضد میکروبی استفاده شد.

تعیین محتوای کل فنل (Total phenolic content (TPC)) با استفاده از روش Kahkonen و همکاران (۱۹۹۹) فنل اسانس‌ها به شرح زیر سنجیده شد: ۳۰۰ میکرولیتر از نمونه در لوله آزمایش ریخته شده و ۱/۵ میلی‌لیتر Folin-Ciocalteau's reagent (10x dilution) کریبات‌سدیم ۷/۵٪ ریخته شده و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده و جذب در 765nm سنجیده شد. فنل کل براساس معادل میکروگرم گالیک‌اسید در هر میلی‌گرم نمونه بیان شد ($y = 0.001x + 0.0335$; $r^2 = 0.9986$).

تعیین خواص آنتی‌اکسیدانی اسانس خواص آنتی‌اکسیدانی با سه روش بتا-کاروتین‌زدایی، تعیین قدرت رادیکال‌زدایی DPPH و سنجش قدرت احیاء فریک (FRAP) با روشهای استاندارد انجام شد.

روش بتا-کاروتین‌زدایی

در روش بتا-کاروتین‌زدایی فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از مهار ترکیب‌های آلی فرار و conjugated diene به روش توصیف شده Miraliakbari و hydroperoxides Shahidi (2008) با اصلاح جزئی استفاده شد. محلول استوک بتا-کاروتون و لینولئیک‌اسید با ۰/۵ میلی‌گرم بتا-کاروتون در ۱ میلی‌لیتر کلروفرم، ۲۵ میکرولیتر لینولئیک‌اسید و ۲۰۰ میلی‌گرم توئین ۴۰ آماده شد و کلروفرم در خلاً تبخیر شد و به آن ۱۰۰ میلی‌لیتر از آب هواده شده اضافه شد. نمونه‌ها (۲ گرم/لیتر) حل شد و ۳۵۰ میکرولیتر از آن به ۲/۵ میلی‌لیتر از مخلوط بالا موجود در لوله‌ها افزوده شد. لوله‌های آزمایش به مدت

روش رقت لوله‌ای استفاده شد. مقدار ۱۰µl اسانس با رقت‌های ۲/۵، ۵ و ۱۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر در ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون میکروبی ریخته و پس از همزدن به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در انکوباتور قرار داده شد و بعد به‌وسیله اسپکتروفوتومتر جمعیت میکروبی تعیین و در نتیجه حداقل غلظت مهارکنندگی (Minimal Inhibitory Concentration) مشخص گردید. سپس از هر کدام از لوله‌ها که رشد جمعیت نشان نداده بودند ۰/۱ میلی‌لیتر روی پلیت حاوی نوترینت آگار کشت داده شد و حداقل غلظت کشنندگی (Minimal Bactericidal Concentration) ماده ضد میکروبی تعیین گردید. برای مطالعه سیتیک میکروبکشی اسانس پس از تعیین MBC از سوسپانسیون‌های میکروبی محتوى 10^6 سلول میکروبی تهیه و مقدار ۱۰µl اسانس در ۵ml سوسپانسیون ریخته شد. در فواصل زمانی معین، مقدار ۱۰µl از هر لوله برداشته، پس از رقیق‌سازی بر سطح محیط نوترینت آگار به‌طور یکنواخت گسترد و به مدت ۲۴ ساعت داخل انکوباتور گذاشته شد. بعد تعداد کلنی‌ها با کلنی کانتر شمارش و با ضرب عکس رقت در تعداد کلنی‌ها تعداد باکتریهای زنده در هر میلی‌لیتر سوسپانسیون تعیین گردید. با استفاده از سیتیک مرگ میکروبی ارزش D (Decimal Reduction Value) براساس زمان لازم برای کاهش ۹۰٪ جمعیت میکروبی در نمونه محاسبه شد.

حالات مختلف که در اسانس‌گیری یا رقیق‌سازی اسانس مورد استفاده قرار می‌گیرند قبلاً در رقت‌های مختلف تهیه و تأثیر آنها را روی میکروب‌های مورد مطالعه با روشهای انتشار و رقت آزمایش شد. متانول و Dimethyl Sulfoxide (DMSO) تأثیر ضد میکروبی نداشتند و مورد استفاده رقیق‌سازی قرار گرفتند. در کلیه

تعیین فعالیت رادیکال زدایی با تست DPPH (pH 7.4) اسانس را با $10\mu\text{L}$ اسانس و $900\mu\text{L}$ میکرولیتر 100mM Tris-HCl و $50\text{ }\mu\text{L}$ میکرولیتر اتانول و 0.5% w/w TWEEN 20 (در $0.5\text{mM} = 0.2\text{mg/ml}$) در اتانول اضافه گردید. مخلوط را به شدت هم زده و جذب فوراً با طول موج 517nm ثبت گردید. ثبت تا 70 دقیقه ادامه یافت و نوسانها یادداشت گردید تا جایی که دیگر نوسانی دیده نشد. برای شاهد به جای اسانس از آب مقطر استفاده شد و Trolox (1mM) به عنوان آنتی اکسیدان پایدار استفاده شد.

فعالیت رادیکال زدایی اسانس با فرمول زیر و براساس درصد ممانعت DPPH محاسبه گردید:

2 ساعت در حمام آب گرم با دمای 50 درجه سانتی گراد همرا با دو تا بلانک گذاشته شدند که یکی از آنها دارای آنتی اکسیدان BHT به عنوان کنترل مثبت و دیگری حاوی DMSO به جای اسانس به عنوان کنترل منفی بودند. لوله های دارای BHT در طول انکوباسیون رنگ خودشان را حفظ کردند. جذب در طول موج 470 نانومتر اندازه گیری شد. فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها (درصد ممانعت کنندگی) با استفاده از فرمول زیر بدست آمد:

$$\text{I\%} = \left(\frac{A_{\beta\text{-carotene after 90min assay}}}{A_{\text{initial } \beta\text{-carotene}}} \right) \times 100$$

$A_{\beta\text{-carotene after 90min assay}}$ جذب بتا-کاروتون بعد از 90 دقیقه باقی ماندن در نمونه ها و $A_{\text{initial } \beta\text{-carotene}}$ جذب بتا-کاروتون در شروع آزمایش می باشد. تمام تست ها سه بار تکرار شده و درصد ممانعت کنندگی با انحراف معیار سه تایی گزارش شد.

$$\text{Inhibition percentage (IP)} = \left[\frac{(A_B - A_A)}{A_B} \right] \times 100$$

A_B = Absorbance value of blank checked after 70 minutes

A_A = Absorbance value of sample checked after 70 minutes

FRAP (2009). به صورت معادل گالیک اسید (GAE) در نمونه محاسبه شد (mg/g)
 $y = 16.66x + 0.0038$; $(r^2 = 0.999)$

تعیین سمیت سلولی اسانس دو رده سلول سرتانی و سلول های تک هسته ای خون محیطی با روش MTT مورد مطالعه قرار گرفتند (Plumb et al., 1989). در این روش احیاء MTT [dimethylthiazolyl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide به وسیله دی هیدروژناز میتوکندری ها به محصول آبی فرمازان انجام می شود که نشان دهنده عملکرد طبیعی

Ferric-reducing power (FRAP assay) سنجش قدرت احیاء فریک (FRAP) assay یک میلی لیتر از رقت های مختلف اسانس به $2/5$ میلی لیتر بافر $0/2\text{M}$ فسفات پتابسیم با $6/6$ pH و $2/5$ میلی لیتر پتابسیم فری سیانید 1% اضافه شده و در دمای 50 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه انکوبه گردید. سپس $2/5$ میلی لیتر تری کلرواستنیک اسید 10% به آن اضافه شد. این ترکیب به چند بخش $2/5$ میلی لیتری تقسیم و با $2/5$ میلی لیتر آب دی یونیزه مخلوط گردید. $0/5$ میلی لیتر FeCl_3 از 30 دقیقه جذب در 700nm سنجیده شد (Lim et al., 2001).

به منظور تعیین حداقل غلظت های مهارکنندگی (MIC) و کشنندگی (MBC) اسانس تازه را در رقت های مختلف در برابر سوسپانسیون های میکروبی محتوی ^۷ ۱۰ میکروارگانیسم در میلی لیتر قرار دادیم. رقت های تعیین شده در آزمایش MBC در برابر سوسپانسیون میکروبی قرار داده شدند تا سنتیک مرگ میکروبی و ارزش D (Decimal Reduction Value) بدست آید (جدول ۱).

فنل کل اسانس های شوید و شوید تجاری به ترتیب معادل $۲ \pm ۰/۹۴$ و $۱۷۴/۹۱$ میکروگرم گالیک اسید در هر میلی گرم نمونه تعیین شد (جدول ۲). خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس با روش بتا-کاروتون زدایی نیز انجام و نتایج مقایسه ای آنها با آنتی اکسیدانهای سنتیک استاندارد در جدول ۲ نشان داده شده است. بازدارندگی پراکسیداسیون لیپید به وسیله اسانس شوید قابل مقایسه با قدرت آنتی اکسیدانهای سنتیک بود (جدول ۲). مقدار اسانس لازم برای ۵۰% رادیکال زدایی اسانس شوید خالص و شوید تجاری به ترتیب $۶/۷$ و $۱۰/۵۳ \mu\text{g}/\text{ml}$ بود. قدرت احیاء فریک (FRAP) اسانس شوید به مراتب بیش از اسانس شوید تجاری بود (جدول ۲).

سمیت سلولی رقت های مختلف اسانس بر سلول های طبیعی انسان، شوید خالص و شوید تجاری به صورت ۵۰% غلظت ممانعت (IC_{50}) به ترتیب $۷\mu\text{g}$ و $۳۰۴۲\mu\text{g}$ (جدول ۳) و در خصوص سلول های سرطانی به ترتیب $۸/۵۱\mu\text{g}$ و $۲۰/۵\mu\text{g}$ بود (جدول ۴).

میتوکندری و حیات سلول است (Lau et al., 2004). پس از برداشت از فلاسک های کشت، سلول ها به تعداد ۱×10^4 تا ۵×10^5 (براساس پروتکل کشت هر سلول سرطانی) در پلیت های ۹۶ چاهکی محتوی ۱۰۰ میکرولیتر محیط کشت در هر چاهک انکوبه شدند. سلول ها برای چسبیدن ۲۴ ساعت زمان نیاز دارند و پس از آن با رقت های مختلف اسانس به مدت ۴۸ ساعت مواجه شدند. ۲۰ میکرولیتر از $5\text{mg}/\text{ml}$ MTT در سالین بافر فسفاته (PBS) به هر چاهک اضافه شده و به مدت ۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شدند. محیط تخلیه شده و ۱۰۰ میکرولیتر DMSO به هر چاهک اضافه شد. پس از ۱۰ دقیقه انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد جذب شاهد (مواجده شده با $۱\% \text{DMSO}$) و نمونه های مواجه شده با اسانس در دستگاه الایزا ریدر با طول موج ۵۷۰ نانومتر خوانده و ثبت شد. منحنی بقا (سلول های زنده) با توجه به سلول های انکوبه شده شاهد ترسیم و سمیت سلولی عبارت از غلظت ماده مانع رشد به میزان $۵۰\% (\text{IC}_{50})$ است. همه تست ها به صورت سه بار تکرار انجام می شوند.

نتایج

نمای حساسیتی میکروارگانیسم ها در برابر اسانس شوید و شوید تجاری براساس حساسترین به مقاومترین *Candida albicans* > *S. aureus* > *E. coli* > *P. aeruginosa* بود. اسانس ها خاصیت کشنندگی و مهارکنندگی میکروبی خوبی بجز در خصوص *Pseudomonas aeruginosa* نشان دادند (جدول ۱).

جدول ۱- میانگین هاله ممانعت رشد میکروبی (میلی متر)، کمترین غلظت های مهار کننده و کشنده و ارزش D ناشی از تأثیر اسانس های خالص و تجارتی شوید

<i>Candida albicans</i>		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		<i>S. aureus</i>		<i>E. coli</i>		غلظت اسانس (mg/ml)
اسانس تجارتی	اسانس خالص	اسانس تجارتی	اسانس خالص	اسانس تجارتی	اسانس خالص	اسانس تجارتی	اسانس خالص	
۱۶ ± ۱	۲۶ ± ۱	۸/۳۳ ± ۰/۵	۱۲ ± ۱	۱۴/۳۳ ± ۱	۱۶/۳۳ ± ۱/۵	۱۰ ± ۱	۱۵ ± ۱	۱۰
۱۲/۷ ± ۰/۶	۲۱/۷ ± ۰/۶	-	۹ ± ۱	۱۱/۳۳ ± ۱/۵	۱۳/۶۷ ± ۱/۵	-	۹/۶۷ ± ۰/۵۸	۵
۱۰/۷ ± ۰/۶	۱۶/۳۳ ± ۱/۵	-	-	۷/۷ ± ۱	۹ ± ۱	-	-	۲/۵
۱۰/۵	۵/۲۵	-	۱۰/۵	۱۰/۵	۱۰/۵	۱۰/۱۰	۱۰/۵	MIC/MBC (mg/ml)
۱۷/۱۴	۸/۵۷	-	-	۱۷/۱۴	۱۲/۸۶	۱۷/۱۴	۱۲/۸۶	D ارزش (دقیقه)

جدول ۲- محتوای فنلی و فعالیتهای آنتی اکسیدانی اسانس های شوید و آنتی اکسیدان های استاندارد

محتوای فنلی (µg/ml GAE)	قدرت احیاء فریک (FRAP) (%) با معادل گالیک اسید (میلی گرم در گرم نمونه)	فعالیت آنتی اکسیدانی (%) با روشن بنا- کاروتین و (مقدار اسانس)	IC ₅₀ (µg)	درصد بازدارندگی DPPH و (مقدار اسانس)	اسانس
۱۷۴/۹۱ ± ۲	۹/۴۳ ± ۱/۴	۹۲/۱۳ + ۳/۶ (۰/۶۲۵mg/ml)	۶/۷	۳۸/۰۲ ± ۲/۷ (۵mg/ml)	شوید خالص
۴/۳۴ ± ۰/۹۴	۰/۱۲ ± ۰/۰۸	۶۸ ± ۳/۳ (۰/۶۲۵mg/ml)	۱۰/۵۳	۲۵/۴۲ ± ۰/۱۸ (۵mg/ml)	شوید تجارتی
				۲۵/۹ ± ۰/۴۷	BHT 1mM
				۴۷/۷ ± ۰/۵	BHA 1mM
				۳۴/۵ ± ۰/۴	Trolox 1mM

جدول ۳- سمیت سلولی رقت های مختلف اسانس بر سلول های طبیعی انسان

درصد مرگ لنفوسیت های زنده	درصد رقت اسانس شوید	درصد مرگ لنفوسیت های زنده	درصد رقت اسانس شوید	درصد مرگ لنفوسیت های زنده	درصد رقت اسانس شوید
تجاری (µg/ml)	تجاری (µg/ml)	تجاری (µg/ml)	تجاری (µg/ml)	تجاری (µg/ml)	تجاری (µg/ml)
۰	۱۰۰ ± ۱/۲	شاهد	۰	۱۰۰ ± ۳	شاهد
۴۴/۳۱	۵۵/۶۹ + ۱/۵	۴	۵۷/۱۷	۴۲/۸۳ ± ۳	۴۰۰
۳۹/۱۱	۶۰/۸۹ + ۱	۲	۴۷/۰۴	۵۲/۹۶ + ۴/۱۹	۲۰۰
۳۸/۱۵	۶۱/۸۵ + ۳	۱	۳۵/۹۸	۶۴/۰۲ ± ۳/۰۵	۲۰۰
۲۴/۱۲	۷۵/۸۸ + ۱/۸	۰/۵	۰	۱۰۰ ± ۱/۴	۱۰۰
۲۲/۸۵	۷۷/۱۵ + ۷	۰/۲۵	۰	۱۰۰ ± ۱/۱	۵۰
				۱۰۰ ± ۱/۳	۲۵
	V µg			۳۰۴۲ µg	IC ₅₀

جدول ۴- سمیت سلولی رقت‌های مختلف انسنس بر سلول‌های سرطانی انسان

درصد مرگ سلول‌های Hela	درصد سلول‌های زنده Hela	رقت انسنس شوید ($\mu\text{g}/\text{ml}$)	درصد مرگ سلول‌های Hela	درصد سلول‌های زنده Hela	رقت انسنس شوید تجاری ($\mu\text{g}/\text{ml}$)
۰	$100 \pm 0/09$	شاهد	۰	$100 \pm 1/9$	شاهد
۵۴/۶۲	$45/۳۸ \pm 0/5$	۲۰	۶۷/۶۴	$۳۱/۳۶ \pm 4$	۱۰۰
۵۲/۰۵	$47/۹۵ \pm 1/6$	۱۰	۶۳/۲۶	$۳۶/۷۴ + 7$	۵۰۰
۴۴/۱۵	$55/۸۵ \pm 1$	۴	۵۴/۲۴	$45/۷۶ \pm 7$	۲۵۰
۴۰/۶۶	$59/۳۴ \pm 2/2$	۲	۴۴/۲۸	$55/۷۲ \pm 4$	۱۰۰
۲۴/۲۹	$65/۷۱ \pm 0/5$	۱	۲۲/۲۱	$77/۷۹ \pm 1/5$	۵۰
۳۰/۲۹	$69/۷۱ \pm 0/3$	۰/۵	۱۶/۰۲	$83/۹۸ \pm 5$	۲۰
$8/51 \mu\text{g}$			$20.5/65 \mu\text{g}$		

بحث

مطالعه انجام شده توسط Naigre و همکاران (۱۹۹۶) نشان داده شده است که در غلظت‌های بالای $10 \mu\text{g}/\text{ml}$ ، (4R)-کاروون فعالیت خوبی بر علیه اشرشیاکولی (*Escherichia coli*)، انتروکوکوس فاسیوم (*Enterococcus faecium*) و آسپرژیلوس نایجر (*A. niger*) دارد. تبدیل (4S)-(+) کاروون به سولفون در سمیت سلولی بخش سمت چپ این سزکویی ترین دخیل است. در مطالعه‌ای، یک سری از ترکیب‌های مرتبط با کاروون، برای توانایی شان در القاء افزایش فعالیت گلوتاتیون-S-ترانسفراز، در چند بافت از موش A/J بررسی شده‌اند (Zheng et al., 1992) و مشخص شده است که (4S)-(+) کاروون بیشترین فعالیت را به عنوان القاء‌کننده در همه بافت‌های آزمایش شده دارد. یک نگهدارنده غذایی ایده‌آل باید اثر بازدارنده‌ی مداومی روی میکروارگانیسم هدف داشته باشد. از آنجا که نیمه عمر و سلامت مواد غذایی به کارایی مواد نگهدارنده آن بستگی دارد؛ بنابراین تغییرپذیری ذاتی ترکیب و فعالیت روغن‌های انسانی خام، کاربردهای آنها را در صنایع غذایی با تردید مواجه می‌سازد. چندین عامل

در مطالعه حاضر فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی انسنس خالص و تجاری شوید مورد آزمایش قرار گرفت. حساسیت میکروبی در مواجهه با انسنس متفاوت بود و کاندیدا آلبیکنس (*C. albicans*) حساس‌ترین میکروارگانیسم در برابر هر دو انسنس بود. کاندیدا آلبیکنس یکی از معمول‌ترین پاتوژن‌های انسانی است که باعث عفونت‌های وسیعی می‌شود و ممکن است سلامتی افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، خصوصاً افراد مبتلا به ایدز را تهدید کند. محدودی از داروها بر علیه عفونت‌های کاندیدایی مؤثر هستند، اما اکثراً محدودیت‌هایی هم از نظر سودمندی و هم از نظر اثرهای جانبی دارند (Raphael & Kuttan, 2003). ترکیب‌های شیمیایی انسنس‌ها مانند کاروون و پریل‌آلدهید (Candida albicans) مانع از تغییر شکل کاندیدا آلبیکنس (*C. albicans*) از فرم کروی به رشته‌ای می‌شوند. با توجه به ارتباط این تغییر با بیماری‌زایی کاندیدا آلبیکنس (*C. albicans*)، این ترکیب‌ها عوامل درمانی بالقوه خوبی در برابر عفونت‌های ناشی از این قارچ هستند (McGeady et al., 2002).

تجاری را دارند، در یک سری از باکتریها و نمونه‌های Franzios *et al.* (1997)، Whysner & Stammati *et al.*, 1999، Williams, 1996).

اگر غلظت‌های نسبی ترکیب‌های ضدمیکروبی در سطوحی تنظیم شوند که به طور مداوم قدرت و طیف مهارکنندگی مورد نیاز را فراهم کنند، ممکن است روغن‌های انسانی تأثیر قابل اطمینانی داشته باشند. این امر توسط تقديری روغن خام (به منظور تولید محصولاتی که ترکیب ثابت و تجدیدپذیر دارند و یا توسط مخلوط کردن بخش‌های منفرد) برای بدست آوردن سطح فعالیت مورد نظر، انجام شدنی است. فنل‌ها و فلاونوئیدهای گیاهی ممانعت از شروع واکنش پراکسیداسیون لیپید را با فرونشانی رادیکال‌های پروکسی و احیاء یا کلاته کردن آهن در آنزیم لیپوکسیژناز، انجام می‌دهند. در این مطالعه ظرفیت DPPH زدایی انسان با آنتی اکسیدان‌های سنتیک استاندارد مقایسه شد (جدول ۲). تفاوت در فعالیت آنتی اکسیدانی می‌تواند مربوط به توانایی زدودن رادیکال‌های پروکسی، رادیکال‌های آزاد DPPH، و رادیکال‌های هیدروکسی باشد (Singh *et al.*, 2005).

بنابراین انسان‌ها با محتوای فنلی بالا و خاصیت خوب آنتی اکسیدانی می‌توانند برای اهداف تغذیه‌ای و نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند. البته نقش مفید دی‌ترپین‌ها، مونو‌ترپین‌ها و تتراترپین‌ها در سلامتی بررسی و بحث شده است (Wagner & Elmadfa, 2003).

در مطالعه فوق به روش‌های مختلف عمل ترپین‌ها به خصوص مسیری که مانع استرس اکسیداتیو، بیماریهای سرطان و قلبی-عروقی می‌شوند، توجه شده است. غلظت ۵۰٪ کشنده (IC₅₀) انسان‌های شوید بر علیه سلول‌های Hela

ممکن است در ناهمخوانی نتایج پتانسیل ضدمیکروبی روغن‌های انسانی نقش داشته باشد که برخی از آنها به شرح زیر است:

گاهی تفاوت در کیفیت و کمیت فعالیت روغن‌های انسانی، به اختلاف تکنیک‌های آنالیزی نسبت داده می‌شود (Mann & Markham, 1998).

قابلیت تبخیر و محلولیت بسیار کم، در بیشتر روغن‌های انسانی مشکل‌آفرین است، به ویژه در روش‌هایی که براساس انتشار و رقت ماده مورد آزمایش در محیط میکروبیولوژیکی است.

تفاوت در ترکیب مربوطه به علت تنوع عملیات و فرآوری‌های کشاورزی در ویژگی‌های ضدمیکروبی تأثیرگذار است؛ زیرا این فاکتورها در غلظت اجزاء فعال نقش دارند.

روغن‌های انسانی خاصی ممکن است حاوی ترکیب‌های پیچیده‌ای باشند ولی واکنش بین ترکیب‌های ضدمیکروبی کمتر شناخته شده و ممکن است منجر به تأثیرات آنتاگونیستیک و همافرایی شود (Davidson & Didry, 1989؛ Parish, 1989)؛ به طوری که همکاران (1993) فعالیت همافرایی را بین کارواکرول و تیمول گزارش کرده‌اند. اگرچه مقالات مرتبط با سمتیت ژنتیکی بسیار فراوان هستند (حدود ۳۰ جزء از روغن‌های انسانی به خصوص مونو‌ترپین‌ها و آلکنیل‌بنزن‌ها آزمایش شده‌اند)، به نظر می‌رسد حدود یک سوم موارد آزمایش شده در یک یا چندین تست سمتیت ژنتیکی این اثر منفی را نشان داده باشند. مثال‌هایی از این دسته عبارتند از: آنتول (Kim *et al.*, 1982)، آنتول اکسید (Sekizawa & Shibamoto, 1982)، آنتول اکسید (1999)، با وجود این، ترکیب‌های دیگری نظیر بتامیرسین، d-لیمونیل و کاروون که بیشترین اهمیت

- Yadegarinia, D., Gachkar, L., Rezaei, M.B., Taghizadeh, M., Astaneh, S.A. and Rasooli, I., 2006. Biochemical activities of Iranian *Mentha piperita* L. and *Myrtus communis* L. essential oils. *Phytochemistry*, 67(12): 1249-1255.
- de Carvalho, C.C.C.R. and da Fonseca, M.M., 2006. Carvone: Why and how should one bother to produce this terpene. *Food Chemistry*, 95(3): 413-422.
- Deans, S.G. and Ritchie, G., 1987. Antibacterial properties of plant essential oils. *International Journal of Food Microbiology*, 5(2): 165-180.
- Franzios, G., Mirotsou, M., Hatziapostolou, E., Kral, J., Scouras, Z.G. and Mavragani-Tsipidou, P., 1997. Insecticidal and genotoxic activities of mint essential oils. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 45(7): 2690-2694.
- Hartmans, K.J., Diepenhorst, P., Bakker, W. and Gorris, L.G.M., 1995. The use of carvone in agriculture: sprout suppression of potatoes and antifungal activity against potato tuber and other plant diseases. *Industrial Crops and Products*, 4: 3-13.
- Jirovetz, L., Buchbauer, G., Stoyanova, A.S., Georgiev, E.V. and Damjanova, S.T., 2003. Composition, quality control, and antimicrobial activity of the essential oil of long-time stored dill (*Anethum graveolens* L.) seeds from Bulgaria. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 51(13): 3854-3857.
- Kahkonen, M.P., Hopia, A.I., Vuorela, H.J., Rauha, J.P., Pihlaja, K., Kujala, T.S. and Heinonen, M., 1999. Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 47(10): 3954-3962.
- Lau, C.B.S., Ho, C.Y., Kim, C.F., Leung, K.N., Fung, K.P., Tse, T.F., Chan, H.H.L. and Chow, M.S.S., 2004. Cytotoxic activities of *Coriolus versicolor* (Yunzhi) extract on human leukemia and lymphoma cells by induction of apoptosis. *Life Sciences*, 75(7): 797-808.
- Lazutka, J.R., Mierauskienė, J., Slapsyte, G. and Dedonyte, V., 2001. Genotoxicity of dill (*Anethum graveolens* L.), peppermint (*Mentha piperita* L.) and pine (*Pinus sylvestris* L.) essential oils in human lymphocytes and *Drosophila melanogaster*. *Food and Chemical Toxicology*, 39(5): 485-492.
- Lim, T.Y., Lim, Y.Y. and Yule, C.M., 2009. Evaluation of antioxidant, antibacterial and anti-tyrosinase activities of four *Macaranga* species. *Food Chemistry*, 114(2): 594-599.
- Mann, C.M. and Markham, J.L., 1998. A new method for determining the minimum inhibitory concentration of essential oils. *Journal of Applied Microbiology*, 84: 538-544.

و خون محیطی ارزیابی گردید (جدولهای ۳ و ۴). نتایج این مطالعه ارزش توجه از دریچه خاصیت آنتی اکسیدانی و کمoterاپی ضدنئوپلاستی (anti-neoplastic chemotherapy) پیدا می کنند که می تواند پایه یک تحقیق ارزشمند دیگر قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که انسان شوید با احتیاط و فقط پس از تعیین دوز مورد مصرف قرار گیرد. با توجه به تأثیر منفی مقدار کم انسان شوید خالص بر سلولهای سالم خون محیطی (جدول ۳) می توان تأثیرات منفی خوراکی این انسان را مورد توجه قرار داد و فقط نباید خاصیت کشنده گی قوی آن در مورد سلولهای سرطانی (جدول ۴) را مبنای استفاده دانست.

سپاسگزاری

بدین وسیله مراتب تشكیر و قدردانی خود را از مسئولان مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد که با تأمین هزینه های این طرح امکان عملی شدن آن را فراهم آورددند، اعلام می کنیم.

منابع مورد استفاده

- Davidson, P.M. and Parish, M.E., 1989. Methods for testing the efficacy of food antimicrobials. *Food Technology*, 52: 148-155.
- Delaquis, P.J., Stanich, K., Girard, B. and Mazza, G., 2002. Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils. *International Journal of Food Microbiology*, 74: 101-109.
- Didry, N., Dubreuil, L. and Pinkas, M., 1993. Antimicrobial activity of thymol, carvacrol and cinnamaldehyde alone or in combination. *Pharmazie*, 48(4): 301-304.
- Kim, S.G., Liem, A., Stewart, B.C. and Miller, J.A., 1999. New studies on trans-anethole oxide and trans-asarone oxide. *Carcinogenesis*, 20(7): 1303-1307.
- Wagner, K.H. and Elmadafa, I., 2003. Biological relevance of terpenoids: Overview focusing on mono-, di-and tetraterpenes. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 47(3-4): 95-106.

- Mutation Research/Genetic Toxicology, 101(2): 127-140.
- Singh, G., Maurya, S., de Lampasona, M.P. and Catalan, C., 2005. Chemical constituents, antimicrobial investigations, and antioxidative potentials of *Anethum graveolens* L. essential oil and acetone extract: Part 52. Journal of Food Science, 70(4): M208-M215.
 - Stammati, A., Bonsi, P., Zucco, F., Moezelaar, R., Alakomi, H.L. and Von Wright, A., 1999. Toxicity of selected plant volatiles in microbial and mammalian short-term assays. Food and Chemical Toxicology, 37(8): 813-823.
 - Whysner, J. and Williams, G.M., 1996. d-Limonene mechanistic data and risk assessment: Absolute species-specific cytotoxicity, enhanced cell proliferation, and tumor promotion. Pharmacology and Therapeutics, 71: 127-136.
 - Yang, Y., Huang, C.Y., Peng, S.S. and Li, J., 1996. Carotenoid analysis of several dark-green leafy vegetables associated with a lower risk of cancers. Biomedical and Environmental Sciences, 9(4): 386-392.
 - Zheng, G.Q., Kenney, P.M. and Lam, L.K.T., 1992. Effects of carvone compounds on glutathione S-transferase activity in A/J mice. Journal of agricultural and food chemistry, 40: 751-755.
 - McGeady, P., Wansley, D.L. and Logan, D.A., 2002. Carvone and perillaldehyde interfere with the serum-induced formation of filamentous structures in *Candida albicans* at substantially lower concentrations than those causing significant inhibition of growth. Journal of Natural Products, 65(7): 953-955.
 - Miraliakbari, H. and Shahidi, F., 2008. Antioxidant activity of minor components of tree nut oils. Food Chemistry, 111(2): 421-427.
 - Naigre, R., Kalck, P., Roques, C., Roux, I. and Michel, G., 1996. Comparison of antimicrobial properties of monoterpenes and their carbonylated products. Planta Medica, 62(3): 275-277.
 - Plumb, J.A., Milroy, R. and Kaye, S.B., 1989. Effects of the pH dependence of 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide-formazan absorption on chemosensitivity determined by a novel tetrazolium-based assay. Cancer Research, 49(16): 4435-4440.
 - Raphael, T.J. and Kuttan, G., 2003. Immunomodulatory activity of naturally occurring monoterpenes carvone, limonene, and perillie acid. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 25(2): 285-294.
 - Sekizawa, J. and Shibamoto, T., 1982. Genotoxicity of safrole-related chemicals in microbial test systems.

Antimicrobial, antioxidant and cytotoxic properties of essential oil of *Anethum graveolens* L.

M. Dadashpour¹, I. Rasooli^{2*}, F. Sefidkon³, M. Taghizadeh⁴ and S. Darvish Alipour Astaneh¹

1- MSc. Student, College of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran

2*- Corresponding author, Department of Biology, College of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran

E-mail: rasooli@shahed.ac.ir

3- Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

4- Department of Chemistry, College of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran

Received: August 2010

Revised: December 2010

Accepted: December 2011

Abstract

Essential oils with good antioxidant properties could be used for therapeutic, nutritional and food preservation purposes. With the increasing use of medicinal plant products, different aspects need to be considered in terms of useful applications and their potential harm to human health. In the present study, antimicrobial, antioxidative and cytotoxic properties of fresh and commercial essential oils of *Anethum graveolens* L. were studied. The bacterial strains sensitive to *Anethum graveolens* oils were in the following order: *Candida albicans*>*S. aureus*>*E. coli*>*P. aeruginosa*. The minimum inhibitory and bactericidal concentrations of the oils were determined. The essential oils had good bactericidal and bacteriostatic properties except for *Pseudomonas aeruginosa*. Antioxidative properties of the oils were studied using DPPH free radical scavenging and beta-carotene bleaching tests and the results were compared with standard synthetic antioxidants. Lipid peroxidation inhibitions were comparable to the synthetic antioxidants of BHT and BHA. The oil concentration required for 50% free radical scavenging (IC_{50}) was 6.7 μ g/ml with total phenol contents of 174.91 μ g GAE/mg for fresh oil of *A. graveolens*, while they were 10.53 μ g/ml and 4.34 GAE/mg respectively for the commercial oil. The volatile oils from fresh and commercial *A. graveolens* displayed cytotoxic effects on human peripheral blood cells (lymphocytes) with IC_{50} of 7 and 3042 μ g/ml and on human tumor cell line (HeLa cells) with IC_{50} of 8.51 μ g/ml and 205.65 μ g/ml respectively. The results show that essential oils of *A. graveolens* could be used with caution and after determining the dose.

Key words: *Anethum graveolens* L., antimicrobial, antioxidant, cytotoxicity, essential oils.