

## خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه‌شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک مخصوصات انباری

فاطمه حمزه‌وی<sup>۱</sup>، سعید محمرمی‌پور<sup>۲\*</sup> و علی‌اصغر طالبی<sup>۳</sup>

۱- کارشناس ارشد، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۲- نویسنده مسئول، دانشیار، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

پست الکترونیک: moharami@modares.ac.ir

۳- دانشیار، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۱

تاریخ اصلاح نهایی: اردیبهشت ۱۳۹۱

### چکیده

شیشه آرد (Sitophilus granarius L.) و شیشه گندم (Tribolium confusum Jacquel du Val) و شیشه دندانه‌دار (Oryzaephilus surinamensis L.) از مهمترین آفات انباری محسوب می‌شوند، به همین منظور اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه‌شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی حشرات فوق مورد بررسی قرار گرفت. استخراج اسانس از برگ‌های خشک اکالیپتوس و شیشه‌شور با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب انجام شد. برای بررسی قدرت دورکنندگی اسانس‌ها از بویایی‌سنج Y شکل استفاده شد. غلظت‌های ۴ تا ۱۰ میکرولیتر از هر اسانس در ۵۰ میکرولیتر از استون روی ۲ گرم گندم در بازوی تیمار بویایی‌سنج بکار برد شد. بالاترین میزان دورکنندگی اسانس اکالیپتوس و شیشه‌شور در غلظت‌های مورد استفاده به ترتیب ۹۰٪ و ۷۰٪ برای شیشه آرد، ۶۰٪ و ۳۵٪ برای شیشه گندم و برای شیشه دندانه‌دار ۶۰٪ و ۵۳٪ مشاهده شد. اسانس‌ها روی شیشه آرد اثر دورکنندگی بیشتری نسبت به شیشه گندم و شیشه دندانه‌دار داشتند. در غلظت ۳۵/۷۱ میکرولیتر بر لیتر هوا دوام یا نیمه عمر اسانس اکالیپتوس (۳/۷۹ روز) و شیشه‌شور (۴/۳۴ روز) روی شیشه آرد بدست آمد که اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند، اما روی شیشه گندم دوام اسانس اکالیپتوس (۴/۴۰ روز) به‌طور معنی‌داری بیشتر از اسانس شیشه شور (۲/۱۵ روز) بود. این نتایج نشان می‌دهد که اسانس‌های فوق در محیط‌های سربسته با وجودی که در غلظت‌های پایین اثر دورکنندگی قابل توجهی دارند اما این ترکیب‌ها بسیار کم دوام بوده و با سرعت بیشتری تجزیه می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: اسانس، دورکنندگی، آفات انباری، بویایی‌سنج، دوام.

### مقدمه

برای یافتن جایگزین‌های مناسب برای این سوموم در حال انجام است.

مواد شیمیایی دورکننده از پرصرف‌ترین و قدیمی‌ترین ترکیب‌های شیمیایی هستند که برای کنترل آفات بکار می‌روند (Butler, 2007). تحقیقات زیادی در دنیا برای شناسایی خواص دورکنندگی اسانس‌های گیاهی در حال

در میان آفات انباری، راسته سخت‌بالپوشان از رده حشرات، بدون تردید بیشترین خسارت را به فرآورده‌های انباری وارد می‌کنند (باقری زنوز، ۱۳۷۵). از آنجا که استفاده از متیل‌بروماید به‌دلیل اثرات مخرب آن بر محیط‌زیست ممنوع شده (Haque et al., 2000) و شواهد بسیاری حکایت از مقاومت آفات انباری به گاز فسفین دارد

## مواد و روشها

### جمع آوری گیاه

در اواسط شهریور ۱۳۸۸ برگ اکالیپتوس *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. از شاخه‌های ۱-۲ ساله از منطقه سیستان واقع در چاه نیمه و برگ شیشه‌شور *Callistemon viminalis* (Gaertn) از شهرک نمک آبرود استان مازندران در مرحله گلدهی جمع آوری شد. سپس در شرایط سایه با تهویه مناسب خشک شده و در پاکت‌های کاغذی بسته‌بندی و در مکانی تاریک نگهداری گردید و گونه آنها با کمک متخصص گیاه‌شناسی شناسایی شد.

### پرورش حشرات

شیشه آرد *T. confusum* از کلنی موجود در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهیه شد و روی آرد گندم مخلوط با مخمر به نسبت ۱۰ به ۱ پرورش یافت. شیشه گندم *S. granarius* و شیشه دندانه‌دار *O. surinamensis* از روی محصولات انباری آلوهه جمع آوری شدند. بعد از شناسایی توسط متخصص، شیشه گندم روی گندم، شیشه دندانه‌دار روی گندم تکثیر گردیدند. حشرات در ۵٪ مخمر و ۵٪ آرد جوانه گندم تکثیر گردیدند. حشرات در ۶۰ ± ۱ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵ Binder 240 liter در صد و تاریکی در دستگاه ژرمیناتور ۲۷ درجه شدن. بعد از غنی شدن کلنی از لارو و شفیره، پرورش داده شدند. بعد از درون ظروف پرورش جمع آوری شده و حشرات کامل از درون ظروف پرورش جمع آوری شده و حشرات کامل ظاهر شده با طول عمر ۱ تا ۳ روز برای آزمایش استفاده شدند.

### استخراج اسانس

برای تهیه اسانس هر بار ۵۰ گرم نمونه برگ خرد شده همراه با ۶۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر به درون بالن ریخته شد و با کمک دستگاه اسانس‌گیر شیشه‌ای Clevenger (ساخته شده در واحد شیشه‌گری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران) در دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس به مدت ۴ ساعت اسانس‌گیری شد. اسانس بدست آمده توسط سولفات سدیم آبگیری شد و تا زمان استفاده در میکروتیوب‌هایی به حجم ۲ میلی‌لیتر که با فویل آلومینیومی پوشیده شده بودند در یخچال نگهداری گردید.

انجام است. Negahban و Moharrampour (۲۰۰۷) سمشیت تتفصیل اسانس سه گونه اکالیپتوس را روی شیشه آرد، شیشه برنج و سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات بررسی کردند. نگهبان و محرومی‌پور (۱۳۸۵) خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس درمنه دشتی را روی چند آفت انباری مطالعه کرده‌اند. رفیعی کره‌ودی و همکاران (۱۳۸۹) اثرات دورکنندگی ۱۸ گونه اسانس گیاهی از تیره‌های مختلف را روی شب‌پره هندی بررسی نموده‌اند. همچنین خاصیت دورکنندگی اسانس *Eucalyptus citridora* Hook. روی آفت انباری *Sitophilus zeamais* Motschulsky بررسی شده‌است (Nerio et al., 2009). اما حری ری مقدم و همکاران (۱۳۹۰) علاوه بر مطالعه خاصیت کنه‌کشی، اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس را روی کنه دو لکه‌ای اثبات کرده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر اثرات دورکنندگی ترکیب‌های گیاهی روی آفات انباری مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال Kostyukovsky و همکاران (۲۰۰۶) اثرات حشره‌کشی و دورکنندگی تعداد بسیاری از ترکیب‌های معطر گیاهی به خصوص از خانواده نعنایان را روی شیشه دندانه‌دار مورد بررسی قرار داده‌اند. همچنین اثرات حشره‌کشی و دورکنندگی *Ocimum gratissimum* L. روی شیشه برنج، شیشه آرد و شیشه دندانه‌دار بررسی شده‌است (Ogendo et al., 2008). به علاوه اثرات ترکیب‌های دورکننده در قدرت نفوذ آفات انباری به داخل محصولات انباری مورد توجه قرار گرفته است (Hou et al., 2004). از آنجا ترکیب‌های فرار گیاهی روی تحرک و پراکنش آفات انباری تأثیر می‌گذارند روشهای مختلفی برای تعیین پراکنش و فراوانی این حشرات بررسی شده‌است (Hagstrum, 2000).

بعلاوه اینکه دوام سمشیت تتفصیل برخی اسانس‌های گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات مورد توجه قرار گرفته است (تقی‌زاده ساروکلایی و محرومی‌پور، ۱۳۹۰). با وجود این اطلاعاتی در مورد اثر دورکنندگی اسانس‌های اکالیپتوس و شیشه‌شور روی آفات انباری مطالعه شده در این پژوهش موجود نیست. از این‌رو به منظور دستیابی به ترکیب‌های دورکننده اینم، در این پژوهش خواص دورکنندگی و دوام اسانس برگ گیاهان اکالیپتوس و شیشه شور روی چند آفت انباری بررسی می‌شود.

۱۰ میکرولیتر (معادل ۳۵/۷۱ میکرولیتر بر لیتر هوای) از هر انسان به ۱۰۰ شیشه با حجم ۲۸۰ میلی لیتر تزریق شد. بدین ترتیب که انسان روى کاغذ صافی که در درب شیشه ها قرار داده شده بود ریخته شد. در شیشه ها بسته شده و دور آن نوار پارافیلم کشیده شد. هر روز ۴ شیشه انتخاب شده (۴ تکرار) و ۱۰ حشره ۱ تا ۳ روزه به آن منتقل شدند. بلافضله در شیشه ها بسته شده و نوار پارافیلم به دور آن کشیده می شد و بعد از گذشت ۲۴ ساعت مرگ و میر حشرات ثبت می شدند و این مراحل تا زمانی که انسان خاصیت حشره کشی خود را از دست داد و مرگ و میر حشرات به صفر رسید ادامه یافت. آزمایش ها در شرایط دمایی  $27 \pm 1$  درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  $65 \pm 5$  و در تاریکی انجام شد. برای تعیین LT<sub>50</sub> دوام سمیت تنفسی انسان از محاسبه پروبیت به روش Finney (۱۹۷۱) استفاده شد.

## نتایج

### بررسی خاصیت دورکنندگی

در بررسی اثر دورکنندگی انسان ها بین دو متغیر درصد دورکنندگی و غلظت بکار رفته همبستگی خطی مشتبی وجود دارد، به طوری که با افزایش غلظت انسان درصد دورکنندگی آنها افزایش می یابد (شکل ۱). انسان اکالیپتوس روی شیشه آرد در سه غلظت ۶، ۸ و ۱۰ میکرولیتر اثر دورکنندگی معنی داری نشان داد و در بالاترین غلظت به ۹۰٪ رسید اما روی شیشه گندم در غلظت های مورد استفاده از ۱۰٪ تا ۶۰٪ نوسان داشت و به طور کلی در غلظت ۱۰ میکرولیتر اختلاف معنی داری میان شاهد و تیمار مشاهده شد. روی شیشه دندانه دار در بالاترین غلظت دورکنندگی برابر با ۶۰٪ بودست آمد (جدول ۱). انسان شیشه شور روی شیشه آرد در غلظت های ۸ و ۱۰ میکرولیتر در بالاترین غلظت درصد دورکنندگی آن به ۷۶٪ رسید که اثر دورکنندگی معنی داری در سطح ۵٪ نشان داد (جدول ۲) و روی شیشه گندم، انسان شیشه شور دورکنندگی آن به ۳۵٪ رسید. با وجود این اختلاف معنی داری با شاهد در هیچ یک از غلظت های بکار رفته مشاهده نشد، در صورتی که برای انسان اکالیپتوس در غلظت ۱۰ میکرولیتر اختلاف آن با شاهد معنی دار شد و روی شیشه دندانه دار در مقادیر ۸ و ۱۰ میکرولیتر با حداقل ۵۷٪ دورکنندگی آن معنی دار شد.

### آزمایش های دورکنندگی

برای بررسی قدرت دورکنندگی انسان ها از بویایی سنج (Olfactometer) به شکل Y مدل RZR استفاده شد (رفیعی کروهروندی و همکاران، ۱۳۸۷) که در یک طرف حشره کامل گرسنه و در دو بازوی آن غذای سالم و آغشته به انسان قرار گرفت. ۱۵ دقیقه قبل از شروع هر آزمایش دستگاه روشن شد، بدین ترتیب هوا پس از عبور از ذغال فعال وارد دستگاه بویایی سنج می شود. به منظور پخش یکنواخت انسان با غذا، غلظت های ۴، ۶، ۸ و ۱۰ میکرولیتر از هر انسان در ۵۰ میکرولیتر از استون روی غذای حشره ریخته شد. در بازوی شاهد از ۲ گرم گندم با ۵۰ میکرولیتر استون استفاده شد، بعد از ۱۵ دقیقه از تبخیر استون، گندم آغشته به انسان در بازوی تیمار و گندم آغشته به استون در بازوی شاهد قرار گرفت. سپس از حشراتی که ۲۴ ساعت گرسنه و بدون غذا بودند، یک حشره انتخاب و به داخل اتاقک ورودی رهاسازی شد. بعد از ۱۵ دقیقه وضعیت استقرار حشره در سمت بازوی غذای سالم و یا تیمار شده با انسان ثبت گردید. بعد از هر آزمایش بویایی سنج با مخلوط آب و استون شسته شده و در آزمایش بعد محل بازوی تیمار و شاهد جابجا و بعكس شد. این آزمایش برای شیشه آرد و شیشه گندم در ۲۰ تکرار و برای شیشه دندانه دار در ۳۰ تکرار، با حشرات ۱ تا ۳ روزه از هر گونه انجام شد.

درصد دورکنندگی انسان طبق فرمول زیر محاسبه شد .(Liu et al., 2006)

$$\%R = \left[ \frac{C - E}{T} \right] \times 100$$

R درصد دورکنندگی، C تعداد حشرات در ظرف شاهد، E تعداد حشرات در ظرف تیمار و T کل حشرات مورد آزمایش می باشد. به منظور بررسی اثر دورکنندگی انسان داده های هر غلظت با استفاده از آزمون غیرپارامتریک نیکوبی برازش (کای اسکوئر) با فرض برابری نسبت حشره در بازوی شاهد و بازوی تیمار مقایسه آماری شدند.

بررسی دوام سمیت تنفسی انسان ها این آزمایش روی دو آفت شیشه آرد و شیشه گندم انجام شد. به منظور بررسی دوام انسان های مورد مطالعه،

اکالیپتوس و شیشه‌شور داشته و اختلاف معنی‌داری بین آنها دیده نمی‌شود (جدول ۴). همچنین شب خوط معادلات پروریت آنها اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند ( $\chi^2 = 0.0001$ ,  $df = 1$ ,  $P = 1$ ). اما دوام اسانس اکالیپتوس روی شیشه آرد نسبت به اسانس شیشه‌شور  $2/54$  برابر بیشتر بود که این اختلاف براساس حدود اطمینان ۹۵٪ دو اسانس معنی‌دار می‌باشد (جدول ۴). اما شب خوط معادلات پروریت آنها اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند ( $\chi^2 = 1.78$ ,  $df = 1$ ,  $P = 0.182$ ) از دوام دو اسانس روی حشرات مورد مطالعه بدست آمده است. بدین معنی که در مورد اسانس اکالیپتوس، شیشه گندم به طور معنی‌دار نسبت به شیشه آرد حساس‌تر بوده و دوام بیشتری داشته است (شکل ۲ و جدول ۵). اما بعکس دوام اسانس شیشه‌شور روی شیشه آرد به طور معنی‌دار بیشتر از شیشه گندم بوده است (شکل ۲ و جدول ۵). بررسی شب خوط معادلات پروریت در مورد اسانس اکالیپتوس و شیشه شور روی دو حشره به ترتیب ( $\chi^2 = 2.96$ ,  $df = 1$ ,  $P = 0.065$ ) و ( $\chi^2 = 3.39$ ,  $df = 1$ ,  $P = 0.085$ ) بود که اختلاف معنی‌داری نشان ندادند.

### بررسی دوام اسانس‌ها

نتایج نشان داد که دوام اسانس با گذشت زمان کاهش یافته است (شکل ۲)، به طوری که بعد از گذشت ۷ و ۹ روز اسانس اکالیپتوس به ترتیب روی شیشه آرد و شیشه گندم به طور کامل سمیت خود را از دست داد. با تجزیه داده‌های حاصل از آزمایش بررسی دوام اسانس اکالیپتوس نیمه عمر آن روی شیشه آرد برابر  $3/79$  روز و برای شیشه گندم برابر  $4/40$  روز بدست آمد (جدول ۳). اسانس شیشه‌شور بعد از گذشت ۵ و ۴ روز به ترتیب روی شیشه آرد و شیشه گندم اثر بخشی خود را به طور کامل از دست داد. با تجزیه داده‌های حاصل از آزمایش بررسی دوام اسانس شیشه‌شور نیمه عمر آن روی شیشه آرد برابر  $3/29$  روز و برای شیشه گندم برابر  $1/27$  روز بدست آمد و به این معنی است که غلظت  $35/71$  میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس بعد از گذشت زمان‌های بدست آمده می‌تواند  $50\%$  حشرات تحت آزمایش را در مدت زمان ۲۴ ساعت از بین ببرد. نتایجی که از مقایسه سمیت نسبی بدست آمد حکایت از آن داشت که دوام اسانس اکالیپتوس  $1/14$  برابر دوام اسانس شیشه‌شور روی شیشه آرد می‌باشد که حدود اطمینان ۹۵٪ آنها نشان می‌دهد که شیشه آرد حساسیت مشابهی در مقابل اسانس

جدول ۱- میزان دورکنندگی اسانس اکالیپتوس روی شیشه آرد، شیشه گندم و شیشه دندانه‌دار در غلظت‌های مختلف

P-value	$\chi^2$ (df = 1)	تعداد حشرات			غلظت ( $\mu$ l)	اسانس اکالیپتوس
		بی‌پاسخ	تیمار	شاهد		
۰/۱۵۷	۲/۰۰	۲	۶	۱۲	۴	<i>T. confusum</i>
۰/۰۱۲	۶/۲۵۰	۴	۳	۱۳	۶	
۰/۰۰۱	۱۲/۸۰	۰	۲	۱۸	۸	
۰/۰۰۰	۱۶/۲۰۰	۰	۱	۱۹	۱۰	
۰/۶۱۷	۰/۲۵۰	۴	۷	۹	۴	<i>S. granarius</i>
۰/۲۵۱	۱/۳۱۶	۱	۷	۱۲	۶	
۰/۰۷۱	۳/۳۶۷	۵	۴	۱۱	۸	
۰/۰۰۵	۸/۰۰۰	۲	۳	۱۵	۱۰	
۰/۱۷۸	۱/۸۱۵	۳	۱۰	۱۷	۴	<i>O. surinamensis</i>
۰/۴۱۰	۴/۱۷۲	۱	۹	۲۰	۶	
۰/۰۱۹	۵/۵۳۸	۴	۷	۱۹	۸	
۰/۰۰۱	۱۰/۸۰۰	۰	۶	۲۴	۱۰	

جدول ۲- میزان دورکنندگی اسانس شیشه‌شور روی شپشه آرد، شپشه گندم و شپشه دندانه‌دار در غلظت‌های مختلف

P-value	$\chi^2$ (df = 1)	تعداد حشرات			غلظت (μl)	اسانس شیشه‌شور
		بی‌پاسخ	تیمار	شاهد		
۰/۶۳۷	۰/۲۲۲	۲	۸	۱۰	۴	<i>T. confusum</i>
۰/۰۷۴	۳/۲۰۰	۰	۶	۱۴	۶	
۰/۰۰۳	۸/۸۹۵	۱	۳	۱۶	۸	
۰/۰۰۱	۱۰/۸۸۹	۳	۲	۱۶	۱۰	
۰/۸۱۹	۰/۰۵۳	۱	۹	۱۰	۴	<i>S. granarius</i>
۰/۶۱۷	۰/۲۵۰	۴	۷	۹	۶	
۰/۴۶۷	۰/۵۲۹	۳	۷	۱۰	۸	
۰/۱۰۸	۲/۵۷۹	۱	۶	۱۳	۱۰	
۰/۴۵۰	۰/۵۷۱	۲	۱۲	۱۶	۴	<i>O. surinamensis</i>
۰/۱۸۹	۱/۱۲۵	۰	۱۳	۱۹	۶	
۰/۰۲۸	۴/۸۴۰	۵	۷	۱۸	۸	
۰/۰۰۲	۹/۱۴۳	۲	۶	۲۲	۱۰	

جدول ۳- نیمه عمر محاسبه شده در بررسی دوام اسانس اکالیپتوس و شیشه‌شور در غلظت ۳۵/۷۱ میکرولیتر بر لیتر هوا


LT <sub>50</sub> (day) (حدود اطمینان %۹۵)	Slope ± SE	χ <sup>2</sup> (df)	P-value	تعداد	اسانس	حشرات مورد آزمایش
۳/۷۹ (۳/۴۷ - ۴/۱۱)	-۵/۴۰ ± ۰/۶۰	۱/۴۴ (۴)	۰/۸۳۷	۲۴۰	اکالیپتوس	<i>T. confusum</i>
۴/۴۰ (۳/۹۷ - ۴/۸۱)	-۴/۰۰ ± ۰/۴۳	۲/۱۱ (۶)	۰/۸۴۴	۳۲۰	اکالیپتوس	<i>S. granarius</i>
۴/۳۴ (۳/۹۹ - ۴/۷۱)	-۶/۲۸ ± ۱/۰۳	۰/۹۵ (۲)	۰/۶۲۰	۱۶۰	شیشه‌شور	<i>T. confusum</i>
۲/۱۵ (۰/۰۱ - ۲/۹۱)	-۳/۱۴ ± ۱/۴۵	۰/۰۰ (۱)	۰/۹۸۷	۱۲۰	شیشه‌شور	<i>S. granarius</i>

جدول ۴- نسبت‌های LT<sub>50</sub> و حدود اطمینان %۹۵ جهت مقایسه سمتیت اسانس اکالیپتوس و شیشه‌شور روی شپشه آرد و شپشه گندم


حدود اطمینان	نسبت LT <sub>50</sub> اسانس اکالیپتوس / LT <sub>50</sub> اسانس شیشه‌شور	گونه حشره
%۹۵		
۱/۰۰-۱/۳۳	۱/۱۴	شپشه آرد
۱/۸۵-۳/۹۹	۲/۵۴	شپشه گندم

جدول ۵- نسبت‌های  $LT_{50}$  و حدود اطمینان ۹۵٪ جهت مقایسه حساسیت  
شپشه آرد و شپشه گندم نسبت به اسانس‌های اکالیپتوس و شیشه‌شور

حدود اطمینان ٪ ۹۵	نسبت (Relative median potency) $LT_{50}$		نوع اسانس
	$LT_{50}$ شپشه آرد	$LT_{50}$ شپشه گندم	
۰/۷۲-۰/۹۵	۰/۸۳		اکالیپتوس
۱/۴۴-۲/۹۶	۱/۸۸		شیشه‌شور



شکل ۱- میزان دورکنندگی اسانس اکالیپتوس و شیشه‌شور در غلظت‌های مختلف روی شپشه آرد، شپشه گندم و شپشه دندانه‌دار با استفاده از دستگاه بویایی سنج مدل RZR



شکل ۲- دوام اسانس اکالیپتوس و شیشه‌شور بعد از گذشت روزهای مختلف روی شپشه آرد و شپشه گندم

می‌دهند. این نتایج توسط محققان مختلف از جمله شاکری و همکاران (۱۳۸۲)، نگهبان و محرمی‌پور (۱۳۸۵) و صاحف (۱۳۸۵) گزارش گردیده است.

در کشورهای آفریقایی طبق روشی سنتی برای مقابله با آفات انباری برگ گیاهان انسان‌دار را که در محیط فراوان است در لایه‌لای بذرهای انبار شده قرار می‌دهند و از این طریق با کمترین هزینه از محصولات انباری خود محافظت می‌کنند (Golob & Webley, 1980). مطالعات انجام شده در زمینه خاصیت دورکنندگی انسان‌آکالیپتوس و مشتقات آن روی *Aedes albopictus* (Skuse) منجر به ساخت امولسیون‌های دورکننده بر ضد حشرات نیش زننده از انسانس گونه‌های اکالیپتوس شده است (Carroll & Loye, 2006).

دوام انسانس اکالیپتوس و شیشه‌شور بسیار کوتاه‌مدت است، چون این آزمایش در شیشه‌های دربسته و بدون تبادل هوا صورت گرفته است، در واقع زمان لازم برای تجزیه و بی‌اثر شدن انسانس توسط حساسیت حشرات به آنها اندازه‌گیری شده است. ترکیب اصلی انسانس اکالیپتوس و شیشه‌شور ۱،۸-سینئول است که ماده‌ای بسیار فرآربوده و به سرعت اثربخشی خود را از دست می‌دهد (Prates et al., 1999) و می‌تواند دوام کوتاه‌مدت این ترکیب‌ها را توجیه نماید. دوام کوتاه‌مدت و اثر دورکنندگی قابل ملاحظه انسانس‌ها باعث می‌شود که علاوه بر کنترل آفات اثرات مخرب بر محیط زیست نداشته باشند. از طرف دیگر از آنجا که انسانس‌های گیاهی اثرات گسترده طیف داشته و روی گونه‌های مختلف حشرات از جمله دشمنان طبیعی اثرات حشره‌کشی بسیار بالایی دارند، بنابراین دوام کم انسانس‌های فوق امکان استفاده از این ترکیب‌ها را با سایر روش‌های کنترل تلفیقی آفات انباری به خصوص کنترل بیولوژیک فراهم می‌آورد. به نحوی که پس از استفاده از انسانس‌های گیاهی در انبار با ایجاد تهويه مناسب می‌توان حتی از رهاسازی دشمنان طبیعی در این امر استفاده کرد. هر چند در این پژوهش اثرات دورکنندگی بالا اما دوام کم این ترکیب‌ها به اثبات رسیده است، اما این بررسی‌ها در شرایط آزمایشی خاص و در محیطی خارج از توده محصول انباری انجام شده است. به علاوه اینکه عوامل بسیار متعددی در شرایط طبیعی انبار از جمله نوع محصول

بحث

اسانس اکالیپتوس و شیشه‌شور به ترتیب اثر دورکنندگی بیشتری روی شیشه آرد، شیشه دندانه‌دار و شیشه گندم داشتند. با مراجعت به ترکیب‌های اصلی اسانس ها براساس نتایج حاصل از GC-MS ۱،۸-سینثول، آلفا-پینن و متیل استات به ترتیب با ۶۱/۷، ۲۶/۱، ۲۶٪ درصد، بیشترین فراوانی را در اسانس شیشه شور داشته‌اند (Srivastava *et al.*, 2003)، اما در اسانس اکالیپتوس ۱،۸-سینثول (۲۶٪)، آلفا-پینن (۱۲٪) و بتا-فلاندرن (۱۲٪) مهمترین ترکیب‌های آن هستند (Sefidkon *et al.*, 2006). بعضی از منوتین‌ها مثل آلفا-پینن، سینثول، اوژنول، لیمونن، ترپینول، سیترونلول، سیترونلال، کامفور و تیمول به کرات در تحقیقات انجام شده خاصیت دورکنندگی آنها اثبات شده‌است (Yang *et al.*, 2004; Jaenson *et al.*, 2006).

(Park *et al.*, 2005) خاصیت دورکنندگی اسانس‌ها مربوط به نوع ترکیب‌های آنهاست اما اثر سینرژیستی که در بین ترکیب‌ها وجود دارد اثر افزایشی را در ترکیب نسبت به هر یک از آنها به تهایی نشان می‌دهد (Gillij *et al.*, 2001; Hummelbrunner & Isman, 2001).

گاهی این اثر سینرژیستی مربوط به ترکیب‌هایی است که درصد بسیار کمی از اسانس را تشکیل می‌دهند. چون همگی این ترکیب‌ها به صورت دسته جمعی نقش دفاع را در گیاه بر عهده دارند و به صورت انفرادی عمل نمی‌کنند (Berenbaum, 1985). در تحقیقات Hori (2003) اسانس اکالیپتوس (*E. camaldulensis*) بر سوسک توتون (Lassioderma serricorne (F.) در غلظت یک میکرولیتر نداشته‌است، در صورتی که اثر دورکنندگی اسانس *Eucalyptus citridora* Hook روی *Sitophilus zeamais* Mostchulsky قابل توجه ذکر شده است که وجود مقدار فراوان ترکیب سیتریدول را دلیل اثربخشی خوب این اسانس دانسته‌اند. نتایج نشان می‌دهد با افزایش غلظت اسانس درصد دورکنندگی هر سه گونه حشره افزایش می‌یابد و بیشترین درصد دورکنندگی در بالاترین مقدار مشاهده می‌گردد. اثر دورکنندگی اسانس ها همواره روی شیشه آرد مؤثرتر از سایر آفات گزارش شده‌است و این عامل را به دلیل قدرت تحرک و فرار پیشتر شیشه آرد نسبت به سایر حشرات انباری نسبت

صحاف، ب.ز.، ۱۳۸۵. اثرات حشرهکشی اسانس زینیان (*Vitex pseudo-negundo*) و هندیده (*Carum copticum*) روی برخی از آفات انباری. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. نگهبان، م. و محرمی پور، س.، ۱۳۸۵. اثر دورکنندگی و دوام اسانس درمنه دشتی (*Artemisia sieberi Besser*) روی سه گونه آفت انباری. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۴(۲۲): ۳۰۲-۲۹۳.

- Berenbaum, M., 1985. Brementown revisited: Interaction among allelochemicals in plants. *Recent Advances in Phytochemistry*, 19: 139-169.
- Butler, J.F., 2007. *Insect Repellents Principles, Methods and Uses*. CRC press, London, 495p.
- Carroll, S.P. and Loyer, J., 2006. Field Test of a Lemon eucalyptus repellent against leptoconops biting midges. *Journal American of Mosquito Control Association*, 22(3): 483-488.
- Finney, D.J., 1971. *Probit Analysis*. Cambridge University Press, London, 272p.
- Gillij, Y.G., Gleiser, R.M. and Zygadlo, J.A., 2008. Mosquito repellent activity of essential oil aromatic plant growing in Argentina. *Bioresource Technology*, 99(7): 2507-2515.
- Golob, P. and Webley, D., 1980. *The use of Plants and Minerals as Traditional Protectants of Stored Product*. Tropical Products Institute, London, 31p.
- Hagstrum, D.W., 2000. Using five sampling methods to measure insect distribution and abundance in bins storing wheat. *Journal of Stored Products Research*, 36(3): 253-262.
- Haque, M.A., Nakakita, H., Ikenaga, H. and Sota, N., 2000. Development inhibiting activity of some tropical plants against *Sitophilus zeamais* Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae). *Journal of Stored Products Research*, 36(3): 281-287.
- Hori, M., 2003. Repellency of essential oils against the Cigarette beetle, *Lasioderma serricorne* (Fabricius) (Coleoptera: Anobiidae). *Applied Entomology and Zoology*, 38(4): 467-473.
- Hou, X., Fields, P. and Taylor, W., 2004. The effect of repellents on penetration into packaging by stored-product insects. *Journal of Stored Products Research*, 40: 47-54.
- Hummelbrunner, L.A. and Isman, M.B., 2001. Acute, sublethal, antifeedant and synergistic effects of monoterpenoid essential oil compounds on the tobacco cutworm, *Spodoptera litura* (Lep. Noctuidae). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49(2): 715-720.
- Jaenson, T.G.T., Garboui, S. and Palsson, K., 2006. Repellency of oils of lemon Eucalyptus, Geranium, and Lavender and the mosquito repellent muggy natural to *Ixodes ricinus* (Acari: Ixodidae) in the laboratory and field. *Journal of Medical Entomology*, 43(4): 731-736.
- Kostyukovsky, M., Ravid, U., Maor, D., Ogendo, J., Matasyoh, J. and Shaaya, E., 2006. *Phytochemicals*

انباری، میزان حجم و وزن محصول، دما و رطوبت توده انباری در قدرت جذب اسانس، اثر دورکنندگی و دوام آن می‌توانند مؤثر باشند؛ بنابراین موارد فوق از نظر کاربردی باید مورد توجه قرار بگیرند. از طرف دیگر ترکیب‌های روغنی اسانس چون قدرت پخش‌شوندگی مناسبی ندارند به نظر می‌رسد که برای کاربردی کردن این ترکیب‌ها باید از فناوری‌های نو برای تهیه فرمولاسیون‌های مناسب استفاده نمود.

### منابع مورد استفاده

- باقری زنوز، ا.، ۱۳۷۵. آفات فرآورده‌های انباری و روش‌های مبارزه (سخت‌بالپوشان زیان‌آور محولات غذایی و صنعتی) (جلد اول). مرکز نشر سپهر. تهران، ۳۷۵صفحه.
- تقی‌زاده ساروکلایی، ا. و محرمی پور، س.، ۱۳۹۰. اثر بازدارندگی تخم‌ریزی و دوام اسانس‌های گیاهی آویشن ایرانی (*Prangos Thymus persicus*) در مقایسه با جاشیر کوتوله (*Callosobruchus maculatus*) تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۲۷(۲): ۲۱۱-۲۰۲.
- حریری مقدم، ف.، محرمی پور، س. و سفیدکن، ف.، ۱۳۹۰. اثرات دورکنندگی و دوام اسانس *Eucalyptus* روی کنه تارتان *Eucalyptus kingsmillii* و *salmonophloia* دولکه‌ای (*Tetranychus urticae*). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۲۷(۳): ۳۸۳-۳۷۵.
- رفیعی کرهرودی، ز.، محرمی پور، س.، رهبرپور، ع.، ذهبی، پ. و صالحی مزیجانی، م.، ۱۳۸۷. معرفی الفکتور RZR جهت ارزیابی اثر دورکنندگی اسانس‌های گیاهی. هجدهمین کنگره گیاهپژوهی ایران، دانشگاه بوعالی سینا، همدان، ۳-۶ شهریور: ۱۴۴.
- رفیعی کرهرودی، ز.، محرمی پور، س.، فرازنده، ح. و کریم‌زاده اصفهانی، ج.، ۱۳۸۹. خاصیت دورکنندگی و سمیت تنفسی ۱۸ گونه اسانس گیاهی روی شب‌پره هندی (*Plodia interpunctella* Hubner (Lep., Pyralidae)) گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)، ۲۴(۲): ۱۷۲-۱۶۵.
- شاکرمی، ج.، کمالی، ک.، محرمی پور، س. و مشکوه‌السادات، م.۵.۵.، ۱۳۸۳. سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی (*Salvia bracteata*) روی چهار گونه آفت انباری. نامه‌ی انجمن حشره‌شناسی ایران، ۲۴(۲): ۴۹-۲۵.

- Prates, H.T., Santos, J.P., Waquil, J.M. and Oliveira, A.B., 1999. The potential use of plant substances extracted from Brazilian flora to control stored grain pests. Proceedings of the Seventh International Working Conference on Stored-Product Protection, 14-19 October 1998, Beijing, China: 820-825.
- Sefidkon, F., Assareh, M.H., Abravesh, Z. and Mirza, M., 2006. Chemical composition of the essential oils of five cultivated eucalyptus species in Iran: *E. intertexta*, *E. platypus*, *E. leucoxylon*, *E. sergentii* and *E. camaldulensis*. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 9(3): 245-250.
- Srivastava, S.K., Ahmad, A., Syamsunder, K.V., Aggarwal, K.K. and Khanuja, S.P.S., 2003. Essential oil composition of *Callistemon viminalis* leaves from India. Flavour and Fragrance Journal, 18: 361-363.
- Shaaya, E., Kostjukovski, M., Eilberg, J. and Sukprakarn, C., 1997. Plant oils as fumigants and contact insecticides for the control of stored-products insects. Journal of Stored Products Research, 33: 7-15.
- Yang, Y.C., Choi, H.C., Choi, W.S., Clark, J.M. and Ahn, Y.J., 2004. Ovicidal and adulticidal activity of *Eucalyptus globulus* leaf oil terpenoids against *Pediculus humanus Capitis* (Anoplura: Pediculidae). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(9): 2507-2511.
- Liu, C.H., Mishra, A.K., Tan, R.X., Tang, C., Yang, H. and Shen, Y.F., 2006. Repellent and insecticidal activities of essential oils from *Artemisia princeps* and *Cinnamomum camphora* and their effect on seed germination of wheat and broad bean. Bioresource Technology, 97(15): 1969-1973.
- Negahban, M. and Moharrampour, S., 2007. Fumigant toxicity of *Eucalyptus intertexta*, *Eucalyptus sargentii* and *Eucalyptus camaldulensis* against stored product beetles. Journal of Applied Entomology, 131(4): 256-261.
- Neria, L.S., Verbal, J.O. and Stashenko, E.E., 2009. Repellent activity of essential oils from seven aromatic plants grown in Colombia against *Sitophilus zeamais* Motschulsky (Coleoptera). Journal of Stored Products Research, 45(3): 212-214.
- Ogendo, J.O., Kostyukovsky, M., Ravid, U., Matasyoh, J.C., Deng, A.L., Omolo, E.O., Kariuki, S.T. and Shaaya, E., 2008. Bioactivity of *Ocimum gratissimum* L. oil and two of its constituents against five insect pests attacking stored food products. Journal of Stored Products Research, 44(4): 328-334.
- Park, B.S., Choi, W.S., Kim, J.H. and Lee, S.E., 2005. Monoterpene from thyme (*Thymus vulgaris*) as potential mosquito repellent. Journal of the American of Mosquito Control Association, 21: 80-83.

**Repellent activity and persistence of essential oils from  
*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. and *Callistemon viminalis* (Gaertn.)  
G.Don on some species of stored-product beetles**

**F. Hamzavi<sup>1</sup>, S. Moharramipour<sup>2\*</sup> and A.A. Talebi<sup>1</sup>**

1- Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2\*- Corresponding Author, Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

E-mail: moharami@modares.ac.ir

Received: February 2012

Revised: April 2012

Accepted: May 2012

**Abstract**

*Tribolium confusum* Jacquelin du Val., *Sitophilus granarius* L. and *Oryzaephilus surinamensis* L. are the most important stored-product pests on stored wheat. This research was aimed to investigate the repellency effect of *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. and *Callistemon viminalis* (Gaertn.) G.Don essential oils against the above mentioned insects. Essential oils were obtained from dry leaves of *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. and *Callistemon viminalis* (Gaertn.), subjected to hydrodistillation using a modified Clevenger. The Y-tube olfactometer bioassay was used to test the repellency of essential oils. Different concentrations of essential oils (4-10 µl) were prepared by dissolving in 50 µl acetone and mixing with 2 g wheat kernels. The highest repellency of *E. camaldulensis* and *C. viminalis* essential oils were obtained at concentration levels of 90% and 70% for *T. confusum*, 60% and 35% for *S. granarius* and 60% and 53% for *O. surinamensis*, respectively. Results indicated that the essential oils were more repellent to *T. confusum* as compared to *S. granarius* and *O. surinamensis*. At a concentration of 35.71 µl/l. air, the half-life time of *E. camaldulensis* essential oils (3.79 days) was as long as *C. viminalis* (4.34 days) on *T. confusum*. The persistence of *E. camaldulensis* essential oils (4.40 days) was significantly longer than that of *C. viminalis* (2.15 days) on *S. granarius*. Findings indicated that the tested essential oils in protected areas had substantial repellency even at low concentrations; however, they were less persistent compounds, broken down more quickly.

**Key words:** Essential oil, repellency, stored product pests, olfactometer, persistence.