

## اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتیبیوتیک بر بعضی از عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در جوجه‌های گوشته‌ی

زهرا رنجبر<sup>۱</sup>، فرید شریعت‌داری<sup>۲\*</sup> و محمدامیر کریمی ترشیزی<sup>۳</sup>

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۲- نویسنده مسئول، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، پست الکترونیک: shariatf@modares.ac.ir

۳- استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۹۲

تاریخ اصلاح نهایی: اسفند ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: اسفند ۱۳۸۸

### چکیده

این بررسی به منظور مطالعه افزودنی‌های خوراکی شامل سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتیبیوتیک بر عملکرد، سیستم ایمنی، فاکتورهای خونی و شاخص آسیتی اجرا شد. از ۳۱۲ قطعه جوجه گوشته یک روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار، و در ۳ تکرار با ۲۶ جوجه (۱۳ نر و ۱۳ ماده) استفاده شد. تیمارها شامل شاهد (بدون افزودنی)، سطوح ۱۵۰ mg/kg و ۲۲۵ mg/kg از عصاره *Yucca schidigera* و جیره حاوی ۱۵ mg/kg آنتیبیوتیک ویرجینیامايسین می‌باشد. وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل در ۴۲ روزگی بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری را نشان داد ( $p < 0.01$ ). به طوری که تیمار سطح ۱ از عصاره و آنتیبیوتیک بالاترین وزن بدن و بهترین ضریب تبدیل را داشتند. عیارهای پادتن تحت تأثیر افزودنی‌های جیره قرار گرفت ( $p < 0.01$ ). وزن اندام‌های لنفی در گروه‌های آزمایشی بین تیمارها معنی‌دار نبود ( $p > 0.05$ ). اثر تیمارهای آزمایشی بر کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL و LDL در ۳۵ روزگی در گروه‌های آزمایشی مختلف تفاوت معنی‌داری ( $p < 0.01$ ) را بر پارامترهای ذکر شده نشان دادند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می‌دهند که یوکا می‌تواند تأثیرات مثبت بر عملکرد طیور داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: عصاره یوکا، عملکرد، سیستم ایمنی، شاخص آسیتی، جوجه‌های گوشته.

### آن داشته که به مواد جایگزین مؤثره گیاه به عنوان راهکاری

برای بهبود سلامت در حیوان روی بیاورند.

گیاه یوکا (*Yucca schidigera*) با داشتن ماده مؤثره ساپونین‌ها به عنوان متابولیت‌های ثانویه گیاهی و یلی‌فنول‌ها دارای اثرات زیاد و متفاوتی است که در صنعت دام و طیور مورد استفاده می‌باشد (Francis *et al.*, 2002). بدليل اثرات مختلفی که ساپونین‌ها دارند، می‌توانند به عنوان یک مکمل غذایی به منظور تعدیل فلور میکروبی در روده پرندگان، نقش آن در سیستم ایمنی و جذب مواد مغذی، کاهش غلظت آمونیاک و ترکیب‌های بودار در سالن‌های پرورش طیور مورد استفاده قرار گیرند (Cheeke *et al.*, 2006).

مقدمه در تولید تجاری طیور هر گونه اختلال در سلامت پرنده، تأثیر مهمی بر راحتی حیوان و بازده اقتصادی آن خواهد داشت. در طی سال‌ها آنتیبیوتیک به طور گستردگی در تولید طیور به عنوان افزایش‌دهنده رشد برای بهبود استفاده از خوراک و بهبود تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر مصرف آنتیبیوتیک‌ها باعث ظهور مقاومت آنتیبیوتیکی شده و عوارض جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارند و از این‌رو در بسیاری از کشورها استفاده از آنها منسوخ شده است (Banfando *et al.*, 2003). پیدا کردن راهکارهایی برای جایگزینی مواد ممنوع شده، محققان را بر

۱/۰ میلی لیتر (۵٪) در ۲۵ و ۴۵ روزگی انجام گردید و خونگیری ۶ روز بعد از هر تزریق برای تعیین تیتر آنتیبادی انجام شد (Peterson *et al.*, 1999). برای بررسی پاسخ ایمنی با واسطه سلولی از طریق افزایش ضخامت پرده پا پس از تزریق فیتوهماگلوتنین (PHA) در سن ۴۳ روزگی ۲ پرنده از هر واحد آزمایشی به طور تصادفی انتخاب و بعد به هر کدام از پرنده‌ها مقدار ۱/۰ میلی لیتر PHA در فاصله بین انگشتان پای چپ و همین مقدار PBS در فاصله بین انگشتان پای راست تزریق شد. میزان افزایش در قطر محل تزریق اندازه‌گیری شده و به عنوان معیاری برای سنجش سیستم ایمنی منظور شد. کلسترول و تری‌گلیسرید موجود در نمونه‌های سرم شد. کلسترول و تری‌گلیسرید موجود در نمونه‌های آزمون با استفاده از روش آنژیمی CHOD-PAP و با کیت اسپکتروفتومتر خوانده شد (Richmond, 1973). آنالیز داده‌ها به وسیله نرم افزار SAS و مقایسه میانگین‌ها توسط آزمون دانکن انجام گردید.

## نتایج عملکرد

نتایج مربوط به تأثیر استفاده از سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی‌بیوتیک بر فاکتورهای عملکردی جوجه‌های گوشتی در کل دوره در جدول ۱ ارائه شده است. مقایسه نتایج حاصل از تیمارها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی تفاوت معنی‌داری را نشان داد. کاربرد یوکا و آنتی‌بیوتیک در جیره جوجه‌های گوشتی در مقایسه با گروه شاهد، به طور معنی‌داری سبب بهبود وزن بدن گردید ( $0/05 > 0/0$ ). تیمار سطح ۱ عصاره و آنتی‌بیوتیک بیشترین وزن بدن و گروه شاهد کمترین وزن بدن را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد. در کل دوره بالاترین مصرف خوراک مربوط به گروه آنتی‌بیوتیک بوده که با سطح ۱ تفاوتی نداشته و کمترین آن مربوط به گروه شاهد می‌باشد. ضریب تبدیل جوجه‌ها نیز از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را نشان داد، به طوری که در کل دوره (۱-۴۲ روزگی) جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی یوکا در سطح ۱ و آنتی‌بیوتیک کمترین و گروه شاهد بالاترین ضریب تبدیل را نشان دادند ( $0/05 < 0/0$ ).

آزمایش‌ها نشان داده‌است که عصاره یوکا موجب بهبود عملکرد (افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی) می‌گردد (Yeo & Kim, 1997). گیاهان دارویی مانند یوکا علاوه بر اثرات ضدیکروزی، فواید دیگری نیز دارند. این اثرات مفید شامل اثرات کاهش لیپیدهای سرمی، سطح کلسترول خونی و بهبود دیگر فاکتورهای خونی است (Cheeke, 2000). از طرف دیگر نتایج بدست آمده از برخی تحقیقات، بهبودی در عملکرد طیور را اثبات نکرده است (Rowland *et al.*, 1976). بررسی اثر سه سطح عصاره یوکا بر عملکرد مرغ تخم‌گذار نشان داد که وزن بدن، تولید تخم مرغ، مصرف خوراک و ضریب تبدیل تحت تأثیر یوکا قرار نگرفت (Kaya *et al.*, 2003). در تحقیقی اثرات یوکا بر رشد جوجه‌های گوشتی و کاهش آمونیاک تولید شده و اوره در روده غیرمعنی‌دار گزارش شد (Yeo & Kim, 1997). هدف از این آزمایش بررسی استفاده از یوکا در مقایسه با آنتی‌بیوتیک بر عملکرد طیور بوده است.

## مواد و روشها

این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد ۳۱۲ قطعه جوجه نژاد آرین با ۴ تیمار و ۳ تکرار و تعداد ۲۶ جوجه (۱۳ نر و ۱۳ ماده) در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل افزایش سطوح ۱۵۰ppm و ۲۲۵ppm از عصاره *Yucca schidigera* به جیره در مقایسه با جیره حاوی ۱۵ppm آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین و شاهد در نظر گرفته شد. جیره آزمایشی در سه مرحله ۱-۱۴ روزگی، ۱۵-۲۸ روزگی و ۲۹-۴۲ روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت (جدول ۱). هر تکرار در پن‌هایی مجزا در ابعاد  $1 \times 2$  متر و بر روی بستر کاه گندم (هر پن ۵kg به ارتفاع ۵cm) جا داده شدند. فاکتورهای اندازه‌گیری شده شامل وزن بدن، ضریب تبدیل، مصرف خوراک، سیستم ایمنی، فاکتورهای خونی، اندازه‌گیری فشار سرخرگی و هماتوکریت خون بودند. در طول دوره آزمایشی برای تعیین فاکتورهای خونی و سنجش سیستم ایمنی از هر تیمار ۶ قطعه مرغ از طریق ورید بال خونگیری شدند. برای اندازه‌گیری سیستم ایمنی همورال، دوبار تزریق آنتی‌زن گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به میزان

جدول ۱- اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن بدن (گرم)، خوراک مصرفی (گرم) و ضریب تبدیل در کل دوره (۴۲ روزگی)

تیمار	وزن بدن	خوراک مصرفی	ضریب تبدیل
شاهد	۲۱۸۶/۳۱ ± ۵۴/۲۴ b	۴۲۹۶/۷۰ ± ۵۱/۴۱ b	۱/۹۷ ± ۰/۰۳ a
سطح ۱ یوکا	۲۵۱۵/۱۱ ± ۳۲/۹۰ a	۴۵۸۵/۰۱ ± ۴۱/۰۳ a	۱/۸۲ ± ۰/۰۰ b
سطح ۲ یوکا	۲۳۱۵/۵۶ ± ۳۹/۷۵ b	۴۳۱۰/۵۱ ± ۷۱/۷۳ b	۱/۸۶ ± ۰/۰۱ b
آنتیبیوتیک	۲۵۱۲/۹۱ ± ۳۳/۸۱ a	۴۵۹۵/۹۷ ± ۲۱/۵۱ a	۱/۸۳ ± ۰/۴۸ b
SEM	۴۵/۵۰	۴۸/۲۲	۰/۰۱۹
P value	۰/۰۰۱	۰/۰۰۳	۰/۰۰۱

a و b: میانگین‌های با حروف متفاوت اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد ( $p < 0.05$ ).

سطح ۱ از عصاره داشتند ( $p < 0.05$ ). اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش ضخامت پوست در تست فیتوهاماکلوبینین اختلاف معنی‌داری را نشان داد ( $p < 0.05$ ). به گونه‌ای که بیشترین افزایش ضخامت پوست مربوط به تیمار سطح ۲ و کمترین افزایش ضخامت مربوط به تیمار شاهد بود (جدول ۲). وزن اندام‌های لنفی در گروه‌های آزمایشی بین تیمارها معنی‌دار نبود ( $p < 0.05$ ).

بررسی سیستم ایمنی تیمارهای آزمایشی در نوبت اول بر سیستم ایمنی اثر معنی‌داری بر عیار پادتن داشتند ( $p < 0.05$ ). به طوری که بالاترین عیار پادتن مربوط به تیمار شاهد و پایین‌ترین عیار پادتن مربوط به تیمار آنتیبیوتیک بود. عیار پادتن در نوبت دوم نیز تحت تأثیر افزودنی‌های جیره قرار گرفت، ولی در این دوره کمترین عیار را گروه شاهد و بیشترین را گروه

جدول ۲- اثر تیمارهای آزمایشی بر پاسخ ایمنی و وزن نسبی اندام‌های لنفی

تیمار	عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفتند		نوبت دوم	نوبت اول
	وزن نسبی بورس	وزن نسبی طحال		
شاهد	۴/۰۲ ± ۰/۷۴ b	۰/۱۲ ± ۰/۰۱	۰/۳۲ ± ۰/۱۰ c	۲/۳۳ ± ۰/۸۸ a
سطح ۱ یوکا	۶/۷۲ ± ۰/۶۱ a	۰/۱۰ ± ۰/۰۱	۰/۸۲ ± ۰/۱۳ ab	۲/۰۰ ± ۰/۳۶ ab
سطح ۲ یوکا	۴/۵۰ ± ۰/۳۹ b	۰/۱۱ ± ۰/۰۱	۱/۰۰ ± ۰/۱۵ a	۳/۰۴ ± ۰/۲۶ a
آنتیبیوتیک	۴/۵۰ ± ۰/۳۹ b	۰/۱۱ ± ۰/۰۰	۰/۵۸ ± ۰/۱۴ bc	۱/۱۷ ± ۰/۱۷ b
SEM	۰/۲۹	۰/۰۰۸	۰/۰۸	۰/۳۳
P value	۰/۰۲	۰/۹۴	۰/۰۱	۰/۰۱

میانگین‌های با حروف متفاوت اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد ( $p < 0.05$ ).

pha = افزایش ضخامت پوست در تست فیتوهاماکلوبینین (میلی‌متر)

تفاوت معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) را بر پارامترهای ذکر شده نشان دادند (جدول ۳). میزان کلسیرون گروه آنتیبیوتیک از همه‌ی گروه‌ها بالاتر بود، در حالی که کمترین مقدار به گروه سطح ۲ از عصاره یوکا تعلق داشت. بیشترین میزان تری‌گلیسرید مربوط به گروه سطح ۱ از عصاره یوکا بوده است.

فاکتورهای خونی اثر تیمارهای آزمایشی بر کلسیرون، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا (High Density Lipoprotein) و لیپوپروتئین‌های با چگالی پایین (Low Density Lipoprotein) در ۳۵ روزگی در گروه‌های آزمایشی مختلف،

جدول ۳- اثر تیمارهای آزمایشی بر فاکتورهای خونی (میلی گرم بر دسی لیتر) در ۳۵ روزگی

LDL	HDL	تری گلیسرید	کلسترول	تیمار
۴۰/۸۶ ± ۲/۸۲ ab	۲۹/۴۶ ± ۲/۱۷ b	۸۹/۵۲ ± ۲/۴۰ b	۹۶/۲۶ ± ۱/۴۸ b	شاهد
۳۲/۶۲ ± ۲/۵۲ b	۴۸/۴۷ ± ۱/۶۴ a	۱۰۳/۲۰ ± ۴/۲۳ a	۱۰۱/۷۳ ± ۱/۷۵ b	سطح ۱ یوکا
۲۵/۶۲ ± ۲/۷۲ ab	۳۴/۶۸ ± ۲/۰۶ b	۸۶/۳۲ ± ۴/۰۵ c	۹۶/۱۵ ± ۲/۰۳ b	سطح ۲ یوکا
۴۲/۰۲ ± ۲/۸۴ a	۵۰/۰۶ ± ۱/۶۲ a	۹۸/۳۸ ± ۱/۵۰ ab	۱۱۱/۷۶ ± ۲/۵۰ a	آنتی بیوتیک
۱/۵۴	۱/۶۳	۲/۱۲	۱/۹۹	SEM
۰/۰۹	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	P value

a, b و c: میانگین‌های با حروف متفاوت اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهند ( $p < 0.05$ ).

1981). ساپونین‌ها به دلیل نوع ساختاری که دارند، از غشای اپیتلیال دستگاه گوارش قابل جذب نبوده، بنابراین درون لوله گوارشی بر هضم اثر می‌گذارند. به طور کلی نتایج حاصل از استفاده یوکا و تأثیر آن بر حیوانات در بررسی‌های گوناگون آمار متفاوتی را نشان می‌دهد. البته مصرف خوراک در موش‌های تغذیه شده با ساپونین تأثیری نداشته است (Periston *et al.*, 1987) جیره (به دلیل مزه یوکا به صورت گس، تلن و صابونی) موجب کاهش مصرف خوراک گردید (Cheeke, 1996).

مطابق با این بررسی (جدول ۳) افزایش ایمنی (هومورال و سلوالی) با استفاده از عصاره گیاهان حاوی ساپونین شده است. به دلیل وجود ترکیب‌های ثانویه گیاه، بهبود سیستم ایمنی می‌تواند در نتیجه اثر سینزیتیکی اجزاء به وجود آید. جوجه‌هایی که سیستم ایمنی قوی ندارند، نهایتاً از رشد مناسبی نیز برخوردار نخواهند بود، پس این نکته حائز اهمیت است که جوجه بتواند به طور کامل سیستم ایمنی خود را تکامل ببخشد.

با توجه به نتایج حاصل از کاهش عیار پادتن در نوبت اول و تست فیتوهاماگلوبولین‌ها در گروه آنتی بیوتیک ممکن است تولید ایمنوگلوبولین‌ها که برای محافظت مسیر روده‌ای از عفونت ضروری می‌باشد، کاهش یافته باشد. مشاهده شده که در حیوانات دارای میکروفلورایی کامل روده‌ای، سطح بالاتری از ایمنوگلوبولین و فعالیت فاگوسیتیوزی نسبت به حیوان عاری از میکروب وجود داشته است. با ترکیها ممکن است تولید ایمنوگلوبولین‌های مورد احتیاج برای محافظت مسیر روده‌ای از عفونت را تحریک کنند (El-Husseiny *et al.*, 2008). نشان داده شده است که ساپونین‌ها از طریق اثر مستقیم در نتیجه

میزان HDL در گروه آنتی بیوتیک بیشترین میزان را دارد، و کمترین مقدار مربوط به گروه سطح ۲ از عصاره یوکا بوده که با گروه‌های شاهد و پودر یوکا تفاوتی ندارد. لیبوپروتئین با چگالی پایین در گروه سطح ۱ یوکا کمترین و در تیمار آنتی بیوتیک بالاترین می‌باشد.

### بحث

همان‌طور که نتایج حاصل از این آزمایش در جدول ۲ نشان می‌دهد استفاده از افزودنی‌های تغذیه‌ای فاکتورهای عملکردی را بهبود می‌دهد. اما از طرفی در تحقیقی مشابه افزودن ۳۱ ppm تا ۱۵۵ از عصار یوکا تولید تخم مرغ را افزایش داده و با افزایش سطح عصاره تا ۴۶۵ ppm تولید را کاهش داده است. افزایش وزن بدن در جیره حاوی یوکا در Yeo & Kim, 1997 محققان با افزودن عصاره یوکا افزایش صفات عملکردی را نسبت به شاهد گزارش شده‌اند (Amber *et al.*, 2004). نتایج مفید به طور کلی به وضع سلامتی حیوان نسبت داده می‌شود. از طرفی استدلال می‌نمایند که کاهش آمونیاک و اوره در خون منجر به توسعه سلامت حیوان و افزایش رشد گردیده است (Johnston *et al.*, 1981). آمونیاک تولیدی در مخاط روده از هیدرولیز اوره تولید شده و می‌تواند به سطح سلول‌ها صدمه برساند (Wrong, 1981). گزارش شده که تحریک‌کنندگی رشد ساپونین همانند آنتی بیوتیک می‌باشد (Perry *et al.*, 1953). در ارزیابی که روی ساپونین یوکا بر روی جوجه‌های گوشتشی انجام شد، افزایش وزن بیشتر در دوره پایانی می‌تواند ناشی از تأثیر افزودنی گیاهی یوکا بر دستگاه گوارش در طول دوره دوران رشد باشد (Johnston *et al.*,

- Zealand rabbits. 8th World Rabbit Congress, Mexica, 7-10 September: 737-745.
- Banfando, K.W., Cox, L.A. and Bywater, R., 2003. Review lends perspective to recent scientific findings on virginiamycin, antibiotic resistance debate. *Feedstuffs*, 75(3): 26-27.
  - Cheeke, P.R., 2000. Actual and potential applications of *Yucca schidigera* and *Quillaja saponaria* saponins in human and animal nutrition. *Proceedings American Society of Animal Science, Proceedings*. 45: 241-254.
  - Cheeke, P.R., Piacente, S. and Oleszek, W., 2006. Anti-inflammatory and anti-arthritis effects of *Yucca schidigera*: a review. *Journal of Inflammation*, 3: 1-7.
  - Cheeke, P.R., 1996. Biological effects of feed and forage saponins and their impact on animal production. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 405: 377-385.
  - Dong, X.F., Gao, W.W., Tong, J.M., Jia, H.Q., Sa, R.N. and Zhang, Q., 2007. Effect of Polysavone (alfalfa extract) on abdominal fat deposition and immunity in broiler chickens. *Poultry Science*, 86(9): 1955-1959.
  - Francis, G., Kerem, Z., Makkar, H.P.S. and Becker, K., 2002. The biological action of saponins in animal systems: a review. *British Journal of Nutrition*, 88(6): 587-605.
  - El-Husseiny, O.M., Abdallah, A.G. and Abdel-Latif, K.O., 2008. The influence of biological feed additives on broiler performance. *International Journal of Poultry Science*, 7(9): 862-871.
  - Ilsley, S.E., Miller, H.M. and Kamel, C., 2005. Effects of dietary quillaja saponin and curcumin on the performance and immune status of weaned piglets. *Journal of Animal Science*, 83: 82-88.
  - Johnston, N.L., Quarles, C.L., Fagerberg, D.J. and Caveny, D.D., 1981. Evaluation of yucca saponin on broiler performance and ammonia suppression. *Poultry Science*, 60(10): 2289-2292.
  - Kaya, S., Erdogan, Z. and Erdogan, S., 2003. Effect of different dietary levels of *Yucca schidigera* powder on performance, blood parameters and egg yolk cholesterol of laying quails. *Journal of Veterinary Medicine Series A*, 50: 14-17.
  - Oakenfull, D. and Sidhu, G.S., 1989. Saponins: 97-141. In: Cheeke, P.R., (Ed.). *Toxicants of Plant Origin: Glycosides (Volume II)*. CRC Press, 277p.
  - Perry, T.W., Beeson, W.M. and Vosteen, B.W., 1953. The effect of an antibiotic or a surfactant on the growth and carcass composition of swine. *Journal of Animal Science*, 12(2): 310-315.

خواص شویندگی و اثر متقابل با غشای اپتیلیالی نفوذیزیری را افزایش می‌دهند، که می‌توانند موجب افزایش تحریک سیستم ایمنی گردند. بیان شده است که خصوصیت ساپونین‌ها در افزایش بازساخت سلول در روده مکانیسم حفاظتی را برای مخاطب به وجود می‌آورد و از طرفی ممکن است سهولت ورود آنتی‌زن‌ها و پیتیدهای فعال خوراکی را نیز به دنبال داشته باشد (Johnston *et al.*, 1981).

نشان داده شده است که خوک‌های تغذیه شده با آنتی‌بیوتیک و ساپونین میزان لیپید خون بیشتری را نسبت به گروه شاهد داشته‌اند. البته این دو گروه افزایش وزن بیشتری را نیز نشان داده‌اند که می‌تواند در نتیجه تأثیر افزودنی‌ها بر جذب مواد مغذی و لیپیدی از روده باشد (Perry *et al.*, 1953). ساپونین به‌دلیل امولسیفه کردن مواد قابل حل در چربی به‌دلیل خواص شویندگی بر جذب تأثیرگذار می‌باشد. کاهش کلسترول پلاسما به‌طور گسترده‌ای در جیره‌های غنی از ساپونین در طیور یا پستانداران مانند انسان گزارش شده است (Oakenfull & Sidhu, 1989). کاهش کلسترول به‌دلیل اتصال اسیدهای صفراء و کلسترول توسط ساپونین‌ها می‌باشد. اسیدهای صفراء میسل‌های مخلوطی با کلسترول تشکیل داده که سهولت جذب‌شان را به دنبال دارد. ساپونین‌ها از طریق جلوگیری از جذب دوباره باعث تقلیل کلسترول بدن می‌شوند و تشکیل اسیدهای ثانویه صفراء را کاهش می‌دهند. میزان کلسترول در دوره پایانی در گروه شاهد و آنتی‌بیوتیک کاهش زیادی را نشان می‌دهد و همچنین در پیامد آن نیز میزان LDL یا کلسترول بد نیز در سه سطح کاهش نشان می‌دهد. تغذیه ساپونین‌ها متابولیسم اسیدهای صفراء توسط میکروفلورا را ممانعت می‌کند که می‌تواند برای پرنده مفید واقع شود (Oknenfull & Sidhu, 1989).

با توجه به اثرات مفید عصاره یوکا بر عملکرد و سلامت جوجه‌های گوشتی به‌عنوان افزودنی عاری از بقایای ترکیب‌های شیمیایی، سطح ۱ عصاره برای جایگزینی آنتی‌بیونیک در این تحقیق معرفی می‌گردد.

#### منابع مورد استفاده

- Amber, K.H., Yakout, H.M. and Hamed, R.S., 2004. Effect of feeding diets containing yucca extract or probiotic on growth, digestibility, nitrogen balance and caecal microbial activity of growing New

- Rowland, L.O., Plyer, J.E. and Bradley, J.W., 1976. *Yucca schidigera* extract effect on egg production and house ammonia levels. *Poultry Science*, 55: 2086.
- Wrong, O.M., 1981. Nitrogen compounds: 133-211. In: Wrong, O.M., Edmonds, C.J. and Chadwick V.S., (Eds.). *The Large Intestine: Its Role in Mammalian Nutrition and Homeostasis*. Springer, New York, 217p.
- Yeo, J. and Kim, K.I., 1997. Effect of feeding diets containing an antibiotic, a probiotic, or yucca extract on growth and intestinal urease activity in broiler chicks. *Poultry Science*, 76(2): 381-385.
- Peterson, A.L., Qureshi, M.A., Ferket, P.R. and Fuller, J.C.Jr., 1999. Enhancement of cellular and humoral immunity in young broilers by the dietary supplementation of  $\beta$ -hydroxy- $\beta$ -methylbutyrate. *Immunopharmacology and Immunotoxicology*, 21(2): 307-330.
- Periston, R.L., Bartle, S.J., May, T. and Goodall, S.R., 1987. Influence of Sarsaponin on growth, feed and nitrogen utilization in growing male rats fed diets with added urea or protein. *Journal of Animal Science*, 65(2): 481-487.
- Richmond, W., 1973. Preparation and properties of a cholesterol oxidase from *Nocardia* sp. and its application to the enzymatic assay of total cholesterol in serum. *Clinical Chemistry*, 19: 1350-1356.

## Effect of different levels of *Yucca* extract and antibiotic on growth performance, immune response and blood factors of broiler chickens

Z. Ranjbar<sup>1</sup>, F. Shariatmadari<sup>2\*</sup> and M.A. Karimi Torshizi<sup>1</sup>

1- Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2\*- Corresponding author, Department of Animal Science, Collage of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

E-mail: shariatf@modares.ac.ir

Received: March 2010

Revised: February 2013

Accepted: March 2013

### Abstract

This experiment was designed to study the effects of feeding diets containing different levels of yucca extract and antibiotic on growth performance, blood parameters, immune system and ascites index. Three hundred and twelve, one-day old broiler chicks (Arian) were used in a completely randomized design with four treatments, consisting of three replications and 26 (male & female) chicks per pen. The treatments consisted of control (without supplementation), *Yucca schidigera* extract at 150 and 225 mg/kg, and virginiamycin at 15 mg/kg up to six weeks of age. Significant differences were found for feed intake, feed efficiency, and body weight gain in the studied treatments ( $p < 0.01$ ). Immune responses, expressed as a primary and secondary antibody response to SRBC, were affected by treatments ( $p < 0.01$ ). Treatment groups did not affect the weights of organs ( $p < 0.05$ ). Effects of treatments on cholesterol, triglycerides, HDL and LDL levels, at 35 days of age, were significant on the parameters evaluated in different experimental groups ( $p < 0.01$ ). The trends observed indicate that *Yucca schidigera* extract could have beneficial effects on broiler chicks performance.

**Keywords:** *Yucca Schidigera* extract, performance, immune system, blood factor, broiler.