

## خواص ضدلیستریایی انسانس نعناع در مقادیر مختلف دما، pH و نمک

میرحسن موسوی<sup>۱\*</sup> و نسیم شاویسی<sup>۲</sup>

- ۱- نویسنده مستول، استادیار، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، پست الکترونیک: moosavymh@gmail.com  
۲- دانش آموخته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۹۲

تاریخ اصلاح نهایی: اردیبهشت ۱۳۹۲

تاریخ دریافت: دی ۱۳۹۱

### چکیده

باکتری لیستریا مونوستیوتوزنر یکی از مهمترین باکتری‌های بیماری‌زای منتقله از مواد غذایی بوده و در حال حاضر کنترل آن مهمترین چالش در کارخانجات صنایع غذایی محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر انسانس نعناع در کنترل رشد لیستریا مونوستیوتوزنر در سه دما (۴، ۹ و ۱۴ درجه سلسیوس)، سه pH (۵، ۶ و ۷) و چهار غلظت نمک (۰، ۱، ۲ و ۴ درصد) می‌باشد. آنالیز ترکیب‌های تشکیل‌دهنده انسانس نعناع با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی (GC-MS) انجام گردید. تعیین میزان حساسیت باکتری به انسانس نعناع با اندازه‌گیری حداقل غلظت مهاری و به روش برات میکرو‌دایلوشن انجام شد. ترکیب‌های اصلی تشکیل‌دهنده انسانس شامل کاروون (۷۸/۸٪)، لیمونن (۱۱/۵٪) و متنون (۱۱٪) بود. در این مطالعه غلظت مهاری حداقل انسانس نعناع  $160\text{ }\mu\text{l/ml}$  تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش غلظت نمک و دما و کاهش میزان pH خواص ضدبакتریایی انسانس نعناع افزایش یافت. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت که از انسانس نعناع می‌توان به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در کنترل باکتری لیستریا مونوستیوتوزنر استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: لیستریا مونوستیوتوزنر، انسانس نعناع، دما، pH، نمک.

(Evrendilek & Balasubramaniam, 2011). در کشورهای در حال توسعه سالانه صدها مورد گزارش مرگ و میر ناشی از لیستریوز به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده گزارش می‌شود (Hsieh et al., 2011). یکی از مهمترین روش‌های جلوگیری از رشد عوامل بیماری‌زا و فساد، نگهداری مواد غذایی در دماهای پایین و به‌طور معمول دمای یخچال است، اما به دلیل توانایی باکتری لیستریا مونوستیوتوزنر در تحمل شرایط محیطی نامناسب مانند دمای پایین (۲-۴ درجه سلسیوس) و بالا (۴۵ درجه سلسیوس)، شرایط اسیدی ( $\text{pH}=4/4$ ) و غلظت‌های بالای نمک (۱۰٪)، در کنترل این باکتری باید از پارامترهای چند مانعی استفاده گردد (Rasooli et al., 2006; Shannon et al., 2011; Xi et al., 2011).

### مقدمه

لیستریا مونوستیوتوزنر یکی از مهمترین عوامل بیماری‌زای منتقله از مواد غذایی می‌باشد که سبب بیماری لیستریوز در انسان می‌گردد. این بیماری با سقط جنین در خانم‌های باردار و منژیت و آنسفالیت در نوزادان، کودکان و افراد بالغ دارای ضعف سیستم ایمنی همراه می‌باشد (Karina et al., 2011). این باکتری در طیف وسیعی از مواد غذایی مانند گوشت قرمز، سبزیجات خام مصرفی، فرآورده‌های لبنی، فرآورده‌های دریابی (ماهی دودی و خام)، انواع سالادها و غذاهای آماده مصرف یافت می‌شود (Magalhães & Nitschke, 2013). بروز بیماری لیستریوز اغلب به مصرف مواد غذایی خام به خصوص غذاهای آماده مصرف و همچنین پنیر و سایر فرآورده‌های لبنی نسبت داده شده است.

### آنالیز ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس

در این مطالعه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده نیز مورد بررسی قرار گرفت. اسانس گیاه مورد نظر پس از آماده‌سازی به دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-Mass) تزریق گردید تا نوع ترکیب‌های تشکیل‌دهنده آن مشخص شود. مشخصات دستگاه گاز کروماتوگراف Agilent 6890 شامل: ستون مویینه به طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۲۵۰ میکرومتر و ضخامت لایه داخلی ۰/۲۵ میکرومتر از نوع HP-5MS با برنامه دمایی ۷۰ تا ۲۸۰ درجه سلسیوس و با افزایش تدریجی ۲۵ درجه سلسیوس در هر دقیقه و نگهداری ستون در ۲۸۰ درجه سلسیوس به مدت ۲-۱۰ دقیقه بود. دمای محفظه تزریق ۲۶۵ درجه سلسیوس و سرعت گاز هلیوم (به عنوان حامل) ۱/۲ میلی‌لیتر در هر دقیقه بود. طیف‌سنج جرمی از نوع Agilent 5973 با انرژی یونیزاسیون (EI) ۷۰ کلترون ولت و دمای منیم یونیزاسیون ۲۵۰ درجه سلسیوس بود.

### آماده‌سازی اسانس نعناع

برای افزایش حلایت و گسترش یکتواخت هر کدام از غلظت‌های مورد مطالعه اسانس نعناع در محیط کشت آبگوشت قلب و مغز از دی‌متیل سولفوکساید ۱۰٪ (DMSO) (مرک، آلمان) به عنوان امولسیفایر استفاده گردید. بر این اساس غلظت‌های مورد مطالعه اسانس نعناع از دو تایی تعیین شد (Mahboubi & Haghi, 2008).

### باکتری مورد مطالعه

کشت لیوفیلیزه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز (ATCC 19115) تهیه شده از سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران برای این بررسی مورد استفاده قرار گرفت.

### آماده‌سازی و تعیین مقدار دوز تلقیح باکتری

تهیه میزان تلقیح باکتری مورد آزمایش با انتقال باکتری از میکروتیوب استریل به محیط آبگوشت قلب و مغز (مرک، آلمان) و نگهداری آن به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتی‌گراد انجام شد. مجدداً کشت دومی از کشت ۲۴ ساعته اول در محیط آبگوشت قلب و مغز دیگر (در ۳۷ درجه

در سال‌های اخیر کاربرد مصرف اسانس‌های گیاهی در مواد غذایی خام به خصوص مواد غذایی فرآوری شده به عنوان جایگزین مناسبی برای مواد نگهدارنده سنتیک و Noriega *et al.*, ۲۰۱۰؛ Afzayesh *et al.*, ۲۰۱۲؛ (Tyagi *et al.*, 2010

نعمان معروف‌ترین جنس گیاهان خانواده لامیاسه بوده که از زمان‌های قدیم، رومیان، یونانیان و مصریان از آن برای درمان بیماری‌های عفونی مختلف و همچنین در تهیه عطرها و به عنوان طعم‌دهنده در مواد غذایی استفاده می‌کرده‌اند (Kumar *et al.*, 2011).

گونه‌های مختلف نعناع در سراسر جهان پراکنده‌گی دارند و لی بیشتر در مناطقی از آمریکا، اروپا و آسیا مانند بربازیل، چین و هند که دارای آب و هوای گرمسیری هستند، یافت می‌شود (Tyagi *et al.*, 2012). عصاره و اسانس نعناع دارای خواص ضدمیکروبی علیه برخی از عوامل بیماری‌زای منتقله از مواد غذایی می‌باشد (Znini *et al.*, 2011) (Tyagi *et al.*, 2012).

مهتمرین ترکیبی که در نعناع دارای خواص ضدمیکروبی می‌باشد کاروون است (Telci *et al.*, 2010). همچنین لازم به تذکر این مطلب است که میزان خواص ضدبacterیایی اسانس‌های گیاهان به روش اسانس‌گیری و نوع میکرووارگانیسم نیز بستگی دارد (Evrendilek & Balasubramaniam, 2011). در مطالعه خواص ضدمیکروبی اسانس‌های گیاهی باید تأثیر عوامل درونی و خارجی مانند pH، غلظت نمک و درجه حرارت نیز مورد بررسی قرار گیرد (Razavi *et al.*, 2011). به همین دلیل هدف از این مطالعه بررسی خواص ضدبacterیایی اسانس نعناع بر روی باکتری لیستریا مونوسیتوژن در سه دما (۹، ۴ و ۱۴ درجه سلسیوس)، سه pH (۵، ۶ و ۷) و چهار غلظت نمک (۰، ۱، ۲ و ۴ درصد) می‌باشد.

### مواد و روشها

#### تهیه اسانس

اسانس استاندارد گیاه نعناع (*Mentha spicata*) از شرکت داروسازی باریج اسناس کاشان تهیه شد. اسانس‌گیری از گیاهان اغلب به روش تقطیر با آب انجام گردید (Lv *et al.*, 2011).

بررسی اثر اسانس بر روی رشد باکتری در pH، دما و غلظت‌های مختلف نمک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در هر چاهک پلیت‌های میکرولیتر، ۱۶۰ میکرولیتر محیط آبگوشت قلب و مغز استریل دارای pH ۶، ۵ و ۷ و دارای نمک ۰، ۱، ۲ و ۴ درصد، ۲۰ میکرولیتر از دو غلظت مورد مطالعه اسانس و ۲۰ میکرولیتر کشت باکتریایی اضافه گردید. کنترل مثبت (چاهک حاوی باکتری + محیط آبگوشت قلب و مغز بدون ترکیب ضدمیکروبی) و کنترل منفی (ترکیب ضدمیکروبی + محیط آبگوشت قلب و مغز بدون باکتری) نیز در این مرحله از آزمایش در نظر گرفته شد. پس از افزودن غلظت‌های مورد نظر از اسانس و باکتری مورد مطالعه، میکروپلیت‌ها به مدت ۳۰ ثانیه با دور ۲۵۰ rpm در شیکر برای مخلوط شدن قرار داده شد و بعد به مدت ۲۴ ساعت در ۳ دمای ۴، ۹ و ۱۴ درجه سلسیوس گرمخانه‌گذاری شدند. به منظور ارزیابی رشد باکتری‌ها پس از طی دمای گرمخانه‌گذاری شمارش کلونی به روش کشت سطحی در محیط آکار قلب و مغز انجام شد (Razavi Rohani *et al.*, 2011).

برای شمارش تعداد باکتری در هر کدام از مراحل انجام آزمایش، پس از ۲۴ ساعت گرمخانه‌گذاری در دمای ۳۷ درجه سلسیوس، پلیتی انتخاب شد که تعداد کلی باکتری آن بین ۳۰۰-۳۰۰۰ باکتری بود.

Differences in DP (Population) استفاده گردید که به صورت زیر محاسبه می‌شود (Zhou *et al.*, 2007).

$$\text{Log DP} = \log \frac{N}{N_0} = \log(N) - \log(N_0)$$

$N_0$ : تعداد باکتری‌های اولیه  
 $N$ : تعداد باکتری‌ها پس از ۲۴ ساعت گرمخانه‌گذاری این مطالعه با سه بار تکرار انجام شد.

تجزیه و تحلیل آماری  
 برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹ استفاده گردید و مقدار P کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی‌دار لحاظ گردید. از آزمون

سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت) تهیه شد. سپس مقادیر مختلفی از کشت آبگوشت قلب و مغز ۲۴ ساعته دوم را بر روی لوله‌های کووت مختلف برد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۶۰۰ نانومتر، جذب نوری لوله‌های مذکور خوانده شد. از محتويات لوله‌های کووت، با استفاده از تهیه سری رقت و کشت سطحی مقدار باکتری در هر میلی‌لیتر مشخص و در نهایت به هر میلی‌لیتر محیط کشت تعداد  $10^6$  باکتری تلقیح گردید.

تعیین حداقل غلظت مهاری اسانس نعناع  
 برای تعیین حداقل غلظت مهاری اسانس نعناع از روش براث میکرودایلوشن در پلیت‌های میکروپلیت ۹۶ چاهکی با حجم ۳۰۰ میکرولیتری استریل (اکستراژن، آمریکا) استفاده شد. در هر چاهک ۱۶۰ میکرولیتر محیط آبگوشت قلب و مغز استریل، ۲۰ میکرولیتر از هر کدام از رقت‌های متواتی اسانس مورد مطالعه و ۲۰ میکرولیتر کشت باکتریایی اضافه گردید. کنترل مثبت (چاهک حاوی باکتری + محیط آبگوشت قلب و مغز بدون ترکیب ضدمیکروبی) و کنترل منفی (ترکیب ضدمیکروبی + محیط آبگوشت قلب و مغز بدون باکتری) نیز در این مرحله از آزمایش در نظر گرفته شد. پس از افزودن غلظت‌های مورد نظر از ترکیب ضدمیکروبی و باکتری مورد مطالعه، پلیت‌های میکرولیتر به مدت ۳۰ ثانیه با دور ۲۵۰ rpm برای مخلوط شدن در شیکر قرار داده شدند. بعد از طی شدن زمان ۲۴ ساعت گرمخانه‌گذاری و در دمای ۳۷ درجه سلسیوس در انکوباتور، به منظور تعیین حداقل غلظت مهاری، چاهک‌ها برای وجود کدورت به طریق چشمی بررسی و حداقل غلظتی که ایجاد حالت عدم رشد یا عدم کدورت مشهود با گروه کنترل کرد، به عنوان غلظت مهاری حداقل تعیین گردید. در مرحله بعد ۲۰ میکرولیتر از نمونه در محیط آکار قلب و مغز (مرک، آلمان) کشت داده شد و پس از طی ۲۴ ساعت گرمخانه‌گذاری در دمای ۳۷ درجه سلسیوس عدم رشد تأیید گردید (Weerakkody *et al.*, 2010; Rivas *et al.*, 2010).

بررسی اثر اسانس نعناع بر روی رشد باکتری لیستریا مونوسيتوژن  
 پس از تعیین حداقل غلظت مهاری اسانس نعناع، دو غلظت پایین‌تر از آن ( $40\mu\text{l}/\text{ml}$  و  $80\mu\text{l}/\text{ml}$ ) برای

جدول ۱- نتایج آنالیز اسانس نعناع خوراکی

ردیف	ترکیب	درصد
۱	$\beta$ -myrcene	۰/۳
۲	limonene	۱۱/۵
۳	$\gamma$ -terpinene	۰/۲
۴	menthone	۱/۰
۵	menthol	۱/۰
۶	terpinen-4-ol	۱/۰
۷	$\alpha$ -terpinol	۰/۳
۸	dihydrocarveol	۰/۲
۹	cis-dihydrocarveol	۱/۴
۱۰	dihydrocarvone	۰/۴
۱۱	trans-carveol	۰/۳
۱۲	carvone	۷۸/۸
۱۳	cihydrocarvyl acetate	۰/۶
۱۴	l-carveol	۰/۳
۱۵	$\beta$ -bourbonene	۱/۲
۱۶	E-caryophyllene	۱/۰
۱۷	$\gamma$ -amorphene	۰/۲
۱۸	$\alpha$ -amorphene	۰/۲
۱۹	سایر ترکیبات	۰/۱
	جمع	۱۰۰

اثر درجه حرارت بر روی میزان رشد باکتری مطالعه اثر درجه حرارت های مختلف گرمخانه گذاری (۴، ۹ و ۱۴ درجه سلسیوس) بر متغیر وابسته (لگاریتم تعداد باکتری ها بر حسب CFU/ml) توسط آنالیز واریانس نشان داد که بین درجه حرارت های مختلف در کاهش رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنر تفاوت معنی داری وجود دارد ( $p < 0.001$ ). آزمون t-test نیز نشان داد که دمای ۱۴ درجه در مقایسه با دمای ۴ و ۹ درجه باعث کاهش بیشتر لگاریتم باکتری ها می شود ( $p < 0.016$ ).

آنالیز واریانس و با استفاده از ANOVA Turkey test برای بررسی اثر متغیر های مستقل (مقادیر اسانس و نایسین، مقادیر مختلف نمک و درجه حرارت) بر روی متغیر وابسته (لگاریتم تعداد باکتری) استفاده گردید و از همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط متغیر های مذبور با هم استفاده شد.

## نتایج

### آنالیز اسانس

نتایج آنالیز ترکیب های اسانس نعناع مورد استفاده در این مطالعه در جدول ۱ نشان داده شده است. همان طور که در این جدول آمده است، ترکیب های اصلی تشکیل دهنده اسانس شامل کاروون (۷۸/۸٪)، لیمون (۱۱/۵٪)، متنون (۱٪)، منتول (۱٪)، سیس دی هیدروکارول (۱/۴٪)، ترانس - کاریوفیلین (۱٪)، بتا - بوربون (۱/۲٪) و ترپینین (۱٪) می باشند.

تعیین حداقل غلظت مهاری اسانس نعناع به منظور بررسی خواص ضدباکتریایی اسانس نعناع بر روی لیستریا مونوسیتوژنر، ابتدا حداقل غلظت مهاری (MIC) این ترکیب در غلظت های ۲۰ تا ۲۵۶۰ ماکرولیتر در هر میلی لیتر اسانس نعناع بررسی گردید. غلظت مهاری حداقل اسانس نعناع  $160 \mu\text{l/ml}$  تعیین شد. با توجه به این نتیجه، دو غلظت  $40 \mu\text{l/ml}$  و  $80 \mu\text{l/ml}$  اسانس نعناع به منظور بررسی اثر دما، pH و نمک بر میزان خواص ضدلیستریایی آن انتخاب گردید.

اثر ضدباکتریایی اسانس نعناع تجزیه و تحلیل آماری واریانس بررسی اثر غلظت های مختلف اسانس نعناع بر متغیر وابسته (لگاریتم تعداد باکتری ها بر حسب CFU/ml) نشان داد که بین دو غلظت  $40 \mu\text{l/ml}$  و  $80 \mu\text{l/ml}$  اسانس نعناع تفاوت معنی داری وجود دارد ( $p < 0.001$ ). همچنین هر دو غلظت مذکور (غلظت  $40 \mu\text{l/ml}$  و  $80 \mu\text{l/ml}$ ) غلظت  $80 \mu\text{l/ml}$  ( $p < 0.001$ ) به صورت معنی داری باعث کاهش تعداد باکتری ها شدند (جدول ۲، ۳ و ۴).

جدول ۲- اثر اسانس نعناع بر روی شاخص DP لیستریا مونوسیتوژن در دمای ۱۴°C

تیمار	نمک	غله‌ت اسانس (µl/ml)	۴۰	۸۰
pH	(g/۱۰۰)			
۵	.	۰/۳۰ ± ۰/۱۸۳	-۰/۰۰۵ ± ۰/۳۳۲	-۰/۰۰۵ ± ۰/۳۳۲
۶	۱	-۰/۱۷ ± ۰/۴۴۵	-۰/۰۵۶ ± ۰/۱۸۳	-۰/۰۵۶ ± ۰/۱۸۳
۷	۲	-۱/۲۸ ± ۰/۲۱۹	-۱/۱۹ ± ۰/۵۸۶	-۱/۱۹ ± ۰/۵۸۶
۸	۴	-۱/۷ ± ۰/۱۷۶	-۱/۷ ± ۰/۱۰۵	-۱/۷ ± ۰/۱۰۵
۹	.	۱/۳۲ ± ۰/۷۴۲	۰/۶۷ ± ۰/۰۶۳	۰/۶۷ ± ۰/۰۶۳
۱۰	۱	۰/۱۷ ± ۰/۲۸۹	-۰/۱۳ ± ۰/۰۹۱	-۰/۱۳ ± ۰/۰۹۱
۱۱	۲	-۰/۸۱ ± ۰/۶۹۲	-۰/۸۱ ± ۰/۶۹۲	-۰/۸۱ ± ۰/۶۹۲
۱۲	۴	-۱/۲۰ ± ۰/۳۰۴	-۱/۹۶ ± ۰/۰۴۹	-۱/۹۶ ± ۰/۰۴۹
۱۳	.	۱/۳۰ ± ۰/۶۲۲	۰/۸۹ ± ۰/۱۴۸	۰/۸۹ ± ۰/۱۴۸
۱۴	۱	۰/۴۹ ± ۰/۰۳۵	۰/۳۸ ± ۰/۷۴۲	۰/۳۸ ± ۰/۷۴۲
۱۵	۲	-۰/۲۱ ± ۰/۱۲۰	-۰/۴۳ ± ۰/۰۰۰	-۰/۴۳ ± ۰/۰۰۰
۱۶	۴	-۱/۰۳ ± ۰/۳۸۱	-۱/۲۶ ± ۰/۳۶۷	-۱/۲۶ ± ۰/۳۶۷

جدول ۳- اثر اسانس نعناع بر روی شاخص DP لیستریا مونوسیتوژن در دمای ۹°C

تیمار	نمک	غله‌ت اسانس (µl/ml)	۴۰	۸۰
pH	(g/۱۰۰)			
۵	.	۱/۵۸ ± ۰/۱۴۱	۰/۵±۰/۰۹۸	۰/۵±۰/۰۹۸
۶	۱	-۰/۳۱ ± ۰/۰۰۰	-۰/۳۷±۰/۰۴۹	-۰/۳۷±۰/۰۴۹
۷	۲	-۰/۴۵ ± ۰/۰۴۲	-۰/۸۳±۰/۰۲۸	-۰/۸۳±۰/۰۲۸
۸	۴	-۱/۴۱ ± ۰/۰۴۲	-۲/۰۶±۰/۰۸۴	-۲/۰۶±۰/۰۸۴
۹	.	۱/۴۹ ± ۰/۰۵۷۹	۰/۹۱±۰/۰۳۵	۰/۹۱±۰/۰۳۵
۱۰	۱	۰/۶۸ ± ۰/۰۰۰	۰/۲۷±۰/۳۸۱	۰/۲۷±۰/۳۸۱
۱۱	۲	-۰/۲۳ ± ۰/۱۲۷	-۰/۴۲±۰/۱۲۷	-۰/۴۲±۰/۱۲۷
۱۲	۴	-۱/۱۴ ± ۰/۰۲۸	-۱/۴۶±۰/۴۵۹	-۱/۴۶±۰/۴۵۹
۱۳	.	۱/۹۶±۰/۰۳۵	۱/۱۹±۰/۱۶۹	۱/۱۹±۰/۱۶۹
۱۴	۱	۰/۷۸±۰/۰۸۴	۰/۶۶±۰/۲۹۶	۰/۶۶±۰/۲۹۶
۱۵	۲	-۰/۱۵±۰/۰۴۲	-۰/۱۹±۰/۰۰۷	-۰/۱۹±۰/۰۰۷
۱۶	۴	-۰/۰۵±۱/۳۶	-۱/۰۸±۰/۱۲۰	-۱/۰۸±۰/۱۲۰

جدول -۴- اثر اسانس نعناع بر روی شاخص DP لیستریا مونوسیتوژنر در دمای ۴۰°C

تیمار	pH	نمک	غله اسانس $\mu\text{l/ml}$	غلظت اسانس
			۸۰	۴۰
			$0.78 \pm 0.106$	$1.82 \pm 0.127$
			$-0.23 \pm 0.084$	$0.67 \pm 0.212$
			$-0.06 \pm 0.056$	$0.19 \pm 0.021$
			$-1.13 \pm 0.155$	$-0.66 \pm 0.077$
			$1.37 \pm 0.268$	$1.90 \pm 0.113$
			$0.64 \pm 0.473$	$0.94 \pm 0.084$
			$0.26 \pm 0.205$	$0.40 \pm 0.028$
			$-0.38 \pm 0.289$	$-0.10 \pm 0.028$
			$1.63 \pm 0.07$	$1.94 \pm 0.091$
			$0.69 \pm 0.523$	$0.90 \pm 0.311$
			$0.07 \pm 0.155$	$0.16 \pm 0.226$
			$-0.10 \pm 0.007$	$-0.01 \pm 0.007$

بهمنظر کنترل این باکتری با استفاده از مواد ضد میکروبی در شرایط آزمایشگاهی و مدل‌های غذایی انجام شده است. همچنین با توجه به مقاومت سویه‌های مختلف باکتری لیستریا و به ویژه لیستریا مونوسیتوژنر به آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد نگهدارنده سنتیک، استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی و همچنین ترکیب عواملی از قبیل درجه حرارت پایین، pH، اسید و نمک در کنترل این باکتری افزایش یافته است (Boziaris & Yoon *et al.*, 2011). در این مطالعه خواص ضد لیستریایی اسانس Nychas, 2006 مختلف دما (۴، ۹ و ۱۴ درجه سلسیوس)، pH (۵، ۶ و ۷) و نمک (۰، ۱، ۲، ۴) مورد مطالعه قرار گرفت. در آنالیز اسانس نعناع با استفاده از GC-MS مشخص شد که بیشترین ترکیب‌های موجود در آن کاروون (۷۸/۷۶٪) و لیمونن (۱۱/۵٪) می‌باشد. نتایج آنالیز اسانس با سایر مطالعاتی که ترکیب اسانس نعناع را بررسی کرده‌اند همخوانی دارد (Znini *et al.*, 2009; Telci *et al.*, 2010; Chauhan *et al.*, 2009; Govindarajan *et al.*, 2012; 2011). تفاوت‌هایی که در میزان این ترکیب‌ها در اسانس نعناع و حتی سایر اسانس‌های گیاهی وجود دارد به دلیل تفاوت در مرحله رشد گیاه و شرایط جغرافیایی مانند درجه حرارت، رطوبت نسبی و میزان تابش نور خورشید می‌باشد (Telci *et al.*, 2010).

اثر pH بر روی میزان رشد باکتری بررسی اثر pH مختلف (۵، ۶، ۷) بر متغیر وابسته (لگاریتم تعداد باکتری بر حسب CFU/ml) با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد که بین pH‌های مختلف در کاهش تعداد باکتری‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد ( $0.001 < p$ ). به عبارت دیگر این نتیجه نشان می‌دهد که با کاهش میزان pH لگاریتم تعداد باکتری‌ها کاهش می‌یابد. آزمون t-test نیز نشان داد که اثر pH بیشتر از سایر pH‌ها می‌باشد ( $0.001 < p$ ).

اثر مقادیر نمک بر روی میزان رشد باکتری مطالعه اثر درصدهای نمک (۰، ۱، ۲ و ۴ درصد) بر متغیر وابسته (لگاریتم تعداد باکتری بر حسب CFU/ml) توسط آنالیز واریانس نشان داد که بین غلظت‌های مختلف نمک، ۰، ۱، ۲ و ۴ درصد تفاوت معنی‌داری در کاهش t-test تعداد باکتری‌ها وجود دارد ( $0.001 < p$ ). آزمون نیز نشان داد که نمک باعث کاهش تعداد باکتری‌ها می‌گردد. به طوری که کاهش تعداد باکتری‌ها در دو غلظت نمک ۰٪ (۰/۰۰۲) و ۴٪ (۰/۰۰۱) معنی‌دار بود.

### بحث

به دلیل اهمیت فوق العاده زیاد لیستریا مونوسیتوژنر به عنوان یک عامل بیماری‌زای منتقله از مواد غذایی مطالعات زیادی

با دمای ۴ درجه بیشتر می باشد (Tyagi *et al.*, 2012). در بررسی تأثیر دما بر روی خواص ضدبacterیایی انسس های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی (شکلات) بر علیه لیستریا مونوستیوتز نز گزارش شده است که دمای ۲۰ درجه در مقایسه با دمای ۷ درجه سلسیوس تأثیر بیشتری در کاهش تعداد این باکتری دارد (Kotzekidou *et al.*, 2008) که نتایج این مطالعات با نتایج ما همخوانی دارد. عدم تأثیر دمای های پایین در کاهش تعداد لیستریا مونوستیوتز نز برخلاف بسیاری از باکتری های بیماری زا به علت تفاوت در اسیدهای چرب موجود در غشای خارجی این باکتری می باشد که سبب شده است این باکتری در گروه باکتری های سرمادوست طبقه بندی شود (Mastronicolisa *et al.*, 2006).

نتایج این مطالعه نشان می دهد که احتمالاً از انسس نعناع می توان به عنوان نگهدارنده طبیعی در کارخانجات صنایع غذایی استفاده نمود، زیرا این ماده دارای خواص ضد میکروبی علیه باکتری لیستریا مونوستیوتز نز می باشد. به منظور کاربردی نمودن استفاده از این انسس باید تحقیقات بیشتری بر روی خواص ضد میکروبی آن در مدل های غذایی صورت گیرد. همچنین به منظور افزایش حساسیت باکتری های بیماری زا و کاهش غلظت استفاده از انسس نعناع، مطالعه اثرات سینزیست سایر انسس های گیاهی با انسس نعناع بیشنهاد می گردد.

### منابع مورد استفاده

- Boziaris, I.S. and Nychas, G.J.E., 2006. Effect of nisin on growth boundaries of *Listeria monocytogenes* Scott A, at various temperatures, pH and water activities. *Food Microbiology*, 23(8): 779-784.
- Bouttefroy, A., Mansour, M., Linder, M. and Milliere, J.B., 2000. Inhibitory combination of nisin, sodium chloride and pH on *Listeria monocytogenes* ATCC 15313 in broth by an experimental design approach. *International Journal of Food Microbiology*, 54(1-2): 109-115.
- Canillac, N. and Mourey, A., 2004. Effects of several environmental factors on the anti-*Listeria monocytogenes* activity of an essential oil of *Picea excelsa*. *International Journal of Food Microbiology*, 92(1): 95-103.
- Chauhan, R.S., Kaul, M.K., Shahi, A.K., Kumar, A., Ram, G. and Tawa, A.. 2009. Chemical composition of essential oils in *Mentha spicata* L. accession [IIM(J)26] from North-West Himalayan region, India. *Industrial Crops and Products*, 29(2-3): 654-656.
- Evrendilek, G.A. and Balasubramaniam, V.M., 2011. Inactivation of *Listeria monocytogenes* and *Listeria innocua* in yogurt drink applying combination of high pressure processing and mint essential oils. *Food Control*, 22(8): 1435-1441.

در این بررسی حداقل غلظت مهاری انسس نعناع  $160\mu\text{ml}$  تعیین شد. مطالعات کمی خواص ضدبacterیایی انسس گونه های مختلف نعناع را مورد بررسی قرار داده اند. از این مطالعات می توان به بررسی Haghi و Mahboubi (۲۰۰۸) اشاره کرد که حداقل غلظت مهاری انسس نعناع بر روی لیستریا مونوستیوتز نز  $1\mu\text{ml}$  گزارش نمودند. تفاوت هایی که در میزان گزارش این شاخص بر روی باکتری وجود دارد می تواند به دلیل تفاوت در نوع سویه، دوز تلقیح و نوع محیط کشت باشد (Tajkarimi & Ibrahim, 2011).

در این مطالعه صرف نظر از تأثیر غلظت های مختلف نمک و درجه حرارت، با افزایش شرایط اسیدی تعداد باکتری ها کاهش یافت. Nychas و Boziaris (۲۰۰۶) و Razavi Rohani و همکاران (۲۰۱۱) نیز گزارش کردند که pH اسیدی فاکتور تأثیرگذاری در کاهش تعداد باکتری لیستریا مونوستیوتز نز در شرایط آزمایشگاهی می باشد. به طوری که نتایج این مطالعات و سایر مطالعات با بررسی ما Le Marc *et al.*, 2000 (Bouttefroy *et al.*, 2000) همخوانی دارد (Koutsoumanis *et al.*, 2004; Le Marc *et al.*, 2002).

در این مطالعه مشخص گردید که غلظت های نمک  $2\%$  و  $4\%$  به صورت معنی داری باعث افزایش اثر انسس نعناع در کاهش تعداد باکتری ها می شوند. همچنین استفاده از pH های پایین و غلظت های نمک بالا سبب افزایش خواص ضد لیستریایی انسس نعناع گردید. در واقع با افزایش غلظت نمک خاصیت آب گریزی غشای خارجی باکتری ها افزایش و نیز حلایق پروتئین های آن کاهش می یابد که این امر نفوذ انسس نعناع به داخل غشای باکتری و به تبع آن خواص ضد میکروبی آن را تسهیل می کند (Canillac & Mourey, 2004). تأثیر نمک در افزایش اثر انسس نعناع در کاهش تعداد باکتری لیستریا مونوستیوتز نز با بسیاری از مطالعات که در این زمینه انجام شده است، همخوانی دارد (Canillac *et al.*, 2004; Karina *et al.*, 2006; Boziaris & Nychas, 2004; Razavi Rohani *et al.*, 2011).

همچنین افزایش دما نیز تأثیر معنی داری در کاهش تعداد باکتری ها داشت، به طوری که دمای ۱۴ درجه در مقایسه با دمای ۹ و ۴ درجه سلسیوس سبب کاهش بیشتر لگاریتم باکتری ها شد ( $p < 0.016$ ). محققان در مطالعه اثر ضد لیستریایی هویج در درجه حرارت های مختلف نشان دادند که اثر این ماده در دمای ۱۰ و  $15$  درجه سلسیوس در مقایسه

- International Journal of Infectious Diseases, 10(3): 236-241.
- Razavi Rohani, S.M., Moradi, M., Mehdizadeh, T., Saei-Dehkordi, S.S. and Griffiths, M.W., 2011. The effect of nisin and garlic (*Allium sativum* L.) essential oil separately and in combination on the growth of *Listeria monocytogenes*. LWT-Food Science and Technology, 44(10): 2260-2265.
  - Rivas, L., McDonnell, M.J., Burgess, C.M., O'Brien, M., Navarro-Villa, A., Fanning, S. and Duffy, G., 2010. Inhibition of verocytotoxigenic *Escherichia coli* in model broth and rumen systems by carvacrol and thymol. International Journal of Food Microbiology, 139(1-2): 70-78.
  - Shannon, E.M., Milillo, S.R., Johnson, M.G. and Ricke, S.C., 2011. Inhibition of *Listeria monocytogenes* by exposure to a combination of nisin and cold-pressed terpeneless valencia oil. Journal of Food Science, 76(9): M600-604.
  - Tajkarimi, M. and Ibrahim, S.A., 2011. Antimicrobial activity of ascorbic acid alone or in combination with lactic acid on *Escherichia coli* O157:H7 in laboratory medium and carrot juice. Food Control, 22(6): 801-804.
  - Telci, I., Demirtas, I., Bayram, E., Arabaci, O. and Kacar, O., 2010. Environmental variation on aroma components of pulegone/piperitone rich spearmint (*Mentha spicata* L.). Industrial Crops and Products, 32(3): 558-592.
  - Tyagi, A.K., Malik, A., Gottardi, D. and Guerzoni, M.E., 2012. Essential oil vapour and negative air ions: A novel tool for food preservation. Trends in Food Science and Technology, 26(2): 99-113.
  - Weerakkody, N.S., Caffin, N., Turner, M.S. and Dykes, G.A., 2010. In vitro antimicrobial activity of less-utilized spice and herb extracts against selected food-borne bacteria. Food Control, 21(10): 1408-1414.
  - Xi, Y., Sullivan, G.A., Jackson, A.L., Zhou, G.H. and Sebranek, J.G., 2011. Use of natural antimicrobials to improve the control of *Listeria monocytogenes* in a cured cooked meat model system. Meat Science, 88(3): 503-511.
  - Yoon, J.I., Bajpai, V.K. and Kang, S.C., 2011. Synergistic effect of nisin and cone essential oil of *Metasequoia glyptostroboides* Miki ex Hu against *Listeria monocytogenes* in milk samples. Food and Chemical Toxicology, 49(1): 109-114.
  - Zhou, F., Ji, B., Zhang, H., Jiang, H., Yang, Z., Li, J., Li, J. and Yan, W., 2007. The antibacterial effects of cinnamaldehyde, thymol, carvacrol and their combinations against the foodborne pathogen *Salmonella typhimurium*. Journal of Food safety, 27(2): 124-133.
  - Znini, M., Bouklah, M., Majidi, L., Kharchouf, S., Aouniti, A., Bouyanzer, A., Hammouti, B., Costa, J. and Al-Deyab, S.S., 2011. Chemical composition and inhibitory effect of *Mentha spicata* essential oil on the corrosion of steel in molar hydrochloric acid. International Journal of Electrochemical Science, 6(1): 691-704.
  - Govindarajan, M., Sivakumar, R., Rajeswari, M. and Yoganakshmi, K., 2012. Chemical composition and larvicidal activity of essential oil from *Mentha spicata* (Linn.) against three mosquito species. Parasitology Research, 110(5): 2023-2032.
  - Hsieh, Y.H., Yan, M., Liu, J.G. and Hwang, J.C., 2011. The synergistic effect of nisin and garlic shoot juice against *Listeria* spp. in soymilk. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42(4): 576-579.
  - Karina, P., Julio, C., Leda, G. and Noemi, Z., 2011. Behavior of *Listeria monocytogenes* type1 355/98 (85) in meat emulsions as affected by temperature, pH, water activity, fat and microbial preservatives. Food Control, 22(10): 1573-1581.
  - Kotzekidou, P., Giannakidis, P. and Boulamatsis, A., 2008. Antimicrobial activity of some plant extracts and essential oils against foodborne pathogens in vitro and on the fate of inoculated pathogens in chocolate. LWT-Food Science and Technology, 41(1): 119-127.
  - Koutsoumanis, K.P., Kendall, P.A. and Sofos, J.N., 2004. A comparative study on growth limits of *Listeria monocytogenes* as affected by temperature, pH and aw when grown in suspension or on a solid surface. Food Microbiology, 21(4): 415-422.
  - Kumar, P., Mishra, S., Malik, A. and Satya, S., 2011. Insecticidal properties of *Mentha* species: A review. Industrial Crops and Products, 34(1): 802-817.
  - Le Marc, Y., Huchet, V., Bourgeois, C.M., Guyonnet, J.P., Mafart, P. and Thuault, D., 2002. Modelling the growth kinetics of *Listeria* as a function of temperature, pH and organic acid concentration. International Journal of Food Microbiology, 73(2-3): 219-237.
  - Lv, F., Liang, H., Yuan, Q. and Li, C., 2011. In vitro antimicrobial effects and mechanism of action of selected plant essential oil combinations against four food-related microorganisms. Food Research International, 44(9): 3057-3064.
  - Magalhães, L. and Nitschke, M., 2013. Antimicrobial activity of rhamnolipids against *Listeria monocytogenes* and their synergistic interaction with nisin. Food Control, 29(1): 138-142.
  - Mahboubi, M. and Hagh, Gh., 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of *Mentha pulegium* L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology, 119(2): 325-327.
  - Mastronicolisa, S.K., Bouraa, A., Karaliota, A., Magiatisc, P., Arvanitisa, N., Litos, C., Tsakirakis, A., Paraskevas, P., Moustaka, H. and Heropoulos, G., 2006. Effect of cold temperature on the composition of different lipid classes of the foodborne pathogen *Listeria monocytogenes*: focus on neutral lipids. Food Microbiology, 23(2): 184-194.
  - Noriega, E., Newman, J., Saggers, E., Robertson, J., Laca, A., Díaz, M. and Brocklehurst, T.F., 2010. Antilisterial activity of carrots: effect of temperature and properties of different carrot fractions. Food Research International, 43(10): 2425-2431.
  - Rasooli, I., Rezaei, M.B. and Allameh, A., 2006. Ultrastructural studies on antimicrobial efficacy of thyme essential oils on *Listeria monocytogenes*.

## **Antilisterial effect of *Mentha spicata* in the presence of temperature, pH and NaCl**

**M.H. Moosavy<sup>1\*</sup> and N. Shavisi<sup>2</sup>**

1\*- Corresponding author, Department of Food Hygiene and Aquatics, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran, E-mail: moosavymh@gmail.com

2- Veterinary Medicine Graduate Student, Department of Food Hygiene and Aquatics, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Received: January 2013

Revised: May 2013

Accepted: May 2013

### **Abstract**

*Listeria monocytogenes* is an important food-borne pathogen and its control in foods is a significant challenge. This study evaluated the effectiveness of *Mentha spicata* essential oil on limiting *L. monocytogenes* growth at different temperatures (4, 9 and 14°C), pH (5, 6 and 7) and NaCl concentrations (0, 1, 2 and 4 g/100mL). Chemical constituents of the *M. spicata* essential oil were identified by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The susceptibility of bacterium was performed by the minimal inhibitory concentration (MIC) using the micro-broth dilution technique. The major detected components were carvone (78.76%), limonene (11.50%) and menthol (1%). The MIC value of essential oil was 160µl/mL. The results obtained showed that the effectiveness of *M. spicata* was pronounced by increasing of salt and temperature and decreasing pH. In conclusion, the encouraging results indicated that the essential oil of *M. spicata* might be exploited as natural preservative for the control of *L. monocytogenes*.

**Keywords:** *Listeria monocytogenes*, *Mentha spicata*, temperature, pH, NaCl.