

اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسمیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلنوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

سید حسن حجازیان^{۱*}، فاطمه صفری^۲ و محمد بامری^۳

۱- نویسنده مسئول، استادیار، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران، پست الکترونیک: hejaziansh@yahoo.com

۲- استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران

۳- کارشناس ارشد، دانشکده پرديس بين الملل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۴

تاریخ اصلاح نهایی: خرداد ۱۳۹۴

تاریخ دریافت: دی ۱۳۹۳

چکیده

وراپامیل با مهار کانال‌های کلسمیم نوع T فعال و غیرفعال از ورود کلسمیم به داخل سلول‌ها جلوگیری می‌کند. با توجه به اینکه اثرات ضداسپاسمی مواد از طریق مهار کانال‌های کلسمیم اعمال می‌شود و اثر ضدانقباضی و کاهش فعالیت مکانیکی عضلات صاف ایلنوم توسط اسانس مرزه نشان داده شده است، مطالعه حاضر اثر هم‌افزایی کلسمیم بلوکر وراپامیل و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) را بر جلوگیری از تحریک کولینرژیک ایلنوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه فیزیوگراف، اثر غلظت‌های مختلف اسانس مرزه و وراپامیل بر انقباضات ایزوتوپیک ایجاد شده بهوسیله استیل کولین $^{+/-} ۱۰$ مولار در ایلنوم مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که هر دو ماده وراپامیل و اسانس مرزه بر انقباض ناشی از استیل کولین اثر مهارکننده‌ی داشته و همچنین غلظت‌های غیرمؤثر آنها نیز اثر هم‌افزایی در مهار انقباض داشته که از لحاظ آماری معنی دار می‌باشد ($p < 0.05$).

واژه‌های کلیدی: وراپامیل، اسانس مرزه (Satureja hortensis L.), ضداسپاسمی، استیل کولین، ایلنوم، عضله صاف.

از بار کاری قلب نیز کاسته می‌شود. بیش از ۹۰٪ دارو از راه خوراکی جذب می‌شود. به دلیل متابولیسم عبور اول از کبد، فراهمی زیستی آن ۳۵-۲۰ درصد است (Katzung et al., 2009). گیاه مرزه با نام علمی Satureja hortensis از تیره نعناع می‌باشد که در نواحی شمال‌غربی ایران، تبریز و نواحی مختلف خراسان می‌روید و دارای اثر نیرودهنده، تسهیل‌کننده عمل هضم و رفع اسهال و ضدکرم می‌باشد (Zargari, 2011). همچنین در رفع اسهال‌های عفونی و التهاب کولون

مقدمه

وراپامیل یک داروی مسدودکننده کانال کلسمیم می‌باشد که در بدن موجب جلوگیری از ورود کلسمیم به داخل سلول‌ها می‌شود؛ به علت اثر مسدودکننده‌ی این دارو بر کانال‌های کلسمیم مقدار کلسمیم در فیبرهای عضله قلب و عروق خونی کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به کاهش تعداد ضربان قلب و گشاد شدن عروق خونی گردد که در نتیجه آن فشار خون کاهش و جریان خون افزایش می‌یابد و

منابع طبیعی استان یزد به شماره (TARI-۵۸۴۱۶) قرار گرفته بود، در بالن تقطیر ریخته شد و بعد به آن، تا دو سوم حجم بالن آب م قطر اضافه گردید، سپس بالن به دستگاه کلونجر متصل شد و با حرارت دادن آن ۵ میلی لیتر انسانس بدست آمده جدا شد و تا زمان آزمایش در یخچال نگهداری شد.

روش انجام آزمایش ۳

در این مطالعه از موش‌های صحرایی نر نژاد ویستان در محدوده وزنی ۲۷۰-۲۵۰ گرم استفاده گردید. حیوانات در شرایط استاندارد دوره نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و دمای 22°C با دسترسی مناسب به آب و غذا نگهداری شدند. کلیه مداخلات مطابق با اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شد.

پس از بیهوش کردن حیوانات توسط مخلوط کتابین و زیلازین قطعاتی از بخش انتهای روده (ایلئوم) جدا گردید و پس از تمیز کردن تا انجام آزمایش در محلول تیروود نگهداری شدند. برای بررسی انقباضات ایلئوم قطعات یک سانتی‌متری از روده را جدا کرده و یک طرف آن را توسط نخ به قسمت پایین محفظه داخلی حمام بافت حاوی محلول تیروود (CaCl_2 ۰.۲g/L, KCl ۰.۲g/L, NaCl ۸g/L, NaHCO_3 ۱g/L, NaH_2PO_4 ۰.۰۵g/L, MgCl_2 ۰.۱g/L و $\text{D}\text{-glucose}$ ۱g/L) متصل و سر دیگر آن را به یک ترانسدیوسر ایزوتونیک که با دستگاه فیزیوگراف مرتبط بود، وصل کردیم. در تمام طول آزمایش، محلول تیروود توسط مخلوطی از ۹۵٪ اکسیژن و ۵٪ گاز کربونیک هوادهی شد و پس از حدود ۲۰ دقیقه که برای رسیدن دستگاه به وضعیت تعادل لازم بود انقباضات ایزوتونیک ایلئوم توسط دستگاه فیزیوگراف یک کاناله (Bioscience) ثبت شد. در هر دوره آزمایش یکی از محلول‌های مورد آزمایش با غلظت مورد نظر به حمام بافت اضافه شد و اثر آن بر انقباض ایلئوم ثبت گردید. پس از هر دوره آزمایش، بافت مورد نظر با محلول تیروود تازه شستشو و در صورت فعل می‌باشد، آزمایش

مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه دارای محتوای مناسبی از تانن و مواد چرب می‌باشد. انسانس آن دارای کارواکرول (Zargari, 2011) و سیمن (۲۵-۲۰٪) می‌باشد (Ghoneh et al., 2009). گونه‌های مختلف گیاه از نظر میزان انسانس و نوع ترکیب‌های تشکیل‌دهنده آن تنوع زیادی دارند و بر حسب نوع و درصد اجزاء تشکیل‌دهنده و نیز کاربرد انسانس متفاوت می‌باشد. انسانس بدست آمده از این گیاه در مرحله گلدهی آن می‌باشد که براساس یافته‌های Ahmadi و همکاران (2009) ترکیب‌های شناسایی شده در مرحله گلدهی کامل پاراسیمن (۲۱٪) و کارواکرول (۳٪/۶۲) می‌باشند. براساس بررسی‌های انجام شده، غلظت‌های مختلف انسانس مرزه دارای اثر اسپاسمولتیک و آنتی‌اسپاسمودیک بر ایلئوم می‌باشد (Hejazian et al., 2014b). انقباض عضلات صاف، وابسته به کلسیم و ATP می‌باشد. افزایش کلسیم سارکوپلاسمی در عضلات صاف موجب فعال شدن میوزین کیناز و فسفریلاسیون سر میوزین می‌شود و حاصل آن انقباض می‌باشد. بنابراین، نیروی انقباض عضله صاف معمولاً بستگی زیادی به غلظت یون کلسیم مایع خارج سلولی دارد و هر عاملی که بتواند موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سلول‌های عضلانی شود پاسخ انقباضی آن را کاهش می‌دهد (Parnas et al., 2009). به طوری که بیشتر سازوکارهای تعدیل‌کننده انقباضات عضلات صاف لوله گوارش اثرات خود را به واسطه مهار Cavalcante Fde et al., 2010؛ Nagao et al., 2011؛ ۲۰۱۰) کanal‌های کلسیمی اعمال می‌کنند (Hejazian et al., 2014b). با توجه به اثر ضدانقباضی این انسانس بر دستگاه گوارش (Hejazian et al., 2014b) هدف مطالعه حاضر بررسی اثر هم‌افزایی داروی وراپامیل و انسانس مرزه بر انقباضات ایزوتونیک در ایلئوم موش سفید آزمایشگاهی می‌باشد.

مواد و روشها

روش تهیه نمونه

برای استخراج انسانس، ۱۰۰ گرم نمونه گیاهی خشک شده گیاه مرزه که مورد تأیید مرکز تحقیقات کشاورزی و

برای هر محلول تعیین گردید و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و پس آزمون توکی مقایسه شد. ارزش ($p < 0.05$) به عنوان معیاری برای معنی‌دار بودن اختلاف در نظر گرفته شده است.

نتایج

اثر اسپاسمولتیک و راپامیل بر شدت انقباضات ایلئوم با اثر استیل کولین

بررسی اثرات اسپاسمولتیک و راپامیل بر شدت انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز $4\text{--}10$ مولار نشان می‌دهد که غلظت یک و دو میکرومول و راپامیل شدت انقباض ناشی از استیل کولین را بهتر ترتیب به میزان ۹٪ و ۱۵٪ کاهش می‌دهد که این کاهش از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد (شکل ۱). در حالی‌که غلظت ۴ میکرومول آن انقباضات ناشی از استیل کولین را به میزان ۷۸٪ کاهش داده که از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد ($p < 0.05$).

اثر اسپاسمولتیک انسنس مرزه بر شدت انقباضات ایجاد شده به‌وسیله استیل کولین

در مرحله بعد، اثر اسپاسمولتیک دوزهای مختلف انسنس مرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که انسنس مرزه با غلظت $25\text{--}50$ نانوگرم/میلی‌لیتر دارای اثرات اسپاسمولتیک نسبتاً ضعیفی است که از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد، اما زمانی که دوزهای بالاتر مرزه مورد استفاده قرار گرفت پاسخ متفاوتی مشاهده شد (شکل ۲). استفاده از غلظت $100\text{--}200$ نانوگرم بر میلی‌لیتر این انسنس شدت انقباضات را بهتر ترتیب به میزان ۳۳٪ و ۸۲٪ کاهش می‌دهد که از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد ($p < 0.05$).


بعدی انجام شد. آنگاه هر محلول بر روی ۵ نمونه بافتی بررسی شده و تجزیه و تحلیل آماری بر روی میانگین درصد انقباض ناشی از استیل کولین انجام گردید. برای بررسی اثر داروهای مذکور، نمونه‌ها به گروه‌های زیر تقسیم شدند:

- ۱- گروه استیل کولین
 - ۲- گروه وراپامیل با دوز ۱ میکرومول
 - ۳- گروه وراپامیل با دوز ۲ میکرومول
 - ۴- گروه وراپامیل با دوز ۴ میکرومول
 - ۵- گروه مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۶- گروه مرزه با دوز ۵۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۷- گروه مرزه با دوز ۱۰۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۸- گروه مرزه با دوز ۲۰۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۹- گروه دریافت کننده وراپامیل با دوز ۱ میکرومول
- + مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی‌لیتر


آزمایش آثار ضداسپاسمی

آثار اسپاسمولتیک، در این روش ابتدا حداقل انقباضات ایزوتوونیک ایلئوم را با استفاده از استیل کولین (مرک-آلمان) $4\text{--}10$ مولار ایجاد کردیم. مطالعات قبل و از جمله مطالعه گروه ما نشان داد که استفاده از استیل کولین با دوز مذکور توانایی ایجاد حداقل انقباض را در عضله ایلئوم دارد (Hejazian *et al.*, 2014a). سپس در هر دوره آزمایش اثر محلول‌های مختلف وراپامیل (مرک-آلمان) و انسنس مرزه را بر انقباضات ایجاد شده در ایلئوم ثبت کردیم.

روش جمع‌آوری نتایج و تجزیه و تحلیل آماری به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد و نتایج به صورت میانگین \pm انحراف معیار درصد تغییر وضعیت انقباضی به صورت میلی‌متر انحراف قلم



شکل ۱- مقایسه اثر اسپاسمولیتیک وراپامیل با دوزهای ۱، ۲ و ۴ میکرومول بر انقباضات ناشی از استیل کولین


با دوز 10^{-4} مولار (n=5)**، نشان‌دهنده $p<0.01$ می‌باشد.

شکل ۲- مقایسه اثر اسپاسمولیتیک اسانس مرزه با غلظت‌های ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ نانوگرم/میلی‌لیتر

بر انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار (n=5)*، نشان‌دهنده $p<0.05$ و **، نشان‌دهنده $p<0.01$ می‌باشند.

نشان داده شده است تجویز دوز غیر مؤثره اسانس مرزه به همراه دوز غیر مؤثره وراپامیل شدت انقباض ناشی از استیل کولین را به میزان % کاهش داده که این کاهش در مقایسه با گروه استیل کولین معنی دار می باشد ($p<0.01$). همچنین کاهش شدت انقباضات در گروه دریافت کننده توأم داروها در مقایسه با گروه هایی که اسانس مرزه و یا وراپامیل را به تنها ی دریافت کردند نیز معنی دار است ($p<0.05$).

اثر همافزایی دوز غیر مؤثره اسانس مرزه و وراپامیل بر شدت انقباضات ایجاد شده به وسیله استیل کولین همان طور که در قسمت قبل نشان داده شد استفاده از وراپامیل با دوز ۱ میکرومول و همچنین مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی لیتر کاهش معنی داری در شدت انقباضات ناشی از استیل کولین ایجاد نکرد، بنابراین به منظور بررسی اثر سینرژیسم احتمالی این دو ترکیب از دوز های مذکور به صورت توأم استفاده شد. همان گونه که در شکل ۳



شکل ۳- مقایسه اثر اسپاسمولتیک دوز های غیر مؤثره وراپامیل با دوز یک میکرومول به اضافه غلظت ۲۵ نانوگرم / میلی لیتر اسانس مرزه بر ضد انقباض ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار (n=5)

**، نشان دهنده $p<0.01$ می باشد.

انقباض عضلات صاف وابسته به کلسیم می باشد. غشای عضله صاف دارای کانال های کلسیمی در یچه دار وابسته به ولتاژ است و کلسیم در جهت شبکه کتروشیمیایی خود از طریق کانال های کلسیمی به سمت داخل حرکت می کند تا با افزایش غلظت کلسیم آزاد به افزایش قدرت انقباضی عضلات صاف کمک کند. هر عاملی که بتواند موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سلول های عضلانی شود پاسخ انقباضی آن را کاهش می دهد (Parnas *et al.*, 2009) وراپامیل به عنوان یک مهارکننده کانال های کلسیمی

بحث

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از دوز های ۱۰۰ و ۲۰۰ نانوگرم اسانس مرزه شدت انقباضات ناشی از استیل کولین را کاهش می دهد اما در دوز های پایین اثری بر این انقباضات نشان نمی دهد. در مورد وراپامیل نیز تنها دوز ۴ میکرومولار دارو توانست اثرات اسپاسمولتیک نشان دهد. همچنین استفاده توأم دوز غیر مؤثره این اسانس به همراه وراپامیل به عنوان یک بلوکر کانال کلسیمی می تواند اثرات اسپاسمولتیک معنی داری نشان دهد.

می‌کنند. کanal‌های TRP دسته بزرگی از کanal‌های یونی هستند که بسیاری از فعالیت‌های فیزیولوژیک همانند انقباض، لمس، فشار، شناوبی و بویایی را کنترل می‌کنند. کanal‌های کاتیونی TRP باسطه هدایت سدیم و کلسیم از طریق غشاء پلاسمایی به سیتوپلاسم می‌باشند و هدایت این یون‌ها برای دیپلاریزه شدن سلول‌های تحریک‌پذیر ضروریست (Song & Yuan, 2010). این کanal‌ها به وسیله تحریک گیرنده‌های موسکارینی در عضلات صاف روده فعال می‌شوند که حاصل آن انقباض این عضلات است و به موجب آن هدایت کلسیم افزایش یافته و حرکات روده تشدید می‌شود. کanal‌های مذکور بیشتر در بخش‌های انتهای روده یعنی ایلئوم وجود دارند و در بخش‌های ابتدای Tsvilovskyy *et al.*, 2009 آن و در معده کمتر دیده می‌شود (2009). بررسی‌های فوق در خصوص نقش روغن‌های فرّار مبین این واقعیت است که مهمترین سازوکار آنتی‌اسپاسmodیک بر عضله صاف لوله گوارش مهار کanal‌های کلسیمی متکی به ولتاژ و جلوگیری از ورود کلسیم به داخل فیبر عضلانی از طریق این کanal‌ها می‌باشد. مطالعات نشان داده است که غلظت بالایی از کارواکرول در انسان مزه وجود دارد (Ahmadi *et al.*, 2009). از طرفی در مورد اثر اسپاسمولتیک کارواکرول تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که کارواکرول از طریق مهار کanal‌های گذرا (Parnas *et al.*, 2009) و همچنین مهار کanal‌های کلسیمی (Earley *et al.*, 2010) و نیز کاهش حساسیت اجزا انقباضی عضله به کلسیم می‌تواند اثرات اسپاسمولتیک نشان دهد (Peixoto *et al.*, 2010). البته مهار ورود کلسیم توسط بعضی از روغن‌های فرّار دیگر نیز Leonhardt *et al.*, 2010 نشان داده شده است (Brankovic *et al.*, 2009). بنابراین با در نظر گرفتن این نکته که کارواکرول با درصد نسبتاً بالایی در انسان مزه وجود دارد بخش عمداتی از آثار اسپاسمولتیک انسان مزه بر انقباضات روده ممکن است به وسیله کارواکرول انجام شده باشد. همچنین با توجه به اینکه دوز غیر مؤثره این انسان به همراه دوز غیر مؤثره و راپامیل توانست اثرات

می‌تواند موجب مهار انقباض وابسته به دوز شود، به طوری که در این مطالعه این دارو در غلظت ۴ میکرومولار انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار را به میزان ۷۸٪ کاهش داده است که این نتایج همسو با نتایج مطالعه Leonhardt و همکاران (۲۰۱۰) می‌باشد. این محققان اثر روغن‌های فرّار گیاه *Pterodon polygalaeiflorus* بر انقباض ناشی از استیل کولین و میزان کلسیم را مورد آزمایش قرار داده و نتایج را با اثر و راپامیل مقایسه کردند. نتایج آنان نشان داد که اثر مهاری این ترکیب بر انقباض روده ناشی از تأثیر بر عضلات بوده و به طور کامل با واسطه سازوکار درون سلولی انجام شده و روغن‌های فرّار در این رابطه موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سیتوپلاسم شده‌اند. در بررسی دیگری که توسط Brankovic و همکاران (۲۰۰۹) بر روی روغن‌های فرّار گیاه *Calamintha glandulosa* انجام شده نقش آن را در مهار کanal‌های کلسیمی مورد تأیید قرار داده و نشان می‌دهند که روغن‌های فرّار دارای یک اثر مهاری بر انقباض ایلئوم بوده که پس از شستشو قابل برگشت می‌باشد و این مؤید این است که این روغن بافت روده را تخریب نکرده و بر انقباض ناشی از پتاسیم مؤثر است؛ و همان‌گونه که مشخص شده است افزایش پتاسیم موجب فعال شدن کanal‌های کلسیمی متکی به ولتاژ غشاء شده و ورود کلسیم را زیاد می‌کند؛ بنابراین با توجه به اثر فوق، روغن‌های فرّار از طریق مهار ورود کلسیم به داخل سارکوپلاسم اثر گذاشته و منحنی غلظت پاسخ کلسیم را کاهش داده که این عمل مشابه اثر و راپامیل بوده و باعث عمل آنتاگونیستی بر کanal‌های کلسیمی می‌باشد که بر روی اسپاسمولتیک آن از این راه اعمال می‌شود (Brankovic *et al.*, 2009). بررسی Mahieu و همکاران (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که تأثیر بعضی از گیاهان دارویی که دارای روغن فرّار می‌باشند از طریق کanal‌های زودگذر (transient receptor potential channels: TRP در کنترل رهایش کلسیم و فراهمی آن نقش خود را ایفا

- Leonhardt, V., Leal-Cardoso, J.H., Lahlou, S., Albuquerque, A.A., Porto, R.S., Celedônio, N.R., Oliveira, A.C., Pereira, R.F., Silva, L.P., Garcia-Teófilo, T.M., Silva, A.P., Magalhães, P.J., Duarte, G.P. and Coelho-de-Souza, A.N., 2010. Antispasmodic effects of essential oil of *Pterodon polygalaeformis* and its main constituent beta-caryophyllene on rat isolated ileum. Fundamental and Clinical Pharmacology, 24(6): 749-758.
- Mahieu, F., Owsianik, G., Verbert, L., Janssens, A., De Smedt, H., Nilius, B. and Voets, T., 2007. TRPM8-independent menthol-induced Ca^{2+} release from endoplasmic reticulum and Golgi. The Journal of Biological Chemistry, 282(5): 3325-3336.
- Nagao, M., Linden, L.D., Duenes, J.A. and Sarr, M.G., 2011. Mechanisms of action of the gastro transmitter hydrogen sulfide in modulating contractile activity of longitudinal muscle of rat ileum. Journal of Gastrointestinal Surgery, 15(1): 12-22.
- Parnas, M., Peters, M., Dadon, D., Lev, S., Vertkin, I., Slutsky, I. and Minke, B., 2009. Carvacrol is a novel inhibitor of Drosophila TRPL and mammalian TRPM7 channels. Cell Calcium, 45(3): 300-309.
- Peixoto-Neves, D., Silva-Alves, K.S., Gomes, M.D., Lima, F.C., Lahlou, S., Magalhães, P.J., Ceccatto, V.M., Coelho-de-Souza, A.N. and Leal-Cardoso, J.H., 2010. Vasorelaxant effects of the monoterpenic phenol isomers, carvacrol and thymol, on rat isolated aorta. Fundamental and Clinical Pharmacology, 24(3): 341-350.
- Song, M.Y. and Yuan, J.X., 2010. Introduction to TRP channels: structure, function, and regulation. Advances in Experimental Medicine and Biology, 661: 99-108.
- Tsvilovskyy, V.V., Zholos, A.V., Aberle, T., Philipp, S.E., Dietrich, A., Zhu, M.X., Birnbaumer, L., Freichel, M. and Flockerzi, V., 2009. Deletion of TRPC4 and TRPC6 in mice impairs smooth muscle contraction and intestinal motility in vivo. Gastroenterology, 137(4): 1415-1424.
- Zargari, A., 2011. Medicinal Plants (Vol. 4). University of Tehran Press, 948p, (In Persian).

هم افزایی در جهت کاهش قابل توجه شدت انقباضات ایلئوم نشان دهد، می توان مهار کانال های کلسیمی را به عنوان یکی از سازوکارهای اثر اسانس مرзе بر انقباضات عضله صاف ایلئوم معرفی کرد.

منابع مورد استفاده

- Ahmadi, Sh., Sefidkon, F., Babakhanlo, P., Asgari, F., Khademi, K., Valizadeh, N. and Karimifar, M.A., 2009. Comparing essential oil composition of *Satureja bachtiarica* Bunge before and full flowering stages in field and provenance. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(2): 159-169.
- Brankovic, S.V., Kitic, D., Radenkovic, M.M., Veljkovic, S.M. and Golubovic, T.D., 2009. Calcium blocking activity as a mechanism of the spasmolytic effect of the essential oil of *Calamintha glandulosa* Silic on the isolated rat ileum. General Physiology and Biophysics, 28:174-178.
- Cavalcante Fde, A., Monteiro Fde, S., Martins, I.R., Barbosa, T.P., Camara Cde, A. and Pinto, A.C., 2010. Synthetic lapachol derivatives relax guinea-pig ileum by blockade of the voltage-gated calcium channels. Zeitschrift fur Naturforschung C, 65(9-10): 627-636.
- Earley, S., Gonzales, A.L. and Garcia, Z.I., 2010. Dietary agonist of transient receptor potential cation channel V3 elicits endothelium-dependent vasodilation. Molecular Pharmacology, 77(4): 612-620.
- Hejazian, S.H., Bagheri, S.M. and Safari, F., 2014a. Spasmolytic and antispasmodic action of *Trachyspermum ammi* essence on rat's ileum contraction. North American Journal of Medical Sciences, 6(12): 643-647.
- Hejazian, S.H., Bameri, M. and Abassi Sarcheshma, A., 2014b. The effect of *Satureja* essential oil on acetylcholine induced contraction in male rats ileum. Journal of Rafsanjan Medical Sciene, 13(4): 395-404.
- Katzung, B.G., Masters, S.B. and Trevor, A.J., 2009. Basic and Clinical Pharmacology. McGraw Hill Professional, 1232p.

The inhibitory synergistic effects of verapamil and *Satureja hortensis* essential oil on cholinergic contraction of rat ileum

S.H. Hejazian^{1*}, F. Safari² and M.Bameri³

1*- Corresponding author, Department of Physiology/Herbal Medicine Research Center, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran, E-mail: hejaziansh@yahoo.com

2- Department of Physiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran.

3- Paradise University, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

Received: December 2014

Revised: May 2015

Accepted: May 2015

Abstract

Verapamil inhibits the cytosolic calcium content by blocking both activated and inactivated T-type calcium. Regarding the spasmolytic effect of materials caused by blockage of calcium channels and due to the inhibitory effect of *Satureja hortensis* L. on ileum smooth muscle contraction. The present study was designed to find out the synergistic effects of calcium blocker verapamil and *Satureja* essential oil on inhibition of cholinergic contraction in male rat's ileum. In this study, by using an oscillographic device, the effects of different concentration of *Satureja* essential oil and verapamil were examined on isotonic contraction of ileum induced by acetylcholine 10^{-4} M. Our results showed that both verapamil and *Satureja* essential oils inhibited acetylcholine-induced contraction of ileum. In addition, their ineffective doses had synergistic spasmolytic effects, which were statistically significant ($p<0.05$).

Keywords: Verapamil, *Satureja hortensis* L., essential oil, spasmolytic, acetylcholine, ileum, smooth muscle.

اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسمیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلنوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

سید حسن حجازیان^{۱*}، فاطمه صفری^۲ و محمد بامری^۳

۱- نویسنده مسئول، استادیار، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران، پست الکترونیک: hejaziansh@yahoo.com

۲- استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران

۳- کارشناس ارشد، دانشکده پرديس بين الملل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۴

تاریخ اصلاح نهایی: خرداد ۱۳۹۴

تاریخ دریافت: دی ۱۳۹۳

چکیده

وراپامیل با مهار کانال‌های کلسمیم نوع T فعال و غیرفعال از ورود کلسمیم به داخل سلول‌ها جلوگیری می‌کند. با توجه به اینکه اثرات ضداسپاسمی مواد از طریق مهار کانال‌های کلسمیم اعمال می‌شود و اثر ضدانقباضی و کاهش فعالیت مکانیکی عضلات صاف ایلنوم توسط اسانس مرزه نشان داده شده است، مطالعه حاضر اثر هم‌افزایی کلسمیم بلوکر وراپامیل و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) را بر جلوگیری از تحریک کولینرژیک ایلنوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه فیزیوگراف، اثر غلظت‌های مختلف اسانس مرزه و وراپامیل بر انقباضات ایزوتوپیک ایجاد شده بهوسیله استیل کولین $^{+/-} ۱۰$ مولار در ایلنوم مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که هر دو ماده وراپامیل و اسانس مرزه بر انقباض ناشی از استیل کولین اثر مهارکننده‌ی داشته و همچنین غلظت‌های غیرمؤثر آنها نیز اثر هم‌افزایی در مهار انقباض داشته که از لحاظ آماری معنی دار می‌باشد ($p < 0.05$).

واژه‌های کلیدی: وراپامیل، اسانس مرزه (Satureja hortensis L.), ضداسپاسمی، استیل کولین، ایلنوم، عضله صاف.

از بار کاری قلب نیز کاسته می‌شود. بیش از ۹۰٪ دارو از راه خوراکی جذب می‌شود. به دلیل متابولیسم عبور اول از کبد، فراهمی زیستی آن ۳۵-۲۰ درصد است (Katzung et al., 2009). گیاه مرزه با نام علمی Satureja hortensis از تیره نعناع می‌باشد که در نواحی شمال‌غربی ایران، تبریز و نواحی مختلف خراسان می‌روید و دارای اثر نیرودهنده، تسهیل‌کننده عمل هضم و رفع اسهال و ضدکرم می‌باشد (Zargari, 2011). همچنین در رفع اسهال‌های عفونی و التهاب کولون

مقدمه

وراپامیل یک داروی مسدودکننده کانال کلسمیم می‌باشد که در بدن موجب جلوگیری از ورود کلسمیم به داخل سلول‌ها می‌شود؛ به علت اثر مسدودکننده‌ی این دارو بر کانال‌های کلسمیم مقدار کلسمیم در فیبرهای عضله قلب و عروق خونی کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به کاهش تعداد ضربان قلب و گشاد شدن عروق خونی گردد که در نتیجه آن فشار خون کاهش و جریان خون افزایش می‌یابد و

منابع طبیعی استان یزد به شماره (TARI-۵۸۴۱۶) قرار گرفته بود، در بالن تقطیر ریخته شد و بعد به آن، تا دو سوم حجم بالن آب م قطر اضافه گردید، سپس بالن به دستگاه کلونجر متصل شد و با حرارت دادن آن ۵ میلی لیتر انسانس بدست آمده جدا شد و تا زمان آزمایش در یخچال نگهداری شد.

روش انجام آزمایش ۳

در این مطالعه از موش‌های صحرایی نر نژاد ویستان در محدوده وزنی ۲۷۰-۲۵۰ گرم استفاده گردید. حیوانات در شرایط استاندارد دوره نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و دمای 22°C با دسترسی مناسب به آب و غذا نگهداری شدند. کلیه مداخلات مطابق با اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شد.

پس از بیهوش کردن حیوانات توسط مخلوط کتابین و زیلازین قطعاتی از بخش انتهای روده (ایلئوم) جدا گردید و پس از تمیز کردن تا انجام آزمایش در محلول تیروود نگهداری شدند. برای بررسی انقباضات ایلئوم قطعات یک سانتی‌متری از روده را جدا کرده و یک طرف آن را توسط نخ به قسمت پایین محفظه داخلی حمام بافت حاوی محلول تیروود (CaCl_2 ۰.۲g/L, KCl ۰.۲g/L, NaCl ۸g/L, NaHCO_3 ۱g/L, NaH_2PO_4 ۰.۰۵g/L, MgCl_2 ۰.۱g/L و $\text{D}\text{-glucose}$ ۱g/L) متصل و سر دیگر آن را به یک ترانسدیوسر ایزوتونیک که با دستگاه فیزیوگراف مرتبط بود، وصل کردیم. در تمام طول آزمایش، محلول تیروود توسط مخلوطی از ۹۵٪ اکسیژن و ۵٪ گاز کربونیک هوادهی شد و پس از حدود ۲۰ دقیقه که برای رسیدن دستگاه به وضعیت تعادل لازم بود انقباضات ایزوتونیک ایلئوم توسط دستگاه فیزیوگراف یک کاناله (Bioscience) ثبت شد. در هر دوره آزمایش یکی از محلول‌های مورد آزمایش با غلظت مورد نظر به حمام بافت اضافه شد و اثر آن بر انقباض ایلئوم ثبت گردید. پس از هر دوره آزمایش، بافت مورد نظر با محلول تیروود تازه شستشو و در صورت فعل می‌باشد، آزمایش

مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه دارای محتوای مناسبی از تانن و مواد چرب می‌باشد. انسانس آن دارای کارواکرول (Zargari, 2011) و سیمن (۲۵-۲۰٪) می‌باشد (Ghoneh et al., 2009). گونه‌های مختلف گیاه از نظر میزان انسانس و نوع ترکیب‌های تشکیل‌دهنده آن تنوع زیادی دارند و بر حسب نوع و درصد اجزاء تشکیل‌دهنده و نیز کاربرد انسانس متفاوت می‌باشد. انسانس بدست آمده از این گیاه در مرحله گلدهی آن می‌باشد که براساس یافته‌های Ahmadi و همکاران (2009) ترکیب‌های شناسایی شده در مرحله گلدهی کامل پاراسیمن (۲۱٪) و کارواکرول (۳٪/۶۲) می‌باشند. براساس بررسی‌های انجام شده، غلظت‌های مختلف انسانس مرزه دارای اثر اسپاسمولتیک و آنتی‌اسپاسمودیک بر ایلئوم می‌باشد (Hejazian et al., 2014b). انقباض عضلات صاف، وابسته به کلسیم و ATP می‌باشد. افزایش کلسیم سارکوپلاسمی در عضلات صاف موجب فعال شدن میوزین کیناز و فسفریلاسیون سر میوزین می‌شود و حاصل آن انقباض می‌باشد. بنابراین، نیروی انقباض عضله صاف معمولاً بستگی زیادی به غلظت یون کلسیم مایع خارج سلولی دارد و هر عاملی که بتواند موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سلول‌های عضلانی شود پاسخ انقباضی آن را کاهش می‌دهد (Parnas et al., 2009). به طوری که بیشتر سازوکارهای تعدیل‌کننده انقباضات عضلات صاف لوله گوارش اثرات خود را به واسطه مهار Cavalcante Fde et al., 2010؛ Nagao et al., 2011؛ ۲۰۱۰) کانال‌های کلسیمی اعمال می‌کنند (Hejazian et al., 2014b). با توجه به اثر ضدانقباضی این انسانس بر دستگاه گوارش (Hejazian et al., 2014b) هدف مطالعه حاضر بررسی اثر هم‌افزایی داروی وراپامیل و انسانس مرزه بر انقباضات ایزوتونیک در ایلئوم موش سفید آزمایشگاهی می‌باشد.

مواد و روشها

روش تهیه نمونه

برای استخراج انسانس، ۱۰۰ گرم نمونه گیاهی خشک شده گیاه مرزه که مورد تأیید مرکز تحقیقات کشاورزی و

در صد تغییر وضعیت انقباضی به صورت میلی‌متر انحراف قلم برای هر محلول تعیین گردید و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و پس آزمون توکی مقایسه شد. ارزش $p < 0.05$ به عنوان معیاری برای معنی‌دار بودن اختلاف در نظر گرفته شده است.

نتایج

اثر اسپاسمولتیک و راپامیل بر شدت انقباضات ایلئوم با استیل کولین

بررسی اثرات اسپاسمولتیک و راپامیل بر شدت انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار نشان می‌دهد که غلظت یک و دو میکرومول و راپامیل شدت انقباض ناشی از استیل کولین را به ترتیب به میزان ۹٪ و ۱۵٪ کاهش می‌دهد که این کاهش از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد (شکل ۱). در حالی‌که غلظت ۴ میکرومول آن انقباضات ناشی از استیل کولین را به میزان ۷۸٪ کاهش داده که از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد ($p < 0.05$).

اثر اسپاسمولتیک انسنس مرزه بر شدت انقباضات ایجاد شده به‌وسیله استیل کولین

در مرحله بعد، اثر اسپاسمولتیک دوزهای مختلف انسنس مرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که انسنس مرزه با غلظت ۲۵ و ۵۰ نانوگرم/میلی‌لیتر دارای اثرات اسپاسمولتیک نسبتاً ضعیفی است که از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد، اما زمانی که دوزهای بالاتر مرزه مورد استفاده قرار گرفت پاسخ متفاوتی مشاهده شد (شکل ۲). استفاده از غلظت ۱۰۰ و ۲۰۰ نانوگرم بر میلی‌لیتر این انسنس شدت انقباضات را به ترتیب به میزان ۳۳٪ و ۸۲٪ کاهش می‌دهد که از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد ($p < 0.05$).


بعدی انجام شد. آنگاه هر محلول بر روی ۵ نمونه بافتی بررسی شده و تجزیه و تحلیل آماری بر روی میانگین در صد انقباض ناشی از استیل کولین انجام گردید. برای بررسی اثر داروهای مذکور، نمونه‌ها به گروه‌های زیر تقسیم شدند:

- ۱- گروه استیل کولین
 - ۲- گروه وراپامیل با دوز ۱ میکرومول
 - ۳- گروه وراپامیل با دوز ۲ میکرومول
 - ۴- گروه وراپامیل با دوز ۴ میکرومول
 - ۵- گروه مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۶- گروه مرزه با دوز ۵۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۷- گروه مرزه با دوز ۱۰۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۸- گروه مرزه با دوز ۲۰۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۹- گروه دریافت کننده وراپامیل با دوز ۱ میکرومول
- + مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی‌لیتر


آزمایش آثار ضداسپاسمی

اثار اسپاسمولتیک، در این روش ابتدا حداقل انقباضات ایزوتونیک ایلئوم را با استفاده از استیل کولین (مرک-آلمان) 10^{-4} مولار ایجاد کردیم. مطالعات قبل و از جمله مطالعه گروه ما نشان داد که استفاده از استیل کولین با دوز مذکور توانایی ایجاد حداقل انقباض را در عضله ایلئوم دارد (Hejazian *et al.*, 2014a). سپس در هر دوره آزمایش اثر محلول‌های مختلف وراپامیل (مرک-آلمان) و انسنس مرزه را بر انقباضات ایجاد شده در ایلئوم ثبت کردیم.

روش جمع‌آوری نتایج و تجزیه و تحلیل آماری به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد و نتایج به صورت میانگین \pm انحراف معیار



شکل ۱- مقایسه اثر اسپاسمولیتیک وراپامیل با دوزهای ۱، ۲ و ۴ میکرومول بر انقباضات ناشی از استیل کولین


با دوز 10^{-4} مولار (n=5)**، نشان‌دهنده $p<0.01$ می‌باشد.

شکل ۲- مقایسه اثر اسپاسمولیتیک اسانس مرزه با غلظت‌های ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ نانوگرم/میلی‌لیتر

بر انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار (n=5)*، نشان‌دهنده $p<0.05$ و **، نشان‌دهنده $p<0.01$ می‌باشند.

نشان داده شده است تجویز دوز غیر مؤثره اسانس مرزه به همراه دوز غیر مؤثره وراپامیل شدت انقباض ناشی از استیل کولین را به میزان % کاهش داده که این کاهش در مقایسه با گروه استیل کولین معنی دار می باشد ($p<0.01$). همچنین کاهش شدت انقباضات در گروه دریافت کننده توأم داروها در مقایسه با گروه هایی که اسانس مرزه و یا وراپامیل را به تنها ی دریافت کردند نیز معنی دار است ($p<0.05$).

اثر همافزایی دوز غیر مؤثره اسانس مرزه و وراپامیل بر شدت انقباضات ایجاد شده به وسیله استیل کولین همان طور که در قسمت قبل نشان داده شد استفاده از وراپامیل با دوز ۱ میکرومول و همچنین مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی لیتر کاهش معنی داری در شدت انقباضات ناشی از استیل کولین ایجاد نکرد، بنابراین به منظور بررسی اثر سینرژیسم احتمالی این دو ترکیب از دوز های مذکور به صورت توأم استفاده شد. همان گونه که در شکل ۳



شکل ۳- مقایسه اثر اسپاسمولتیک دوز های غیر مؤثره وراپامیل با دوز یک میکرومول به اضافه غلظت ۲۵ نانوگرم / میلی لیتر اسانس مرزه بر ضد انقباض ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار (n=5)

**، نشان دهنده $p<0.01$ می باشد.

انقباض عضلات صاف وابسته به کلسیم می باشد. غشای عضله صاف دارای کانال های کلسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ است و کلسیم در جهت شبکه کتروشیمیایی خود از طریق کانال های کلسیمی به سمت داخل حرکت می کند تا با افزایش غلظت کلسیم آزاد به افزایش قدرت انقباضی عضلات صاف کمک کند. هر عاملی که بتواند موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سلول های عضلانی شود پاسخ انقباضی آن را کاهش می دهد (Parnas *et al.*, 2009) وراپامیل به عنوان یک مهارکننده کانال های کلسیمی

بحث

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از دوز های ۱۰۰ و ۲۰۰ نانوگرم اسانس مرزه شدت انقباضات ناشی از استیل کولین را کاهش می دهد اما در دوز های پایین اثری بر این انقباضات نشان نمی دهد. در مورد وراپامیل نیز تنها دوز ۴ میکرومولار دارو توانست اثرات اسپاسمولتیک نشان دهد. همچنین استفاده توأم دوز غیر مؤثره این اسانس به همراه وراپامیل به عنوان یک بلوکر کانال کلسیمی می تواند اثرات اسپاسمولتیک معنی داری نشان دهد.

می‌کنند. کanal‌های TRP دسته بزرگی از کanal‌های یونی هستند که بسیاری از فعالیت‌های فیزیولوژیک همانند انقباض، لمس، فشار، شناوبی و بویایی را کنترل می‌کنند. کanal‌های کاتیونی TRP باسطه هدایت سدیم و کلسیم از طریق غشاء پلاسمایی به سیتوپلاسم می‌باشند و هدایت این یون‌ها برای دیپلاریزه شدن سلول‌های تحریک‌پذیر ضروریست (Song & Yuan, 2010). این کanal‌ها به وسیله تحریک گیرنده‌های موسکارینی در عضلات صاف روده فعال می‌شوند که حاصل آن انقباض این عضلات است و به موجب آن هدایت کلسیم افزایش یافته و حرکات روده تشدید می‌شود. کanal‌های مذکور بیشتر در بخش‌های انتهای روده یعنی ایلئوم وجود دارند و در بخش‌های ابتدای Tsvilovskyy *et al.*, 2009 آن و در معده کمتر دیده می‌شود (2009). بررسی‌های فوق در خصوص نقش روغن‌های فرّار مبین این واقعیت است که مهمترین سازوکار آنتی‌اسپاسmodیک بر عضله صاف لوله گوارش مهار کanal‌های کلسیمی متکی به ولتاژ و جلوگیری از ورود کلسیم به داخل فیبر عضلانی از طریق این کanal‌ها می‌باشد. مطالعات نشان داده است که غلظت بالایی از کارواکرول در انسان مزه وجود دارد (Ahmadi *et al.*, 2009). از طرفی در مورد اثر اسپاسمولتیک کارواکرول تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که کارواکرول از طریق مهار کanal‌های گذرا (Parnas *et al.*, 2009) و همچنین مهار کanal‌های کلسیمی (Earley *et al.*, 2010) و نیز کاهش حساسیت اجزا انقباضی عضله به کلسیم می‌تواند اثرات اسپاسمولتیک نشان دهد (Peixoto *et al.*, 2010). البته مهار ورود کلسیم توسط بعضی از روغن‌های فرّار دیگر نیز Leonhardt *et al.*, 2010 نشان داده شده است (Brankovic *et al.*, 2009). بنابراین با در نظر گرفتن این نکته که کارواکرول با درصد نسبتاً بالایی در انسان مزه وجود دارد بخش عمداتی از آثار اسپاسمولتیک انسان مزه بر انقباضات روده ممکن است به وسیله کارواکرول انجام شده باشد. همچنین با توجه به اینکه دوز غیر مؤثره این انسان به همراه دوز غیر مؤثره و راپامیل توانست اثرات

می‌تواند موجب مهار انقباض وابسته به دوز شود، به طوری که در این مطالعه این دارو در غلظت ۴ میکرومولار انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار را به میزان ۷۸٪ کاهش داده است که این نتایج همسو با نتایج مطالعه Leonhardt و همکاران (۲۰۱۰) می‌باشد. این محققان اثر روغن‌های فرّار گیاه *Pterodon polygalaeiflorus* بر انقباض ناشی از استیل کولین و میزان کلسیم را مورد آزمایش قرار داده و نتایج را با اثر و راپامیل مقایسه کردند. نتایج آنان نشان داد که اثر مهاری این ترکیب بر انقباض روده ناشی از تأثیر بر عضلات بوده و به طور کامل با واسطه سازوکار درون سلولی انجام شده و روغن‌های فرّار در این رابطه موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سیتوپلاسم شده‌اند. در بررسی دیگری که توسط Brankovic و همکاران (۲۰۰۹) بر روی روغن‌های فرّار گیاه *Calamintha glandulosa* انجام شده نقش آن را در مهار کanal‌های کلسیمی مورد تأیید قرار داده و نشان می‌دهند که روغن‌های فرّار دارای یک اثر مهاری بر انقباض ایلئوم بوده که پس از شستشو قابل برگشت می‌باشد و این مؤید این است که این روغن بافت روده را تخریب نکرده و بر انقباض ناشی از پتاسیم مؤثر است؛ و همان‌گونه که مشخص شده است افزایش پتاسیم موجب فعال شدن کanal‌های کلسیمی متکی به ولتاژ غشاء شده و ورود کلسیم را زیاد می‌کند؛ بنابراین با توجه به اثر فوق، روغن‌های فرّار از طریق مهار ورود کلسیم به داخل سارکوپلاسم اثر گذاشته و منحنی غلظت پاسخ کلسیم را کاهش داده که این عمل مشابه اثر و راپامیل بوده و باعث عمل آنتاگونیستی بر کanal‌های کلسیمی می‌باشد که بر روی اسپاسمولتیک آن از این راه اعمال می‌شود (Brankovic *et al.*, 2009). بررسی Mahieu و همکاران (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که تأثیر بعضی از گیاهان دارویی که دارای روغن فرّار می‌باشند از طریق کanal‌های زودگذر (transient receptor potential channels: TRP در کنترل رهایش کلسیم و فراهمی آن نقش خود را ایفا

- Basic and Clinical Pharmacology. McGraw Hill Professional, 1232p.
- Leonhardt, V., Leal-Cardoso, J.H., Lahlou, S., Albuquerque, A.A., Porto, R.S., Celedônio, N.R., Oliveira, A.C., Pereira, R.F., Silva, L.P., Garcia-Teófilo, T.M., Silva, A.P., Magalhães, P.J., Duarte, G.P. and Coelho-de-Souza, A.N., 2010. Antispasmodic effects of essential oil of *Pterodon polygalaeiflorus* and its main constituent beta-caryophyllene on rat isolated ileum. Fundamental and Clinical Pharmacology, 24(6): 749-758.
 - Mahieu, F., Owsianik, G., Verbert, L., Janssens, A., De Smedt, H., Nilius, B. and Voets, T., 2007. TRPM8-independent menthol-induced Ca^{2+} release from endoplasmic reticulum and Golgi. The Journal of Biological Chemistry, 282(5): 3325-3336.
 - Nagao, M., Linden, L.D., Duenes, J.A. and Sarr, M.G., 2011. Mechanisms of action of the gastro transmitter hydrogen sulfide in modulating contractile activity of longitudinal muscle of rat ileum. Journal of Gastrointestinal Surgery, 15(1): 12-22.
 - Parnas, M., Peters, M., Dadon, D., Lev, S., Vertkin, I., Slutsky, I. and Minke, B., 2009. Carvacrol is a novel inhibitor of *Drosophila* TRPL and mammalian TRPM7 channels. Cell Calcium, 45(3): 300-309.
 - Peixoto-Neves, D., Silva-Alves, K.S., Gomes, M.D., Lima, F.C., Lahlou, S., Magalhães, P.J., Ceccatto, V.M., Coelho-de-Souza, A.N. and Leal-Cardoso, J.H., 2010. Vasorelaxant effects of the monoterpenic phenol isomers, carvacrol and thymol, on rat isolated aorta. Fundamental and Clinical Pharmacology, 24(3): 341-350.
 - Song, M.Y. and Yuan, J.X., 2010. Introduction to TRP channels: structure, function, and regulation. Advances in Experimental Medicine and Biology, 661: 99-108.
 - Tsvilovskyy, V.V., Zholos, A.V., Aberle, T., Philipp, S.E., Dietrich, A., Zhu, M.X., Birnbaumer, L., Freichel, M. and Flockerzi, V., 2009. Deletion of TRPC4 and TRPC6 in mice impairs smooth muscle contraction and intestinal motility in vivo. Gastroenterology, 137(4): 1415-1424.
 - Zargari, A., 2011. Medicinal Plants (Vol. 4). University of Tehran Press, 948p, (In Persian).

هم افزایی در جهت کاهش قابل توجه شدت انقباضات ایلنوم نشان دهد، می توان مهار کانال های کلسیمی را به عنوان یکی از سازوکارهای اثر اسانس مرзе بر انقباضات عضله صاف ایلنوم معرفی کرد.

منابع مورد استفاده

- Ahmadi, Sh., Sefidkon, F., Babakhanlo, P., Asgari, F., Khademi, K., Valizadeh, N. and Karimifar, M.A., 2009. Comparing essential oil composition of *Satureja bachtiarica* Bunge before and full flowering stages in field and provenance. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(2): 159-169.
- Brankovic, S.V., Kitic, D., Radenkovic, M.M., Veljkovic, S.M. and Golubovic, T.D., 2009. Calcium blocking activity as a mechanism of the spasmolytic effect of the essential oil of *Calamintha glandulosa* Silic on the isolated rat ileum. General Physiology and Biophysics, 28:174-178.
- Cavalcante Fde, A., Monteiro Fde, S., Martins, I.R., Barbosa, T.P., Camara Cde, A. and Pinto, A.C., 2010. Synthetic lapachol derivatives relax guinea-pig ileum by blockade of the voltage-gated calcium channels. Zeitschrift fur Naturforschung C, 65(9-10): 627-636.
- Earley, S., Gonzales, A.L. and Garcia, Z.I., 2010. Dietary agonist of transient receptor potential cation channel V3 elicits endothelium-dependent vasodilation. Molecular Pharmacology, 77(4): 612-620.
- Hejazian, S.H., Bagheri, S.M. and Safari, F., 2014a. Spasmolytic and antispasmodic action of *Trachyspermum ammi* essence on rat's ileum contraction. North American Journal of Medical Sciences, 6(12): 643-647.
- Hejazian, S.H., Bameri, M. and Abassi Sarcheshma, A., 2014b. The effect of *Satureja* essential oil on acetylcholine induced contraction in male rats ileum. Journal of Rafsanjan Medical Sciense, 13(4): 395-404.
- Katzung, B.G., Masters, S.B. and Trevor, A.J., 2009.

The inhibitory synergistic effects of verapamil and *Satureja hortensis* essential oil on cholinergic contraction of rat ileum

S.H. Hejazian^{1*}, F. Safari² and M.Bameri³

1*- Corresponding author, Department of Physiology/Herbal Medicine Research Center, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran, E-mail: hejaziansh@yahoo.com

2- Department of Physiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran.

3- Paradise University, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

Received: December 2014

Revised: May 2015

Accepted: May 2015

Abstract

Verapamil inhibits the cytosolic calcium content by blocking both activated and inactivated T-type calcium. Regarding the spasmolytic effect of materials caused by blockage of calcium channels and due to the inhibitory effect of *Satureja hortensis* L. on ileum smooth muscle contraction. The present study was designed to find out the synergistic effects of calcium blocker verapamil and *Satureja* essential oil on inhibition of cholinergic contraction in male rat's ileum. In this study, by using an oscillographic device, the effects of different concentration of *Satureja* essential oil and verapamil were examined on isotonic contraction of ileum induced by acetylcholine 10^{-4} M. Our results showed that both verapamil and *Satureja* essential oils inhibited acetylcholine-induced contraction of ileum. In addition, their ineffective doses had synergistic spasmolytic effects, which were statistically significant ($p<0.05$).

Keywords: Verapamil, *Satureja hortensis* L., essential oil, spasmolytic, acetylcholine, ileum, smooth muscle.

اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسمیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلنوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

سید حسن حجازیان^{۱*}، فاطمه صفری^۲ و محمد بامری^۳

۱- نویسنده مسئول، استادیار، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران، پست الکترونیک: hejaziansh@yahoo.com

۲- استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران

۳- کارشناس ارشد، دانشکده پرديس بين الملل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، ایران

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۴

تاریخ اصلاح نهایی: خرداد ۱۳۹۴

تاریخ دریافت: دی ۱۳۹۳

چکیده

وراپامیل با مهار کانال‌های کلسمیم نوع T فعال و غیرفعال از ورود کلسمیم به داخل سلول‌ها جلوگیری می‌کند. با توجه به اینکه اثرات ضداسپاسمی مواد از طریق مهار کانال‌های کلسمیم اعمال می‌شود و اثر ضدانقباضی و کاهش فعالیت مکانیکی عضلات صاف ایلنوم توسط اسانس مرزه نشان داده شده است، مطالعه حاضر اثر هم‌افزایی کلسمیم بلوکر وراپامیل و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) را بر جلوگیری از تحریک کولینرژیک ایلنوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه فیزیوگراف، اثر غلظت‌های مختلف اسانس مرزه و وراپامیل بر انقباضات ایزوتوپیک ایجاد شده بهوسیله استیل کولین $^{+/-} ۱۰$ مولار در ایلنوم مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که هر دو ماده وراپامیل و اسانس مرزه بر انقباض ناشی از استیل کولین اثر مهارکننده‌ی داشته و همچنین غلظت‌های غیرمؤثر آنها نیز اثر هم‌افزایی در مهار انقباض داشته که از لحاظ آماری معنی دار می‌باشد ($p < 0.05$).

واژه‌های کلیدی: وراپامیل، اسانس مرزه (Satureja hortensis L.), ضداسپاسمی، استیل کولین، ایلنوم، عضله صاف.

از بار کاری قلب نیز کاسته می‌شود. بیش از ۹۰٪ دارو از راه خوراکی جذب می‌شود. به دلیل متابولیسم عبور اول از کبد، فراهمی زیستی آن ۳۵-۲۰ درصد است (Katzung et al., 2009). گیاه مرزه با نام علمی Satureja hortensis از تیره نعناع می‌باشد که در نواحی شمال‌غربی ایران، تبریز و نواحی مختلف خراسان می‌روید و دارای اثر نیرودهنده، تسهیل‌کننده عمل هضم و رفع اسهال و ضدکرم می‌باشد (Zargari, 2011). همچنین در رفع اسهال‌های عفونی و التهاب کولون

مقدمه

وراپامیل یک داروی مسدودکننده کانال کلسمیم می‌باشد که در بدن موجب جلوگیری از ورود کلسمیم به داخل سلول‌ها می‌شود؛ به علت اثر مسدودکننده‌ی این دارو بر کانال‌های کلسمیم مقدار کلسمیم در فیبرهای عضله قلب و عروق خونی کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به کاهش تعداد ضربان قلب و گشاد شدن عروق خونی گردد که در نتیجه آن فشار خون کاهش و جریان خون افزایش می‌یابد و

منابع طبیعی استان یزد به شماره (TARI-۵۸۴۱۶) قرار گرفته بود، در بالن تقطیر ریخته شد و بعد به آن، تا دو سوم حجم بالن آب م قطر اضافه گردید، سپس بالن به دستگاه کلونجر متصل شد و با حرارت دادن آن ۵ میلی لیتر انسانس بدست آمده جدا شد و تا زمان آزمایش در یخچال نگهداری شد.

روش انجام آزمایش ۳

در این مطالعه از موش‌های صحرایی نر نژاد ویستان در محدوده وزنی ۲۷۰-۲۵۰ گرم استفاده گردید. حیوانات در شرایط استاندارد دوره نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و دمای 22°C با دسترسی مناسب به آب و غذا نگهداری شدند. کلیه مداخلات مطابق با اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شد.

پس از بیهوش کردن حیوانات توسط مخلوط کتابین و زیلازین قطعاتی از بخش انتهای روده (ایلئوم) جدا گردید و پس از تمیز کردن تا انجام آزمایش در محلول تیروود نگهداری شدند. برای بررسی انقباضات ایلئوم قطعات یک سانتی‌متری از روده را جدا کرده و یک طرف آن را توسط نخ به قسمت پایین محفظه داخلی حمام بافت حاوی محلول تیروود (CaCl_2 ۰.۲g/L, KCl ۰.۲g/L, NaCl ۸g/L, NaHCO_3 ۱g/L, NaH_2PO_4 ۰.۰۵g/L, MgCl_2 ۰.۱g/L و $\text{D}\text{-glucose}$ ۱g/L) متصل و سر دیگر آن را به یک ترانسدیوسر ایزوتونیک که با دستگاه فیزیوگراف مرتبط بود، وصل کردیم. در تمام طول آزمایش، محلول تیروود توسط مخلوطی از ۹۵٪ اکسیژن و ۵٪ گاز کربونیک هوادهی شد و پس از حدود ۲۰ دقیقه که برای رسیدن دستگاه به وضعیت تعادل لازم بود انقباضات ایزوتونیک ایلئوم توسط دستگاه فیزیوگراف یک کاناله (Bioscience) ثبت شد. در هر دوره آزمایش یکی از محلول‌های مورد آزمایش با غلظت مورد نظر به حمام بافت اضافه شد و اثر آن بر انقباض ایلئوم ثبت گردید. پس از هر دوره آزمایش، بافت مورد نظر با محلول تیروود تازه شستشو و در صورت فعل می‌باشد، آزمایش

مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه دارای محتوای مناسبی از تانن و مواد چرب می‌باشد. انسانس آن دارای کارواکرول (Zargari, 2011) و سیمن (۲۵-۲۰٪) می‌باشد (Ahmadi et al., 2009). گونه‌های مختلف گیاه از نظر میزان انسانس و نوع ترکیب‌های تشکیل‌دهنده آن تنوع زیادی دارند و بر حسب نوع و درصد اجزاء تشکیل‌دهنده و نیز کاربرد انسانس متفاوت می‌باشد. انسانس بدست آمده از این گیاه در مرحله گلدهی آن می‌باشد که براساس یافته‌های Hejazian et al., (2014b) ترکیب‌های شناسایی شده در مرحله گلدهی کامل پاراسیمن (۲۱٪) و کارواکرول (۳٪) می‌باشند. براساس بررسی‌های انجام شده، غلظت‌های مختلف انسانس مرزه دارای اثر اسپاسمولتیک و آنتی‌اسپاسمودیک بر ایلئوم می‌باشد (Parnas et al., 2009). انقباض عضلات صاف، وابسته به کلسیم و ATP می‌باشد. افزایش کلسیم سارکوپلاسمی در عضلات صاف موجب فعال شدن میوزین کیناز و فسفریلاسیون سر میوزین می‌شود و حاصل آن انقباض می‌باشد. بنابراین، نیروی انقباض عضله صاف معمولاً بستگی زیادی به غلظت یون کلسیم مایع خارج سلولی دارد و هر عاملی که بتواند موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سلول‌های عضلانی شود پاسخ انقباضی آن را کاهش می‌دهد (Cavalcante Fde et al., 2010). به طوری که بیشتر سازوکارهای تعدیل‌کننده انقباضات عضلات صاف لوله گوارش اثرات خود را به واسطه مهار Nagao et al., 2011؛ 2010 این انسانس بر دستگاه گوارش (Hejazian et al., 2014b) هدف مطالعه حاضر بررسی اثر هم‌افزایی داروی وراپامیل و انسانس مرزه بر انقباضات ایزوتونیک در ایلئوم موش سفید آزمایشگاهی می‌باشد.

مواد و روشها

روش تهیه نمونه

برای استخراج انسانس، ۱۰۰ گرم نمونه گیاهی خشک شده گیاه مرزه که مورد تأیید مرکز تحقیقات کشاورزی و

در صد تغییر وضعیت انقباضی به صورت میلی‌متر انحراف قلم برای هر محلول تعیین گردید و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و پس آزمون توکی مقایسه شد. ارزش $p < 0.05$ به عنوان معیاری برای معنی‌دار بودن اختلاف در نظر گرفته شده است.

نتایج

اثر اسپاسمولتیک و راپامیل بر شدت انقباضات ایلئوم با استیل کولین

بررسی اثرات اسپاسمولتیک و راپامیل بر شدت انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار نشان می‌دهد که غلظت یک و دو میکرومول و راپامیل شدت انقباض ناشی از استیل کولین را به ترتیب به میزان ۹٪ و ۱۵٪ کاهش می‌دهد که این کاهش از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد (شکل ۱). در حالی‌که غلظت ۴ میکرومول آن انقباضات ناشی از استیل کولین را به میزان ۷۸٪ کاهش داده که از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد ($p < 0.05$).

اثر اسپاسمولتیک انسنس مرزه بر شدت انقباضات ایجاد شده به‌وسیله استیل کولین

در مرحله بعد، اثر اسپاسمولتیک دوزهای مختلف انسنس مرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که انسنس مرزه با غلظت ۲۵ و ۵۰ نانوگرم/میلی‌لیتر دارای اثرات اسپاسمولتیک نسبتاً ضعیفی است که از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد، اما زمانی که دوزهای بالاتر مرزه مورد استفاده قرار گرفت پاسخ متفاوتی مشاهده شد (شکل ۲). استفاده از غلظت ۱۰۰ و ۲۰۰ نانوگرم بر میلی‌لیتر این انسنس شدت انقباضات را به ترتیب به میزان ۳۳٪ و ۸۲٪ کاهش می‌دهد که از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد ($p < 0.05$).


بعدی انجام شد. آنگاه هر محلول بر روی ۵ نمونه بافتی بررسی شده و تجزیه و تحلیل آماری بر روی میانگین در صد انقباض ناشی از استیل کولین انجام گردید. برای بررسی اثر داروهای مذکور، نمونه‌ها به گروه‌های زیر تقسیم شدند:

- ۱- گروه استیل کولین
 - ۲- گروه وراپامیل با دوز ۱ میکرومول
 - ۳- گروه وراپامیل با دوز ۲ میکرومول
 - ۴- گروه وراپامیل با دوز ۴ میکرومول
 - ۵- گروه مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۶- گروه مرزه با دوز ۵۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۷- گروه مرزه با دوز ۱۰۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۸- گروه مرزه با دوز ۲۰۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۹- گروه دریافت کننده وراپامیل با دوز ۱ میکرومول
- + مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی‌لیتر


آزمایش آثار ضداسپاسمی

اثار اسپاسمولتیک، در این روش ابتدا حداقل انقباضات ایزوتونیک ایلئوم را با استفاده از استیل کولین (مرک-آلمان) 10^{-4} مولار ایجاد کردیم. مطالعات قبل و از جمله مطالعه گروه ما نشان داد که استفاده از استیل کولین با دوز مذکور توانایی ایجاد حداقل انقباض را در عضله ایلئوم دارد (Hejazian *et al.*, 2014a). سپس در هر دوره آزمایش اثر محلول‌های مختلف وراپامیل (مرک-آلمان) و انسنس مرزه را بر انقباضات ایجاد شده در ایلئوم ثبت کردیم.

روش جمع‌آوری نتایج و تجزیه و تحلیل آماری به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد و نتایج به صورت میانگین \pm انحراف معیار



شکل ۱- مقایسه اثر اسپاسمولیتیک وراپامیل با دوزهای ۱، ۲ و ۴ میکرومول بر انقباضات ناشی از استیل کولین


با دوز 10^{-4} مولار (n=5)**، نشان‌دهنده $p<0.01$ می‌باشد.

شکل ۲- مقایسه اثر اسپاسمولیتیک اسانس مرزه با غلظت‌های ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ نانوگرم/میلی‌لیتر

بر انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار (n=5)*، نشان‌دهنده $p<0.05$ و **، نشان‌دهنده $p<0.01$ می‌باشند.

نشان داده شده است تجویز دوز غیر مؤثره اسانس مرزه به همراه دوز غیر مؤثره وراپامیل شدت انقباض ناشی از استیل کولین را به میزان % کاهش داده که این کاهش در مقایسه با گروه استیل کولین معنی دار می باشد ($p<0.01$). همچنین کاهش شدت انقباضات در گروه دریافت کننده توأم داروها در مقایسه با گروه هایی که اسانس مرزه و یا وراپامیل را به تنها ی دریافت کردند نیز معنی دار است ($p<0.05$).

اثر همافزایی دوز غیر مؤثره اسانس مرزه و وراپامیل بر شدت انقباضات ایجاد شده به وسیله استیل کولین همان طور که در قسمت قبل نشان داده شد استفاده از وراپامیل با دوز ۱ میکرومول و همچنین مرزه با دوز ۲۵ نانوگرم در میلی لیتر کاهش معنی داری در شدت انقباضات ناشی از استیل کولین ایجاد نکرد، بنابراین به منظور بررسی اثر سینرژیسم احتمالی این دو ترکیب از دوز های مذکور به صورت توأم استفاده شد. همان گونه که در شکل ۳



شکل ۳- مقایسه اثر اسپاسمولتیک دوز های غیر مؤثره وراپامیل با دوز یک میکرومول به اضافه غلظت ۲۵ نانوگرم / میلی لیتر اسانس مرزه بر ضد انقباض ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار ($n=5$)

**، نشان دهنده $p<0.01$ می باشد.

انقباض عضلات صاف وابسته به کلسیم می باشد. غشای عضله صاف دارای کانال های کلسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ است و کلسیم در جهت شبکه اکتروشیمیایی خود از طریق کانال های کلسیمی به سمت داخل حرکت می کند تا با افزایش غلظت کلسیم آزاد به افزایش قدرت انقباضی عضلات صاف کمک کند. هر عاملی که بتواند موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سلول های عضلانی شود پاسخ انقباضی آن را کاهش می دهد (Parnas *et al.*, 2009) وراپامیل به عنوان یک مهارکننده کانال های کلسیمی

بحث

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از دوز های ۱۰۰ و ۲۰۰ نانوگرم اسانس مرزه شدت انقباضات ناشی از استیل کولین را کاهش می دهد اما در دوز های پایین اثری بر این انقباضات نشان نمی دهد. در مورد وراپامیل نیز تنها دوز ۴ میکرومولار دارو توانست اثرات اسپاسمولتیک نشان دهد. همچنین استفاده توأم دوز غیر مؤثره این اسانس به همراه وراپامیل به عنوان یک بلوکر کانال کلسیمی می تواند اثرات اسپاسمولتیک معنی داری نشان دهد.

می‌کنند. کanal‌های TRP دسته بزرگی از کanal‌های یونی هستند که بسیاری از فعالیت‌های فیزیولوژیک همانند انقباض، لمس، فشار، شناوبی و بویایی را کنترل می‌کنند. کanal‌های کاتیونی TRP باسطه هدایت سدیم و کلسیم از طریق غشاء پلاسمایی به سیتوپلاسم می‌باشند و هدایت این یون‌ها برای دیپلاریزه شدن سلول‌های تحریک‌پذیر ضروریست (Song & Yuan, 2010). این کanal‌ها به وسیله تحریک گیرنده‌های موسکارینی در عضلات صاف روده فعال می‌شوند که حاصل آن انقباض این عضلات است و به موجب آن هدایت کلسیم افزایش یافته و حرکات روده تشدید می‌شود. کanal‌های مذکور بیشتر در بخش‌های انتهای روده یعنی ایلئوم وجود دارند و در بخش‌های ابتدای Tsvilovskyy *et al.*, 2009 آن و در معده کمتر دیده می‌شود (2009). بررسی‌های فوق در خصوص نقش روغن‌های فرّار مبین این واقعیت است که مهمترین سازوکار آنتی‌اسپاسmodیک بر عضله صاف لوله گوارش مهار کanal‌های کلسیمی متکی به ولتاژ و جلوگیری از ورود کلسیم به داخل فیبر عضلانی از طریق این کanal‌ها می‌باشد. مطالعات نشان داده است که غلظت بالایی از کارواکرول در انسان مزه وجود دارد (Ahmadi *et al.*, 2009). از طرفی در مورد اثر اسپاسمولتیک کارواکرول تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که کارواکرول از طریق مهار کanal‌های گذرا (Parnas *et al.*, 2009) و همچنین مهار کanal‌های کلسیمی (Earley *et al.*, 2010) و نیز کاهش حساسیت اجزا انقباضی عضله به کلسیم می‌تواند اثرات اسپاسمولتیک نشان دهد (Peixoto *et al.*, 2010). البته مهار ورود کلسیم توسط بعضی از روغن‌های فرّار دیگر نیز Leonhardt *et al.*, 2010 نشان داده شده است (Brankovic *et al.*, 2009). بنابراین با در نظر گرفتن این نکته که کارواکرول با درصد نسبتاً بالایی در انسان مزه وجود دارد بخش عمداتی از آثار اسپاسمولتیک انسان مزه بر انقباضات روده ممکن است به وسیله کارواکرول انجام شده باشد. همچنین با توجه به اینکه دوز غیر مؤثره این انسان به همراه دوز غیر مؤثره و راپامیل توانست اثرات

می‌تواند موجب مهار انقباض وابسته به دوز شود، به طوری که در این مطالعه این دارو در غلظت ۴ میکرومولار انقباضات ناشی از استیل کولین با دوز 10^{-4} مولار را به میزان ۷۸٪ کاهش داده است که این نتایج همسو با نتایج Matalan و همکاران (2010) می‌باشد. این محققان اثر روغن‌های فرّار گیاه *Pterodon polygalaeiflorus* بر انقباض ناشی از استیل کولین و میزان کلسیم را مورد آزمایش قرار داد که اثر مهاری این مقایسه کردند. نتایج آنان نشان داد که اثر مهاری این ترکیب بر انقباض روده ناشی از تأثیر بر عضلات بوده و به طور کامل با واسطه سازوکار درون سلولی انجام شده و روغن‌های فرّار در این رابطه موجب کاهش ورود کلسیم به داخل سیتوپلاسم شده‌اند. در بررسی دیگری که توسط Brankovic و همکاران (2009) بر روی روغن‌های فرّار گیاه *Calamintha glandulosa* انجام شده نقش آن را در مهار کanal‌های کلسیمی مورد تأیید قرار داده و نشان می‌دهند که روغن‌های فرّار دارای یک اثر مهاری بر انقباض ایلئوم بوده که پس از شستشو قابل برگشت می‌باشد و این مؤید این است که این روغن بافت روده را تخریب نکرده و بر انقباض ناشی از پتاسیم مؤثر است؛ و همان‌گونه که مشخص شده است افزایش پتاسیم موجب فعال شدن کanal‌های کلسیمی متکی به ولتاژ غشاء شده و ورود کلسیم را زیاد می‌کند؛ بنابراین با توجه به اثر فوق، روغن‌های فرّار از طریق مهار ورود کلسیم به داخل سارکوپلاسم اثر گذاشته و منحنی غلظت پاسخ کلسیم را کاهش داده که این عمل مشابه اثر و راپامیل بوده و باعث عمل آنتاگونیستی بر کanal‌های کلسیمی می‌باشد که بر روی اسپاسمولتیک آن از این راه اعمال می‌شود (Brankovic *et al.*, 2009). بررسی Mahieu و همکاران (2007) نشان می‌دهد که تأثیر بعضی از گیاهان دارویی که دارای روغن فرّار می‌باشند از طریق کanal‌های زودگذر (transient receptor potential channels: TRP در کنترل رهایش کلسیم و فراهمی آن نقش خود را ایفا

- Basic and Clinical Pharmacology. McGraw Hill Professional, 1232p.
- Leonhardt, V., Leal-Cardoso, J.H., Lahlou, S., Albuquerque, A.A., Porto, R.S., Celedônio, N.R., Oliveira, A.C., Pereira, R.F., Silva, L.P., Garcia-Teófilo, T.M., Silva, A.P., Magalhães, P.J., Duarte, G.P. and Coelho-de-Souza, A.N., 2010. Antispasmodic effects of essential oil of *Pterodon polygalaeiflorus* and its main constituent beta-caryophyllene on rat isolated ileum. Fundamental and Clinical Pharmacology, 24(6): 749-758.
 - Mahieu, F., Owsianik, G., Verbert, L., Janssens, A., De Smedt, H., Nilius, B. and Voets, T., 2007. TRPM8-independent menthol-induced Ca^{2+} release from endoplasmic reticulum and Golgi. The Journal of Biological Chemistry, 282(5): 3325-3336.
 - Nagao, M., Linden, L.D., Duenes, J.A. and Sarr, M.G., 2011. Mechanisms of action of the gastro transmitter hydrogen sulfide in modulating contractile activity of longitudinal muscle of rat ileum. Journal of Gastrointestinal Surgery, 15(1): 12-22.
 - Parnas, M., Peters, M., Dadon, D., Lev, S., Vertkin, I., Slutsky, I. and Minke, B., 2009. Carvacrol is a novel inhibitor of *Drosophila* TRPL and mammalian TRPM7 channels. Cell Calcium, 45(3): 300-309.
 - Peixoto-Neves, D., Silva-Alves, K.S., Gomes, M.D., Lima, F.C., Lahlou, S., Magalhães, P.J., Ceccatto, V.M., Coelho-de-Souza, A.N. and Leal-Cardoso, J.H., 2010. Vasorelaxant effects of the monoterpenic phenol isomers, carvacrol and thymol, on rat isolated aorta. Fundamental and Clinical Pharmacology, 24(3): 341-350.
 - Song, M.Y. and Yuan, J.X., 2010. Introduction to TRP channels: structure, function, and regulation. Advances in Experimental Medicine and Biology, 661: 99-108.
 - Tsvilovskyy, V.V., Zholos, A.V., Aberle, T., Philipp, S.E., Dietrich, A., Zhu, M.X., Birnbaumer, L., Freichel, M. and Flockerzi, V., 2009. Deletion of TRPC4 and TRPC6 in mice impairs smooth muscle contraction and intestinal motility in vivo. Gastroenterology, 137(4): 1415-1424.
 - Zargari, A., 2011. Medicinal Plants (Vol. 4). University of Tehran Press, 948p, (In Persian).

هم افزایی در جهت کاهش قابل توجه شدت انقباضات ایلنوم نشان دهد، می توان مهار کانال های کلسیمی را به عنوان یکی از سازوکارهای اثر اسانس مرзе بر انقباضات عضله صاف ایلنوم معرفی کرد.

منابع مورد استفاده

- Ahmadi, Sh., Sefidkon, F., Babakhanlo, P., Asgari, F., Khademi, K., Valizadeh, N. and Karimifar, M.A., 2009. Comparing essential oil composition of *Satureja bachtiarica* Bunge before and full flowering stages in field and provenance. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(2): 159-169.
- Brankovic, S.V., Kitic, D., Radenkovic, M.M., Veljkovic, S.M. and Golubovic, T.D., 2009. Calcium blocking activity as a mechanism of the spasmolytic effect of the essential oil of *Calamintha glandulosa* Silic on the isolated rat ileum. General Physiology and Biophysics, 28:174-178.
- Cavalcante Fde, A., Monteiro Fde, S., Martins, I.R., Barbosa, T.P., Camara Cde, A. and Pinto, A.C., 2010. Synthetic lapachol derivatives relax guinea-pig ileum by blockade of the voltage-gated calcium channels. Zeitschrift fur Naturforschung C, 65(9-10): 627-636.
- Earley, S., Gonzales, A.L. and Garcia, Z.I., 2010. Dietary agonist of transient receptor potential cation channel V3 elicits endothelium-dependent vasodilation. Molecular Pharmacology, 77(4): 612-620.
- Hejazian, S.H., Bagheri, S.M. and Safari, F., 2014a. Spasmolytic and antispasmodic action of *Trachyspermum ammi* essence on rat's ileum contraction. North American Journal of Medical Sciences, 6(12): 643-647.
- Hejazian, S.H., Bameri, M. and Abassi Sarcheshma, A., 2014b. The effect of *Satureja* essential oil on acetylcholine induced contraction in male rats ileum. Journal of Rafsanjan Medical Sciense, 13(4): 395-404.
- Katzung, B.G., Masters, S.B. and Trevor, A.J., 2009.

The inhibitory synergistic effects of verapamil and *Satureja hortensis* essential oil on cholinergic contraction of rat ileum

S.H. Hejazian^{1*}, F. Safari² and M.Bameri³

1*- Corresponding author, Department of Physiology/Herbal Medicine Research Center, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran, E-mail: hejaziansh@yahoo.com

2- Department of Physiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran.

3- Paradise University, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

Received: December 2014

Revised: May 2015

Accepted: May 2015

Abstract

Verapamil inhibits the cytosolic calcium content by blocking both activated and inactivated T-type calcium. Regarding the spasmolytic effect of materials caused by blockage of calcium channels and due to the inhibitory effect of *Satureja hortensis* L. on ileum smooth muscle contraction. The present study was designed to find out the synergistic effects of calcium blocker verapamil and *Satureja* essential oil on inhibition of cholinergic contraction in male rat's ileum. In this study, by using an oscillographic device, the effects of different concentration of *Satureja* essential oil and verapamil were examined on isotonic contraction of ileum induced by acetylcholine 10^{-4} M. Our results showed that both verapamil and *Satureja* essential oils inhibited acetylcholine-induced contraction of ileum. In addition, their ineffective doses had synergistic spasmolytic effects, which were statistically significant ($p<0.05$).

Keywords: Verapamil, *Satureja hortensis* L., essential oil, spasmolytic, acetylcholine, ileum, smooth muscle.