

حرکت

شماره ۲۲ - ص ص : ۱۴۸ - ۱۳۲

تاریخ دریافت : ۰۲/۳۰/۸۲

تاریخ تصویب : ۰۲/۲۹/۸۲

بررسی ارتباط بین آزمون‌های دراز و نشت ایفرد و آهنگین در سنجش استقامت عضلات شکمی

جواد یوسفیان^۱ - دکتر فرزاد ناظم - دکتر نادر فرهپور - لیلی خاوری

مدرس مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد - استادیار دانشگاه همدان - استادیار دانشگاه همدان -
عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده

باتوجه به ارتباطی که بین ضعف عضلات شکمی و سلامتی و ظاهر افراد وجود دارد، تقویت این عضلات همواره مورد توجه کارشناسان و محققان بوده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین دو نوع آزمون دراز و نشت ایفرد و آهنگین برای ارزیابی استقامت عضلات شکمی است. بدین منظور از بین دانشجویان داوطلب، ۳۲ دانشجوی پسر تربیت بدنی به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای برآورده استقامت عضلات شکمی، آزمون‌های دراز و نشت ایفرد و آهنگین اجرا شد. از مدل آماری آنالیز رگرسیون و آزمون t برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد ($P < 0.05$). نتایج تحقیق نشان می‌دهد همبستگی بین دو آزمون دراز و نشت ایفرد و آهنگین معنی دار است ($t = 6.5 / 0.01 = 65$). ارتباط معنی‌داری بین تکرار دراز و نشت آهنگین و متغیرهای سن، وزن، قد، شاخص توده بدنی، محیط کمر، محیط لگن و نسبت محیط کمر به لگن به دست نیامد. همچنین نتیجه مذکور در مورد تکرار دراز و نشت ایفرد به دست آمد (به جز ارتباط معنی‌دار و منفی که بین تکرار دراز و نشت ایفرد و سن وجود داشت). باتوجه به نتایج به دست آمده می‌توان از آزمون دراز و نشت آهنگین برای ارزیابی یا تقویت استقامت عضلات شکمی استفاده کرد. ضمن اینکه آزمون اخیر، برخی تردیدهایی را که در مورد آزمون دراز و نشت ایفرد وجود دارد، مرتفع می‌سازد.

واژه‌های کلیدی

استقامت عضلات شکمی، آزمون‌های دراز و نشت آهنگین و ایفرد.

1- Email : jyosefian@yahoo.com

مقدمه

تحقیقات مختلف نشان می‌دهد سطح بالای قدرت و استقامت عضلات شکمی ممکن است نقش پیشگیرانه در بروز کمر درد داشته باشد (۲، ۳، ۵ و ۷). در بسیاری از موارد، ضعف یا تحلیل رفتگی قدرت عضلات شکم، دلیل اصلی کمر درد است. زمانی که عضلات شکم ضعیف و عضلات خلفی ران انعطاف‌پذیری کافی را نداشته باشند، لگن به جلو چرخش پیدا می‌کند و موجب ایجاد قوس غیرطبیعی در ناحیه کمر می‌شود که نتیجه آن کمر درد خواهد بود (۲۶). با این حال، جکسون^۱ و همکارانش (۱۵) و ناچمنسون^۲ (۲۲) معتقدند همبستگی ضعیفی بین کمر درد و آزمون دراز و نشست وجود دارد. نتایج تحقیق آنها از روایی مناسب آزمون دراز و نشست به عنوان یکی از موارد آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی به علت همبستگی بسیار ضعیف با کمر درد حمایت نمی‌کند.

تحلیل آزمون‌های میدانی ارزیابی‌کننده استقامت عضلات شکمی کار مشکلی است (۳۱). اجرای آزمون میدانی باید با آزمون آزمایشگاهی مقایسه، تعبیر و تفسیر شود، ولی در مورد آمادگی عضلات شکمی ملاک و استاندارد مشخص و متفق القولی وجود ندارد. با این حال، طی سه دهه اخیر تحقیقات مختلفی برای بررسی روایی این آزمون‌ها صورت گرفته است.

مراجع، سازمان‌ها و برنامه‌های ورزشی زیادی نظریه برنامه جایزه آمادگی جسمانی جوانان ریاست جمهوری (۱)، آزمون تگزاس (۱)، آزمون کارولینای جنوبی (۱)، آزمون عملکرد آمادگی جسمانی مانیتوبا (۱۹) و آزمون آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی ایفرد (۵) آزمون یک دقیقه‌ای دراز و نشست ایفرد^۳ را برای ارزیابی استقامت و قدرت عضلات شکمی پیشنهاد داده‌اند.

انواع مختلفی از آزمون‌های بالا آوردن سر و شانه (دراز و نشست جزئی)^۴ به عنوان جایگزین آزمون دراز و نشست ایفرد پیشنهاد شده است (۹، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۷ و ۲۸). در تمام این آزمون‌ها زانو خم است و پاها گرفته نمی‌شود. بالاتر افراد ۳۰ تا ۴۰ درجه از سطح تشک بالا

1- Jackson

2- Nachemson

3- AAHPERD sit-up test

4- curl - up (partial sit - up) test

می‌آید. این دامنه حرکتی محدود در به کارگیری عضلات شکمی - که در یک سوم اول حرکت فعال‌اند - مناسب است (۳۱).

آزمون یک دقیقه‌ای بالا آوردن سر و شانه (دراز و نشست جزئی)، برای اولین بار توسط رابرتسون و مگنوس دوتیر^۱ (۲۸) برای جایگزینی آزمون دراز و نشست یک دقیقه‌ای ایفرد برای کودکان و جوانان ارائه داد. این آزمون همراه با ضربه‌انگ (۲۵ تکرار در دقیقه) بود و دست‌ها همانند آزمون بالا آوردن سر و شانه حرکت می‌کرد.

آزمون‌های دراز و نشست ایفرد و رابرتسون و به‌طور کلی آزمون‌هایی که در یک دقیقه اجرا می‌شوند، آزمون‌هایی سرعتی و از نظر تئوریکی بیشتر منعکس‌کننده توان عضلانی‌اند تا استقامت عضلانی (۳۱).

برای تعیین استقامت عضلات شکمی، آزمون یک دقیقه‌ای دراز و نشست ایفرد عمومیت بیشتری دارد. تحقیقات متعددی پایانی این آزمون را اثبات کرده‌اند (۱، ۶، ۱۲ و ۲۰). با وجود استفاده گسترده‌ای که از این آزمون می‌شود، برخی محققان تردیدهایی را در مورد آن بیان کرده‌اند:

الف) فلکسورهای هیپ فعال‌اند و زمانی که عضلات شکمی خسته می‌شوند، به‌طور فراینده برای اجرا به کار می‌روند.

ب) فلکشن کمر موجب زاویه‌دار شدن ناحیه کمری - خاجی می‌گردد و ممکن است برای دیسک‌های کمری مضر باشد.

ج) فلکسورهای هیپ که در دامنه حرکتی معینی (۴۵ درجه پایانی) تمرين داده شوند، ممکن است کوتاه شده و موجب هایپرلوردوسیس گردد.

د) آزمون دراز و نشست ایفرد، آزمونی سرعتی است که توان عضلات را می‌سنجد تا استقامت آنها را (۱۰، ۱۶، ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۲).^۳

در این زمینه، اسپارلینگ^۲ و همکارانش (۳۱) آزمون دراز و نشست آهنگین^۳ را پیشنهاد

1- Robertson and Magnusdottir

2- Sparling

3- Cadence curl - up test

کرده‌اند که همبستگی این آزمون با دراز و نشست ایفرد $= ۵۰/۰$ بوده است. در تعیین روایی این آزمون از الکترومیوگرافی (EMG) عضلات مایل بزرگ راست و چپ، عضلات راست رانی راست و چپ و قسمت بالا و پایین عضله راست شکمی استفاده شد. شواهد نشان داد عضلات فلکسور ران در این آزمون نسبت به آزمون دراز و نشست کمتر درگیرند که نشان دهنده روایی این آزمون است (۳۱). همچنین پایابی این آزمون $= ۹۲/۰$ گزارش شده است (۳۱).

نکته قابل توجه اینکه اگرچه تحقیقات متعددی در این مورد صورت گرفته، ولی تأثیر احتمالی عواملی نظری سن، وزن، قد، شاخص توده بدنی، محیط کمر، محیط لگن و نسبت محیط کمر به لگن مورد توجه قرار نگرفته است. از این‌رو در تحقیق حاضر برآئیم تا همبستگی دو نوع آزمون دراز و نشست ایفرد و آهنگین و ارتباط دو آزمون را با متغیرهای سن، وزن، قد، شاخص توده بدنی، محیط کمر، محیط لگن و نسبت محیط کمر به لگن بررسی کنیم.

روش تحقیق

تحقیق حاضر به روش توصیفی و همبستگی و به شکل میدانی است. از بین ۶۲ دانشجوی داوطلب پسر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینای همدان ۳۲ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه، از وضعیت سلامتی افراد اطلاعاتی به دست آمد.

قد و وزن آزمودنی‌ها با استفاده از ترازوی ترکیبی قدسنج (مدل Health-o-meter) ساخت کشور آلمان) و محیط (دور) کمر و لگن با استفاده از متر نواری اندازه‌گیری شد (۸). نسبت محیط کمر به لگن (WHR) از تقسیم محیط کمر به محیط لگن (۲۳) و شاخص توده بدنی از تقسیم وزن (بر حسب کیلوگرم) بر مجلدور قد (بر حسب متر) به دست آمد (۴).

برای برآورد استقامت عضلات شکمی از آزمون‌های دراز و نشست ایفرد و آهنگین استفاده شد. به هنگام اجرای آزمون یک دقیقه‌ای دراز و نشست ایفرد، زانوها خمیده و دست‌ها به صورت ضربه‌ری روی سینه بود. پاها توسط فرد دیگری گرفته می‌شد (۱۵ و ۳۱).

در آزمون دراز و نشست آهنگین، آزمودنی طاقباز روی تشک دراز می‌کشید. به طوری که ران‌ها عمود بر سطح زمینه، زاویه زانو ۹۰° درجه بود و کف پاها بر سطح دیوار اتکا داشت. جعبه چوبی در زیر پاشنه قرار می‌گرفت تا شکل صحیح وضعیت فرد برقرار شود. دست‌های

آزمودنی به صورت ضربدری روی سینه قرار می‌گرفت، حرکت رفت و برگشت توسط یک مترونوم که با سرعت ۵۰ ضربه در دقیقه تنظیم شده بود، اجرا می‌شد. با ضربه اول، سر و تنۀ آزمودنی بالا می‌آمد و وی آرنج خود را به ران می‌رساند و با ضربه بعدی، به طرف پایین باز می‌گشت و سپس با ضربه بعدی دوباره حرکت را تکرار می‌کرد. در واقع، آزمودنی می‌توانست در هر دقیقه ۲۵ تکرار داشته باشد. کل زمان اجرای آزمون ۳ دقیقه بود که در مجموع ۷۵ تکرار قابل اجرا بود. ملاک پایان آزمون بدین صورت بود:

الف) آزمودنی نمی‌توانست همراه با آهنگ مترونوم حرکت را ادامه دهد؛

ب) پاهای آزمودنی از دیوار جدا می‌شد؛

ج) آزمودنی نمی‌توانست بالا آمده و آرنج‌ها را به ران برساند (۳۱).

قبل از اجرای آزمون‌ها، توضیح دقیقی در مورد نحوه اجرا داده شد و بین اجرای هر آزمون ۴۸ ساعت فاصله زمانی منظور گردید.

نتایج و یافته‌های تحقیق

برای بررسی ارتباط بین دو نوع آزمون دراز و نشست ایفرد و آهنگین، از آنالیز رگرسیون و برای مطالعه اختلاف میانگین متغیرها از آزمون استفاده شد. سطح آماری معنی‌دار ۵ درصد انتخاب شد. مشخصات فیزیکی و عملکردی آزمودنی‌ها در جدول ۱ آورده شده است. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تعداد دراز و نشست‌های ایفرد و آهنگین به دست آمد ($P < 0.001$) (جدول ۲ و شکل ۱) و میانگین‌های دو آزمون تفاوت معنی‌داری نداشتند (جدول ۳).

بین تکرار دراز و نشست آهنگین و متغیرهای سن، وزن، قد، شاخص توده بدنی، محیط کمر، محیط لگن و نسبت محیط کمر به لگن ارتباط معنی‌داری به دست نیامد. نتیجه مذکور در مورد تکرار دراز و نشست ایفرد نیز به دست آمد (به جز ارتباط معنی‌دار و منفی که بین تکرار دراز و نشست ایفرد و سن وجود داشت).

جدول ۱. وضعیت فیزیکی و عملکردی آزمودنی‌ها


Range	Max	Min	SD	Mean	شاخص‌های آماری متغیرها
۹	۲۰	۲۰	۲/۲۲	۲۲	سن (سال)
۳۶/۲۰	۹۱/۵۰	۵۵/۳۰	۸/۱۸	۶۸/۱۴	وزن (کیلوگرم)
۲۰	۱۸۳	۱۶۳	۵/۳۹	۱۷۲/۸۱	قد (سانتی متر)
۹/۸۷	۲۹/۸۸	۲۰/۰۱	۲/۱۳	۲۲/۷۸	شاخص توده بدنی
۲۷	۹۰	۶۸	۵/۰۹	۷۴/۹۳	محیط کمر (سانتی متر)
۲۰	۱۰۳/۵	۸۲/۵	۴/۰۴	۹۱/۸۵	محیط لگن (سانتی متر)
۰/۱۷	۰/۹۱	۰/۷۴	۰/۰۳	۰/۸۱	نسبت محیط کمر به لگن (درصد)
۳۸	۶۲	۲۴	۱۰/۰۳	۴۵	تکرار دراز و نشست ایفرد
۰۴	۷۵	۲۱	۱۶/۹۱	۴۶	تکرار دراز و نشست آهنگین

جدول ۲. همبستگی بین تکرار دراز و نشست ایفرد و آهنگین و معادله رگرسیونی آنها

متغیر وابسته (Y)	R	R ²	R ² (adjust)	SEE	Pvalue	معادله رگرسیون
دراز و نشست ایفرد	۰/۶۵	۰/۴۳	۰/۴۱	۷/۷۰	۰/۰۰	۰/۹۳ + ۲۷/۹۳ (دراز و نشست آهنگین)
Y = ۰/۳۸						

جدول ۳. تفاوت بین میانگین تکرار دراز و نشست ایفرد و آهنگین

متغیرها	Tvalue	DF	2-tail sig.	تعداد آزمودنی
آزمون‌های دراز و نشست ایفرد و آهنگین	۰/۰۹	۳۱	۰/۹۲	۳۲



شکل ۱. نگاره پراکندگی ارتباط بین دراز و نشست ایفرد و آهنگین

بحث و نتیجه گیری

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط دو آزمون ارزیابی کننده استقامت عضلات شکمی بود. (آزمون دراز و نشست ایفرد که به صورت گستردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی تردیدهایی در مورد آن مطرح است و آزمون دراز و نشست آهنگین که روش جدیدی از آزمون های ارزیابی کننده استقامت عضلات شکمی است و با ریتم معینی اجرا می شود) ویژگی های اساسی این دو آزمون در جدول ۴ آمده است.

جدول ۴. ویژگی های اساسی آزمون دراز و نشست ایفرد و آهنگین (۳۱)

ویژگی	آزمون	آزمون دراز و نشست ایفرد	آزمون دراز و نشست آهنگین
وضعیت دست ها		روی سینه	روی سینه
گرفته شدن پاها		گرفته نمی شود	گرفته نمی شود
دامنه حرکت		۴۵ تا ۳۵ درجه	۹۰ تا ۸۰ درجه
نوع آزمون		سرعتی (۱ دقیقه)	آهنگین (۲۵ تکرار در دقیقه)
وسایل مورد نیاز		ニازی نیست	مترونوم و نیمکت

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دو آزمون این است که آزمون دراز و نشست ایفرد سرعتی (تکرار انجام شده در یک دقیقه) و آزمون دراز و نشست آهنگین، ریتمیک (انجام حرکت را با سرعت ۲۰ تکرار در دقیقه) است. از این‌رو به نظر می‌رسد آزمون دراز و نشست ایفرد منعکس‌کننده قدرت و توان عضلانی باشد تا اینکه استقامت را ارزیابی کند. از طرفی، آزمون دراز و نشست آهنگین در زمان طولانی‌تری انجام می‌شود (۳۱ دقیقه در مقابل ۱ دقیقه) و در نتیجه، از نظر تئوریکی می‌تواند شاخص بهتری از استقامت عضلات شکمی باشد (۳۱).

از دیگر عوامل قابل ملاحظه در اجرای آزمون‌ها، شیوه صحیح اجراست. در آزمون دراز و نشست ایفرد، به علت سرعتی بودن اجرا، جدا شدن لگن از زمین، افزایش قوس کمری، حرکت ناصحیح دست‌ها و عدم اتصال کتف‌ها به زمین غیرمعمول نیست (۱۶ و ۲۶).

سافریت^۱ و همکارانش (۲۹) ۱۸ روش دراز و نشست مختلف را ($N = ۴۲۶$) که در آنها وضعیت دست‌ها، درجه خم شدن تن، درجه شیب وضعیت پاها (گرفته شدن و نشدن) متفاوت بود، بررسی کردند. نتایج آزمون‌ها یکسان بود، به این معنی که تمام آزمون‌ها، شاخصی از عوامل قدرت و توان عضلات شکمی بودند.

تحقیقات مختلف با استفاده از EMG نشان داده‌اند که فعالیت عضله راست رانی در آزمون‌های بالا آوردن سر و شانه (دراز و نشست جزوی) - زمانی که پاها گرفته نشود - نسبت به دراز و نشست ایفرد کمتر است (۲۱، ۲۴ و ۲۶). در آزمون دراز و نشست آهنگین، آزمودنی‌ها کمتر به عضلات فلیکسور ران متکنی‌اند. در مورد عضلات مایل بزرگ شکمی، چنانچه حرکت خم شدن به جلو صحیح انجام شود، فعالیت EMG این عضله زمانی بیشتر است که پاها گرفته نشود (۱۴ و ۲۶).

در تحقیق حاضر، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین آزمون‌های دراز و نشست آهنگین و ایفرد ($P < ۰/۰۰۱$) به دست آمد. نتایج این تحقیق با یافته‌های اسپارلینگ و همکارانش (۳۱) همسوی دارد. شاید پایین بودن ضریب تعیین در تحقیق حاضر ($r^2 = ۰/۴۳$) بیان‌گر این واقعیت باشد که آنچه در آزمون دراز و نشست آهنگین ارزیابی شود، تا حدودی

متفاوت از آزمون سرعتی دراز و نشست ایفرد است. به طور کلی، در مقایسه با آزمون دراز و نشست ایفرد، در آزمون دراز و نشست آهنگین عضلات شکمی بیشتر و عضلات فلکسور ران کمتر درگیرند. بنابراین می‌توان از این آزمون برای تقویت یا ارزیابی استقامت عضلات شکمی بهره برد. ضمن اینکه آزمون اخیر، برخی تردیدهایی را که در مورد آزمون دراز و نشست ایفرد وجود دارد، مرتفع می‌سازد. در پایان با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه انجام شده، پیشنهاد می‌شود تحقیقات دقیق‌تر و گسترده‌تری روی گروه‌های سنی مختلف و همچنین گروه دختران صورت گیرد.

منابع و مأخذ

- ۱- بوام گارتner، تد ای و جکسون، آندرواس، "سنجهش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی". ترجمه حسین سپاسی و پریوش نوربخش، انتشارات سمت. ۱۳۷۶.
- ۲- تانر، جان. "دردهای پشت و کمر". ترجمه بابک حق‌بناه. انتشارات ققنوس. ۱۳۸۰.
- ۳- عزیزآبادی فراهانی، ابوالفضل. "حرکات اصلاحی". انتشارات پیام نور. ۱۳۷۴.
- ۴- فاکسن و ماتیوس. "فیزیولوژی ورزش"، ترجمه علی اصغر خالدان. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۷۳.
- 5- AAHPERD, "Health - related physical fitness test". Manual reston, VA: AAHPERD. Washington DC.1980.
- 6- AAHPERD. "Reliability of physical fitness test administration to young children". percept. Mot. skills.1990,71 (3pt2): PP: 1123-8.
- 7- AHPERD."Technical Manual. Health - related physical fitness test". Reston VA: AAHPERD. 1984.
- 8- Bloomfield, J. Ackland, TR. Elliott, BC. "Applied anatomy and biomechanics in sports". Blackwell scientifics Pub.1994.
- 9- CIAR. "The prudential fitnessgram test administration test manual". Dallas, TX: Author.1992.

- Archive of SID
- 10- Clarke, HH."Exercise and the abdominal muscles". Phys. Fitness research digest. 1976, 6(3): PP: 1-21.
 - 11- Diener, MH. et al. "Validity and reliability of a one - minute half sit-up test of abdominal strength and endurance". Sport. Med. Train. Rehab. 1995, 6: PP: 105-119.
 - 12- Dinucci, J. Mccune, D. Shows, D. "Reliability of a modification of the health - related physical fitness test for use with physical education majors". Res. Q. Exerc. Sport. Mar,1990, 61 (1): PP: 20-5.
 - 13- Faulkner, RA. et al. "A partial curl - up protocol for adults based on an analysis of two procedures". can. J. sport. sci.1989,14: PP: 135-141.
 - 14- Hall, GL. et al."Evaluation of selected sit-up variations for the individual with low back pain". J.Appl. Sport. Sci. Res. 1990, 4: PP: 42-46.
 - 15- Jackson, AW. et al. "Relations of sit-up and sit-and-reach tests to low back pain in adults". JOSPT.1998, 27(1): PP: 22-26.
 - 16- Jette, M. et al."A critical analysis of sit-up: a case for partial curl-up as a test of abdominal muscular endurance". CAHPER J. 1984, 51 (4-9).
 - 17- Knudson, D. Johnston, D. "Validity and reliability of a bench trunk-curl test of abdominal endurance". J. Strength. Condit. Res. 1995, 9:PP:165-169.
 - 18- Liemohn, W. et al. "Unresolved controversies in back management". a review. J.Ortho. Sport. Phys. Ther. 1988, 9: PP: 239-244.
 - 19- Manitoba department of education. "Manitoba physical fitness performance test manual and fitness objectives". Manitoba, canada.1977.
 - 20- Moreland, J. Finch, E. Stradford, P. Balsor, B. Gill, C. "Interrater reliability of six tests of trunk muscle function and endurance". Orthop

Phys Ther, Oct ,1997, 26(4): PP: 200-8.

21- Mutoh, Y. et al."The relation between sit-up exercise and the occurrence of low backpain". Biomechanics VIII. A. human kinetics. 1983,PP: 180-185.

22- Nachemson, AL. "Exercise, fitness and backpain". A consensus of current knowledge. Champaign IL. Human kinetics publishers.1990.

23- Nieman, CD. Fitness and sports medicine, an introduction. Bull publishing company. 1990.

24- Noble, L. "Effects of various types of sit-up on EMG of the abdominal musculature". J.Hum. Mov. Stud.1981, 7: PP: 124-130.

25- O'Brien, TS. "The personal trainer's handbook". Human kinetics pub.1997.

26- Prentice, EW. "Fitness and wellness for life". sixth edit. McGraw-Hill company.1999.

27- Plowman, SA. "Physical activity, physical fitness and low backpain". Exer. Sport. Sci. Rev. Baltimore, MD: Williams and Wilkins.1992, PP: 221-224.

28- Robertson, LD. Magnusdottir, H."Evaluation of criteria of associated with abdominal fitness testing". Res. Q. Exer. Sport. 1987,58: PP: 355-359.

29- Safrit, MJ. et al. "The difficulty of sit-up tests: an empirical investigation". Res. Q. Exer. Sport. 1992, 68: PP: 80-84.

30- Sarti, MA. Monford, M. Fuster, MA. Willaplana, LA."Muscle activity in upper and lower rectus abdominus during abdominal exercise". Arch. Phys. Med. Rehabil. 1996, 77 (12): PP: 1293 - 7.

- 31- Sparling, PB. Millard, Stafford, M. Now, TK. "Development of a cadence curl - up test for college students". Res. Q. Exerc. Sport. 1997, 68(4): PP: 309-16.