

تشخیص، پیش‌گیری و درمان در آندوفتالمیت

دکتر نسرین رفعتی^۱ و دکتر مسعود سهیلیان^۲

چکیده

پیشینه و هدف: این مطالعه به منظور بررسی تشخیص و درمان در مبتلایان به انواع مختلف آندوفتالمیت و کمک به برگشت افت بینایی ناشی از آن و حتی المقدور نجات چشم از خطر تخلیه و نایبینایی در موارد شدید آن انجام شده است.

مواد و روش‌ها: به منظور نگارش این مقاله مروری، ابتدا مقالات معتبر و فراگیری که در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ در مورد آندوفتالمیت منتشر شده بودند از طریق جستجو در مدلاین و دیگر منابع موجود، براساس واژه **endophthalmitis**، مشخص شدند. سپس براساس منابع این مقالات، مقالاتی که در بیش از سه مورد به آن‌ها استناد شده بود نیز مشخص گردیدند. گزارش‌های مربوط به عوارض و نتایج و روش درمانی و جراحی در مورد هر یک از انواع آندوفتالمیت، جداگانه خلاصه‌برداری شدند. یافته‌ها، ارزیابی و با هم مقایسه شدند و به ارایه نظر در مورد هر یک از مقوله‌ها اقدام گردید.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در مجموع ۶۱ مقاله و کتاب مورد بررسی قرار گرفت. به غیر از مطالعه EVS که در مورد بیماران مبتلا به آندوفتالمیت بعد از عمل، به صورت کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده انجام پذیرفته بود؛ سایر مطالعات به صورت مجموعه موارد (case series) بودند. بعضی از روش‌های درمانی توضیح داده شده نیز با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و ضدقارچ‌های جدیدتر و با پوشش بیش تر بر میکرووارگانیسم‌ها، در حال پیشرفت و تکامل می‌باشند. با توجه به خطرناک بودن آندوفتالمیت در همه انواع آن، پیش‌گیری بهتر از هر نوع درمانی است. نتایج درمان آن نیز به تشخیص زودهنگام، افتراق نوع حاد از مزمن، درمان سریع و صحیح طبی و مداخله جراحی به موقع بستگی دارد. تمنه‌برداری از مایعات داخل چشمی، قابل اعتمادترین راه برای تشخیص و درمان به موقع عفونت می‌باشد. پیش‌آگهی در موارد کشت‌منفی، انواع دیررس آندوفتالمیت و عفونت با جرم‌های دارای بیماری‌زایی کم، بهتر است و بدترین پیش‌آگهی، در عفونت با استرپتوکوک‌ها و باکتری‌های گرم‌منفی و باسیلوس سرایوس دیده می‌شود. در مجموع، پیش‌آگهی خوبی در انتظار بیماران مبتلا به آندوفتالمیت نمی‌باشد.

ACIOL: anterior chamber intraocular lens

APD: afferent pupillary defect

BEE: bacterial endogenous endophthalmitis

CMV: cytomegalovirus

EBV: ebstein bar virus

ECCE: extracapsular cataract excision

EVS: Endophthalmitis Vitrectomy Study

FNA: fine needle aspiration

HIV: human immunodeficiency virus

HSV: herpes simplex virus

IOFB: intraorbital foreign body

IOL: intraocular lens

KP: keratic precipitant

۱- چشم‌پزشک- مرکز تحقیقات چشم- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲- استاد- چشم‌پزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

■ تهران- پاسداران- بستان نهم- بیمارستان لبافی نؤاد- مرکز تحقیقات چشم

تاریخ دریافت مقاله: ۴ مهر ۱۳۸۰

تاریخ تایید مقاله: ۱۲ آبان ۱۳۸۰

LP: light perception

MIC: minimum inhibitory concentration

PAS: periodic acid-schiff

PS: posterior synechia

PK: penetrating keratectomy

RK: radial keratectomy

RPE: retinal pigmented epithelium

بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. براساس این منابع، آندوفتالمیت‌های عفونی، بر پایه وضعیت بالینی و زمان شروع آن، به انواع مختلف زیر طبقه‌بندی شدند و مورد بحث قرار گرفتند:

الف- آندوفتالمیت به دنبال اعمال جراحی که خود به انواع حاد و دیررس تقسیم می‌گردد.

ب- آندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی فیلترینگ (filtering bleb associated)

- ج- آندوفتالمیت به دنبال ضربه
- د- آندوفتالمیت درونزاد (آندوؤن)
- ه- آندوفتالمیت غیرعفونی (استریل) مُثُل افتالمی سمتاًیک و آندوفتالمیت فیکوآنافیلاکتیک.

یافته‌ها و بحث

در مجموع ۶۱ مقاله و کتاب مورد مطالعه قرار گرفتند. در بین مقالات، به جز مطالعه EVS که در مورد بیماران مبتلا به آندوفتالمیت بعد از عمل به صورت کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده، انجام شده بود و از نظر مبتنی بودن بر شواهد از درجه اعتبار بالا (سطح ۲) برخوردار بود^۱، سایر مطالعات به صورت گزارش مجموعه موارد (case series) بودند که از نظر مبتنی بودن بر شواهد، از اعتبار سطح ۴ برخوردارند.

آندوفتالمیت حاد بعد از عمل

چنانچه آندوفتالمیت در ۶ هفته اول پس از عمل جراحی روی دهد، آندوفتالمیت حاد تلقی می‌شود. این عارضه پس از همه عمل‌های جراحی چشم و حتی بدون نفوذ به فضای استریل داخل چشم، از قبیل جراحی RK و جراحی‌های استرایسم نیز ممکن است رخ دهد. به طور کلی شیوع آندوفتالمیت حاد عفونی بعد از عمل، حدود ۰,۹۳٪ است. این میزان در عمل‌های جراحی ECCE یا فیکوامولسیفیکیشن

مقدمه

بروز آندوفتالمیت از نظر همه چشم‌پزشکان، یک عارضه جدی تلقی می‌گردد. آندوفتالمیت به دو دسته کلی عفونی و غیرعفونی تقسیم می‌شود. آندوفتالمیت عفونی ممکن است به صورت درونزاد (آندوؤن) با انتقال عامل عفونت از طریق خون به چشم ایجاد گردد و یا به صورت برونزاد (اگرؤن) به واسطه انتقال عامل عفونت به دنبال جراحی یا ضربه روی دهد. انواعی از آندوفتالمیت نیز به صورت غیرعفونی (استریل) رخ می‌دهند^۲.

نتایج بینایی پس از بروز آندوفتالمیت به تشخیص زودهنگام و صحیح، حاد یا مزمن بودن آن، عامل مولد آن، روش‌های درمانی مناسب و رعایت اصول پیش‌گیری بستگی دارد. با ورود آنتی‌بیوتیک‌هایی که با قدرت نفوذ بهتری در چشم، به MIC^۳، بالاتری می‌رسند؛ هزینه‌های سنگین درمانی ناشی از بسترهای شدن بیماران برای دریافت آنتی‌بیوتیک سیستمیک و احیاناً نیاز به جراحی ویترکتومی عمیق، همگی بر ضرورت استفاده از برنامه‌های درمانی جدید تأکید دارند^۴.

هدف از نگارش این مقاله، مروری بر ویژگی‌های انواع آندوفتالمیت، روش‌های جدید تشخیص، پیش‌گیری و درمان می‌باشد.

روش مطالعه

به منظور نگارش این مقاله مروری، ابتدا مقالات معتبر و مرتبط انتشار یافته طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ براساس واژه endophthalmitis در مدلاین، جستجو و بررسی شدند. سپس براساس منابع مقالات مشخص شده در این مرحله، مقالاتی که در بیش از ۳ مورد به آن‌ها استناد شده بود، مشخص گردیدند. در مرحله بعد، مقالات براساس مقوله‌های تشخیص، پیش‌گیری، درمان، عوارض و نتایج درمان دسته‌بندی شدند. به علاوه کتب مرجع درسی نیز مورد مطالعه و بررسی مشابه قرار گرفتند. یافته‌های مربوط به هر کدام از این منابع در مقوله‌های گفته شده خلاصه برداری شدند و مورد مقایسه و

فیبرینی در اتاق قدامی، التهاب زجاجیه، رتینیت و پری فلیبت شبکیه می باشند.^۱

در افرادی که ارتضاح قرنیه، همراه با از بین رفتن بازتاب قرمز و دید اولیه LP در دو روز اول پس از عمل جراحی رخ داده است و در موارد مختلط بودن APD، اختلال در زخم جراحی آب مروارید (قرار گرفتن عنیبه و زجاجیه در لای زخم) و یا ایجاد آب سه بخیه؛ ارگانیسم های گرم منفی و گرم مثبت (به جز استافیلوکوک اپیدرمیدیس) بیش تر شایعند که به طور چشم گیری همراه با پیش آگهی بد بینایی می باشند. هرچند وجود هیپوپیون در آندوفتالمیت، بالهمیت تلقی می شود ولی با استفاده از متوسط ارتفاع هیپوپیون نمی توان به میکرووارگانیسم مولد آن پی برد.^۲

دید نهایی ۲۰/۱۰۰ یا بیش تر در آندوفتالمیت هایی با منشا استافیلوکوک اپیدرمیدیس تا ۸۴ درصد موارد دیده می شود ولی دید اولیه بیمار نسبت به عوامل میکروبی، در پیش آگهی دید نهایی اهمیت بیش تری دارد.^۳ عوامل زیر به عنوان عوامل خطرساز بروز آندوفتالمیت در مرحله قبل از عمل جراحی شناخته شده اند: بلفاریت، کونژنکتیویت، کاتالیکولیت، داکریوسیستیت، انسداد مجرای اشکی و استفاده از لزهای تماسی یا پروتز چشمی در چشم مقابل، نقص ایمنی، دیابت، عفونت های تنفسی فوقانی به ویوه در بچه ها و مواردی مثل درماتیت آتوپیک و کراتوکونژنکتیویت سیکا (به دلیل تجمع استافیلوکوک ها با درصد بالاتر). عوامل خطرساز حین عمل جراحی نیز شامل ضد عفونی کردن ناقص ملتحمه و پلک ها، جراحی طولانی تر از ۶۰ دقیقه، از دست رفتن زجاجیه، ورود ناخواسته به چشم در عمل های جراحی خارج چشمی، بی حسی رتروبولیار، اختلال در زخم [نشت از زخم و جداشدگی (dehiscence)، دفن نامناسب بخیه ها، گیر افتادن زجاجیه در زخم]، تونل اسکلرال در عمل جراحی (به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه غیرعروقی، یک فضای بالقوه برای آب سه و تجمع ارگانیسم های عفونی است) و فیلترینگ بلب ناخواسته در ملتحمه می باشند. عوامل خطرساز برای بروز آندوفتالمیت های به دنبال کارگذاری تأثیری IOL که عمدتاً با استافیلوکوک اپیدرمیدیس رخ می دهند نیز شامل دیابت، لزهای اتاق خلفی با بخیه های ترس اسکلرال، هاپتیک های پلی پروپیلن، اختلالات پلک ها، ورود به چشم از محل زخم قبلی و اشکالات در زخم می باشند. عوامل خطرساز اخلاقی ای از پیوند قرنیه شامل آلودگی قرنیه دهنده و بزرگی اندازه آن است.^{۱۲-۱۴}

همراه با کارگذاری IOL، ۱۳ تا ۰/۰۷ درصد؛ در کارگذاری تأثیری IOL، ۰/۰۴ درصد؛ در جراحی توام PK و آب مروارید، ۰/۱۹۴ درصد؛ PK به تهایی، ۱۱ تا ۰/۱۸ درصد و در پارس پلاتا ویترکتومی، ۰/۰۴ تا ۰/۰۷ درصد می باشد^{۱۵-۱۶}. هر چند بعضی از مطالعات نشان داده اند که در عمل جراحی فیکوامولسیفیکیشن، چون اتاق قدامی با حفظ ساختار (form باقی می ماند و جریان مایع به سمت خارج از چشم می باشد، حرکت میکروبی کم تری به سمت اتاق قدامی چشم وجود دارد.^۷

شایع ترین عامل بروز این عارضه، میکرووارگانیسم های موجود در ساختمان های سطحی چشم مثل پلک ها، کیسه اشکی و ملتحمه می باشند که شامل باکتری های گرم مثبت (۰/۹۰ درصد)، گرم منفی (۰/۷ درصد) و قارچ ها (۳ درصد) هستند. میکروب های بی هوازی و انواع قارچ ها مثل کاندیدا، آسپرئیلوس، سفالوسپوریوم و فوزاریوم نیز موجب آندوفتالمیت پس از عمل های جراحی می شوند. علاوه بر وجود عوامل بیماری زا در ساختمان های سطحی چشم؛ می توان از وسائل عمل، محلول های شستشوی چشم، قرنیه دهنده در پیوند قرنیه، لنز داخل چشمی، ذرات هوای محلول های ویسکوالاستیک آلوده نام برد.^۸ در مطالعه EVS، ۷۰ درصد بیماران با میکروکوک های کواگ-ولازمنفی (عمدتاً استافیلوکوک اپیدرمیدیس)، ۱۰ درصد با استافیلوکوک طلایی، ۹ درصد با استرپتوکوک ها، ۶ درصد با گرم منفی ها، ۳ درصد با بقیه گرم مثبت ها و ۲ درصد با آنتروکوک ها آلوده شده بودند. استافیلوکوک اپیدرمیدیس شایع ترین میکرووارگانیسم مولد آندوفتالمیت های بعد از عمل جراحی است که نسبت به میکرووارگانیسم های دیگر از بیماری زایی کم تر برخوردار است. استافیلوکوک اپیدرمیدیس در افراد مبتلا به دیابت با شیوع بیش تری نسبت به افراد غیر دیابتی دیده می شود (۵۸/۶ درصد در مقابل ۴۵ درصد). چنانچه در زمان بروز آندوفتالمیت، عروق شبکیه توسط افتالموسکوپ مستقیم قابل رویت باشند؛ میکرووارگانیسم های گرم منفی کم تر دیده می شوند و نتایج کشت این افراد اکثرآ با پاسخ هایی مثل عدم رشد (no growth) یا بینایی (equivocal) همراه است.^{۹-۱۰}

یافته های بالینی در آندوفتالمیت حاد پس از عمل های جراحی شامل قرمی چشم، کموزیس، ادم پلک ها، کاهش دید، مختلط شدن رفلکس آوران مردمکی (APD)، ادم و ارتضاح قرنیه، واکنش

می‌رسد. باید دقت شود که استفاده روتین از وانکومایسین برای پیش‌گیری توصیه نشده است.^{۱۸-۲۱}

از آنتی‌بیوتیک‌ها به صورت محلول در انفوزیون داخل چشمی نیز استفاده شده است اما باید خطر سمیت با آمینوگلیکوزیدها، اشتباہ در تهیه محلول با غلظت غیرسمی و افزایش هزینه را نیز در نظر داشت.^{۲۲-۲۳}

هپارین به صورت پوشش بر روی لنزهای داخل چشمی و یا انفوزیون حین عمل جهت کاهش احتمال چسبیدن باکتری‌ها به کار رفته است اما یک مطالعه دوسوکور نشان داد که با استفاده از انفوزیون مایع هپارینه از فراوانی کشت مثبت در بیماران کاسته نشده است.^{۲۴-۲۵}

آندوفتالمیت مزمن پس از عمل

در صورتی که آندوفتالمیت پس از ۶ هفته از انجام عمل جراحی روی دهد تحت عنوان آندوفتالمیت دیررس طبقه‌بندی می‌شود. شایع‌ترین عوامل بروز این نوع آندوفتالمیت؛ استافیلوکوک اپیدرمیدیس، استرپتوکوک، پروپیونی باکتریوم آکنه، کاندیدا، آکتینومایسین و نوکاردیا آستروویسیدس می‌باشند. شروع علایم این عارضه ممکن است به دلیل استفاده از داروهای ضد التهابی در دوران پس از عمل، ویژگی‌های میزان، بیماری‌زایی ارگانیسم و تجمع آن‌ها به تعویق افتاد.^{۲۶-۲۷}

پروپیونی باکتریوم آکنه با ایجاد یک اثر تجمیعی بر روی مواد باقی‌مانده عدسی، موجب تحریک سیستم ایمنی می‌شود. این **sequestrated** میکروارگانیسم می‌تواند در سلول‌های التهابی شود. علایم آندوفتالمیت با استافیلوکوک اپیدرمیدیس در طی چند هفته پس از جراحی ظاهر می‌شود ولی علایم آندوفتالمیت فارچی و یا پروپیونی باکتریوم آکنه، هفته‌ها تا ماه‌ها بعد دیده می‌شوند.^{۲۷}

پیش‌گیری: به دلیل تأثیر بتادین ۵ درصد بر روی باکتری‌ها، ویروس‌ها، تکیاخته‌ها (پروتوزوآها)، قارچ‌ها و اسپورهای آن‌ها؛ این محلول به صورت موضعی در ملتحمه به کار می‌رود. اشکالات استفاده از بتادین ۵ درصد در ملتحمه، اثر سمی آن و لزوم پاکسازی آن از ملتحمه قبل از خشک شدن می‌باشند که از تأثیر بتادین می‌کاهد و به همین جهت استفاده روتین از آن زیر سوال است. با وجودی که هنوز هیچ مطالعه دوسوکوری تأثیر پیش‌گیرانه آنتی‌بیوتیک‌های قبل از عمل را اثبات نکرده است، بعضی از نویسنده‌گان استفاده پیش‌گیری کننده از آنتی‌بیوتیک‌های باکتری کش را که بر علیه میکروب‌های گرم‌مبث و گرم‌منفی موثرند، توصیه می‌کنند.^{۱۹-۲۰} این آنتی‌بیوتیک‌ها به طور عمده ۱-۲ روز قبل از عمل به کار می‌روند. هنوز گزارشی که تأثیر کند مصرف موضعی آنتی‌بیوتیک می‌تواند مقاومت میکروبی را افزایش دهد نیز وجود ندارد. قطره‌ها و پمادهای محتوى باستراتاسین، پلی‌میکسین سولفات و قطره ناسومایسین و کینولون از این دسته‌اند.^{۱۶}

آن‌تی‌بیوتیک‌هایی که با پوشش کلاؤنی ترکیب شده‌اند، قبل یا بعد از عمل به کار می‌روند. البته به علت آزادسازی پالس‌کونه آنتی‌بیوتیک و احتمال سمیت در زخم‌هایی که بخیه نخورده‌اند، باید با دقت مورد استفاده قرار گیرند.^{۱۷}

با تزریق زیرملتحمه‌ای آنتی‌بیوتیک می‌توان به غلظت بالایی در استرومای قرنیه و زلالیه دست یافت. برای تزریق زیرملتحمه، از سفازولین (پوشش مناسب بر روی میکروب‌های گرم‌مبث و گرم‌منفی دارد)، سفتازیدیم (پوشش بهتری بر روی گرم‌منفی‌ها و پوشش کم‌تر بر روی گرم‌مبث‌ها نسبت به سفازولین دارد) و جنتامایسین (که احتمال انفارکتوس ماکولا را به همراه دارد) استفاده می‌شود. در افراد دیابتی به دلیل احتمال بروز آندوفتالمیت ناشی از گرم‌منفی‌ها، ترکیب وانکومایسین- سفتازیدیم به صورت تزریق زیرملتحمه‌ای منطقی به نظر

حداکثر مقدار غیرسمی آنتیبیوتیک‌ها در مایع انفوزیون

دارو	منفرد:	میزان غیرسمی ($\mu\text{g}/\text{ml}$)
کلرامفنیکل		۱۰
کلیندامايسين		۹
آمیکاسین		۱۰
توبرامايسين		۱۰
جنتامايسين		۸
دگزاماتازون		۶۴
متیسیلین		۲۰
امی پن		۱۶
لینکومايسين		۱۰
تیکوپلانین		۸
اگراسیلین		۱۰
پنی سیلین		۸۰
استر متیل آمفورترسین	B	۷۵
نتیل مايسين		۴۰
سفتازیديم		۴۰
وانکومايسين		۳۰
ترکیبی:		
اگراسیلین + جنتامايسين		$\Delta(G) + 10(O)$
کلیندامايسين + جنتامايسين		$\Delta(G) + 9(K)$
متیسیلین + جنتامايسين		$\Delta(G) + 20(M)$
پنی سیلین + جنتامايسين		$\Delta(G) + 20(P)$

G: جنتامايسين، O: اگراسیلین، K: کلیندامايسين، M: متیسیلین، P: پنی سیلین

پلاک‌های تشکیل شده در محیط کپسول قرار می‌گیرند و بنابراین در صورت شک به این نوع آندوفتالمیت باید معاینه از ورای مردمک گشاد انجام شود.^{۷۷} در آندوفتالمیت‌های دیررس بعد از جراحی که با فارچ آلدود شده‌اند نیز علایم فوق دیده می‌شوند اما وجود هیپوپیون و یوویست غیرگرانولوماتوز، نقطه تمایز این نوع عفونت از پروپیونی باکتریوم آکنه است.

این بیماران با علایم و تظاهرات آندوفتالمیت حاد به دنبال عمل جراحی و یا به طور تبیک با یوویست خفیفی که به کورتیکوسترویید به خوبی پاسخ می‌دهد خود را نشان می‌دهند. در شکل‌های شدیدتر، یوویست گرانوماتوز با KP های درشت (Mutton-fat) در آندوتلیوم؛ رشته فیرین به صورت دانه تسبیح در اتاق قدامی؛ پلاک سفید بر روی بقایای کپسول، IOL و قطعات باقی‌مانده عدسی و التهاب شدید زجاجیه (ویتریت) تشخیص را قطعی می‌کند. گاهی

با استفاده از بتادین ۵ درصد، تحت بی‌حسی رتروبوبلار و قرار دادن اسپکلوم پلک انجام می‌شود. ملتحمه در محل اسکلروتومی کوتربیزه می‌گردد و از خلف لیمبوس، از فاصله ۳ میلی‌متری در افراد آفایک و ۴ میلی‌متری در افراد فاکیک، وارد چشم می‌شویم. ورود از طریق سوزن نوک تیز شماره ۲۳ و یا پروب ویترکتومی **single port** در زیر میکروسکوپ انجام می‌شود. اگر فوندوس قابل رویت نباشد، اکوگرافی قبل از عمل ضروری است و در صورتی که غشا فیبرینی پوپیلاری تشکیل شده باشد، با استفاده از سوزن نوک تیز از طریق لیمبوس و یا پروب ویترکتومی (در افراد آفایک و یا سودوفاک) می‌توان غشا فیبرین را برداشت. میدان دید جراح در زجاجیه را می‌توان با استفاده از رترکتورهای عنیبه (در چشم‌های فاکیک) و یا خروج عدسی یا **IOL** افزایش داد. در نمونه‌برداری زجاجیه چنانچه از ویترکتومی **IOL** استفاده شود؛ علاوه بر نمونه زجاجیه، از **two port** یا **three port** مایع داخل کاست ویترکتومی نیز باید برای کشت فرستاده شود. میزان ۰,۱-۰,۲ میلی‌لیتر از نمونه زجاجیه که از طریق آسپیراسیون به دست آمده معادل با ۰,۵ میلی‌لیتر نمونه از طریق پروب **single port** و ۱ میلی‌لیتر زجاجیه از طریق ویترکتومی است. در یک مطالعه نشان داده شده است که در نمونه زجاجیه، ۴۳ درصد و در نمونه مایع کاست ویترکتومی تا ۷۶ درصد موارد، جواب کشت مثبت می‌شود.^{۳۰}

درمان آندوفتالمیت حاد به دنبال عمل جراحی

هر گاه بیماری با علایم مطرح کننده آندوفتالمیت و یا التهاب پایدار پس از عمل جراحی مراجعه کند که به درمان با تجویز مکرر کورتیکوسترویید پاسخ نمی‌دهد؛ باید کشت از اتاق قدامی، زجاجیه و پلک انجام شود مگر این که عامل زمینه‌ای غیرعفونی و شناخته شده‌ای مثل مصرف ترموبین داخل زجاجیه‌ای وجود داشته باشد. در این حالت آسپیره کردن مایع زلالیه به تنها یکی کافی نیست چون در موضعی که از زجاجیه کشت مثبت به دست آمده، نتیجه کشت مایع زلالیه تنها در ۴۳ درصد مثبت بوده است. البته چنانچه با برداشتن نمونه، دیگر کورنل‌اسکلرال روی دهد؛ گرفتن نمونه از اتاق قدامی کافی است. هم‌چنین در صورت وجود پلاک سفید بر روی کپسول عدسی و عنیبه و یا **IOL** و کدورت تسبیح مانند در داخل اتاق قدامی و زجاجیه، از نمونه‌های فوق نیز در صورت امکان باید کشت انجام گردد.^{۳۷-۳۸}

کشت از پلک و قسمت‌های سطحی چشم با سواب پنهانی استریل انجام می‌گیرد و مایع زلالیه نیز از طریق برش **stab** در لیمبوس و با مقدار مایع ۰,۱ تا ۰,۲ میلی‌لیتر که توسط سوزن شماره ۳۰ (۵۸ اینچ) به دست می‌آید، مورد بررسی قرار می‌گیرد.^{۲۹} نمونه زجاجیه با دو روش کشیدن توسط سرنگ یا نمونه‌برداری با استفاده از پروب ویترکتومی به دست می‌آید که روش اخیر کشش کمتری بر روی شبکیه نسبت به کشیدن با سرنگ ایجاد می‌کند و در عین حال نتایج مثبت کاذب را نیز افزایش نمی‌دهد. نمونه زجاجیه در وضعیت استریل

نحوه انجام نمونه‌گیری مایع زلالیه و زجاجیه

شروع می‌شود و در صورت لزوم اعمال جراحی نیز برای درمان به کار می‌روند.^{۲۰}

تزریق آنتی‌بیوتیک به داخل چشم: عفونت در آندوفتالمیت حاد پس از عمل‌های جراحی عمدتاً در زجاجیه متمنکر می‌شود، بنابراین تزریق آنتی‌بیوتیک داخل چشمی به دلیل ایجاد بالاترین غلظت آنتی‌بیوتیک در حفره زجاجیه به عنوان سنگ‌بنای درمان آندوفتالمیت شناخته شده است. این کار بلا فاصله پس از تشخیص و قبل از اعلام **bevel** نتیجه کشت انجام می‌شود. تزریق باید آهسته و در حالی که سوزن به سمت قدام زجاجیه است انجام شود. با این شیوه، آنتی‌بیوتیک به طور کامل در حفره زجاجیه، مخلوط و باعث کاهش احتمال سمیت شبکیه می‌گردد. باید دقت شود که در صورت تجویز سریع محلول‌های غلیظ آنتی‌بیوتیک به سمت زجاجیه خلفی، دارو به صورت بولوس بر روی ماکولا آزاد می‌شود و احتمال انفارکتوس ماکولا به طرز چشم‌گیری افزایش می‌باید.^{۲۱}

به دلیل احتمال سمیت شبکیه در صورت تزریق مجدد (در صورتی که بهبود بالینی ظرف ۴۸-۷۲ دیده نشود) و یا سابقه پارس‌پلانا ویترکتوسی، تجویز مکرر نیز باید با دقت انجام شود. این نکته حتی در مورد تزریق مجدد و انکومایسین و آمیکاسین نیز به دلیل خطر سمیت در لایه **RPE** و لایه‌های خارجی شبکیه، باید رعایت گردد.^{۲۲} در مطالعه **EVS** نشان داده شد که در چشم‌هایی که به تزریق مکرر آنتی‌بیوتیک نیاز داشتند، بیماری شدیدتر بود و پیش‌آگهی بینایی بدتری نیز داشتند.^{۲۳}

ترکیب آنتی‌بیوتیکی تجویز شده باید بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، پوشش مناسبی ایجاد کند. بهترین آنتی‌بیوتیک‌های موثر بر روی باکتری‌های گرم مثبت، سفازولین و انکومایسین هستند. به دلیل عدم مقاومت بر علیه وانکومایسین و پوشش کامل این دارو بر علیه استافیلولوکوک‌های مقاوم به متی‌سیلین و باسیلوس سرایوس (که در این نوع پیش‌آگهی بهتری نسبت به آندوفتالمیت بعد از ضربه دیده می‌شود)، انتخاب اول برای پوشش باکتری‌های گرم مثبت، وانکومایسین است (۱ میلی‌گرم در ۰/۱ میلی‌لیتر).^{۲۴}

جهت پوشش باکتری‌های گرم منفی می‌توان از آمینوگلیکوزیدها مثل جنتامايسین (۲۰۰ میکروگرم در ۰/۱ میلی‌لیتر) یا آمیکاسین (۰/۱ میلی‌گرم در ۰/۱ میلی‌لیتر) استفاده کرد.^{۲۵} مطالعات تجربی نشان داده‌اند که آمیکاسین، سمیت کمتری نسبت به جنتامايسین ایجاد می‌کند،

نمونه‌برداری از ضایعات لوکالیزه زیر شبکیه که بدون ویتریت یا همراه با ویتریت خفیفی باشند توسط سوزن شماره ۲۵ از حاشیه بافت شبکیه طبیعی و آبse انجام می‌شود که باید رتینوپکسی نیز در محل نمونه‌برداری انجام گیرد.^{۲۶}

نمونه مایعات داخل چشمی باید توسط رنگ‌آمیزی گرم، گیمسا، هیدروکسید پتاسیم و در صورت لزوم کالکورفلوروایت بررسی شوند و در محیط‌های آگار خونی و شکلاتی، تیوگلیکولیت در ۳۷°C و در محیط سایبورادو در ۲۵°C (برای بررسی قارچ‌ها) کشت داده شوند.^{۲۷} فاصله زمانی طولانی مورد نیاز برای به دست آمدن نتیجه کشت قارچ‌ها و عدم تناسب بین پاسخ آنها به داروهای ضدقارچ در محیط‌های آزمایشگاهی و محیط زنده، از مشکلات بررسی عفونت‌های قارچی می‌باشد. محیط کشت در موارد آندوفتالمیت مزن می‌باید ۲-۳ هفته برای بررسی رشد قارچ‌ها و باکتری‌های بی‌هوایی نگهداری شود.^{۲۸}

در صورتی که ارگانیسم در دو محیط کشت جامد و مایع رشد کند، نتیجه مثبت تلقی می‌شود و چنانچه رشد میکرووارگانیسم در یک محیط کشت جامد و یا محیط کشت بی‌هوایی دیده شود، نتیجه **confluent** گزارش می‌گردد و اگر تنها در محیط کشت مایع رشد کند، نتیجه **equivocal** خواهد بود. با وجودی که تا دوسوم موارد نتایج اسمیر و کشت با هم مطابقت دارند اما درمان آندوفتالمیت بر پایه نتایج کشت استوار است.^{۲۹}

مطالعات ultrastructural در بررسی پلاک‌ها و آندوفتالمیت مزن به کار می‌روند و میکرووارگانیسم‌های درون فاگوستیت‌ها با میکروسکوپ الکترونی به خوبی دیده می‌شوند. **ultrasonification** زجاجیه قبل از کشت، می‌تواند با آزاد کردن ارگانیسم‌هایی که در فاگوستیت‌ها به دام افتاده‌اند، پاسخ کشت منفی احتمالی را به نتایج مثبت تبدیل کند.^{۳۰}

بررسی اسمیر به ویژه در موارد آندوفتالمیت غیرعفونی مثل آندوفتالمیت فیکوآنافیلاکتیک و گلوكوم فیکولیتیک، بالارزش است. نتایج منفی کشت در یکسوم تا یک‌چهارم موارد نمونه‌هایی که به درستی تهیه شده‌اند دیده می‌شود که می‌تواند به دلیل رفع عفونت از طریق مکانیسم‌های دفاعی میزان، ایزوله شدن میکرووارگانیسم‌ها (توسط فاگوستیت‌ها) یا التهاب استریل باشد. درمان آندوفتالمیت حاد پس از عمل جراحی با تزریق داخل چشمی، سیستمیک و موضعی آنتی‌بیوتیک

می‌رسد یا خیر^{۳۴}. مطالعه EVS نشان داده است که مصرف آنتی‌بیوتیک داخل وریدی (سفتازیدیم و آمیکاسین) در شفایت مديای چشم و یا در دید نهایی بیماران مبتلا به آندوفتالمیت پس از عمل جراحی تأثیری ندارد.^{۳۵} البته وانکومایسین در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است و بنابراین تأثیر بر روی میکروب‌های گرم‌متبت در نظر گرفته نشده است. این مطالعه مصرف آنتی‌بیوتیک سیستمیک را به دلیل افزایش هزینه اضافی و احتمال مسمومیت ناشی از داروها توصیه نمی‌کند. از طرف دیگر در مطالعات تجربی نشان داده شده است که وانکومایسین و سفازولین داخل وریدی در چشم‌های ملتهب به سطح قابل ملاحظه‌ای می‌رسند و پوشش کافی بر علیه گرم‌متبت‌ها ایجاد می‌کنند.^{۳۶} تأثیر تزریق وریدی افلوکسازین بر روی اکثر ارگانیسم‌های مولد آندوفتالمیت در چشم‌های ملتهب خرگوش آلبینو نیز نشان داده شده است.^{۳۷} با توجه به محدودیت‌های نتایج مطالعه EVS، تصمیم برای تجویز آنتی‌بیوتیک‌های وریدی در درمان آندوفتالمیت حاد پس از عمل‌های جراحی، به یافته‌های بالینی و قضاوت پزشک درمان‌کننده بستگی دارد. در مواردی متل عفونت پیشرفته، بیماران یک‌چشمی و یا با نقص سیستم ایمنی؛ وانکومایسین و سفازولین جهت پوشش میکروب‌های گرم‌متبت و سفتازیدیم برای گرم‌منفی‌ها مفید خواهد بود. جهت کاهش خطر سمیت کلیوی و اتوتوکسیتیک باید پس از ۵ دوز از این نظر بررسی نمود و در صورت لزوم، میزان دارو کاهش یابد و چنانچه نتایج کشت، اجازه تعویض آن را با آنتی‌بیوتیک کم خطرتر بدهد، درمان باید بلافصله اصلاح شود. سفتازیدیم نیز همچون BUN وانکومایسین از کلیه ترشح می‌شود. بنابراین کراتینین و بیماران در مدت بستره باید به طور مرتب بررسی گردد و میزان متناسب با وضعیت کلیه تجویز گردد.^{۳۸}

ترکیب درمان وریدی و داخل چشمی، وسیع‌ترین پوشش آنتی‌بیوتیک را با کم‌ترین عارضه ایجاد می‌کند بنابراین می‌توان هم‌زمان با تزریق داخل چشمی، از ۱ گرم وانکومایسین وریدی هر ۱۲ ساعت (انفوژیون آهسته کمتر از ۱۰ میلی‌گرم در دقیقه برای کاهش عوارض جانبی) و ۱ تا ۲ گرم سفتازیدیم وریدی هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز استفاده کرد.^{۳۹}

در مواردی از آندوفتالمیت‌های ناشی از استافیلوکوک اپیدرمیدیس که سرپایی درمان می‌شوند، می‌توان از سپروفلوکسازین خوراکی استفاده کرد. این دارو با نفوذ خوبی که در زجاجیه دارد، پوشش وسیعی ایجاد می‌کند. هر چند این پوشش در مورد گرم‌متبت‌ها کامل

هرچند با این دارو نیز انفارکتوس ماکولا گزارش شده است.^{۴۰} برای کاستن خطر سمیت شبکیه، سفتازیدیم به عنوان جانشین آمینوگلیکوزیدها مطرح شده است که به دلیل تولید رسوب در کنار وانکومایسین، باید با سرنگ جداگانه‌ای تزریق گردد.^{۴۱} البته سفتازیدیم در محیط‌های هیپوسیک و اسیدی که با شرایط زجاجیه در زمان بروز آندوفتالمیت مشابه است، تأثیر بهتری نسبت به آمیکاسین دارد. از طرف دیگر، ترکیب آمینوگلیکوزیدها با وانکومایسین، بر علیه آنتروکوک‌ها، استرپتوكوک‌ها و استافیکوک‌ها اثر سینرئویسم دارند و جستاماًیسین به علت حساسیت کم‌تر به اثر تجمعی باکتری‌ها (inoculum effect): درصو رتی که میکروب‌ها در یک منطقه تجمع حاصل کنند از تأثیر آنتی‌بیوتیک کاسته خواهد شد)، و باستگی تأثیر آن به غلظت دارو (concentration dependent): تأثیر آن به غلظت آنتی‌بیوتیک به کار رفته، بیشتر می‌شود) نسبت به آمیکاسین و سفتازیدیم تأثیر بهتری بر علیه میکروب‌های گرم‌منفی دارد.^{۴۲}

در هر حال برای تجویز آنتی‌بیوتیک داخل چشمی می‌توان از ترکیب وانکومایسین (۱ میلی‌گرم در ۰/۱ میلی‌لیتر) + سفتازیدیم (۲/۲۵ میلی‌گرم در ۱۰ میلی‌لیتر) استفاده کرد.^{۴۳} در افرادی که چشم‌هایشان از روغن سیلیکون پر شده است، میزان آنتی‌بیوتیک‌های داخل چشمی به ۱/۱۰ کاهش می‌باید و چنانچه اگزودای چرکی در حفره زجاجیه دیده شود، باید بلافصله روغن خارج شود و درمان آندوفتالمیت به صورت جدی آغاز گردد.

تجویز آنتی‌بیوتیک موضعی و تزریق زیرملتحمه‌ای آن: جهت افزایش غلظت آنتی‌بیوتیک داخل چشمی در کنار تزریق داخل چشم، از آنتی‌بیوتیک موضعی و زیرملتحمه‌ای نیز به صورت‌های زیر استفاده می‌شود؛ هر چند تأثیر به دست آمده حتی در چشم‌های آفاک فقط محدود به سگمان قدامی است.^{۴۴} برای تزریق زیرملتحمه‌ای، وانکومایسین (۲۵ میلی‌گرم) و سفتازیدیم (۱۰۰ میلی‌گرم) تجویز می‌شود و برای تجویز قطره موضعی از وانکومایسین (۵۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) و سفتازیدیم (۱۰۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) هر نیم ساعت به تناوب استفاده می‌شود.^{۴۵}

تجویز آنتی‌بیوتیک سیستمیک: در مورد استفاده از آنتی‌بیوتیک سیستمیک در درمان آندوفتالمیت حاد پس از عمل جراحی، اختلاف نظر وجود دارد. حتی در چشم‌های ملتهب که سد چشمی‌خونی مختل شده است، مشخص نیست آنتی‌بیوتیک داخل زجاجیه به سطح مناسبی

(LP) داشته باشند چنانچه بلا فاصله تحت عمل جراحی پارسپلانا ویترکتومی قرار گیرند، دید بهتر از ۲۰/۴۰ را تا سه برابر و ۲۰/۱۰۰ را تا ۲ برابر نسبت به دیگر بیماران که بدون ویترکتومی درمان شده‌اند به دست خواهند آورد.^۳

نتایج مطالعه EVS نشان داد که در این تحقیق از کل ۴۲۰ بیمار مورد بررسی، ۵۸ نفر (۱۴ درصد) سابقه دیابت داشتند. مطالعه این عدد نشان داد که دید دیابتی افراد و کدورت مدیا در شروع بیماری، از افراد غیردیابتی بدتر بود و همچنین در افراد دیابتی، نتیجه کشت مایعات داخل چشم بیشتر از افراد غیردیابتی مثبت بود. نتیجه این تحقیق همچنین مشخص نمود که نتیجه دید در افراد مبتلا به دیابت بدتر از افراد غیردیابتی می‌باشد (۳۹ درصد از افراد دیابتی دید در مقایسه با ۵۵ درصد افراد غیر دیابتی، ۲۰/۴۰ یا بهتر کسب نمودند). بر حسب توصیه مطالعه EVS، چنانچه دید بیمار مبتلا به آندوفتالمیت در زمان مراجعه، درک نور (LP) می‌شد؛ چه در افراد دیابتی و چه در افراد غیردیابتی، سریعاً ویترکتومی صورت می‌گیرد ولی چنانچه دید اولیه بیمار، درک حرکت دست (HM) یا بهتر باشد، نتیجه در افراد غیردیابتی و دیابتی متفاوت می‌باشد. به این صورت که در افراد غیردیابتی با دید اولیه بهتر از HM، نتیجه ویترکتومی و انجام tap زجاجیه و تزریق آنتی‌بیوتیک به داخل زجاجیه، تقریباً یکسان می‌باشد و لذا در این افراد درمان غیر جراحی ارجح است.^۴

اما در مورد دیابتی‌ها، به این مساله مورد سوال هنوز جواب داده نشده است زیرا ۵۷ درصد افراد مبتلا به دیابت دارای دید بهتر از HM، بعد از انجام ویترکتومی دید بهتر یا مساوی ۲۰/۴۰ کسب نمودند که در مقابل ۴۰ درصد افرادی که تحت tap زجاجیه و تزریق آنتی‌بیوتیک داخل زجاجیه‌ای قرار گرفته بودند، نتیجه بهتری را در گروه ویترکتومی شده نشان می‌دهد. البته با توجه به تعداد کم بیماران دیابتی در مطالعه EVS، این نتایج به لحاظ آماری با اهمیت تلقی نمی‌گردند و لذا در این گونه بیماران، هر دو روش ویترکتومی و یا tap زجاجیه و تزریق داخل زجاجیه‌ای آنتی‌بیوتیک، منطقی به نظر می‌رسد.^۵

ویترکتومی در بیمارانی که دید اولیه در حد LP دارند یا التهاب زجاجیه مانع از رویت سر عصب و یا عروق بزرگ شبکیه در قطب خلفی توسط افتالموسکوپ مستقیم شده باشد و یا در التهاب‌های پیشرونده که به رغم درمان اولیه با آنتی‌بیوتیک، کنترل نشده باشد، در نظر گرفته می‌شود.^۶

نیست و استافیلوکوک و استرپتوکوک‌های مقاوم به آن به سرعت ایجاد می‌شوند.^۷^۸

تجویزکورتیکوستروپیید: بسیاری از چشمپزشکان در کنار آنتی‌بیوتیک‌ها از کورتیکوستروپییدها در درمان آندوفتالمیت حاد پس از عمل‌های جراحی به صورت‌های داخل زجاجیه، زیر ملتحمه، موضعی و سیستمیک استفاده می‌کنند. مطالعات حیوانی اثربات سودمند کورتیکوستروپییدها را در کاهش اثربات تخریبی قابل توجه التهاب همراه با عفونت و حفظ ساختمان شبکیه تأثیت کرده‌اند. موارد منع استفاده از آن عبارتند از دیابت قندی، سل و عفونت‌های قارچی. هر چند کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ای در مورد تزریق داخل زجاجیه‌ای کورتیکوستروپیید صورت نگرفته اما مطالعات تجربی عدم بروز سمیت ناشی از دگزاماتازون را تا مقدار ۱۲۰۰ میکروگرم نشان داده‌اند و تنها عارضه موقت دگزاماتازون داخل چشمی، اختلال موقت در عملکرد سلول‌های مولر است که واپسی به مقدار نیز می‌باشد.^۹ مطالعه حیوانی دیگری که بر روی آندوفتالمیت حاد قارچی پس از عمل جراحی انجام شد نشان داد که ترکیب داخل چشمی آمفوتیریسین B و استروپیید، در شفافیت زجاجیه بدون افزایش تکثیر قارچ‌ها نسبت به تزریق آمفوتیریسین B به تنهایی، موثرتر است. هرچند مطالعه دیگری که در مورد تجویز استروپیید داخل زجاجیه برای درمان عفونت‌های حاد به دنبال عمل جراحی صورت گرفته، نشان داده است که در این موارد دید نهایی بیماران کم‌تر از مواردی است که استروپیید داخل چشمی تزریق نشده است. پردنیزلون خواراکی به میزان 1mg/kg هر روز صبح برای ۳-۵ روز، قطره پردنیزلون

استرات هر ۱-۲ ساعت و تزریق ۴۰۰ میکروگرم دگزاماتازون به حجم ۱۰ میلی‌لیتر در داخل زجاجیه و در صورت نیاز، ۴-۸ میکروگرم دگزاماتازون به صورت زیرملتحمه تجویز می‌شود. به دلیل بروز رسوب در سرنگ حاوی ترکیب وانکومایسین، سفتازیدیم و دگزاماتازون، باید از تزریق‌های جداگانه استفاده شود.^{۱۰}

جراحی: ویترکتومی، از یک سو با خارج کردن ارگانیسم‌های مولد عفونت، توکسین‌ها و غشایهای زجاجیه که می‌توانند منجر به جداسدگی شبکیه شوند و از طرف دیگر با انتشار بهتر آنتی‌بیوتیک داخل چشمی، نقش مهمی در درمان آندوفتالمیت حاد بعد از عمل جراحی ایفا می‌کنند. هر چند فقدان زجاجیه، کلیرانس داروها و سمیت ناشی از آن‌ها را افزایش می‌دهد.^{۱۱} مطالعه EVS نشان داد که بیماران مبتلا به آندوفتالمیت حاد بعد از عمل جراحی که دید اولیه در حد درک نور

فلوکونازول) تجویز می‌گردد. کتوکونازول خوارکی به میزان ۶۰۰-۴۰۰ میلی‌گرم روزانه نیز به عنوان ضد قارچ سیستمیک تجویز شده است. استفاده از این داروها باید با توجه به شدت عفونت، اطلاعات به دست آمده از کشت و خطرات درمان با آمفوتیریسین سیستمیک شروع شود.^{۳۳}

آندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی (Post Trabeculectomy)

آندوفتالمیت پس از عمل جراحی فیلترينگ، هفته‌ها تا سال‌ها پس از جراحی و حتی در حضور یک بلب فعال نیز رخ می‌دهد. شیوع آن بین ۱/۸ تا ۰/۰۶ درصد است. دو شکل از این بیماری دیده می‌شود: ۱- Blebitis که تنها نقطه آلوده، بلب است. هر چند بعضی از نویسنده‌گان به دلیل احتمال تبدیل آن به آندوفتالمیت، آن را عفونت جداگانه‌ای تلقی نمی‌کنند. ۲- آندوفتالمیت که در آن علاوه بر بلب، زجاجیه نیز درگیر خواهد شد.^{۳۴}

شایع‌ترین علت بروز آندوفتالمیت‌های دیررس ثانوی به وجود بلب (bleb associated)، نفوذ میکروب از ملتحمه سالم و یا نشت از دیواره بلب است و علت بروز آندوفتالمیت در چند هفته اول پس از عمل جراحی فیلترينگ، ورود میکروارگانیسم در حین عمل جراحی می‌باشد. نوع ارگانیسم درست شیبیه به موارد آندوفتالمیت پس از عمل جراحی خواهد بود. علایم و نشانه‌های آندوفتالمیت پس از عمل فیلترينگ شامل درد ناگهانی، قرمزی چشم و کاهش دید جدای از سیر بعد از عمل است و در معاینه با اسلیت لامپ، بلب اپنابشته از چرک است. در این زمان، کدورت بلب با روشنایی نور اسلیت به طور مایل، بهتر دیده می‌شود و با انجام آزمایش siedel نیز می‌توان نشت از بلب را بررسی کرد.^{۳۵}

بیش‌ترین میکروارگانیسم به دست آمده از این دسته آندوفتالمیت‌ها شامل استرپتوكوک، ۵۷ درصد و هموفیلوس آنفولانزا، ۲۳ درصد می‌باشند. استافیلولکوک طلایی، پسودومونا، استرپتوكوک ویریدنس و قارچ‌ها نیز دیده می‌شوند.^{۳۶}

عوامل خطرساز بروز آندوفتالمیت پس از فیلترينگ، استفاده از میتوماسین در بلب‌های ناحیه تحتانی ملتحمه، FU، نشت از بلب و زخم، بلب کیستی با دیواره نازک، استفاده از seton (به دلیل اروزیون ناشی از ایمپلنت در بین کونئ) و بلب ملتحمه‌ای در ناحیه تحتانی چشم هستند. کونئونکتیویت، داکریوسیستیت، عفونت تنفسی

گاهی در عمل‌های فیکوامولسیفیکیشن، در محل برش توپل اسکلرال، آبse ایجاد می‌شود که معمولاً نیازمند بازبینی جراحی است.^{۳۷}

درمان آندوفتالمیت مزمن به دنبال عمل جراحی

اگر میزان التهاب در آندوفتالمیت مزمن بعد از عمل جراحی شدید نباشد، درمان با آنتی‌بیوتیک تا حصول نتیجه کشت و اسپیر از زلالیه و زجاجیه به تعویق می‌افتد و چنانچه التهاب شدید باشد، برخورد همانند بیماران مبتلا به آندوفتالمیت حد پس از عمل جراحی خواهد بود. اگر آندوفتالمیت با پروپیونی باکتریوم آکنه به صورت لوکالیزه در capsular bag مجتمع باشد از ورای مردمک گشاد؛ پلاک‌ها، کپسول و کورتکس عدسی از طریق پارس‌پلاتا ویترکتومی خارج می‌شوند. هر چند باید جهت نگهداری IOL، قسمتی از محیط کپسول عدسی باقی بماند. اگر برغم کپسولوتومی محدود، خارج کردن پلاک‌ها و تزریق ۱ میلی‌گرم وانکومایسین داخل bag، التهاب تکرار شود؛ خروج کامل کپسول و لنز داخل چشمی اقدام بعدی خواهد بود و در این شرایط استفاده از لنز اتاق قدامی (ACIOL) بدون خطر است.^{۳۸} اخیراً نیز از آلفا-کموتریپسین در درمان این وضعیت استفاده شده است. چنانچه عفونت فوق منتشر باشد، درمان از طریق پارس‌پلاتا ویترکتومی انجام می‌گیرد.^{۳۹}

وانکومایسین بهترین آنتی‌بیوتیک جهت تزریق داخل چشمی برای درمان آندوفتالمیت مزمن پس از عمل‌های جراحی است که به دلیل پوشش عالی بر علیه پروپیونی باکتریوم و استافیلولکوک اپidermidis می‌باشد.^{۴۰}

در آندوفتالمیت‌های قارچی، از تزریق داخل زجاجیه‌ای آمفوتیریسین B به میزان ۵-۱۰ میکروگرم در ۰/۱ میلی‌لیتر استفاده می‌شود که ممکن است بر حسب نیاز تکرار شود. در موارد مقاوم به آمفوتیریسین B می‌توان از میکونازول و یا فلوکونازول ۲۵ میکروگرم در ۰/۱ میلی‌لیتر) داخل زجاجیه‌ای استفاده نمود.^{۴۱}

فلوکونازول خوارکی به میزان ۲۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز نیز به دلیل نفوذ بهتر به حفره زجاجیه نسبت به آمفوتیریسین B و تحمل بهتر از طرف بیماران، جانشین آمفوتیریسین B در آندوفتالمیت قارچی ایزوله می‌باشد. فلوکونازول داخل چشمی به میزان ۲۵ میکروگرم در ۱ میلی‌لیتر و یا به صورت انفورزیون مایع با غلظت ۲، حین انجام ویترکتومی (به دلیل کاهش سریع غلظت

محل و مقدار عفونت و التهاب طبقه‌بندی کردند و بر این اساس هر چه واکنش چشم، لوکالیزه و قدامی‌تر باشد با پیش‌آگهی بهتری همراه خواهد بود.^{۳۰}

یافته‌های بالینی آندوفتالمیت از قرمزی ملتحمه و یوویست قدامی خفیف با یا بدون هیپوپیون، آبشه‌های موضعی قدامی یا خلفی با حداقل التهاب و کدورت‌های سفید در زجاجیه که به ویژه در آندوفتالمیت‌های قارچی دیده می‌شود تا شکل حاد شدید همراه با هیپوپیون، التهاب شدید زجاجیه (ویتریت) و پانافتالمیت که اسکلرا و ساختمان‌های اوریت را در برگرفته است و به سرعت منجر به کوری و **phytisis bulbi** می‌گردد، تغییر می‌کند. هم‌چنین آندوفتالمیت حاد درونزاد شدید با ایجاد ترومبوز سینوس کاورنوس می‌تواند سبب مرگ بیماران شود. شایع‌ترین ارگانیسم‌های مولد آندوفتالمیت‌های درونزاد قارچی، کاندیدا (۷۵-۸۰ درصد) و آسپرئیلوس می‌باشند. آندوفتالمیت درونزاد کاندیدایی، آمبولی قارچی در سرم ایجاد می‌کند که به کوریوکاپیلرها منتقل می‌گردد.^{۳۱}

این نوع آندوفتالمیت با یک کوریوپیدیت کانونی شروع می‌گردد و سپس با ایجاد ارتاشاج کرم‌نگ با حاشیه مشخص همراه با خونریزی داخل شبکیه‌ای به شبکه منتقل می‌شود. التهاب سر عصب، آبشه شبکیه و نکروز و پارگی شبکیه نیز رخ می‌دهد. در مراحل بعدی، زجاجیه و اتاق قدامی نیز درگیر می‌شوند و به کدورت‌های مرواریدمانند زجاجیه، هیپوپیون و یوویست قدامی نیز اضافه می‌شوند. این تظاهرات، نمای تبیک آندوفتالمیت درونزاد قارچی است.^{۳۲}

آندوفتالمیت درونزاد آسپرئیلوسی در بیماران با نقص ایمنی و سابقه مصرف کورتیکوسترویید؛ پیوند قلب، ریه یا کبد، مبتلایان به لوسومی؛ معتقدان تزریقی و افراد مبتلا به آسیب‌های ریوی آرلریک ناشی از آسپرئیلوس دیده می‌شود و با کاهش دید شدید و درد چشمی در یک فرد مبتلا به پنومونی رخ می‌دهد. آبشه کوریورتینال در ماکولا، هیپوپیون زیرشبکیه‌ای و یا ساب‌هیالویید با التهاب شدید زجاجیه (ویتریت) سریعاً پیش‌رونده و خونریزی شبکیه از ویؤگی‌های این بیماری است. آندوفتالمیت با استرپتوكوک گروه **B** در نوزادان مبتلا به متئوتیت و بزرگسالان دارای نقص ایمنی رخ می‌دهد. عامل بروز آندوفتالمیت درونزاد در بیماران مسن مبتلا به نایسپرولاس‌های بدخیم و زخم‌های پوستی، استرپتوكوک‌های گروه **G** هستند. باسیلوس سریلوس در معتقدان تزریقی شایع است و بیماران با یک زخم حلقوی قرنیه همراه با اگزودای قهوه‌ای در اتاق قدامی مراجعه می‌کنند، هرچند

فوکانی و مصرف لنز تماسی و قطره‌های چشمی آلوده نیز از عوامل مساعد کننده می‌باشند.^{۳۳}

بیماران با بلب فیلترینگ فعال که مبتلا به کونؤنکتیویت، داکریوپیستیت و یا یوویست قدامی خفیف هستند باید روزانه ویزیت شوند و در صورت بروز آندوفتالمیت پس از عمل جراحی فیلترینگ و یا کارگذاری **seton**؛ باید کشت از مایع زلالیه، زجاجیه و احتمالاً بلب انجام شود. هر چند با سوزن زدن به بلب، احتمال نشت از آن و یا توقف فعالیت بلب محتمل است. در این موارد کشت از ملتحمه می‌تواند گمراه‌کننده باشد به طوری که در یک مطالعه، نتیجه به دست آمده از کشت ملتحمه و داخل چشم در ۷۲ درصد موارد متفاوت بوده است. برای درمان عفونت لوکالیزه در بلب از قطره‌های **frequent** و تزریق پری‌اکولار استفاده می‌شود و بیماران روزانه ویزیت می‌شوند. هر چند عده‌ای از پژوهشگران بر لزوم استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک (وریدی یا خوارکی) تاکید می‌کنند. درمان در موارد آندوفتالمیت‌های حاد پس از عمل فیلترینگ (در ۶ هفته اول) همانند آندوفتالمیت حاد پس از عمل جراحی خواهد بود و در موارد دیررس نیز از آنتی‌بیوتیک‌های وانکومایسین و سفتازیدیم داخل زجاجیه‌ای، موضعی و سیستمیک استفاده می‌شود. هر چند پوشش بر علیه استرپتوكوک و هموفیلوس آنفولانزا با این آنتی‌بیوتیک‌ها عالی است ولی استفاده از پارس‌پلاتا ویترکتومی همراه با درمان‌های فوق، پیش‌آگهی بینایی را بهبود می‌بخشد. باید بدانیم که آندوفتالمیت همراه با بلب فیلترینگ، پیش‌آگهی بدی دارد و به رغم درمان‌های اشاره شده، اکثر موارد به **phytisis bulbi** منجر می‌شوند.^{۳۴-۳۵}

آندوفتالمیت درونزاد (آندوئن)

آندوفتالمیت درونزاد در نتیجه پخش خونی ارگانیسم از یک محل عفونی، سوزن و یا کاتتر آلوده و غیره به چشم رخ می‌دهد. شیوع آن ۲-۵ درصد موارد آندوفتالمیت را شامل می‌شود و در گیری دولطنه در ۲۵ درصد آندوفتالمیت‌های درونزاد رخ می‌دهد. در موارد یک طرفه، در چشم چپ شایع‌تر است که به دلیل جریان مستقیم خون شریان کاروتید مشترک از بطن چپ می‌باشد. شایع‌ترین میکرووارگانیسم‌ها در آندوفتالمیت درونزاد عفونی (**BEE**)؛ استرپتوكوک، استافیلکوک طلایی و در بعضی از مطالعات با سیلوس سریلوس است. **Greenwald** و همکارانش، آندوفتالمیت درونزاد را براساس

عفونت آغاز می‌شود. در صورت لزوم، کشت و اسپیریت از زخم‌ها، زخم‌های پوستی و کاترها، مایع مغزی-نخاعی، ادرار و خون انجام می‌شود. اکوکاردیوگرافی نیز در صورت شک به آندوفتالmit نقش مهمی دارد.^{۵۳} در آندوفتالmit درونزاد، نتیجه کشت مثبت از یک حفره بدن متلل چشم، در بیش از ۹۶ درصد موارد به دست می‌آید و نتایج کشت مثبت از زجاجیه نیز تا ۷۴ درصد موارد با اطلاعات مربوط به کشت خون مطابقت دارد. در صورت وجود آندوفتالmit درونزاد آسپرئیلوسی، نمونه به دست آمده از پارسپلاتا ویترکتومی، بیشترین نتیجه کشت مثبت آسپرئیلوس را به همراه دارد. البته این روش نمونه‌گیری فقط در صورت **seeding** در زجاجیه امکان‌پذیر است. اگر درگیری زجاجیه خفیف باشد ولی کشت و اسپیریت برای قارچ مثبت شود، درمان موضعی با فلوكوتازول خوراکی به جای آمفوتیریسین **B** وریدی و بدون درمان داخل چشمی و ویترکتومی تجویز می‌شود. در بیماران مبتلا به ایدز یا **HIV⁺** و یا معتادان تزریقی، احتمال آندوفتالmit درونزاد سیفیلیسی نیز مطرح است که با بررسی مایع مغزی-نخاعی، آزمایش‌های سرولوقی و یافته‌های افتالموؤیک اثبات می‌شود.^{۵۰}

به طور کلی چنانچه آندوفتالmit درونزاد با التهاب قبل ملاحظه‌ای همراه باشد طوری که مانع از رویت ماکولا و سر عصب توسط افتالموسکوپ مستقیم شود یا درگیری چشمی در سگمان قدامی چشم‌های آفак و یا مبتلا به پارگی کپسول خلفی وجود داشته باشد، بلافتاصله پس از انجام کشت‌های لازم، درمان همانند آندوفتالmit حاد عفونی به دنبال اعمال جراحی شروع می‌شود و چنانچه اطلاعاتی از منابع عفونی در بدن وجود داشته باشد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در موارد ابتلا به متنقیت، آنتی‌بیوتیک‌های وانکومایسین و سفتریاکسون انتخاب اول درمان می‌باشد. در عفونت با پسودومونا آسپرئیلوس باشد از آمینوکلیکوزید سیستمیک استفاده شود و در معتادان تزریقی مبتلا به آندوفتالmit درونزاد قارچی که درگیری سیستمیک ندارند، ویترکتومی و آمفوتیریسین **B** داخل چشمی به تنهایی عفونت را برطرف می‌کند. آندوفتالmit کربپیتوئن درونزاد با ترکیبی از آمفوتیریسین **B** و فلوكوتازول سیستمیک درمان می‌شود. در موارد آندوفتالmit درونزاد آسپرئیلوسی، تزریق آمفوتیریسین **B** به میزان ۱۰-۵۰ میکروگرم همراه با ۴۰۰ میکروگرم دگزاماتازون داخل زجاجیه‌ای جهت کاهش التهاب تجویز می‌گردد و چنانچه گرفتاری‌های زجاجیه به صورت **vitreous seeding** وجود داشته باشد، ویترکتومی توصیه

هیپوپیون قهوه‌ای بدون زخم قرنیه به نفع لیستریا مونوستیوئن است. در افراد مبتلا به کارسینومای روده، آندوفتالmit درونزاد با کلستریدیوم رخ می‌دهد که به سرعت منجر به کوری و در نهایت تخلیه چشم می‌گردد.^{۵۴}

باکتری‌های گرم‌منفی روده‌ای متلل اشریشیاکولی، کلبسیلا پنومونیه، هموفیلوس آنفولانزا، پسودومونا آسپرئیلوس و جنس سراتیا (**seratia**) شایع‌ترین عامل بروز آندوفتالmit درونزاد با نوکاردا ۸۰٪ آندوفتالmit با نوکاردا آستروسیدس معمولاً از عفونت‌های ریوی در یک فرد با نقص اینمنی منشا می‌گیرد و آبشه‌های زیرشبكیه‌ای سفید گچی همراه با خون‌ریزی بر روی این ضایعات از علایم ابتلا به وسیله این میکرووارگانیسم می‌باشند. این آبشه‌ها باید از تومورهای کوروپیید و اسکار دیسکی شکل افتراق داده شوند.^{۵۵} پنوموسیتیس کانیس (**Pneumocystis canis**) نیز کوروپییدوپاتی چندکانونی دوطرفه ایجاد می‌کند. علایم بالینی آندوفتالmit درونزاد با فوزاریوم، خود را به صورت **frosted-branch angitis** یک‌طرفه در معتادان تزریقی نشان می‌دهد. توکسوپلاسما و توکسوکارا نیز با فعال شدن عفونت قبلی که به حالت خفته درآمده است منجر به آندوفتالmit درونزاد می‌شوند. توکسوپلاسما به طور معمول با ضایعات **satellite** در اطراف رتینوکوروپییدیت کانونی و التهاب خفیف زجاجیه دیده می‌شود اما گاهی آندوفتالmit خلفی شدید نیز اتفاق می‌افتد. سیتومگالووپروس، هرپس سیمپلکس و هرپس زوستر، ویروس ابشتین بار (EBV) و باسیل سل از عوامل غیرمعمول بروز آندوفتالmit درونزاد هستند.^{۵۶}

عوامل خطرساز بروز آندوفتالmit درونزاد باکتریایی عبارتند از نقص اینمنی (سرطان، دیابت و ایدز)، عفونت‌های رحمی، کاریت، زخم‌های پوستی، آبشه‌های پری‌نفریک و پرستات، استفاده از کاترها و وریدی، مصرف طولانی مدت آنتی‌بیوتیک، اعتیاد تزریقی، افراد دیالیزی و بیمارانی که سابقه جراحی آندوسکوپی و آبشه‌های دستگاه گوارش داشته باشند.^{۵۷}

عواملی همچون استفاده تزریقی از مواد مخدر، درمان طولانی مدت داخل وریدی با یا بدون آنتی‌بیوتیک، ضربه یا جراحی اخیر، کاتر مثانه، بدخیمی‌ها، نقص اینمنی و پیوند اعضا از عوامل خطرساز بروز آندوفتالmit درونزاد قارچی تلقی می‌شوند. بیماران مشکوک به آندوفتالmit عفونی درونزاد باید تحت معاینات سیستمیک قرار گیرند و در بسیاری از موارد، درمان با استفاده از نتیجه کشت کانون اولیه

محیط‌های روتایی، تاخیر در ترمیم اولیه و آسیب با گلوله. استرپتوكوک‌ها، پسودومونا آئروؤینوزا، میکرووارگانیسم‌های گرم‌منفی، قارچ‌ها و به ندرت استافیلکوک اور‌ایوس نیز موجب بروز این نوع آندوفتالمیت می‌شوند.^۶

در آندوفتالمیت‌های پس از ضربه، علاوه بر کشت از مایعات داخل چشمی، از مواد و بافت‌های دربریدشده و **IOFB** نیز نمونه‌برداری می‌شود. هر چند تمام موارد **IOFB** منجر به بروز آندوفتالمیت نمی‌شوند اما به عنوان یک قانون باید حتی المقدور خارج شوند. البته اگر خروج مؤه از چشم در زمان ترمیم اولیه امکان‌پذیر نباشد و چشم هم‌چنان آرام باقی بماند، به منظور اجتناب از آسیب‌های ناشی از جراحی بعدی می‌توانیم بدون خارج کردن مؤه، بیمار را پی‌گیری کنیم.^۷ بعضی از نویسندها، درمان‌های پیش‌گیری‌کننده را به ویژه در حضور عوامل مساعده‌کننده توصیه می‌کنند. باید متذکر شویم که نتایج مثبت کشت و اسمیر از مایعات و اجسام خارجی درون چشمی در زمان ترمیم اولیه همیشه به معنی بروز بالینی آندوفتالمیت نیستند و در یک چشم آرام و صرفًا با اتکا به نتیجه کشت مثبت پس از ترمیم اولیه، ضرورتی برای درمان وجود ندارد. اما اگر جواب کشت اولیه به نفع باسیلوس سرایوس باشد و با علایمی چون درد و التهاب بیش از حد انتظار همراه باشد و یا هیپوپیون ایجاد شود، درمان باید بلا فاصله شروع شود. هم‌چنین تزریق آنتی‌بیوتیک داخل چشمی همراه با پارس‌پلانا ویترکتومی در موارد با ریسک بالا توصیه شده است.^۸

برنامه درمانی در آندوفتالمیت پس از ضربه عبارت است از^۹:

- تزریق داخل چشمی و انکومایسین (۱ میلی‌گرم) همراه با آمیکاسین (۴۰۰ میکروگرم).
- تزریق زیرملتحمه‌ای و انکومایسین (۲۵ میلی‌گرم) همراه با آمیکاسین (۲۰ میلی‌گرم).
- قطره موضعی و انکومایسین (۵۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) و آمیکاسین (۱۴ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) هر نیم ساعت.
- تزریق وریدی آمیکاسین (۸۰ میلی‌گرم) هر ۸ ساعت + وانکومایسین (۱ گرم) هر ۱۲ ساعت (انفوژیون آهسته، کمتر از ۱۰ میلی‌گرم در دقیقه برای کاهش عوارض جانبی) به مدت ۷ روز.

آنٹی‌بیوتیک‌های سیستمیک به کار رفته باید براساس وزن بیمار و عملکرد کلبوی وی تنظیم شوند.^{۱۰}

می‌شود. چنانچه بیماری کنترل نشود، تزریق داخل چشمی در چشم‌های بدون سابقه ویترکتومی، پس از ۲ روز و در چشم‌های ویترکتومی شده، پس از ۵-۷ روز قابل تکرار است. درمان ضد قارچ وریدی (آمفوتیریسین **B** یا ایتراکونازول) نیز در صورت درگیری سیستمیک توصیه شده است. درمان با ضدقارچ موضعی فقط در صورت درگیری قرنیه به کار می‌رond. در آندوفتالمیت‌های درونزاد سیفلیسی، حتی با وجود التهاب شدید زجاجیه نیز، ضرورتی برای تزریق داخل چشمی و ویترکتومی وجود ندارد. این نوع آندوفتالمیت با استفاده از پنی‌سلین وریدی درمان می‌شود و در صورت بروز واکنش آنتی‌ون- آنتی‌بادی پس از آزادشدن آنتی‌ون‌های اسپیروکت‌ها و بروز علایم شبیه به **Jareish-Hexheimer** (پس از آزاد شدن آنتی‌ون‌های اسپیروکت، علایم شبیه به سپسیس در مبتلایان به سیفلیس رخ می‌دهد)، از آسپیرین استفاده می‌شود.^{۱۱}

آندوفتالمیت به دنبال ضربه

این نوع آندوفتالمیت با شیوعی معادل ۷ درصد اتفاق می‌افتد ولی میزان آن در مناطق روتایی تا ۳۰ درصد نیز افزایش می‌یابد. در صورت وجود جسم خارجی درون چشمی (**IOFB**، شیوع آن به حدود ۱۱-۲۶ درصد می‌رسد. آندوفتالمیت عفونی به دنبال ضربه به دلیل وجود میکروارگانیسم‌های متفاوت و نتایج بدتر بینایی، با انواع دیگر آندوفتالمیت تفاوت اساسی دارد. دید ۴۰۰ یا بیشتر در ۳۰ درصد موارد به دست می‌آید. در این نوع آندوفتالمیت نوع آسیب چشمی، طیف متفاوت میکروب‌های عفونتزا (درصد بیشتری از فلورومیکروبی مخلوط) و تاخیر در تشخیص و شروع درمان، با پیش‌آگهی بدتر بینایی همراه است.^{۱۲}

شایع‌ترین میکروارگانیسم در آندوفتالمیت پس از ضربه، استافیلکوک اپیدرمیدیس است ولی باسیلوس سرایوس خطرناک‌ترین نوع آن است. عفونت باسیلوس سرایوس در صورت وجود **IOFB** و آلدگی با مواد گیاهی و خاک، بیشتر دیده می‌شود. عفونت با باسیلوس سرایوس، در زمان کوتاهی پس از ضربه، با التهاب سریعاً پیش‌رونده شروع می‌شود و با ارتشاح حلقوی قرنیه، نکروز شبکیه و در نهایت پانافتالمیت خود را نشان می‌دهد. عوامل خطرساز بروز آندوفتالمیت با باسیلوس سرایوس عبارتند از پارگی کپسول عدسی، **IOFB**، آلدگی به خاک یا مواد گیاهی، جراحت در

افتالمی سمپاتیک یک پانیوویست گرانولوماتوز دو طرفه است که بعد از آسیب چشمی و یا جراحی در یک چشم رخ می‌دهد. عالیم بالینی آن شامل قرمی چشم، ترس از نور و اشکال در دید نزدیک، KP در آندوفتالیوم، ارتاش ندولر عنیبه، چسبندگی‌های قدامی و خلفی (PAS و PS)، التهاب سر عصب (پاییلیت)، ندول‌های دالن‌فوكس (Dalen fuch's) در شبکیه دو چشم و نشت از RPE در آنژیوگرافی با فلورسین می‌باشد.^{۵۹}

گلوکوم فیکولیتیک نیز به دلیل انسداد شبکه ترابکولار توسط ماکروفاکتوها بیکارهایی که قطعات عدسی را فاگوسیت کرده‌اند، ایجاد می‌شود و با افزایش فشار داخل چشمی، هیپوپیون استریل، التهاب شدید و PS اجسام refractile در مایع زلایله و بدون وجود KP یا خود را نشان می‌دهد. گلوکوم فیکولیتیک در بیماران با آب‌مروارید بسیار رسیده (**hypermature**، مبتلایان به پارگی ضربه‌ای کپسول عدسی و یا باقی‌ماندن کورتکس عدسی پس از جراحی آب‌مروارید اتفاق می‌افتد.^{۶۰}

آندوفتالمیت استریل در واکنش به تزریق ترومیبن داخل چشمی و هایفمای Khaki-colored با بروز هیپوپیون خود را نشان می‌دهد. رتینوبلاستوما، لنفوم large cell داخل چشمی، لوسی و تومورهای متاستاتیک نیز از دلایل بروز آن تلقی می‌شوند. در بیمارانی که پس از عمل آب‌مروارید یا با وجود قطعات عدسی، دچار التهاب می‌شوند و به درمان با کورتیکوسترویید و ایمونوساپرسیوها پاسخ نمی‌دهند؛ تنها راه تشخیص، نمونه‌برداری و کشت نمونه و رد عفونت داخل چشمی است^{۶۱}.

اگر آبse داخل چشمی بدون منع مشخص سیستمیک، التهاب شدید زجاجیه (ویریت) یا ارتاش همراه رخ دهد؛ باید نمونه‌برداری به طریق FNA جهت تشخیص انجام شود.^{۳۰}

از آنجا که خطر ابتلا به آندوفتالمیت فیکوآنافیلاکتیک کم است؛ بهترین برخورد در صورت وجود قطعات کوچک عدسی داخل چشمی، پی‌گیری مرتب است و در صورت بروز آندوفتالمیت فیکوآنافیلاکتیک، درمان با کورتیکوسترویید مکرر موضعی و سیکلولپلؤیک همراه با خارج کردن مواد باقی‌مانده عدسی توصیه می‌شود. در عین حال، احتمال بروز هم‌زمان عفونت و التهاب داخل چشمی حتی در فاصله زمانی طولانی پس از عمل جراحی و بدون بروز درد چشم نیز همیشه وجود دارد. به دلیل باقی‌ماندن تکه‌هایی از عدسی و پرتاپ شدن قطعات عدسی به داخل زجاجیه (lost

هر چند و انکومایسین با آمینوگلیکوزیدها و آنتی‌بیوتیک‌های غیرگلیکوزیدی نیز در مقابل باسیلوس اثر سیزؤیسم دارد، MIC_{۹۰} (غلظتی از آنتی‌بیوتیک که با آن ۹۰ درصد میکروب‌های موجود، غیرفعال می‌شوند) به دست آمده از تجویز ۱ میلی‌گرم و انکومایسین داخل زجاجیه‌ای برای مقابله با باسیلوس سرایوس، کافی به نظر می‌رسد. چشم‌های مبتلا به عفونت باسیلوس سرایوس عموماً پیش‌آگهی بدی دارند اما استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های داخل چشمی موثر و سریع‌الاثر، در حفظ وضعیت آنatomیک و حدت بینایی مفید، نقش مهمی ایقا می‌کند.^{۶۲}

یوویست استریل و سندرم Masquerade

این عارضه با بروز هیپوپیون و التهاب شدید داخل چشمی در شرایطی همچون گلوکوم فیکولیتیک، آندوفتالمیت فیکوآنافیلاکتیک و افتالمی سمپاتیک و یا در پاسخ به IOFB. استفاده از ترومیبن و پلاسمین در حین عمل جراحی ویترکتومی و آسیب‌های جراحی مثل آسیب به عنبیه و از دست رفتن زجاجیه رخ می‌دهد. وجود سابقه یوویست، جراحی داخل چشمی و مصرف داروهایی مثل ریفابوتین در افراد مبتلا به ایدز و متی‌پرانول (نوعی بتاپلورک) و Cidofovir (داروی ضدویروسی قوی که با مهار سنتز DNA بر علیه HSV، CMV، EBV گرانولوماتوز می‌دهند، از نظر تشخیصی، کمک‌کننده‌اند)^{۶۳}. البته یوویست استریل و عفونت پس از عمل جراحی به طور هم‌زمان نیز ممکن است رخ دهنده و چنانچه التهاب داخل چشمی از حد مورد انتظار بیش‌تر شود باید ابتدا آندوفتالمیت را رد کرد. آندوفتالمیت فیکوآنافیلاکتیک، پاسخ نادر کمپلکس اینمی (واکنش آرتوس) است که همیشه یک‌طرفه و در چشم دچار صدمه رخ می‌دهد. این عارضه پس از وارد شدن صدمه به چشم یا جراحی و یا در صورت پارگی خودبه‌خود کپسول عدسی (در بیش از ۲۰ درصد موارد) اتفاق می‌افتد. عالیم آن به صورت ترس از نور، قرمی چشم، وجود سلول و flare، چسبندگی خلفی (PS) و فشار متغیر داخل چشمی می‌باشد.^{۶۴} چنانچه Muttonfat KP التهاب دو طرفه رخ دهد باید به فکر افتالمی سمپاتیک بود چرا که این دو بیماری تا ۷ درصد موارد، با هم روی می‌دهند.^{۶۵}

نتیجه‌گیری

درمان موثر آندوفتالمیت عفونی به شدت وابسته به تشخیص سریع آن، افتراق نوع حاد از مزمن و اتخاذ روش مناسب درمانی دارد و نمونه‌برداری مایعات داخل چشمی تنها راه قابل اعتماد برای تشخیص و درمان به موقع این قبیل عفونت‌هاست. پیش‌آگهی دید بیماران در صورت وجود نتیجه کشت منفی، نوع دیررس آندوفتالمیت و بیماری زایی کم میکروارگانیسم‌ها معمولاً بهتر می‌باشد. به طور معمول بدترین نتایج در عفونت با استرپتوکوک‌ها و باکتری‌های گرم منفی و باسیلوس‌سرایوس، عفونت‌های دیررس با فیلترینگ بلب و افتالمی سمپاتیک دیده می‌شود. حتی با وجود درمان مناسب برای آندوفتالمیت‌هایی که توسط میکروارگانیسم‌هایی با بیماری زایی کم به وجود می‌آیند، همیشه پیش‌آگهی خوبی در انتظار این بیماران نمی‌باشد.

(nuclei) در عمل‌های فیکوامولسیفیکیشن، بروز آندوفتالمیت استریل رو به افزایش گذاشته است. پس از کشت نمونه داخل چشمی و اطمینان از عدم عفونت، درمان باکورتیکوستروبید آغاز می‌گردد. گلوكوم فیکولیتیک در گام نخست با کنترل فشار چشم و استفاده از کورتیکوستروبیدهای موضعی و در گام بعدی با خارج کردن قطعات باقی‌مانده عدسی و شیستشوی کامل اتاق قدامی درمان می‌شود. افتالمی سمپاتیک توسط کورتیکوستروبید موضعی، پریاکولار و سیستمیک همراه با قطره‌های میدریاتیک سیکلولپلؤیک قابل کنترل است و در صورت ادامه التهاب و جهت کاهش عوارض کورتیکوستروبیدها، از تجویز همزمان داروهای ایمونوساپرسيو مثل آزاتيورین و سیکلوسپورین نیز استفاده می‌شود.^{۳۰}

جدول ۱ - فارماکولوئی داروهای به کاررفته در درمان آندوفتالمیت

نام دارو	دسته دارویی	عوام تحت پوشش	راه مصرف	نحوه اثر	عوارض دارویی
سغازولین	سفالوسپورین نسل اول	گرم‌منفی‌ها و بعضی گرم‌منفی‌ها (بر استافیلوکوک‌ها موثر نیستند)	عضلانی، وریدی	باکتریوسید	تروموفلبیت یا درد در محل تزریق، راش پوستی، کهیر، ایزوینوفیلی، نوتروفیلی
سفتازیدم	سفالوسپورین نسل سوم	گرم‌منفی‌ها (به ویژه جنس سودومونا)	عضلانی، وریدی	باکتریوسید	سمیت کلیوی و سمیت گوشی
آمیکاسین	آمینوگلیکوزید	گرم‌منفی‌ها؛ بر علیه میکروارگانیسم‌های مقاوم به آهسته)	عضلانی، وریدی (آهسته)	باکتریوسید	جنتامايسین و توبرايماسيين، مقاومند
جنتامايسین	آمینوگلیکوزید	گرم‌منفی‌ها	عضلانی، وریدی (آهسته)	باکتریوسید	اختلالات وستیبولا، آسیب کلیوی
سپیروفلوکساسین	کینولون‌ها	گرم‌منفی‌ها، بیشتر گرم‌منفی‌ها (بر آنتروکوک‌ها موثر نیستند)	خواراکی	باکتریوسید	اختلالات وستیبولا، آسیب کلیوی
افلوکساسین	کینولون‌ها	گرم‌منفی‌ها، بیشتر گرم‌منفی‌ها (بر آنتروکوک‌ها موثر نیستند)	خواراکی	باکتریوسید	اختلالات وستیبولا، آسیب کلیوی
وانکومايسین	متفرقه	گرم‌منفی‌ها، به ویژه کلستریدیا، آنتروکوک و استافیلوکوک	خواراکی و وریدی برای استافیلوکوک،	باکتریوسید	تروموفلبیت، تب دارویی، لوکوبنی، طعم بد دهان در مصرف قرص خواراکی
ریفامپین	متفرقه	باسیل سل، استافیلوکوک، پروفیلاکسی مننگوکوک	خواراکی	fungistatic	سمیت کبدی، سندرم flulike، تغییر رنگ ترشحات بدن، تداخل دارویی
۵ FU	ضد قارچ	کاندیدا، کرپیتوکوکوس	خواراکی	fungistatic	اختلالات گواراشی، لوکوبنی، سمیت کبدی (در افراد با اختلال فعالیت کلیوی باید با دقت مصرف شود)
آمفوتريسين B	ضد قارچ	قارچ‌های مهاجم	وریدی	fungistatic	تب، لرز، تهوع، استفراغ، تروموفلبیت، سمیت کلیوی، هیپوکالمی، سرکوب مغز استخوان، شوک، سمیت قلبی
میکونازول	ضد قارچ	کاندیدا، درماتوفیت	وریدی، موضعی	fungistatic	در مصرف وریدی؛ تروموفلبیت، تروموسیتوز، کم خونی در مصرف وریدی؛ تروموفلبیت، تروموسیتوز، کم خونی راش پوستی، خارش، تهوع، ژنیکوماستی، سمیت کبدی، عقیمی سمیت کم تری نسبت به آمفوتريسين B دارد و بهتر از کتونازول تحمل می‌شود.
کلوتریمازول	ضد قارچ	کاندیدا، درماتوفیت	وریدی، موضعی	fungistatic	
كتوكونازول	ضد قارچ	قارچ‌ها	خواراکی	fungistatic	
فلوکونازول	ضد قارچ	کاندیدا، کرپیتوکوکوس	خواراکی، وریدی	fungistatic	

خوارکی، وریدی
داخل چشمی، وریدی (به دلیل
تاثیر طولانی، حتی هفتگی نیز
قابل استفاده است)

fungistatic

سمیت کم تری نسبت به آمفوتربیسین B دارد و بهتر از کتوکونازول تحمل می‌شود.

جدول ۲- خلاصه برخورد و درمان انواع آندوفتالمیت

نوع آندوفتالمیت	عوامل عفونی	عوامل خطرساز	اقدام پیش گیرانه	نمونه برداری	درمان
آندوفتالمیت حاد	استافیلوکوک	عفونت‌های لبه پلک، داکریوسیستیت، پروترز چشمی، گرم مثبت‌ها، جراحی استرپتوکوک‌ها	بتادین موضعی ۵ درصد، آنتی‌بیوتیک موضعی، آنتی‌بیوتیک با روکش کلاون، تریک زیرملتحمه، آنتی‌بیوتیک به تصویر اینمی، اشکالات حین عمل	کشت و اسمیر از زلالیه و مایع زجاجیه کشت و اسمیر از زلالیه و مایع زجاجیه	تریک داخل چشمی: وانکومایسین ۱ میلی گرم در ۱/۰ میلی لیتر + سفتازیدیم ۲/۲۵ میلی گرم در ۱/۰ میلی لیتر تریک زیرملتحمه: وانکومایسین ۲۵ میلی گرم و سفتازیدیم ۱۰۰ میلی گرم قطره موضعی: وانکومایسین ۵۰ میلی گرم در میلی لیتر و سفتازیدیم ۱۰۰ میلی گرم در میلی لیتر، هر نیم ساعت به تناوب، پردینیزولون استات هر ۱-۳ ساعت تریک وریدی: وانکومایسین ۱ گرم هر ۱۲ ساعت و سفتازیدیم ۱-۲ گرم هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز پردینیزولون خواراکی: ۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم، ۳-۵ روز تریک داخل چشمی ۱ میلی گرم وانکومایسین در موارد پروپیونی باکتریوم آکنه و استافیلوکوک اپیدرمیدیس در آندوفتالمیت قارچی: تریک داخل چشمی: تریک داخل چشمی آمفوتیریسین B، ۱۰-۵ میکروگرم در ۱ میلی لیتر یا میکوناتازول، ۲۵ میکروگرم در ۱/۰ میلی لیتر فلوكوتازول، ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز و یا کتوکوتازول، ۶۰-۴۰۰ میلی گرم روزانه در موارد لوكالیزه در بلب: قطره‌های frequent و تریک زیرملتحمه‌ای وانکومایسین و سفتازیدیم در موارد آندوفتالمیت: همانند آندوفتالمیت حاد پس از عمل جراحی
آندوفتالمیت پروپیونی باکتریوم آکنه، دیررس پس از عمل جراحی	استافیلوکوک	همانند موارد حاد	همانند موارد حاد	کشت و اسمیر از پلک و قسمت‌های سطحی، مایع زلالیه، مایع زجاجیه، کشت از پلاک‌های داخل چشمی	تریک داخل چشمی ۱ میلی گرم وانکومایسین در موارد پروپیونی باکتریوم آکنه و استافیلوکوک اپیدرمیدیس
آندوفتالمیت به هموفیلوس آنفلوانزا	استرپتوکوک، دنبال عمل	-	-	کشت و اسمیر از مایع زلالیه و زجاجیه و گاهی از بلب	بلب در سمت تحتانی ملتحمه، استفاده از FU ۵، بلب کیستی، متومایسین همراه با بلب قسمت تحتانی، استفاده از seton.
آندوفتالمیت به جراحی فیلترینگ	کوئونکتیویت، داکریوسیستیت، عنفونت تنفسی فوقانی، مصرف لنز	-	-	آنتی‌بیوتیک داخل وریدی، موضعی و زیرملتحمه‌ای؛ آنتی‌بیوتیک داخل خاک یا مواد گیاهی، جراحت در	آنتی‌بیوتیک داخل چشمی، جسم زیرملتحمه‌ای؛ آنتی‌بیوتیک داخل چشمی
آندوفتالمیت به اپیدرمیدیس، دنبال ضربه	استافیلوکوک	آنتی‌بیوتیک داخل وریدی، موضعی و زیرملتحمه‌ای؛ آنتی‌بیوتیک داخل خاک یا مواد گیاهی، جراحت در	آنتی‌بیوتیک داخل وریدی، موضعی و بافت‌های دربیدشده، اجسام خارجی درون جسم	پارگی کپسول عدسی، خارجی درون چشمی، آسودگی به جسم	تریک داخل چشمی: وانکومایسین ۱ میلی گرم و آمیکاسین ۴۰۰ میکروگرم تریک زیرملتحمه: وانکومایسین ۲۵ میلی گرم همراه با آمیکاسین ۲۰ میلی گرم قطره موضعی: وانکومایسین ۵۰ میلی گرم در میلی لیتر و آمیکاسین ۱۴ میلی گرم در میلی لیتر، هر نیم ساعت به تناوب تریک وریدی: آمیکاسین ۸۰ میلی گرم هر ۸ ساعت و وانکومایسین ۱ گرم هر ۱۲ ساعت برای ۷ روز
آندوفتالمیت	استرپتوکوک	عفونت‌های مناطق دیگر، نقص	-	کشت و اسمیر از زخم‌ها، کاترها، مایع درمان براساس نتیجه کشت انتخاب خواهد شد	کشت و اسمیر از زخم‌ها، کاترها، مایع

استافیلوکوک، کاندیدا،
ایمنی، معتادان تزریقی، افراد
آسپرئیلوس، گرم منفی‌ها
دیالیزی، سابقه جراحی
آندوسکوپی و آبسه‌های دستگاه
گوارش

مغزی-نخاعی، ادرار، خون و حفره‌های بدن؛
کشت و اسپیر از مایعات داخل چشمی

- 1- Kattan HM, Flynn HW Jr, Pfugfelder SC, et al. Nosocomial endophthalmitis survey: Current incidence of infection after intraocular surgery. *Ophthalmology* 1991;98:227-238.
- 2- Salamon SM, Friberg TR, Luxembourg MN. Endophthalmitis after strabismus surgery. *Am J Ophthalmol* 1982;93:39-40.
- 3- Endophthalmitis Vitrectomy Study Group: Result of the Endophthalmitis Vitrectomy Study: a randomized trial of immediate vitrectomy and of intravenous antibiotics for the treatment of postoperative bacterial endophthalmitis. *Arch Ophthalmol* 1995;113:1479-1496.
- 4- Cohen SM, Flynn HW JR, Murray TG, et al. Endophthalmitis after pars plana vitrectomy. *Ophthalmology* 1995;102:705-712.
- 5- Greenfield DS, Suner IF, Miller MP, et al. Endophthalmitis after filtering surgery with mitomycin-C. *Arch Ophthalmol* 1996;114:943-949.
- 6- Gimbel HV, Sun R, DeBroff BM, Yang HM. Anterior chamber fluid cultures after phacoemulsification and posterior chamber lens implantation. *Ophthalmic Surg Lasers* 1996;27:121-126.
- 7- Scott IU, Flynn HW Jr, Feuer W. Endophthalmitis after secondary intraocular lens implantation: A case-control study. *Ophthalmology* 1995;102:1925-1931.
- 8- Han DP, Wisniewski SR, Wilson LA, et al. Spectrum and susceptibility of microbiologic isolates in the Endophthalmitis Vitrectomy Study. *Am J Ophthalmol* 1996;122:1-17.
- 9- Roy M, Chen JC, Miller M, et al: Epidemic bacillus endophthalmitis after cataract surgery I: Acute presentation and outcome. *Ophthalmology* 1997;104:1768-1772.
- 10- Ormerod LD, Ho DD, Becker LE, et al. Endophthalmitis caused by the coagulase-negative staphylococci. *Ophthalmology* 1993;100:715-723.
- 11- Olson JC, Flynn HW Jr, Forster RK, et al. Results in the treatment of postoperative endophthalmitis. *Ophthalmology* 1983;90:692-699.
- 12- Speaker MG, Menikoff JA. Postoperative endophthalmitis: Pathogenesis, prophylaxis, and management. *Int Ophthalmol Clin* 1993;33:51-68.
- 13- Newman G, Baker AS, D'Amico DJ. Postoperative endophthalmitis: Risk factors and prophylaxis. *Int Ophthalmol Clin* 1996;36:109-130.
- 14- Morris R, Camesasca FI, Byrne J, et al. Postoperative endophthalmitis resulting from prosthesis contamination in a monocular patient. *Am J Ophthalmol* 1993;116:346-349.
- 15- Speaker MG, Menikoff JA. Prophylaxis of endophthalmitis with topical povidone-iodine. *Ophthalmology* 1998;69:-1774-1778.
- 16- Isenberg S, Yoshimori R, et al. Chemical preparation of the eye in ophthalmic surgery III: Effect of povidone-Iodine on the conjunctiva. *Arch Ophthalmol* 1999;102:728-729.
- 17- Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P. Goodman and Gillman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York: Pergamon Press; 1990.
- 18- Wilson FM II. Causes and prevention of endophthalmitis. *Int Ophthalmol Clin* 1987;27:67-73.
- 19- Starr MB, Lally JM. Antimicrobial prophylaxis for ophthalmic surgery. *Surv Ophthalmol* 1995;39:485-501.
- 20- Kanellopoulos AJ, Dreyer EB. Postoperative infection after current cataract extraction surgery. *Int Ophthalmol Clin* 1996;36:97-107.

- 21-Sunaric Megevand G, Pournaras CJ. Current approach to postoperative endophthalmitis. *Br J Ophthalmol* 1997;81:1006-1015.
- 22-Aaberg TM Jr, Flynn HW Jr, Schiffman J, Newton J. Nosocomial acute-onset postoperative endophthalmitis survey. *Ophthalmology* 1998;105:1004-1010.
- 23-Gritz DC, Cevallos AV, Smolin G, Whitcher JP. Antibiotic supplementation of intraocular irrigating solutions: An in vitro model of antibacterial action. *Ophthalmology* 1996;103:1204-1209.
- 24-Portoles M, Refojo MF, Leong FL. Reduced bacterial adhesion to heparin-surface-modified intraocular lenses. *J Cataract Refract Surg* 1993;19:755-759.
- 25-Manners TD, Turner DP, Galloway PH, Glenn AM. Heparinised intraocular infusion and bacterial contamination in cataract surgery. *Br J Ophthalmol* 1997;81:949-952.
- 26-Zimmerman PL, Mamalis N, Alder JB, et al. Chronic nocardia asteroides endophthalmitis after extracapsular cataract extraction. *Arch Ophthalmol* 1993;111:837-840.
- 27-Forster RK. Etiology and diagnosis of bacterial postoperative endophthalmitis. *Ophthalmology* 1978;85:320-326.
- 28-Greenwald MJ, Wohl LG, Sell CH. Metastatic bacterial endophthalmitis: A contemporary reappraisal. *Surv Ophthalmol* 1986;31:81-101.
- 29-Josephberg RG, Sing S, Zaidman G. Office-based no-stitch battery-operated diagnostic pars plana vitrectomy. American Academy of Ophthalmology, Centennial Annual Meeting, Chicago. IL, Oct, 1996;27-31.
- 30-Donahue SP, Kowalski RP, Jewart BH, Friberg TR. Vitreous cultures in suspected endophthalmitis. *Ophthalmology* 1993;100:452-455.
- 31-Donnenfeld ED, Perry HD. Cataract surgery: 5 ways to prevent endophthalmitis. *Rev Ophthalmol Jan* 1996; 67-72.
- 32-Yanoff M, Fine BS. *Ocular Pathology: A Text and Atlas.* 2nd ed. Philadelphia: Harper and Row; 1989.
- 33-Pokorny KS, Libert J, Caspers-Velu L, Goossens H. Culturenegative specimens in bacterial endophthalmitis: a new diagnostic technique using ultrasonification. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1992;33(Suppl):937 (abstract).
- 34-Talamo JH, D'Amico DJ, Kenyon KR. Intravitreal amikacin in the treatment of bacterial endophthalmitis. *Arch Ophthalmol* 1986;104:1483-1485.
- 35-Kresloff MS, Castellarin A, Zarbin M. Endophthalmitis. *Surv Ophthalmol* 1998;43:193-224.
- 36-D'Amico DJ, Caspers-Velu L, Libert J, et al. Comparative toxicity of intravitreal aminoglycoside antibiotics. *Am J Ophthalmol* 1985;100:264-275.
- 37-Roth DB, Flynn HW Jr. Antibiotic selection in the treatment of endophthalmitis: The significance of drug combinations and synergy. *Surv Ophthalmol* 1997; 41: 395-401.
- 38-Theodore FH. Bacterial endophthalmitis after cataract surgery. *Int Ophthalmol Clin* 1965;5:59-79.
- 39-Martin DF, Foxier LA, Aguilar HA, et al. Vitreous cefazolin levels after intravenous injection: Effects of inflammation, repeated antibiotic doses, and surgery. *Arch Ophthalmol* 1990;109:411-414.
- 40-Van Guntel S, Lew D, Paccolat F, et al. Aqueous humor penetration of ofloxacin given by various routes. *Am J Ophthalmol* 1994;117:87-89.
- 41-Lesk MR, Ammann H, Marcil G, et al. The penetration of oral ciprofloxacin into the aqueous humor, vitreous, and subretinal fluid of humans. *Am J Ophthalmol* 1993;115:623-628.
- 42-Meredith TA, Aguilar HE, Miller MJ, et al. Comparative treatment of

- experimental *Staphylococcus epidermidis* endophthalmitis. *Arch Ophthalmol* 1990;108:857-860.
- 43- Park SS, Samry N, Ruoff K, D'Amico DY. Effect of intravitreal dexamethasone in treatment of pneumococcal endophthalmitis in rabbits. *Arch Ophthalmol* 1995;113:1325-1329.
- 44- Gaurav KS, Joshua DS, Sharma S. Visual outcomes following the use of intravitreal steroids in the treatment of postoperative endophthalmitis. *Ophthalmology* 2000;107:486-489.
- 45- Doft BH, Wisniewski SR, Kelsey SF, Fitzgerald SG and the Endophthalmitis Vitrectomy Study Group. Diabetes and postoperative endophthalmitis in the endophthalmitis vitrectomy study. *Arch Ophthalmol* 2001;119:650-656.
- 46- Doft BH, Kelsey SF, Wisniewsky SR. Additional procedures after the initial vitrectomy or tap-biopsy in the Endophthalmitis Vitrectomy Study. *Ophthalmology* 1998;105:707-716.
- 47- Carlson AN, Stewart WC, Tso PC. Intraocular lens complication requiring removal or exchange. *Surv Ophthalmol* 1998;42:417-440.
- 48- Brod RD, Flynn HW Jr. Infectious endophthalmitis. *Curr Opin Infect Dis* 1997;10:153- 162.
- 49- Campochiaro PA, Green WR. Toxicity of intravenous cefazidime in primate retina. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1992;33(Suppl):726 (abstract).
- 50- Campochiaro PA, Lim JI. Aminoglycoside toxicity in the treatment of endophthalmitis. *Arch Ophthalmol* 1994;112:1853.
- 51- Centers for Disease Control and Prevention. Preventing the spread of vancomycin resistance. Report from the Hospital Infection Control Practices Advisory Committee: Comment Period and Public Meeting; Notice. *Federal Register* 1994;59:25758-25763.
- 52- Chan IM, Jalkh AE, Trempe CL, Tolentino FI. Ultrasoundographic findings in endophthalmitis. *Ann Ophthalmol* 1984;16:775-784.
- 53- Okada AA, D'Amico DJ. Endogenous endophthalmitis. In: Albert DM, Jacobiec FA. *Principles and Practice of Ophthalmology*. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1994:3120-3126.
- 54- Okada AA, Johnson PR, Liles WC. Endogenous bacterial endophthalmitis: Report of a ten-year retrospective study. *Ophthalmology* 1994;101:832-838.
- 55- Thompson WS, Rubsamen PE, Flynn HW Jr, et al. Endophthalmitis after penetrating trauma: Risk factors and visual acuity outcomes. *Ophthalmology* 1995; 102:1696-1701.
- 56- O'Day DM, Smith RS, Gregg CR, et al. The problem of bacillus species infection with special emphasis on the virulence of bacillus cereus. *Ophthalmology* 1981;88:833-838.
- 57- Humayun M, de la Cruz Z, Maguire A, et al. Intraocular cilia: Report of six cases of 6 weeks' to 32 years' duration. *Arch Ophthalmol* 1993;111:1396-1401.
- 58- Palu IA, Tufty GT, Pankey GA. Recurrent iritis after intravenous administration of cidofovir. *Clin Infect Dis* 1997;25:337-338.
- 59- Muller H. Phacolytic glaucoma and phacogenic ophthalmia. *Trans Ophthalmol Soc U K* 1963;83:689-704.
- 60- Lubin JR, Albert DM, Weinstein M. Sixty-five years of sympathetic ophthalmia. *Ophthalmology* 1980;87:109-121.
- 61- Shields JA, Shields C. *Intraocular Tumors: A Text and Atlas*. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1992:352-355.

Endophthalmitis: Diagnosis and Management

Rafati N, MD; Soheilian M, MD

Purpose: To review the current methods in the diagnosis and management of patients suffering from different forms of endophthalmitis

Method: By literature search up to 2001, a relevant list of articles was retrieved. All articles were reviewed, summarized and used for preparation of this manuscript

Results and Conclusion: Except the Endophthalmitis Vitrectomy Study (EVS) which is a randomized clinical trial, the published literature contains information from case series, which lack a control group and randomization. Follow up is limited and visual outcome varies widely and is highly dependent on the type of endophthalmitis and emergent referral of patients for proper management of intraocular infection. Considering the poor visual outcome of all forms of endophthalmitis, prophylaxis should have a greater role. Prognosis of these unfortunate events depends on immediate diagnosis, differentiation of acute from chronic form, and early establishment of proper medical and surgical treatment. Sampling intraocular fluids for microbiological study usually provides reliable results. Prognosis in culture negative cases, late onset endophthalmitis, and infection with low virulence organisms is better than infection with streptococci, gram negative organisms, and *bacillus cereus*.

Key words: Endophthalmitis, Diagnosis, Management