

یک مورد جداشده اگزوداتیو شبکیه ناشی از متاستاز دوطرفه کوروئید به عنوان اولین تظاهر کارسینوم پستان

دکتر مهرداد محمدپور^۱، دکتر محمدحسین دهقان^۲ و دکتر حمید احمدیه^۳

چکیده

سابقه و هدف: گزارش یک مورد متاستاز دوطرفه کوروئید همراه با جداشده اگزوداتیو شبکیه به عنوان اولین تظاهر آدنو کارسینوم دوطرفه پستان.

معرفی بیمار: خانم ۵۰ ساله‌ای به علت کاهش دید چشم راست از حدود سه ماه قبل، به درمانگاه چشم مراجعه نمود. در معاینه، دید چشم راست در حد شمارش انگشتان از فاصله ۲ متر و دید چشم چپ بدون اصلاح ۶/۱۰ بود. مارکوس گان چشم راست حدود ۳⁺ بود و در معاینه فوندوس چشم راست، جداشده اگزوداتیو وسیع شبکیه و در شد. فشار چشم‌ها در حد طبیعی بود. در معاینه فوندوس چشم راست، جداشده اگزوداتیو وسیع شبکیه و در فوندوسکوپی چشم چپ، مناطق کوچک و متعدد دکولمان اگزوداتیو دیده شد. در اکوگرافی و CT-اسکن، توده کوروئیدی در هر دو چشم دیده شد. بعد از مشاوره زنان و انجام ماموگرافی، توده دوطرفه پستان مشکوک به بدخیمی گزارش شد. نمونه برداری انجام شده از توده پستان، آدنوکارسینوم تهاجمی داخل مجرای دوطرفه را نشان داد. شیمی درمانی سیستمیک و ترموتراپی از طریق مردمک (برای ضایعه چشمی) انجام شد. بیمار ۶ ماه پس از تشخیص، به علت درگیری سیستمیک درگذشت.

نتیجه‌گیری: در همه بیماران دچار جداشده اگزوداتیو شبکیه با علت نامشخص توصیه می‌گردد که بررسی‌های سیستمیک جهت یافتن علت اصلی از جمله متاستازها صورت گیرد. تشخیص زودرس و اقدام درمانی مقتضی، در برخی موارد می‌تواند باعث نجات بیمار گردد.

• مجله چشم‌پزشکی بینا ۱۳۸۳؛ سال ۹، شماره ۴: ۳۹۱-۳۹۵.

۰ پاسخ‌گو: دکتر مهرداد محمدپور

۱- چشم پزشک- مرکز تحقیقات چشم- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲- دانشیار- چشم پزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳- استاد- چشم پزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسداران- بوستان ۹- بیمارستان لبافی نژاد- مرکز تحقیقات چشم

تاریخ تایید مقاله: ۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ دی ۱۳۸۲

اختصارات

AMD: age-related macular degeneration

ERD: exudative retinal detachment

TTT: transpupillary thermotherapy

VKH: Vogt-Koyanagi-Harada


مقدمه

جداشده اگزوداتیو شبکیه (ERD) یکی از چالش‌های تشخیصی مهم پیش روی چشم‌پزشکان است. این عارضه می‌تواند به علل متنوعی از جمله یوویتیها، تومورهای متاستاتیک، ملانوم بدخیم، بیماری VKH، Coat، رتینوبلاستوما، همانژیوم کوروئید، AMD نوع اگزوداتیو، optic pit، کرایوتراپی و دیاترمی ایجاد گردد. در میان علل متاستاتیک، شایع‌ترین علت آن متاستاز سرطان پستان و بعد سرطان ریه است. گرچه علل


آن به ظاهر متعدد و ناهمگون می‌باشد اما همیشه در برخورد با چنین بیمارانی باید به فکر متاستازها بود. متاستازهای کوروئید عموماً هنگامی تشخیص داده می‌شوند که بیماری زمینه‌ای، قبلًاً تشخیص داده شده است ولی گاهی اولین تظاهر بیماری هستند.^{۱-۳}

از جووه تشخیصی ERD می‌توان به همراهی آن با فشار خون بدخیم، اکلامپسی، نارسایی کلیوی، فقدان گستالت در شبکیه، تبعیت مایع زیر شبکیه از نیروی جاذبه، گسترش اتفاقی به


در فوندوسکوپی، ERD پیش‌رفته و وسیع همراه با جداسدگی ناحیه ماکولا در چشم راست و توده‌های متعدد زیر شبکیه‌ای در چشم چپ دیده شد (شکل ۱ و ۲) و در اکوگرافی، توده کوروئیدی (شکل ۳) مشاهده گردید.



شکل ۱- متاستاز کارسینوم پستان به کوروئید و ایجاد جداسدگی اگزوداتیو شبکیه چشم راست



شکل ۲- متاستاز کارسینوم پستان به کوروئید چشم چپ



شکل ۳- A- اسکن و B- اسکن چشم راست: توده کوروئیدی دیده می‌شود.

در CT-اسکن قبلی بیمار که از مغز و اربیت تهیه شده بود، توده مشکوک به متاستاز در لوب فرونتال دیده می‌شد و در هر دو چشم، توده مجاور صلبیه، مشکوک به متاستاز به چشم می‌خورد. با شک به تومور پستان، بررسی سیستمیک و مشاوره زنان درخواست شد.

ناحیه اورا سراتا، وجود بولهای شبکیه با سطح صاف و بدون چین خوردگی، فقدان پیگمان در زجاجیه (نشانه Sheffer منفی) و همراهی احتمالی با توده کوروئیدی اشاره نمود.^۱

تومورهای متاستاتیک، شایع‌ترین تومور داخل چشمی یا داخل اربیتی در بزرگ‌سالان هستند. در اتوپسی به عمل آمده از بیماران فوت‌شده به علت کارسینومای متاستاتیک، ۱۰ درصد آن‌ها متاستاز چشمی داشته‌اند که شیوع متاستاز در چشم راست و چپ و هم‌چنین در مرد و زن، تفاوتی نداشته است.^۲^۳. شیوع متاستاز داخل چشمی بر حسب خون‌گیری و تعداد سرخرگ‌های خون‌رسان، متفاوت است. به طوری که شیوع متاستاز به کوروئید ۱۰ بار بیش‌تر از عنبیه و جسم مژگانی و در این دو محل نیز ۲ برابر بیش‌تر از شبکیه و دیسک اپتیک می‌باشد؛ زیرا از سرخرگ افتالمیک، ۱۰ تا ۲۰ سرخرگ سیلیاری کوتاه خلفی جدا می‌شوند که خون‌رسانی کوروئید را بر عهده دارند، ۲ سرخرگ سیلیاری بلند جدا می‌گردند که به عنبیه و جسم مژگانی خون می‌رسانند و یک سرخرگ مرکزی شبکیه جدا می‌گردد که شبکیه را مشروب می‌نماید.^۱ در این گزارش، یک مورد جداسدگی اگزوداتیو شبکیه ناشی از متاستاز به کوروئید با منشا کارسینوم پستان که خون‌رسانی کوروئید را صورت تظاهر چشمی نشان داده بود، معرفی می‌گردد.

معرفی بیمار

خانم ۵۰ ساله‌ای با شکایت از کاهش دید چشم راست از حداقل ۳ ماه پیش، به درمانگاه‌های مختلف چشم‌پزشکی مراجعه کرده بود و با تشخیص التهاب داخل چشمی، تحت درمان با استروئید موضعی و تزریق زیرتنفسی دپومدرول در چشم راست قرار گرفته بود. بیمار به دنبال عدم بهبود، به درمانگاه شبکیه بیمارستان لبافی نژاد معرفی شد.

در معاينه اولیه، دید چشم راست بیمار در حد شمارش انگشتان از فاصله ۲ متری بود و دید چشم چپ، بدون اصلاح ۶/۱۰ بود. مارکوسگان چشم راست ۳^۳ بود. در معاينه با اسلیت لمپ، ۲^۴ یاخته در اتاق قدمامی و زجاجیه چشم راست دیده شد. بازتاب قرمز چشم راست کاهش یافته بود. فشار چشم ۱۱ mmHg بود (بدون مصرف داروی پایین‌آورنده فشار چشم) و چشم چپ، طبیعی به نظر می‌رسید.

حدود ۱۰ سرخرگ سیلیاری کوتاه خلفی که خونرسانی بافت کوروئید را بر عهده دارند) قابل توجیه است.^۱

شمار کلی متاستازهای یووهآ در چشمها به صورت یک متاستاز در ۷۱ درصد چشم‌ها، ۲ متاستاز در ۱۲ درصد چشم‌ها و ۳ متاستاز یا بیشتر در ۱۷ درصد چشم‌ها بوده است.^۲

میانگین تعداد متاستازها در یووهآ در هر چشم، ۲ متاستاز بوده است و میانه آن یک مورد بوده است. در متاستازهای کوروئیدی، مرکز درگیری در ۱۲ درصد موارد ماقولا، در ۸۰ درصد موارد بین ماقولا و اکواتور و در ۸ درصد موارد فراتر از اکواتور بوده است. اندازه بزرگ‌ترین تومور کوروئیدی در هر چشم، ۹ میلی‌متر در قاعده و ۳ میلی‌متر در ضخامت تومور بوده است. در زمان تشخیص عارضه چشمی، ۳۴ درصد بیماران هیچ‌گونه تاریخچه‌ای از سرطان نداشتند که بعد از بررسی‌های تشخیصی، در ۳۵ درصد آن‌ها سرطان ریه علت متاستاز بود، در ۷ درصد موارد سرطان پستان تومور اولیه را تشکیل می‌داد و در ۵۱ درصد موارد تومور اولیه مشخص نشد. ولی در کل بیماران در ۴۷ درصد موارد، منشا متاستاز از سرطان پستان بوده است. در مطالعه فوق، حدود یک‌سوم بیماران در زمان تشخیص بیماری چشمی، سابقه‌ای از بدخیمی اولیه را ذکر نمی‌کردند و بدخیمی‌های پستان و ریه در بیش از دو‌سوم موارد، محل اولیه تومور بودند.^۳

در مطالعه Mose و همکاران^۴، پیش‌آگهی کارسینوم دوطرفه پستان با موارد یک‌طرفه آن مورد بررسی قرار گرفت و در یک بی‌گیری ۱۰ ساله مشخص شد که اختلاف موجود بین دو گروه از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است، گرچه عود تومور و متاستازها در موارد دوطرفه بیشتر از موارد یک‌طرفه دیده شده است.

هم‌چنین سرطان پستان به طور نادر در مردان نیز گزارش شده است که پس از جورسازی (matching) عوامل پیش‌آگهی بیماری بین دو جنس، طول عمر در هر دو گروه مشابه بود.^۵

در بیمار ما، هر دو چشم درگیر بودند، تعداد متاستازها در هر دو چشم بیش از ۳ متاستاز کوروئیدی بود و ماقولا در هر دو چشم درگیر بود و عالیم چشمی، اولین یافته‌های بالینی سرطان پستان بوده‌اند. در این مطالعه، قبل از انجام ماموگرافی و نمونه‌برداری از پستان، تشخیص بدخیمی متاستازدهنده پستان (با توجه به نمای ضایعات در فوندو سکوپی) به صورت

در ماموگرافی انجام شده، توده‌های متعدد پستان هر دو طرف، مشکوک به بدخیمی گزارش شد. از توده‌های مزبور توسط پژشک جراح معالج وی، نمونه‌برداری به عمل آمد که گزارش آن، آدنوکارسینومای مهاجم داخل مجرای پستان بود. بیمار تحت شیمی‌درمانی سیستمیک و TTT هر دو چشم قرار گرفت. به علت درگیری وسیع سیستمیک و عدم تاثیر شیمی‌درمانی، حال بیمار به تدریج رو به و خامت گذاشت و ۶ ماه پس از تشخیص بیماری، درگذشت.

بحث

بدخیمی‌ها، شایع‌ترین منشا تومورهای داخل چشمی در بزرگ‌سالان می‌باشند. از میان تومورهای بدخیم، آدنوکارسینوم پستان در زنان و بدخیمی‌های ریه در مردان، مقام اول را دارند. بدخیمی پستان، معمولاً قبل از متاستاز به چشم شناسایی می‌شود و تحت درمان قرار می‌گیرد. در مواردی که عالیم چشمی، اولین تظاهر بیماری باشند (مثل این بیمار)، پیش‌آگهی بیماری بدتر می‌شود.^۶

در مطالعه Demirci و همکاران^۷ که بر روی ۲۶۴ بیمار مبتلا به متاستاز یووه ناشی از سرطان پستان انجام شد، ۹۳ درصد بیماران به علت عالیم بینایی به چشم‌پژشک مراجعه کرده بودند. بیمار معرفی شده نیز با کاهش دید به چشم‌پژشکان مراجعه داشته است. همچنین متاستازهای بدون علامت، به طور شایعی در چشم بدون عالیم بالینی (مشابه آنچه در این بیمار ذکر شد)، یافته شده‌اند. با این حال، پیش‌آگهی سیستمیک (حتی در مواردی که به وسیله درمان‌های متفاوتی مدواوا می‌شوند) ضعیف می‌باشد و بقای یک ساله در ۶۵ درصد موارد و بقای ۵ ساله در ۲۴ درصد موارد دیده شده است.

در مطالعه Shield و همکاران^۸ که بر روی ۵۲۰ چشم مبتلا به متاستاز یووه آ به منظور بررسی یافته‌های سیستمیک و چشمی ۴۲۰ بیمار انجام شد، عنبیه در ۹ درصد موارد، جسم مژگانی در ۲ درصد موارد و کوروئید در ۸۸ درصد موارد درگیری نشان دادند. این ترتیب شیوع به وسیله تعداد سرخرگ‌هایی که از سرخرگ افتالیک منشا می‌گیرند (یک یا دو سرخرگ سیلیاری بلند که تامین‌کننده خون قسمت قدامی بافت یووه آ شامل عنبیه و جسم مژگانی می‌باشند و

می باشد.^۱ TTT به عنوان یک روش جدید و موفقیت‌آمیز در درمان متاستازهای کوروئید مطرح شده است.^{۹,۱۰} اما تجربه بالینی در مورد آن محدود می‌باشد. یک مورد درمان متاستاز سرطان پستان به کوروئید که با ایندوسیانین سبز مشخص شده بود^۹ و یک مورد کارسینوم متاستاتیک منفرد یووهآ با منشا کلیه^{۱۱} گزارش شده است. در مطالعه دکتر فقهی و همکاران^{۱۱}، یک مورد متاستاز سرطان پستان به کوروئید هر دو چشم، تحت درمان به روش TTT قرار گرفت که نتیجه آن به صورت کوچک شدن توده کوروئیدی و جذب مایع زیر شبکیه در یک چشم و محو شدن کامل توده متاستاتیک در چشم دیگر گزارش شده است.

از لحاظ بقا، بیشترین بقا به ترتیب در متاستازهای پستان، ریه، دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی دیده می‌شود. بقا در متاستازهایی که اولین علامت ظهور آن‌ها، درگیری چشمی است، کمتر از سایر بدخیمی‌هاست.^۱

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

با توجه به این که یکی از علل مهم ERD، متاستازهای کوروئید می‌باشد؛ در هر بیمار با ERD با علت ناشناخته، بررسی تشخیصی کامل سیستمیک و مشاوره اونکولوژی و مداخله سریع در قالب یک کار گروهی پزشکی، ضروری به نظر می‌رسد و گاهی می‌تواند نجات‌بخش باشد. از میان علل مختلف بدخیمی، در بررسی‌های سیستمیک با توجه به ترتیب شیوع بدخیمی‌های متاستازدهنده به کوروئید، باید بیشتر به فکر آدنوکارسینوم پستان (در زنان) و بدخیمی‌های ریه (در مردان) بود.

درگیری مناطق متعدد زیرشبکیه‌ای چشم چپ و ایجاد ERD چشم راست)، به عنوان اولین تشخیص بالینی برای بیمار مطرح گردید.

همچنین از آن‌جا که معمولاً متاستازهای کوروئید از غشای بروکس نمی‌گذرند، به ندرت ایجاد نمای قارچی‌شکل می‌نمایند (برخلاف ملانوم بدخیم کوروئید).^۱

از دیگر تومورهای متاستازدهنده به چشم می‌توان به بدخیمی‌های کولون، عدد تناسلی، کبد، کلیه و تومور کارسینوئید اشاره نمود.^۱ در مطالعه Harbour و همکاران^{۱۲}، تومور کارسینوئید به صورت توده پرتفاصل مشخص در فوندوسکوپی دیده شد که منشا آن از برونش بود و از لحاظ بالینی، پیش‌آگهی بهتری از سایر تومورهای متاستازدهنده به کوروئید داشت. در مطالعه Hammad و همکاران^۷، بهبود خوب‌به‌خود متاستاز کوروئید با منشا کارسینومای سلول کلیوی بعد از برداشت تومور اولیه کلیه با جراحی، گزارش شده است.

در مورد اقدامات تشخیصی، آنژیوگرافی با فلورسین به ندرت مفید است و خون‌گیری دوگانه به ندرت دیده می‌شود. توده‌های متاستاتیک کوروئید، در A-اسکن به صورت reflectivity داخلی متوسط تا زیاد و در B-اسکن به صورت توده کوروئیدی اکوژن با حدود نامشخص و پشت‌پشته (lobulated) دیده می‌شوند.^۱ به تازگی، MRI نقش ویژه‌ای در تشخیص تومورهای داخل چشمی T₁ پیدا کرده است. MRI در متاستازهای کوروئیدی در نمای T₁ بدون ماده حاجب، مختصراً نسبت به زجاجیه پرشدت تر (hyperintense) است و در نمای T₂ نسبت به زجاجیه کم‌شدت‌تر (hypointense) می‌باشد.⁸

درمان به صورت شیمی‌درمانی و هورمون درمانی، TTT (external beam) و پرتو خارجی (external beam) پرتو درمانی با پلاک یا با پرتو خارجی (external beam) و

منابع

- American Academy of Ophthalmology. Secondary tumors of the eye. In: Basic and clinical science course: ophthalmic pathology and intraocular tumors. San Francisco: The Academy; 2002-2003: 267-279.
- Demirci H, Shields CL, Chao AN, Shields JA. Uveal metastasis from breast cancer in 264 patients. *Am J Ophthalmol* 2003;136:264-271.
- Shield CL, Shields JA, Gross NE, Shawartz GP, Lally SE. Survey of 520 eyes with uveal metastases. *Ophthalmology* 1997;104:1265-1276.
- Mose S, Adamietz IA, Thilmann C, Saran F, Pahnke R, Bottcher HD. The prognosis of bilateral breast carcinoma compared to unilateral breast tumor: 5- and 10-year follow ups. *Strahlenther Onkol* 1995;171:207-213 (Abstract).

- 5- Willsher PC, Leach IH, Ellis IO, Bourke JB, Blamej RW, Robertson JF. A comparison outcome of male breast cancer with female breast cancer. *Am J Surg* 1997;173:185-188.
- 6- Harbour JW, De Potter P, Shield CL, Shield JA. Uveal metastasis from carcinoid tumor. *Ophthalmology* 1994;101:1084-1090.
- 7- Hammad AM, Paris GR, Van Heuven WA, Thompson IM, Fitzsimmons TD. Spontaneous regression of choroidal metastasis from renal cell carcinoma. *Am J Ophthalmol* 2003;135:911-913.
- 8- Lernke Aj, Hosten N, Wiegel T, Prin RD, Richter M, Bechrakis NE, Foerster PR. Intraocular metastases: differential diagnosis of uveal melanomas with high resolution MRI using a surface coil. *Eur Radiol* 2001;11:2593-2601.
- 9- Puri P, Gupta M, Rundle PA, Rennie IG. Indocyanine green augmented transpupillary thermotherapy in the management of choroidal metastasis from breast carcinoma. *Eye* 2001;15:515-518.
- 10- Kiratli H, Bilgic S. Solitary choroidal metastasis managed by transpupillary thermotherapy. *Eye* 2000;5:799-800.
- ۱۱- فقهی مصطفی، میرآتشی علی محمد، سهیلیان مسعود. گزارش یک مورد درمان متاستاز سرطان پستان به کوروئید به روش ترموتراپی ترانس پوپیلاری. مجله چشم پزشکی بینا ۱۳۸۱؛ سال ۸، شماره ۱۰: ۱۰۵-۱۱۰.