

Visual Outcomes and Complications of Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation

Javadi MA, MD; Jafarinabab MR, MD; Jafarnejadi A, MD; Ahmadi M, MD; Poursalman H, MD; Sadoughi MM, MD

Purpose: To evaluate the prevalence of concomitant systemic and ocular diseases in patients scheduled for phacoemulsification and intraocular lens implantation (PE+PC IOL) and post surgical visual outcomes and complications in 1253 cases.

Methods: Medical records of all patients of a private clinic who underwent PE+PC IOL from 1999 to 2003 were reviewed. All operations were performed by a single surgeon (MAJ).

Results: Among 1253 operated eyes, 95.9% had senile cataracts. Mean age was 61 years and mean follow up was 20 ± 12.5 months. Incidence of systemic hypertension, diabetes mellitus (DM), ischemic heart disease, pseudoexfoliation syndrome (PXF), and glaucoma were 16%, 11.5%, 7.7%, 3.1%, and 2.7%, respectively. After the operation 71.9% and 90.4% of the eyes gained UCVA and BCVA of 20/40 or better, respectively. The most important intraoperative and postoperative complications were sterile uveitis (4.8%), vitreous loss (0.23%), endophthalmitis, CME, RD and, corneal decompensation each in one eye (0.08%). Significant posterior capsule opacity requiring Nd: YAG capsulotomy occurred in 5.8% of the eyes.

Conclusion: PE+PC IOL is a safe and effective procedure in patients with cataract. Systemic hypertension and DM are important concomitant systemic disorders in this group of patients.

Key words: cataract, PE, IOL, visual outcome, complications, concomitant systemic diseases

- Bina J Ophthalmol 2005; 10 (2): 163-169.

گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی

دکتر محمدعلی جوادی^۱، دکتر محمد رضا جعفری نسب^۲، دکتر عباسعلی جعفر نژادی^۳، دکتر ماندانا احمدی^۴، دکتر حسین پورسلمان^۵ و دکتر محمد مهدی صدقی^۶

چکیده

هدف: تعیین شیوع بیماری‌های سیستمیک و چشمی در بیمارانی که تحت عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار گرفتند و ارزیابی نتایج و عوارض این عمل در ۱۲۵۳ مورد جراحی آبمروارید.

روش پژوهش: مطالعه براساسدادهای موجود از روی پرونده بیمارانی که به طور متوالی طی سال‌های ۱۳۷۸-۸۱ به یک کلینیک خصوصی مراجعه و توسط یک جراح تحت عمل جراحی فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار گرفته بودند، انجام شد.

نتایج: از ۱۲۵۳ چشم عمل شده، علت آبمروارید در ۹۵/۹ درصد موارد ناشی از سن (Senile) بود. میانگین سن بیماران ۶۱ سال و مدت پی‌گیری بعد از عمل 20 ± 12.5 ماه بود. شیوع فشار خون بالا، دیابت، بیماری‌های قلبی، سودواکسفویشن و گلوكوم به ترتیب ۱۶، ۱۱/۵، ۱۱/۵، ۲/۷، ۲/۷، ۳/۱، ۷/۷ و ۲/۷ درصد بود. بعد از عمل، به ترتیب ۷۱/۹ درصد و ۹۰/۴ درصد موارد، دید بدون اصلاح و با اصلاح ۲۰/۴۰ یا بهتر به دست آورده‌اند. مهم‌ترین عوارض حین و بعد از عمل عبارت

بودند از یوویت استریل (۴/۸ درصد)، پرولایس زجاجیه (۰/۲۳ درصد) و آندوفتالمیت، ادم سیستویید ماکولا، ادم پایدار قرنیه (که نیاز به پیوند داشت) و جداشگی شبکیه هر کدام یک مورد (۰/۰۸ درصد). کدورت کپسول خلفی (PCO) که نیاز به کپسولوتومی با لیزر یاگ داشت نیز در ۵/۸ درصد موارد روی داد.

نتیجه‌گیری: عمل جراحی فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی، روشی موثر و کم عارضه در مبتلایان به آب‌مروارید با علل مختلف می‌باشد. فشار خون بالا و دیابت، از بیماری‌های سیستمیک شایع همراه با آب‌مروارید می‌باشند.

• مجله چشمپزشکی بینا ۱۳۸۳؛ سال ۱۰، شماره ۲: ۱۶۹-۱۶۳.

تاریخ دریافت مقاله: ۲۵ مرداد ۱۳۸۳

تاریخ تایید مقاله: ۹ آبان ۱۳۸۳

• پاسخ‌گو: دکتر محمدعلی جوادی

۱- استاد- چشمپزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲- استادیار- چشمپزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳- چشمپزشک- فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

۴- دستیار- چشمپزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۵- چشمپزشک- بیمارستان لبافی‌نژاد

تهران- پاسداران- بوستان نهم- بیمارستان لبافی‌نژاد- مرکز تحقیقات چشم

تاكنون مطالعات متعددی در مورد نتایج و عوارض جراحی آب‌مروارید به روش فیکوامولسیفیکاسیون انجام شده‌اند که نتایج آن‌ها قابل مقایسه است^{۹-۱۱} ولی بر حسب اطلاع ما، در ایران تاكنون مطالعه‌ای با این ویژگی‌ها منتشر نشده است. این مطالعه به منظور بررسی نتایج و عوارض جراحی آب‌مروارید به روش فیکوامولسیفیکاسیون و کارگذاری لنز داخل چشمی و تعیین شیوع بیماری‌های سیستمیک و چشمی همراه در بیمارانی که تحت عمل جراحی به روش فوق قرار گرفته بودند، انجام شد.

روش مطالعه

در این مطالعه، پرونده بیمارانی که طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ به طور متوالی به یک کلینیک خصوصی مراجعه کرده و مورد عمل جراحی فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی تمام اعمال جراحی توسط یک جراح (م.ع.ج) انجام شدند. پرونده‌های ناقص و بیماران با پی‌گیری کمتر از ۳ ماه وارد مطالعه نشدند. اطلاعات شامل سن، جنس، بیماری‌های سیستمیک و چشمی همراه از جمله دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی، سودواکسفلیشن، گلوكوم، نوع آب‌مروارید، نوع لنز داخل چشمی، عوارض حین و بعد از عمل، بهترین دید با و بدون

مقدمه

در حال حاضر، جراحی تنها راه درمان آب‌مروارید می‌باشد که یکی از شایع‌ترین و موفق‌ترین اعمال جراحی در سراسر جهان و ایران به حساب می‌آید. در سال‌های گذشته، روش‌های متفاوتی جهت عمل آب‌مروارید ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند ولی طی دو دهه گذشته، تحول عظیمی در این زمینه حاصل شده است که مهم‌ترین آن انجام جراحی با برش کوچک (small incision) و برش بسیار کوچک (micro-incision) و کارگذاری لنزهای داخل چشمی تاشونده و بسیار نازک می‌باشد. این عوامل موجب آسان‌تر شدن انجام عمل جراحی، بازیابی سریع‌تر دید و کاهش عوارض احتمالی شده‌اند^۱ به طوری که در حال حاضر، انجام جراحی به روش فیکوامولسیفیکاسیون و کارگذاری لنزهای تاشونده بدون نیاز به بخیه، روش انتخابی در جراحی آب‌مروارید محسوب می‌شود^{۲-۳}.

در کنار این مزایا باید توجه داشت که روش‌های جدید نه تنها خالی از عارضه نیستند بلکه گاهی اوقات با عوارض وخیمی نیز همراه هستند^{۳-۴}. به علاوه، همراهی بیماری‌های چشمی مانند سودواکسفلیشن (PXF)^۴، رتینوپاتی دیابتی^۵، یوویت^۶ و گلوكوم^{۷-۸} با آب‌مروارید می‌تواند در پیش‌آگهی و روش عمل و عوارض احتمالی عمل موثر باشد که آگاهی از آن‌ها، هم برای بیمار و هم برای جراح، امری لازم و ضروری است^۸.

در مواردی که مردمک تنگ بود، چه در بیماران دیابتی و یا تنگی در اثر سن و یا همراه با سندروم سودواکسفولیشن و سابقه یوویت، کشش عنبیه (iris stretching) صورت می‌گرفت و یا از رترکتور عنبیه (به تعداد ۴ عدد) استفاده می‌شد و در موارد آبمرواریدهای رسیده، از ترپیتان آبی برای رنگ‌آمیزی کپسول قدامی استفاده می‌گردید. در مواردی که پارگی کپسول خلفی با عارضه برولاپس زجاجیه (vitreous loss) وجود داشت؛ پس از ویترکتومی قدامی، لنز داخل چشمی کارگذاشته می‌شد که در صورت وجود فضای کپسولی مناسب، در فضای کپسولی و در غیر این صورت در سولکوس قرار داده می‌شد و در مواردی که امکان قرار دادن لنز در فضای کپسولی و یا در سولکوس وجود نداشت، لنز داخل چشمی در اتاق قدامی قرار می‌گرفت. پی‌گیری بیماران با تجویز قطره آنتی‌بیوتیک موضعی و استروبوید موضعی (که به تدریج قطع می‌گردید)، انجام می‌شد. بیماران در روز اول و دوم و هفته اول و دوم و ماه اول بعد از عمل، ویزیت می‌شدند و معاینات بعدی هر ۳ تا ۶ ماه بسته به وضعیت چشم بیمار ادامه می‌یافتد. داروهای مورد استفاده عبارت بودند از آنتی‌بیوتیک موضعی (کلرامفنیکل، سولفاتامید ۱۰ درصد) چهار بار در روز به مدت ۱ هفته و استروبوید موضعی (بتامتاژون) ۴ تا ۸ بار در روز به مدت ۱ هفته که پس از آن در عرض ۱ تا ۲ ماه کاهش می‌یافتد و قطع می‌گردید.

یافته‌ها

در این فاصله زمانی، ۱۲۵۳ چشم شامل ۵۲ درصد چشم راست و ۴۸ درصد چشم چپ، تحت عمل جراحی فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار گرفتند که بیماران در ۵۴/۵ درصد موارد مرد و در ۴۵/۵ درصد موارد زن بودند. متوسط سن بیماران ۶۱ سال (۱۸ تا ۸۹ سال) و متوسط پی‌گیری بیماران ۲۰ ماه (20 ± 12.5 ماه) بود. در ۶۰ درصد موارد، آبمروارید از نوع ترکیبی (کورتیکال، NS و PSC) بود.

علل آبمروارید عبارت بودند از آبمروارید ناشی از سن ۹۵/۹ (درصد)، یوویت (۱/۲ درصد)، ثانویه به مصرف استروبوید (۰/۸ درصد)، ناشی از ضربه (۰/۶ درصد) و سایر علل ۱/۵ (درصد). شیوع بیماری‌های چشمی همراه، شامل ۳/۱ درصد سودواکسفولیشن، ۲/۷ درصد گلوكوم و ۰/۴ درصد یوویت بود.

اصلاح بعد از عمل، وضعیت رفرکشن، طول مدت پی‌گیری و فشار داخل چشمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

روش جراحی

اعمال جراحی در اکثر موارد با بی‌حسی موضعی (تزریق رتروبولبار و آکینزی پلک) و در مواردی با بی‌هوشی عمومی انجام شدند. پس از پرپ و درپ، ۲ برش کوچک (stab wound) در ساعت ۱۰ و ۱۲ ایجاد شدند و پس از اتساع مردمک با آدرنالین رقیق شده به غلاظت ۱ در ۱۰۰۰ و تزریق مواد ویسکوالاستیک در اتاق قدامی (متیل سلولز ۲ هرصد)، کپسولورکسیس قدامی با سوزن خم شده یکبار مصرف شماره ۲۷ متصل به سرنگ ویسکوالاستیک از طریق برش کوچک ساعت ۱۰ انجام می‌شد. در تمام موارد یک برش صلبیه ای ۱-۲ میلی‌متری، در خلف لیمبوس (scleral tunnel) به عمق تقریبی ۵۰ درصد از ضخامت صلبیه داده شد و با استفاده از کراتوم ۳/۲ میلی‌متری، ۱-۲ mm جلوتر از لیمبوس، ورود به اتاق قدامی صورت گرفت و پس از انجام هیدرودایسکشن و هیدرودلینیشن، با استفاده از روش ۴ کوآدرانی (divide and conquer)، هسته عدسی امولسیفیه و آسپیره گردید.

دستگاه مورد استفاده در عمله موارد، دستگاه آلکان مدل یونیورسال ۱ یا مدل Storz بود. قدرت دستگاه بررسی سختی هسته و نوع دستگاه، بین ۴۰ تا ۹۰ درصد تنظیم می‌گردید و سعی می‌شد با حداقل انرژی ممکن، فیکوامولسیفیکاسیون انجام شود. بقایای قشر عدسی، توسط پروب آسپیریشن دستگاه یا سوزن دومجرای آسپیره می‌گردید. خارج کردن قشر عدسی در زیر محل برش، به کمک سوزن دومجرایی و از طریق برش کوچک ساعت ۲ انجام می‌شد و پس از بزرگ کردن برش و تزریق مواد ویسکوالاستیک (متیل سلولز ۲ درصد) در فضای کپسولی، لنز تاشونده (foldable) و یا لنز سخت (PMMA) در فضای کپسولی (capsular bag) قرار داده می‌شد. پس از شستشوی بقایای مواد ویسکوالاستیک، محل برش در مواردی که از لنز سخت استفاده شده بود و یا در موارد وجود نشت، با یک یا دو بخیه با نایلون ۱۰-صفر دوخته می‌شد و در پایان عمل، ۲۰ میلی‌گرم جنتامایسین و ۴ میلی‌گرم بتامتاژون زیر ملتحمه تزریق می‌گردید.

بیماران در طول پی‌گیری نیاز به کپسولوتومی با لیزر YAG Nd: پیدا کردند.

نتایج بینایی در آخرین ویزیت در جدول (۱) نمایش داده شده است. به طور خلاصه در آخرین ویزیت، ۷۱/۹ درصد بیماران دارای دید اصلاح نشده ۲۰/۴۰ یا بهتر و ۹۰/۴ درصد بیماران دارای بهترین دید اصلاح شده ۲۰/۴۰ یا بهتر بودند. میانگین SE (spherical equivalent) حداقل ۳ ماه بعد از عمل $0,79 \pm 0,79$ دیوپتر بود.

در ۹۶ درصد موارد (۱۱۷ نفر)، بهترین دید اصلاح شده کمتر از ۲۰/۴۰ بود که شایع‌ترین علل کاهش دید در این بیماران، به ترتیب شامل AMD (۵۳/۵ درصد)، رتینوپاتی و ماکولوپاتی دیابتی (۱۴/۸ درصد) و تغییرات میوپیک ماکولا (۱۱/۱ درصد) بودند. سایر علل کاهش دید با شیوع کمتر عبارت بودند از گلوكوم، اسکار ماکولا، سوراخ ماکولا، رتینیت پیگمانته، آتروفی عصب بینایی و نوریت ایسکمیک قدامی عصب بینایی (AION)، آمبليوپی، کدورت زجاجیه، کدورت قرنیه و CME.

شیوع بیماری‌های سیستمیک همراه شامل ۱۶ درصد فشار خون بالا، ۱۱/۵ درصد دیابت و ۷/۷ درصد بیماری‌های قلبی بود.

در ۸۴/۵ درصد موارد از لنز سخت PMMA و در ۱۵/۵ درصد از لنزهای آکریلیک استفاده شده بود. عوارض مهم حین عمل شامل خروج زجاجیه به دنبال پارگی کپسول خلفی در ۳ مورد (۰/۲۴ درصد) و صدمه به عنیه هر کدام در ۲ مورد (۰/۱۶ درصد) بودند.

عوارض بعد از عمل شامل کدورت کپسول خلفی که نیاز به کپسولوتومی با لیزر داشته باشد (۵/۸ درصد)، یووییت استریل (۴/۸ درصد) و آندوفتالمیت، ادم سیستویید ماکولا که باعث کاهش دید شده باشد (clinical CME)، افزایش IOP، ادم دائم قرنیه که منجر به پیوند قرنیه شود (به علت دیستروفی آندوتیال فوکس)، جداشده شبكیه (RD) و گیر افتادن عنیه iris capture)، هر کدام در یک مورد (۰/۰۸ درصد) بودند. ۵/۸

جدول ۱- توزیع فراوانی نسبی بیماران براساس نتایج بینایی با و بدون اصلاح در آخرین معاینه

	$\geq 20/80$	$\geq 20/80$	$\geq 20/60$	$\geq 20/50$	$\geq 20/40$	$\geq 20/30$	$\geq 20/25$	$\geq 20/20$	دید
بدون اصلاح (درصد)	۱/۵	۹۸/۵	۹۰/۷	۸۳	۷۱/۹	۵۲/۳	۲۶/۷	۹/۷	
با اصلاح (درصد)	۰/۹	۹۹/۱	۹۷/۲	۹۵/۳	۹۰/۴	۷۷/۲	۴۸/۵	۲۱/۳	

عوارض عمده حین و پس از عمل جراحی آب‌مروارید شامل باز شدن کپسول خلفی و پرولاپس زجاجیه^{۲۵}، خون‌ریزی کوروئیدی^{۱۱}، آندوفتالمیت^{۱۱}، کراتوپیاتی تاولی^{۳۰}، ادم سیستویید ماکولا^{۱۱}، جداشده شبكیه^{۱۱}، گلوكوم^{۱۱}، جابه‌جایی لنز داخل چشمی و کدورت کپسول خلفی می‌باشد^{۱۱} که شیوع آن‌ها بسته به روش جراحی، تجربه جراح^{۱۵-۱۷}، وضعیت چشم از لحاظ نوع آب‌مروارید^{۱۸} و بیماری‌های سیستمیک و چشمی همراه^{۱۹} در مطالعات مختلف، متفاوت گزارش شده است. علاوه بر این، از آن‌جا که شیوع این عوارض عمده‌کم می‌باشد؛ در صورتی که تعداد نمونه کافی نباشد، مانند اکثر مطالعات گزارش شده، احتمال دخالت شناس در مورد عوارض گزارش شده، زیاد می‌باشد لذا برای آگاهی از میزان دقیق تر نتایج و عوارض جراحی آب‌مروارید، یا

بحث

در این مطالعه، ۱۲۵۳ چشم که به طور متوالی توسط یک جراح تحت عمل فیکامولسیفیکاسیون و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار گرفته بودند، بررسی شدند که بر حسب اطلاع ما بیش‌ترین تعداد گزارش منتشر شده در ایران را شامل می‌شود. از آن‌جا که تمام اعمال جراحی توسط یک جراح انجام شدند و با در نظر گرفتن تعداد چشم‌ها و مدت پی‌گیری، نتایج این مطالعه می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین شیوع بیماری‌های سیستمیک و چشمی همراه با آب‌مروارید و هم‌چنین ارزیابی عوارض عمل مانند کدورت کپسول خلفی، ادم سیستویید ماکولا، جداشده شبكیه و خروج زجاجیه باشد. هرچند برای ارزیابی عوارض بسیار نادر مانند آندوفتالمیت، نیاز به مطالعات وسیع‌تری می‌باشد.

همانگونه که در جدول‌ها ملاحظه می‌شود، نتایج بررسی حاضر هم به لحاظ دید اصلاح شده و هم عوارض ایجاد شده، شبیه میانگین سایر مطالعات می‌باشد^{۹-۱۲}. البته در بعضی موارد، عوارض عمل در مطالعه حاضر کمتر از سایر مطالعات می‌باشد که دلیل آن می‌تواند بهبود و پیشرفت در دستگاه‌های فیکو، لنزهای داخل چشمی، روش جراحی و افزایش تجربه جراح در فاصله زمانی انجام این دو بررسی باشد.

باید تعداد نمونه‌ها زیاد باشد (نظیر مطالعه حاضر) و یا نتایج چندین مطالعه گزارش شده از منابع علمی جمع‌آوری گردند؛ همانند مطالعه Powe و همکاران^۹. از این رو جهت ارزیابی بهتر نتایج این مطالعه در مقایسه با سایر مطالعات، مقایسه‌ای از نتایج این بررسی با مطالعه فوق که حاصل جمع‌آوری ۹۰ مقاله منتشر شده در مجلات چشمپژشکی است، انجام شد که خلاصه آن در جداول (۲) و (۳) نشان داده است. در جدول (۲)، نتایج کلی دو مطالعه از نظر بازیابی دید، سن بیماران و مدت پی‌گیری و در جدول (۳)، عوارض عمل در دو مطالعه بررسی شده‌اند.

جدول ۲- مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعه Powe و همکاران^۹

مطالعه حاضر	مطالعه Powe و همکاران	مولفه‌های مورد مقایسه
فقط فیکو ۶۱ (۱۸-۸۹)	فقط فیکو ۷۱*	نوع عمل میانگین سن به سال (دامنه)
۶۱۰ (۲۳۵-۹۸۵)	۲۱۰ (۴۲-۴۸۰)	مدت پی‌گیری به روز (دامنه)
۹۰,۴	۹۰,۳ (۱۶)	درصد دید اصلاح شده ۲۰/۴۰ یا بیشتر (تعداد مطالعه)

* محدوده سنی در این مطالعه مشخص نشد

جراحی، دستگاه‌های فیکو و افزایش تجربه جراحان گردیده است.

همچنین نتایج این بررسی با مطالعه قبلی نویسندهان^{۲۰} که بر روی ۱۰۰ مورد فیکو انجام شده بود، مشابه می‌باشد. عدم وجود پرولاپس زجاجیه در آن مطالعه در مقایسه با شیوع ۰/۲۴ درصد در این مطالعه، می‌تواند به علت انتخابی بودن بیماران در آن مطالعه و غیرانتخابی بودن آن‌ها در مطالعه حاضر باشد. در آن مطالعه، تنها بیمارانی مورد عمل فیکو قرار گرفته بودند که هیچ‌گونه بیماری زمینه‌ای از قبیل سندروم سودواکسفولیشن، مردمک تنگ و آب‌مروارید رسیده (سفید) نداشتند ولی در این بررسی، کلیه بیماران، مورد عمل فیکو قرار گرفته‌اند.

همان‌طور که در جدول (۲) ملاحظه می‌شود، میانگین سن عمل در این مطالعه، ۱۰ سال کمتر از مطالعه Powe و همکاران^۹ می‌باشد که دلیل آن، لحاظ شدن آب‌مرواریدهای جوانان (Juvenile)، ضربه‌ای و متابولیک، علاوه بر آب‌مرواریدهای سنی، در این مطالعه می‌باشد؛ به طوری که محدوده سنی برای بیماران ما ۱۹-۸۹ سال بوده است. همچنین براساس این جدول، درصد دید اصلاح شده در دو مطالعه تقریباً یکسان می‌باشد.

همان‌گونه که در جدول (۳) مشاهده می‌شود، عوارض عمل در این بررسی مشابه و در مواردی کمتر از بررسی Powe و همکاران^۹ می‌باشد. دلیل کمتر بودن عوارض در این بررسی می‌تواند فاصله زمانی دو مطالعه باشد که سبب بهبود روش‌های

جدول ۳- مقایسه عوارض ایجادشده به دنبال جراحی آبمروارید و کارگذاری لنز داخل چشمی در مطالعه حاضر و مطالعه Powe^۹

عارض	تعداد مطالعه	تعداد کل چشم‌های درصد چشم‌های استخراج شده*	درصد در عمل فیکو*	مطالعه ما (درصد)
آندوفتالمیت	۱۶	۳۰۶۷۵	۰/۱۳ (۰/۰۹-۰/۱۷)	۰/۰۸ (۰/۰۲-۰/۲۵)
کراتوپاتی تاولی	۲۷	۱۵۹۷۱	۰/۳ (۰/۰۵-۰/۰۵)	۰/۰۸
IOL	۴۰	۱۷۹۴۴	۱/۱ (۰/۰۴-۰/۰۹)	۱/۰۸
IOP افزایش	۳۴	۱۱۳۷۶	۱/۲ (۰/۰۸-۰/۱۳)	۰/۰۸
CME بالینی	۴۳	۲۰۶۷۱	۱/۴ (۰/۰۶-۰/۰۶)	۰/۰۸
جداشده‌گی شبکیه	۴۲	۳۳۶۰۳	۰/۷ (۰/۰۶-۰/۱۷)	۰/۰۸
صدمه به عنایه	۸	۵۱۴۷	۱/۳ (۰/۰۱-۰/۱۶)	۰/۱۶
پرولاپس زجاجیه	۲۶	۱۴۶۲۲	۰/۸ (۰/۰۶-۰/۰۱)	۰/۲۴
کدورت کپسول خلفی	۴۱	۱۴۶۷۷	۱۹/۷ (۱۹/۱-۲۰/۳)	**۵/۸

IOL: intraocular lens, CME: cystoid macular edema, IOP: intraocular pressure

* در پرانتز، دامنه میزان گزارش شده در مقالات مختلف آورده شده است.

** تنها مواردی که نیاز به کپسولوتومی با لیزر یاگ پیدا کرده‌اند، ثبت شده‌اند.

آندوفتالمیت به ترتیب ۰/۰۸ درصد و صفر بوده است.^{۱۰} که از مطالعات دیگر که به روش قرنیه شفاف جراحی شدن، کمتر است. بنابراین به نظر ما با توجه به مطالعات فوق می‌توان توصیه کرد که در مواردی که خطر آندوفتالمیت زیادتر باشد، همانند بیماران دیابتی یا بیماران با نقص دستگاه ایمنی و هم‌چنین بیماران یک‌چشمی، روش تونل صلبیه‌ای نسبت به قرنیه شفاف ارجح می‌باشد.

در مجموع براساس یافته‌های این مطالعه و مقایسه آن با سایر مطالعات می‌توان نتیجه گرفت که جراحی آبمروارید به روش فیکو، عملی با موفقیت زیاد و عارضه کم می‌باشد. از آن جا که آبمروارید یک پدیده وابسته به سن است؛ وجود بیماری‌های همراه در این گروه از بیماران را همواره باید در نظر داشت.

عدم وجود آندوفتالمیت و جداشده‌گی شبکیه در مطالعه قبلی^{۱۱} در مقابل شیوع ۰/۰۸ درصد در این مطالعه می‌تواند ناشی از کم بودن تعداد نمونه در مطالعه قبلی باشد.

به تازگی مطالعاتی در مورد تاثیر نوع برش بر شیوع آندوفتالمیت انجام شده‌اند که در تمامی آن‌ها، شیوع آندوفتالمیت در روش قرنیه شفاف (clear cornea) بیشتر از روش تونل صلبیه‌ای (scleral tunnel) بوده است.^{۱۲-۱۳} در یک مطالعه^{۱۴}، شیوع آندوفتالمیت در روش قرنیه شفاف ۳ برابر روش تونل صلبیه‌ای و در مطالعه دیگر^{۱۵}، شیوع آندوفتالمیت در روش قرنیه شفاف و تونل صلبیه‌ای به ترتیب ۰/۲۹ و ۰/۰۵ درصد بوده است.

در این بررسی و هم‌چنین مطالعه قبلی ما که تمامی بیماران به روش تونل صلبیه‌ای جراحی شده‌اند، شیوع

منابع

- 1- Olson RJ, Mamassis N, Werner L, Apple DJ. Cataract treatment in the beginning of the 21st century. *Am J Ophthalmol* 2003;136:146-154.
- 2- Nordlund ML, Marques DM, Marques FF, Cionni RJ, Osher RH. Techniques for managing common complications of cataract surgery. *Curr Opin Ophthalmol* 2003;14:7-19.
- 3- American Academy of Ophthalmology. In: Complications of cataract surgery. Cataract surgery and intraocular lenses. San Francisco: The Academy; 2002-2003.
- 4- Shingleton BJ, Heltzer J, O'Donoghue MW. Outcomes of phacoemulsification in patients with and without pseudoexfoliation syndrome. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:1080-1086.
- 5- Burato L, Oshen RH. Cataract surgery in complicated cases. Thoroface, NJ: SLACK; 2000.
- 6- Estafanous MFG, Lowder CY, Meisler DM, Chauhan R. Phacoemulsification cataract extraction and posterior chamber lens implantation in patients with uveitis. *Am J Ophthalmol* 2001;131:620-625.
- 7- Shingleton BJ, O'Donoghue MW, Hall PE. Results of phacoemulsification in eyes with preexisting glaucoma filters. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:1093-1096.
- 8- Arbisser LB. Managing intraoperative complications in cataract surgery. *Curr Opin Ophthalmol* 2004;15:33-39.
- 9- Powe NR, Schein OD, Greser SC, Tielsch JM, Luthra R, Javitt J, et al. Synthesis of the literature on visual acuity and complications following cataract extraction with intraocular lens implantation. *Arch Ophthalmol* 1994;112:239-252.
- 10- Chan FM, Mathur R, Ku JJK, Chen C, Chan SP, Yong VS, et al. Short-term outcomes in eyes with posterior capsule rupture during cataract surgery. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:537-541.
- 11- Fishkind W. Complication in phacoemulsification. New York: Thieme; 2002.
- 12- Basti S, Gary P, Reddy MK. Posterior capsule dehiscence during phacoemulsification and manual extracapsular cataract extraction: comparison of outcomes. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:532-536.
- 13- Gimbel HV, Sun R, Ferensowicz M, Penno EA, Kamal A. Intraoperative management of posterior capsule tears in phacoemulsification and intraocular lens implantation. *Am J Ophthalmol* 2001;108:2180-2192.
- 14- Goril Bobery ANS, Villumsen J, Henning V. Retinal detachment after phacoemulsification cataract extraction. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:1333-1338.
- 15- Gimbel HV. Posterior capsule tears using phaco-emulsification: causes, prevention and management. *Eur J Implant Refract Surg* 1990;2:63-69.
- 16- Maloney WF. Advances in small incision cataract surgery. American Academy of Ophthalmology. *Focal Points* 2000;18:1-9.
- 17- Badoza D, Mandy JF, Ganly M. Phacoemulsification using the burst mode. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:1101-1105.
- 18- Chakrabarti A, Singh S, Krishnadas R. Phacoemulsification in eyes with white cataract. *J Cataract Refract Surg* 2000;26:1041-1047.
- 19- Bergwerk KL, Miller K. Outcomes of cataract surgery in monocular patients. *J Cataract Refract Surg* 2000;26:1631-1637.
- ٢٠- جعفری نسب محمد رضا و جوادی محمدعلی. نتایج و عوارض عمل آبمروارید به روش فیکو و خارج کردن هسته در آبمروارید سنی. مجله چشمپزشکی ایران .۱۳۷۹؛۱۲:شماره ۱۸-۱۱.
- 21- Nagaki Y, Hayasaka S, Kadoi C, Matsumoto M, Yanagisawa S, Watanabe K, et al. Bacterial endophthalmitis after small-incision cataract surgery. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:20-26.
- 22- McDonnell PJ, Taban M, Sarayba M, Rao B, Zhang J, Schiffman R, et al. Dynamic morphology of clear corneal cataract incision. *Ophthalmology* 2003;110:2342-2348.
- 23- Cooper BA, Holekamp NM, Bohigian G, Thompson PA. Case-control study of endophthalmitis after cataract surgery comparing scleral tunnel and clear corneal wounds. *Am J Ophthalmol* 2003;136:300-305.