

Late Presentation of Retinoblastoma: a Case Report

Ferdosi AA, MD; Doozandeh A, MD*

Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*Corresponding author: azade_80d@yahoo.com

Purpose: To introduce a case of neglected advanced retinoblastoma.

Case report: A 6 year old girl presented with a large orbital mass enlarging over her cheek on the right side. She underwent exenteration and histopathologic evaluation. A diagnosis of retinoblastoma was made with free margins. This case presents a rare form of retinoblastoma with extensive local progression but no metastasis or CNS involvement.

Conclusion: Although most of the retinoblastoma cases are diagnosed before the age of 3 years, there are neglected cases who present at advanced stages.

Key words: Retinoblastoma, Exentration, Chemotherapy

• Bina J Ophthalmol 2011; 16 (4): 360-363.

Received: 31 March 2010

Accepted: 4 November 2010

معرفی بیمار مبتلا به رتینوبلاستومای پیش‌رفته

دکتر احمدعلی فردوسی^۱ و دکتر آزاده دوزنده^۱

هدف: معرفی بیمار مبتلا به رتینوبلاستوم پیش‌رفته و مراجعه دیرهنگام.

معرفی بیمار: دختر ۶ ساله با توده اربیت از ۶ ماه قبل به درمانگاه چشم بیمارستان امام حسین (ع) مراجعه کرد. با تشخیص احتمالی رتینوبلاستوم و با توجه به وسعت ضایعه، ابتدا شیمی‌درمانی و سپس عمل جراحی برداشت کامل ضایعه (exentration) صورت پذیرفت. تشخیص رتینوبلاستوم در بررسی آسیب‌شناسی تایید شد و حاشیه ضایعه سالم بود.

نتیجه‌گیری: با وجود آن که اغلب موارد رتینوبلاستوم قبل از ۳ سالگی و در مراحل اولیه تشخیص داده می‌شوند، هم‌چنان مواردی از تشخیص دیرهنگام به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌گردد.

• مجله چشم‌پزشکی بینا؛ ۱۳۹۰؛ دوره ۱۶، شماره ۴: ۳۶۳-۳۶۰.

دریافت مقاله: ۱۱ فروردین ۱۳۸۹

تایید مقاله: ۱۳ آبان ۱۳۸۹

• پاسخ‌گو: دکتر آزاده دوزنده (e-mail: azade_80d@yahoo.com)

۱- استادیار- چشم‌پزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویژه در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌گردد. این امر مهم‌ترین علت مرگ و میر بالاتر در این مناطق می‌باشد.^۲

مهم‌ترین تشخیص افتراقی رتینوبلاستوم، رتینوپاتی ارتشاحی یا بیماری Coats می‌باشد که گاهی تمایز آن‌ها از یکدیگر مشکل است. به ویژه در موارد پیش‌رفته تشخیص بر اساس معاينه، سونوگرافی اولتراسوند و سی‌تی اسکن صورت می‌پذیرد. در نهایت تشخیص به وسیله نمونه آسیب‌شناسی تایید می‌گردد.^۳

شایع‌ترین تظاهر بالینی رتینوبلاستوم، بازتاب غیرعادی

مقدمه

رتینوبلاستوم شایع‌ترین بدخیمی داخل چشمی اطفال با شیوع تقریبی ۱ در ۱۵ الی ۲۰ هزار کودک می‌باشد.^۱ رتینوبلاستوم ۱ درصد از موارد مرگ ناشی از سرطان و ۵ درصد از علل نابینایی اطفال را تشکیل می‌دهد.^۲ در ایران حدود ۵۸ درصد موارد رتینوبلاستوم یک‌طرفه و ۴۸ درصد دوطرفه گزارش شده است.^۳


رتینوبلاستوم به طور متوسط در ۲۸ ماهگی تشخیص داده می‌شود^{۴-۶}، اما هم‌چنان مواردی از تشخیص و درمان دیرهنگام به

اطراف گوش (periauricular) لمس شد (تصویر ۱).



تصویر ۱ - توده بزرگ در چشم چپ با تهاجم وسیع به خارج از کره چشم

در مورد بیمار تشخیص افتراقی رتینوبلاستوم، رابdomiosarکوم، توده‌های بافت عصبی و عروقی و تومورهای متاستاتیک مطرح گردید. جهت بررسی بیشتر، بیمار تحت سی‌تی اسکن چشم و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) قرار گرفت (تصویر ۲)، که یک تومور حجمی نامنظم و لبویه در داخل حفره اریبیت و سینوس ماگریالری چپ دیده شد. این توده با تخریب استخوانی و گسترش وسیع خارج چشمی و نیز کلسفیکاسیون همراه بود. اثری از گسترش داخل جمجمه‌ای (intracranial) مشاهده نگردید.




تصویر ۲ - تصویر MRI مقطع و axial

سفیدرنگ از شبکیه یا لوکوکوریا (leukocoria) با فراوانی ۶۴/۸ درصد و به عنوان دومین علامت استرابیسم (۲۸/۲ درصد) مطرح می‌باشد.^۳

در ایران ۴۴/۲ درصد موارد با روش‌های نگهدارنده چشم (glob preserving) درمان می‌شوند. به رغم این امر و با وجود رژیم‌های شیمی‌درمانی جدید، انتخاب اول در موارد پیش‌رفته هم‌چنان تخلیه چشم (enucleation) می‌باشد.^۹ در ایران در ۷۵/۹ درصد از موارد یک‌طرفه، چشم به صورت اولیه تخلیه می‌شود.^۳ میزان بقای پنج ساله در کشورهای پیش‌رفته بیش از ۹۵ درصد می‌باشد. مهم‌ترین عامل خطر عود، رشد خارج چشمی تومور می‌باشد.^۴ در ایران نیز آمار مشابه وجود دارد و بقای ۵ ساله ۸۳/۱ درصد گزارش شده است.^۳

معرفی بیمار

دختر ۶ ساله ساکن اسلامشهر به دلیل لوکوکوریا از ۳ سال قبل و به دنبال بروز توده چشمی از ۶ ماه قبل به درمانگاه چشم بیمارستان امام حسین (ع) مراجعه نمود. در معاینه چشم راست هیچ‌گونه یافته غیرطبیعی مشاهده نشد، اما در چشم چپ یک توده بزرگ با ابعاد ۸×۸×۴ cm با تهاجم وسیع به خارج از کره چشم وجود داشت. هم‌چنان، یک عده لنفاوی بزرگ نیز در ناحیه






تصویر ۳- ۶ ماه بعد از جراحی: پرشدگی نسبی کاسه حدقه توسط بافت گرانولاسیون

با تشخیص احتمالی رتینوبلاستوم و بعد از دو جلسه شیمی درمانی با رژیم .carboplatin و vincristine، etoposide پس از القای بیهوشی عمومی و انجام عمل جراحی، توده به طور کامل به همراه محتویات اربیت از جمله اربیت (total exenteration) خارج گردید. نمونه جهت تایید نهایی و نیز مشاهده حاشیه ضایعه، مورد بررسی آسیب شناسی قرار گرفت (تصویر ۳).


در این بررسی، نکروز بافتی وسیع و نواحی متعدد کلسفیکاسیون مشاهده گردید (تصویر ۴-الف). نواحی نکروزه در کنار ارتضاح سلول های تومورال قرار داشتند و با بزرگنمایی بیشتر (تصویر ۴-ب) سلول های تومورال نیز مشخص شدند.




تصویر ۴- رنگآمیز H&E وجود نواحی نکروز وسیع و کانون های کوچک سلول های تومورال. (الف) بزرگنمایی ۱۰ برابر و (ب) بزرگنمایی ۴۰ برابر

پریوست مشاهده شد. در برش عصب، عدم نفوذ سلول های تومورال به حاشیه و حضور سلول های التهابی ملاحظه گردید تصویر (۵). در عرض ۶ ماه بعد از جراحی، حفره حدقه توسط بافت گرانولاسیون تا حد مناسبی پر شد (تصویر ۳) و برای بیمار بروتزر اربیتال تجویز شد و کودک ظاهر مورد قبولی پیدا نمود.


در برش های دیگر (تصویر ۷) روزت های هومر (Homer rosettes) و فلورت (Fleurette) دیده شد که تشخیص رتینوبلاستوم را تایید نمود. در بررسی حاشیه تومور (تصویر ۶)، بافت تومور در کنار پریوست استخوان قرار داشت. همچنین ارتضاح سلول های التهابی بدون نفوذ سلول های تومورال در ناحیه



تصویر ۷- روزت های هومر و فلورت (رنگآمیزی H&E با بزرگنمایی ۴۰ برابر)



تصویر ۶- ارتضاح سلول های التهابی بدون نفوذ سلول های تومورال در ناحیه بینایی (رنگآمیزی H&E با بزرگنمایی ۲۰ برابر)



تصویر ۵- مقطع عصب بینایی: عدم درگیری عصب بینایی با سلول های التهابی (رنگآمیزی H&E با بزرگنمایی ۴۰ برابر)

می‌گردد که همین عامل نیز علت مرگ‌ومیر بیش‌تر این بیماری در این مناطق می‌باشد.

نتیجه‌گیری

با وجود آن که اغلب موارد رتینوبلاستوم در سنین کمتر از ۳ سال و در مراحل اولیه تشخیص داده می‌شوند، همچنان مواردی از تشخیص دیرهنگام به ویژه در کشورهای در حال توسعه گزارش

منابع

1. Szabo B, Szabo I, Nicula C, Crism D, Crivii C. multiple malignant tumors of the orbit. *Rom J Morphol Embryol* 2009;50:491-495.
2. AAO basic and clinical science course 2004-2005, section 6, page 368.
3. Naseripour M, Nazari H, Bakhtiari P, Modarres-zadeh M, Vosough P, Ausari M. Retinoblastoma in Iran: outcomes in terms of patients' survival and globe survival. *Br J Ophthalmol* 2009;93::28-32.
4. Atchonecysakul LO, Wangsiwaroj C, Uiprasertkul M, Sanpakt K, Thephamongkhol K, Trinvarat A. Prognostic factors and treatment outcomes of retinoblastoma in pediatric patients. *Jpn J Ophthalmol* 2009;53:35-39.
5. Broadus E, Toppan A, Singh AD. Survival with retinoblastoma in USA. *Brd Ophthalmol* 2009;93:24-27.
6. Vahedi A, Lumbroso-Le Rovic L, Levy Gabriel C, Doz F, Aerts L, Brisse H, et al. Differential diagnosis of retinoblastoma. *J Fr Ophthalmol* 2008;31:165-172.
7. Forl B, Schmaack I, Grossniklaus HE, Rohrschnelder Kl. Coat's disease, important differential diagnosis for retinoblastoma. *Ophthalmology* 2008;105:761-764.
8. Mallipatna AC, Sutherland JE, Gallie BL, Chan H, Heon E. Management and outcome of unilateral retinoblastoma. *J AAPOS* 2009;13:546-550.
9. Doz F. Retinoblastomas are view. *Arch Pedatr* 2006;13:1329-1337.
10. Kim H, Lee DW, Kang HJ, Park HJ, Kim YY, Yu Ys, et al. Clinical results of chemotherapy based treatment in retinoblastoma patients: a single control experience. *Cancer Res Treat* 2008;40:164-171.