

مقایسه ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم و بzac در بیماران مبتلا به دیابت نوع I

علی اکبر ملکی راد (M.Sc)، علی فانی^{*} (MD)، سید محمدعلی شریعتزاده (Ph.D)، اکرم رنجبر (M.Sc) دانشگاه علوم پزشکی اراک، گروه فیزیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: دیابت یکی از مهم‌ترین بیماری‌های شایع مزمن است که آمار جهانی آن از جمله در ایران رو به افزایش است. این بیماری چهارمین عامل مرگ و میر در اغلب کشورهای توسعه یافته است. از طرف دیگر تضعیف سیستم دفاع آنتیاکسیدانی می‌تواند منجر به بیماری‌های مختلف از جمله دیابت شود؛ که در این پژوهش ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم و بzac در بیماران دیابتی نوع I در مقایسه با گروه کنترل، جهت ارزش تشخیصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی - تحلیلی است که افراد تحت مطالعه ۴۲ نفر از بیماران دیابتیک نوع I مراجعه کننده به مرکز دیابت اراک به عنوان گروه مورد، با ۴۲ نفر گروه شاهد که از لحاظ سن و جنس و سایر معیارهای ورود با افراد مورد همتا بودند مقایسه شدند. ظرفیت آنتیاکسیدانی در سرم و بzac این افراد با استفاده از روش FRAP (Ferric reducing ability of plasma) اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار ($Mean \pm SD$) ظرفیت تام آنتیاکسیدانی سرم و بzac در افراد مورد به ترتیب $2/51 \pm 0/088$ ، $2/73 \pm 0/072$ و در افراد شاهد به ترتیب $1/97 \pm 0/090$ ، $2/9 \pm 0/107$ بود.

نتیجه‌گیری: کاهش ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم گروه مورد از لحاظ آماری معنی‌دار بود، ولی کاهش ظرفیت آنتیاکسیدانی تام بzac معنی‌دار نبود. به عبارت دیگر در این افراد تولید رادیکال‌های آزاد که احتمالاً می‌تواند زمینه‌ساز بیماری باشد افزایش یافته و بنابراین سیستم دفاع آنتیاکسیدانی تضعیف شده است، که برای کاهش آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد توصیه می‌شود این افراد آنتیاکسیدان‌های طبیعی بیشتری مصرف نمایند.

واژه‌های کلیدی: رادیکال‌های آزاد، آنتیاکسیدان، دیابت

پیش آید این حالت را استرس اکسیداتیو گویند [۵]. پارهای از مطالعات نشان می‌دهد که احتمالاً استرس اکسیداتیو می‌تواند عامل ایجاد بیماری‌های مختلف از جمله دیابت باشد [۱۵]. از طرف دیگر دیابت یکی از مهم‌ترین بیماری‌های شایع مزمن است که آمار جهانی آن از جمله در ایران رو به افزایش است [۱۶، ۱۷]. این بیماری چهارمین علت اصلی مرگ و میر در اغلب کشورهای توسعه یافته است [۸] و آمار آن تا سال ۲۰۱۰ در سرتاسر جهان به دو برابر می‌رسد [۱۴]. ماتیوسی در سال ۲۰۰۱ در مطالعه‌ای تحت عنوان وضعیت

مقدمه

رادیکال‌های آزاد، اتم‌ها یا مولکول‌هایی هستند که به خاطر وجود الکترون تک در بدن موجودات، بسیار واکنش پذیرند و آسیب‌های زیادی را به ماکروملکول‌های بدن جانداران همانند DNA، پروتئین‌ها، لیپیدها و کربوهیدرات‌ها وارد می‌سازند. در بدن سیستم‌های خاصی برای مقابله با آسیب‌های حاصل از رادیکال‌های آزاد وجود دارد که به نام سیستم دفاع آنتیاکسیدانی معروفند [۶]. زمانی که عدم تعادل در میزان تولید رادیکال‌های آزاد و سیستم دفاع آنتیاکسیدانی

* نویسنده مسئول. تلفن: ۰۸۶۱-۲۲۲۱۷۰۶، نامبر: ۰۸۶۱-۲۲۲۱۷۰۶ E-mail: iman_fany@yahoo.com

www.SID.ir
تاریخ دریافت: ۸۴/۸/۲۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۵/۱۱/۸۴

با مخلوط کردن ۲۵ میلی‌لیتر بافر استات MM ۳۰۰ با PH=۳/۶ ۳/۱ گرم استات سدیم و ۱۶ میلی‌لیتر اسید استیک گلاسیال در لیتر) و ۲/۵ میلی‌لیتر کلرید فریک و ۲/۵^{cc} میلی‌لیتر محلول TPTZ در ۰/۰۸ (، گرم ماده TPTZ در ۲/۵^{cc} اسید کلریدریک)، محلول FRAP تهیه شد و سپس ۱/۵ میلی‌لیتر از محلول FRAP آماده، در لوله آزمایش ریخته و ۵۰ میکرولیتر از نمونه پلاسما به آن‌ها اضافه گردید و سپس شدت رنگ حاصل در طول موج ۵۹۳^{nm} در مقابل بلانک (H₂O) ۵۰ μ (۱/۵^{cc} FRAP + ۰.۵^{cc}) خوانده شد. محلول استاندارد از سولفات آهن با غلظت ۱^{mM} تهیه و از آن دقت سریال تهیه گردید و در نهایت بر اساس غلظت‌های مختلف استاندارد و میزان جذب خوانده شده، منحنی استاندارد رسم شد و مقادیر غلظت نمونه‌های پلاسما از روی منحنی محاسبه گردید.

روش کار. این مطالعه از نوع مقطعی - تحلیلی است. جامعه مورد پژوهش افراد مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر اراک و کلینیک‌های خصوصی بودند، که از میان آن‌ها ۴۲ نفر (۲۲ مرد و ۲۰ زن)، در محدوده سنی ۶ الی ۳۷ سال که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند به روش تصادفی آسان به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. معیارهای ورود به این بررسی شامل کسانی بود که به مدت حداقل ۲ سال سابقه دیابت داشته، سابقه مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل نداشته و با توجه به تشخیص پزشک متخصص بیماری مزمن دیگری نداشته باشند و مبتلا به عوارض بیماری نباشند. گروه شاهد ۴۲ نفر از افراد سالمی که سابقه مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل و همچنین بیماری خاص نداشتن و از نظر قدر ناشتا (FBS) و قند دو ساعت بعد از Two hour post pradial (2hrpp) نرمال بودند و از لحاظ سن و جنس با گروه مورد همتا شدند. حجم نمونه بر اساس $a = 0.5$, $\alpha = 0.05$, $Power = 0.80$ و $\delta = 0.20$ با استفاده از فرمول مقایسه میانگین‌ها، ۴۲ نفر تعیین شد. پس از تکمیل پرسش‌نامه از لحاظ داشتن معیارهای ورود از افرادی که معیارهای ورود به

آنتی اکسیدانی تام و کلسیفیه شدن سرخرگ کرونر در دیابت نوع I که بر روی ۴۸ فرد با دیابت نوع I و ۲۵ فرد غیر دیابتی صورت گرفت گزارش کرد که وضعیت آنتی اکسیدانی تام در افراد دیابتی نوع I در مقایسه با افراد غیر دیابتی کاهش می‌یابد [۱۱]. جیاپیر و همکاران در سال ۲۰۰۲ در مطالعه‌ای تحت عنوان افزایش سریع استرس اکسیداتیو و کاهش دفاع آنتی اکسیدانی در بیماران دیابتی نوع I بدون عارضه، که بر روی ۳۷ بیمار و ۲۹ فرد کنترل صورت گرفت، گزارش نمودند که بیماران دیابتیک، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای کم‌تری دارند [۱۰]. مطالعه دیگری تحت عنوان ویژگی تمایز آنتی اکسیدان بزاق انسان در سال ۲۰۰۰ توسط نگلر بیان گر این بود که بزاق، سیستم دفاع آنتی اکسیدانی دارد و محیط دهان و دستگاه گوارش را در برابر آسیب اکسیداتیو در تمام طول روز و شب محافظت می‌کند [۱۳]. با توجه به شیوع بالای دیابت، عوارض جبران‌ناپذیر آن و این‌که به نظر می‌رسد یکی از علل احتمالی ایجاد آن می‌تواند تضعیف سیستم دفاع آنتی اکسیدانی باشد و از سوی دیگر با توجه به نقش میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و بزاق در بیماران دیابتیک و نامشخص بودن ارزش تشخیصی این دو عامل در بیماری دیابت، ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و بزاق نیازمند تحقیقات بیش‌تری در این زمینه است؛ لذا هدف این پژوهش در ابتدا مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و بزاق با توجه به نتایج مختلفی که در این زمینه صورت گرفته است می‌باشد. از آن‌جا که تاکنون در ایران مطالعه‌ای در این زمینه انجام نگرفته است ما به بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی سرم و بزاق افراد دیابتی پرداختیم.

مواد و روش‌ها

مواد. اسید کلریدریک (Merck)، استات سدیم (Merck)، اسید استیک گلاسیال (Merck)، کلرید آهن (Merck)، سولفات آهن (Merck) و (Merck) TPTZ

Mann Whitney U برای اختلاف میانگین‌ها استفاده گردید. لازم به ذکر است شرکت کلیه افراد در پژوهش آگاهانه بوده و محققین در کلیه مراحل پژوهش، متعهد به رعایت اصول اخلاقی پژوهش بودند.

نتایج

یافته‌ها نشان داد که در این افراد مقایسه میانگین ظرفیت آنتی اکسیدان‌های تام پلاسمای (براساس Mean \pm SD) افراد مورد با افراد شاهد اختلاف معنی‌داری بین این دو گروه (P=0.025) نشان داد و از طرف دیگر مقایسه میانگین ظرفیت آنتی اکسیدان‌های تام بزاق افراد مورد با افراد شاهد با استفاده از آزمون Mann Whitney U اختلاف معنی‌داری بین این دو گروه نشان نداد.

مطالعه را داشتند، ۵۰ خون وریدی 100 بزاق گرفته شد و هر FRAP (Ferric reducing ability of plasma) از نظر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام مورد ارزیابی قرار گرفتند. این روش بر اساس توانایی پلاسمای بزاق در احیای یون‌های Fe^{2+} (فریک) به Fe^{3+} (فرو) در حضور ماده‌ای به نام TPTZ (Tripyridyl Striazine) که به عنوان معرف مورد استفاده قرار می‌گیرد استوار است، که نتیجه آن کمپلکس آبی رنگ $Fe^{+2} - TPTZ$ با ماکریسم جذب ایجاد می‌کند. میزان قدرت احیاکنندگی سرم یا بزاق از طریق افزایش غلظت کمپلکس فوق توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری مدل ۷۸۰ jasco uv-visible اندازه‌گیری شد [۳]. محاسبات آماری پس از جمع آوری داده‌ها و با استفاده از برنامه SPSS و آزمون‌های آمار توصیفی مانند میانگین، SD (اختلاف استاندارد) و آمار تحلیلی از طریق

جدول ۱. مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی بزاق و سرم در دو گروه مورد و شاهد

Pvalue	گروه شاهد (n = ۴۲) Mean \pm SD	گروه مورد (n = ۴۲) Mean \pm SD	پارامتر استرس اکسیداتیو
0.025	۲/۹۵ \pm /۱۰۷ a	۲/۵۱ \pm /۰۸۸ b	ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای بر حسب میکرومول در میلی لیتر
NS	۱/۹۷ \pm /۰۹۰ C	۱/۷۳ \pm /۰۷۲ C	ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق بر حسب میکرومول در میلی لیتر

دیابت نوع II درمان شده با انسولین انجام گرفت و مشخص شد که در افراد دیابتی، فعالیت SOD و غلظت TBARS مواد واکنش دهنده با تیوباریتوريک اسید (افزایش می‌باید و مقدار GSH و آلفاتوكوفروفول کاهش می‌باید [۱۸]. الیزابت و همکاران در سال ۲۰۰۰ با مطالعه بر روی ۷۳ بیمار دیابتی ۲۴ نفر نوع I و ۴۹ نفر نوع II و ۲۶ نفر به عنوان گروه کنترل گزارش نمودند که فعالیت آنتی اکسیدان‌های آنزیمی سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GSH-PX) در بیماران دیابتی به طور معنی‌داری پایین‌تر است [۵]. مطالعه دیگری که توسط ماتیوسی در سال ۲۰۰۱ تحت عنوان وضعیت تام آنتی اکسیدانی و کلیسیفیه شدن سرخرگ کرونر در دیابت نوع I که بر روی ۴۸ فرد با دیابت نوع I و ۲۵ فرد غیر دیابتی صورت گرفت، گزارش نمود که وضعیت آنتی اکسیدانی تام در افراد دیابتی نوع I در مقایسه با

بحث و نتیجه‌گیری

براساس اطلاعات مندرج در جدول ۱ میانگین آنتی اکسیدان‌های تام سرم در گروه مورد اختلاف معنی‌داری را بین گروه مورد و شاهد نشان داد.

بررسی آنتی اکسیدان‌های تام سرم. هارتنت و همکاران در مطالعه‌ای تحت عنوان نشانه‌های استرس اکسیداتیو سرم و رتینویاتی شدید در دیابتی‌ها، گزارش کردند که در افراد دیابتی مواد واکنش دهنده با تیوباریتوريک اسید (Thiobarbitaric acid reactive substance) TBARS افزایش و میزان سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) Superoxide dismutase (GSH-PX) و گلوتاتیون پراکسیداز (Glutathione peroxidase) کاهش می‌باید [۸]. مطالعه دیگری توسط سکورکنی و همکاران در سال ۲۰۰۲ تحت عنوان پارامترهای استرس اکسیداتیو در دیابت نوع I و II

افراد دیابتی به رژیم غذایی حساس بوده و آنتیاکسیدان‌های بیشتری مصرف می‌کرند و احتمالاً این، دلیل مغایرت مطالعه ما با مطالعات مذکور است.

بررسی آنتیاکسیدان‌های تام بزاق. بر اساس اطلاعات مندرج در جدول ۱، میانگین میزان آنتیاکسیدان‌های تام بزاق در افراد دیابتی نوع I در مقایسه با گروه شاهد معنی‌دار نبود. پاتینو و همکاران در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۲ تحت عنوان ظرفیت آنتیاکسیدانی بزاق؛ گزارش کردند که بزاق می‌تواند یک سیستم دفاعی در برابر رادیکال‌های آزاد و استرس اکسیداتیو ایجاد نماید [۲]. مطالعه دیگری که توسط نگلر و همکاران در سال ۲۰۰۲ تحت عنوان ویژگی متمایز آنتیاکسیدان بزاق انسان گزارش نمودند، که بزاق سیستم دفاع آنتیاکسیدانی دارد و محیط دهان و دستگاه گوارش را در برابر آسیب اکسیداتیو در تمام طول روز و شب محافظت می‌کند [۳]. آنالیزیرو در سال ۲۰۰۳ در مطالعه‌ای تحت عنوان ظرفیت آنتیاکسیدانی تعدادی از مایعات بدن انسان گزارش کرد که ظرفیت آنتیاکسیدانی تام بزاق در محدوده سنی خاص از ظرفیت آنتیاکسیدانی پلاسما بیش‌تر است [۲۰]. آستانی و همکاران در مطالعه وضعیت آنتیاکسیدانی بزاق و سرم بیماران دیابتی گزارش نمودند که ظرفیت آنتیاکسیدانی بزاق بیماران دیابتی نوع I بالاتر از گروه کنترل است [۱]. روزوسکی و همکاران در سال ۲۰۰۱ در مطالعه‌ای تحت عنوان اختلاف در میزان آنتیاکسیدان‌های پلاسما براساس سطح اقتصادی - اجتماعی زنان اسکاتلند که بر روی ۸۱ زن انجام شد نتیجه گرفتند که میزان آنتیاکسیدان‌های افراد با سطح اجتماعی - اقتصادی پائین‌کم‌تر از افرادی است که سطح اجتماعی - اقتصادی بالاتری دارند [۱۶]. دوو و همکاران در سال ۱۹۹۷ در مطالعه‌ای تحت عنوان ظرفیت آنتیاکسیدانی تام پلاسما در جمعیت هنگ کنگ که بر روی ۷۷۸ نفر ۳۶۷ نفر مرد و ۳۶۱ نفر زن) انجام دادند، گزارش کردند که مقدار متوسط ظرفیت آنتیاکسیدانی این افراد $1/78 \pm 0/18$ میلی‌مول در لیتر و مقدار متوسط آنتیاکسیدانی مردان بیش‌تر از زنان بود [۱۹]. نتایج پژوهش ما نشان می‌دهد که همسو بودن کاهاش ظرفیت

گروه کنترل کاهاش می‌باید [۱۱]. جیامپیرو و همکاران در سال ۲۰۰۲ در مطالعه‌ای تحت عنوان افزایش سریع استرس اکسیداتیو و کاهاش دفاع آنتیاکسیدانی در بیماران دیابتی نوع I بدون عارضه که بر روی ۳۷ بیمار و ۲۹ فرد کنترل صورت گرفت، گزارش نمودند که بیماران دیابتیک ظرفیت آنتیاکسیدانی تام پلاسمای کم‌تری دارند [۱۰]. نتایج مطالعه ما با نتایج ذکر شده مطابقت دارد. بهنظر می‌رسد در افراد دیابتی استرس اکسیداتیو افزایش می‌باید و سیستم دفاع آنتیاکسیدانی تضعیف می‌شود، لذا آنتیاکسیدان‌های تام پلاسمای پایین است. مطالعه‌ای تحت عنوان جذب غذایی و سطوح ویتامین‌های آنتیاکسیدانی پلاسما در دیابتی‌های مسن کره‌ای توسط Kim و همکارانش در سال ۲۰۰۴ انجام گرفت که در این مطالعه وضعیت آنتیاکسیدان بین افراد دیابتی و افراد مسن سالم از طریق تعیین میزان ویتامین‌های آنتیاکسیدان رژیم غذایی، سطوح آنتیاکسیدان پلاسما و وضعیت آنتیاکسیدان تام، افراد سالم (گروه کنترل) ۹۶ فرد پیر سالم بودند. در این مطالعه مشخص شد که در افراد دیابتی، متوسط ویتامین A و جذب بتاکاروتون از رژیم غذایی به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه افراد سالم (گروه کنترل) ۶۰ سال و افراد دیابتی شد. افراد دیابتی ۱۲۲ بیمار مسن بالاتر از ۶۰ سال و افراد سالم (گروه کنترل) ۹۶ فرد پیر سالم بودند. در این مطالعه مشخص شد که در افراد دیابتی، متوسط ویتامین C پلاسما، سطح بتاکاروتون و سطح TBARS بین دو گروه مورد و شاهد نبود اما ویتامین‌های A، E و سطح آنتیاکسیدان‌های تام پلاسما در افراد دیابتی به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه کنترل است. به‌هر حال نتایج نشان داد که بیماران دیابتی سطح آنتیاکسیدانی بالاتری از گروه کنترل دارند [۹]؛ که به‌عنوان شاخص بهبودی نسبی محسوب می‌گردد.

در مطالعه‌ای تحت عنوان ظرفیت آنتیاکسیدانی تام و سطوح فاکتور رشد اپی‌درمی و نیتریک اسید (NO) در خون و بزاق بیماران دیابتی وابسته به انسولین که در سال ۲۰۰۵ بر روی ۱۹ بیمار دیابتی نوع I و فرد سالم به‌عنوان گروه کنترل صورت گرفت، مشخص شد که قدرت آنتیاکسیدان تام سرم بیماران دیابتی بالاتر از گروه شاهد بود [۱]. نتایج مطالعه ما با یافته‌های اخیر مغایرت دارد. با توجه به نظر کیم [۹]

of epidermal growth factor and nitric oxide in blood and saliva of insulin dependent diabetic patients. *Arch Med Res*, 2005; 36(4):376-81.

[2] Battino M, Ferreiro MS, Gallardo I, Newman HN, Bullon P. The antioxidant capacity of saliva. *J Clin Periodontol*, 2002; 29(3):189-94.

[3] Benzi IF, Strain S. Ferric reducing antioxidant assay. *Methods Enzymol*, 1999; 292:15-27.

[4] Chapple IL, Mason GI, Garner I, Matthews JB, Thorpe GH, Maxwell SR, et al. Enhanced chemiluminescent assay for measuring the total antioxidant capacity of serum, saliva and crevicular fluid. *Ann Clin Biochem*, 1997; 34 (Pt 4):412-21.

[5] Cochrane CG. Cellular injury by oxidants. *Am J Med*, 1991; 92:235-305.

[6] Halliwell B. Antioxidant characterization. Methodology and mechanism. *Biochem Pharmacol*, 1995; 49(10):1341-8.

[7] Hartnett ME, Stratton RD, Browne RW, Rosner BA, Lanham RJ, Armstrong D. Serum markers of oxidative stress and severity of diabetic retinopathy. *Diabetes Care*, 2000; 23(2):234-40.

[8] International Diabetes Federation – WDD 2004. Available from: www.idf.org/home/index.cfm?Unode=A4EE58E4-B60F-4C85-B974-9BFFF-722A96.

[9] Kim JH, Kim MJ. Dietary intakes and plasma antioxidant vitamins levels in Korea elderly with diabetes. *Asia Pac J Clin Nutr*, 2004; 13(Suppl):S152.

[10] Marra G, Cotroneo P, Pitocco D, Manto A, Di Leo MA, Ruotolo V, et al. Early Increase of oxidative stress and Reduced Antioxidant Defenses in patients with uncomplicated Type 1 Diabetes. *Diabetes Care*, 2002; 25(2):370-5.

[11] Matteucci E, Giampietro O. Oxidative stress in families of type 1 diabetic patients: further evidence. *Diabetes Care*, 2001; 24(1):167-8.

[12] McCraty R, Atkinson M, Conforti K. Heart rate variability, hemoglobin A1C, and psychological health in type 1 and 2 diabetes following an emotional self-management program. Proceeding of the Society of Behavioral Medicine 20th Annual Scientific Sessions, San Diego, California, 1999; [abst].

[13] Nagler RM, Klein I, Zarzhevsky N, Drigues N, Reznick AZ. Characterization of the differentiated antioxidant profile of human saliva. *Free Radic Biol Med*, 2002; 32(3):268-77.

[14] Renders CM, Valk GD, Griffin SJ, Wagner EH, Eijk Van JT, Assendelft WJ. Interventions to improve the management of diabetes in primary care, outpatient, and community settings: a systematic review. *Diabetes Care*, 2001; 24(10):1821-33.

[15] Rodrigues, B, Poucherset P, Battell ML, McNeill JH. Streptozotocin-induced diabetes: induction, mechanism(s), and dose dependency. In: *Experimental Models of Diabetes*. McNeill JH. Boca Raton, LA (editors): CRC, 1999. p. 6-7.

[16] Rozowski J, Cuevas A, Castillo O, Marin PP, Strobel P, Perez DD, et al. Differences in plasma antioxidants according to socioeconomics level in Chilean women. *Rev Med Chil*, 2001; 129(1):43-50.

[17] Rubin RR, Peyrot M. Quality of life and diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*, 1999; 15(3):205-18.

[18] Seghrouchni I, Drai J, Bannier E, Riviere J, Calmard P, Garcia I, et al. Oxidative stress parameters in type I, type II and insulin-treated type 2 diabetes mellitus; insulin treatment efficiency. *Clin Chim Acta*, 2002; 321(1-2):89-96.

[19] Woo J, Leung SS, Lam CW, Ho SC, Lam TH, Janus ED. Plasma total antioxidant capacity in an adult Hong Kong Chinese population. *Clin Biochem*, 1997; 30(7):553-7.

[20] Ziobro A, Bartosz G. A comparison of the total antioxidant capacity of some human body fluids. *Cell Mol Biol Lett*, 2003; 8(2):415-9.

آنتی اکسیدانی سرم و بزاق (علی‌رغم معنی‌دار نبودن آن در بزاق) با نظرات دانشمندان در خصوص این‌که یکی از عوامل ایجاد کننده دیابت می‌تواند تضعیف سیستم آنتی اکسیدانی باشد مطابقت دارد. به عبارت دیگر ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و بزاق در این بیماران کاهش پیدا کرده است.

از طرف دیگر شرایط فیزیولوژیک فرد، اختصاصات نزادی از جمله HLA و مقدار انسولین مصرفی می‌تواند میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی را دست‌خوش تغییر نماید که در افراد و نزادهای مختلف متفاوت است که باعث تغییر در میزان آنتی اکسیدان‌های این افراد می‌شود. در مجموع این عوامل بالا باعث بالا رفتن ظرفیت آنتی اکسیدانی بیماران دیابتی نسبت به گروه شاهد شده است.

ترکیب شیمیایی و میزان کمی و کیفی آنتی اکسیدان‌های بزاق و پلاسمای متفاوت است [۴]؛ از طرف دیگر علاوه بر این‌که بزاق به عنوان اولین خط دفاعی در برابر رادیکال‌های آزاد می‌باشد، مراحلی از جویدن و هضم غذای خورده شده باعث ایجاد انواعی از واکنش‌ها از جمله پراکسیداسیون لیپیدی می‌شود که از این جهت نیز وضعیت آنتی اکسیدانی سرم و بزاق متفاوت می‌شود [۲].

لازم به ذکر است توجه به پیش‌گیری اولیه و ثانویه این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. چنان‌که نتایج مطالعه ما نشان داد، تضعیف سیستم آنتی اکسیدانی می‌تواند از عوامل ایجاد کننده بیماری باشد لذا می‌توان با توصیه به افراد سالم جهت تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی از ایجاد بیماری جلوگیری کرد (پیش‌گیری اولیه) و در بیماران نیز با تقویت این سیستم از عوارض ناشی از بیماری جلوگیری نمود.

در پایان پیشنهاد می‌گردد که جهت ارزش تشخیصی و با توجه به این‌که آنتی اکسیدان‌های محلول در بزاق می‌تواند نقش مهمی در پیش‌گیری دیابت داشته باشد، لذا تحقیقات گستره‌ای را در این زمینه می‌طلبند.

منابع

- [1] Astaneie F, Afshari M, Mojtabaei A, Mostafalou S, Zamani MJ, Larijani B, et al. Total antioxidant capacity and levels