

کارآزمایی بالینی آرامسازی پیش‌رونده عضلانی بر علائم حیاتی بیماران

سکته قلبی

فلاح الدین محمدی^۱(M.Sc)، فضل... احمدی^۲(Ph.D)، ابراهیم نعمتی پور^۳(M.D)، سقراط فقیه‌زاده^۳(Ph.D)

۱- دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری

۲- دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه قلب و عروق، بیمارستان امام خمینی (ره)

۳- دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آمار حیاتی

چکیده

سابقه و هدف: نکروز حاد میوکارد یک واقعه تهدید کننده حیات است و در مرحله حاد، تعداد زیادی از بیماران و خانواده آن‌ها، تنفس روانی شدید و به خصوص اضطراب که در تغییر علائم حیاتی نقش قابل توجهی دارد را تجربه می‌کند. در روزهای اولیه پس از انفارکتوس بسیاری از بیماران واقعاً نگران بوده و اوضاع همودینامیکی متغیری دارند. مواد و روش‌ها: این تحقیق یک تحقیق نیمه تجربی است که به منظور بررسی تأثیر آرامسازی پیش‌رونده عضلانی بر علائم حیاتی در بیماران سکته قلبی انجام شده است. تعداد کل نمونه‌ها، ۷۶ بیمار مبتلا به سکته قلبی بودند که به منظور جلوگیری از در معرض بودن نمونه‌ها، ابتدا نمونه‌های گروه آزمون، مورد مداخله و مطالعه قرار گرفتند و سپس نمونه‌های گروه شاهد مورد بررسی واقع شدند. مداخله انجام شده در گروه آزمون عبارت بود از روش آرامسازی پیش‌رونده عضلانی که به مدت سه روز و هر روز دو جلسه انجام می‌شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و جدول ثبت علائم حیاتی بود.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که استفاده از آرامسازی پیش‌رونده عضلانی باعث کاهش تعداد تنفس در بیماران سکته قلبی می‌شود ($P=0.03$)، ولی بر میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و تعداد نبض تأثیر معنی دار آماری ندارد. نتیجه‌گیری: از آن‌جا که آرامسازی پیش‌رونده عضلانی به طور معنی‌داری موجب کاهش تعداد تنفس در بیماران سکته قلبی شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که، این روش از طریق کاهش تنفس در تعديل تنفس مؤثر بوده و در سایر معیارها نیز اگرچه سیر کاهشی داشته اما از نظر آماری تفاوت معنی‌دار مشاهده نشده است.

واژه‌های کلیدی: آرامسازی پیش‌رونده عضلانی، سکته قلبی، علائم حیاتی

کرونا قلب می‌تواند به دلیل تلاش برای پیش‌گیری اولیه و کاهش میزان عوامل خطرزا به خصوص کاهش مصرف سیگار و تغییرات مفید در عادات غذایی باشد [۱].

مطالعات، نشان می‌دهد، اختلالات قلبی عروقی از جمله بیماری‌هایی است که همواره برای مبتلایان به آن تهدید کننده و خطرزا است. امروزه دومین علت مرگ پس از مرگ و میر

مقدمه

بیماری عروق کرونر قلب هنوز هم علت اصلی مرگ در اکثر کشورهای مدرن و صنعتی است. اگرچه اطلاعات نشان می‌دهند که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونر قلب در حال کاهش است. این کاهش در مرگ و میر ناشی از بیماری

* نویسنده مسئول. تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۱۱۰۰۱، داخلى ۳۵۵۳، نماير: ۰۲۱-۸۸۰۱۳۰۳۰، E-mail: ahmadif@modares.ac.ir

روش‌های متنوعی جهت کنترل اضطراب وجود دارد. Clouski و Belchek سه مداخله پرستاری را در کاهش تنفس، مؤثر می‌دانند: ۱- آموزش به بیمار و شناساندن نکات تنفس آور؛ ۲- استفاده از تکنیک‌های آرامسازی و ۳- موسیقی درمانی [۶].

بنابراین بدیهی است که کنترل اضطراب و برقراری آرامش روحی و روانی در بیماران مبتلا به مشکلات قلب و عروق کرونر اقدام مؤثری در جهت درمان و بهبودی این گونه بیماران است. به طوری که ایجاد آرامش، از فعالیت بیش از حد قلب کاسته و از این طریق می‌تواند مؤثر باشد. برونو ده قلبی، به هنگام آرامشِ کامل پایین می‌آید که خود نشان دهنده کاهش بار وارده بر قلب است. قلب هیچ‌گاه نمی‌تواند کاملاً استراحت کند، اما کار کردن مداوم و بیش از اندازه این عضو به هر دلیل، مثلًاً ورزش یا هیجان مداوم، می‌تواند برای آن زیان آور باشد [۷]. در این میان اهمیت نقش و مهارت پرستاران در کاهش اضطراب و در نهایت جلوگیری از تشدید بیماری‌های قلبی توسط آنان، بیش از پیش مشخص می‌گردد. در واقع یادگیری مهارت‌های کاهش و رفع نگرانی از موارد بسیار مهمی است که پرستار بخش ویژه قلبی باید با نهایت دقیقت و تلاش در فراغیری آن کوشیده و در اجرای آن نیز حوصله و دقیقت خود را به کار گیرد. پرستار بخش ویژه به دلیل کار کردن در محیطی حیاتی، نیاز به مهارت‌های خاص دارد. او باید قادر به شناسایی تغییرات عاطفی در بیمار و خانواده وی باشد [۸].

انجام هرکدام از روش‌های غیردارویی به تنها یی و یا توأم، بر کاهش فشارخون سیستول و دیاستول مؤثر است. بهره‌حال به کارگیری روش‌های غیردارویی در درمان فشارخون خفیف تا متوسط می‌تواند به عنوان انتخاب اول به کار برده شود [۹]. در سال‌های اخیر مقبولیت استفاده از درمان‌های تکمیلی در سیستم بهداشتی افزایش یافته است. Hill (۱۹۹۳) پیشنهاد کرد که درمان‌های تکمیلی می‌توانند از دو جنبه مورد توجه باشند؛ اولاً، می‌توان آن‌ها را به عنوان عوامل روانی بهبودی به منظور ایجاد درجاتی از آرامش و راحتی در موقعیت‌های پرتنش به کار برد و ثانیاً می‌توان برای تسهیل رابطه درمانی بین

ناشی از حوادث و سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی است. بیمار دچار افخارکتوس حاد میوکارد، عفریت مرگ را به عینه رودرروی خود می‌بیند و به شدت نگران است و هم وجود او و هم نزدیکانش را تهدید می‌کند [۲].

تنش‌های روحی روانی، اغلب اختلالات طبی متفاوتی را ایجاد می‌کند و سهم عمدہ‌ای در ایجاد هزینه‌های درمانی از طریق آزمایشات تشخیصی و معاینات دوره‌ای را سبب می‌گردد. از جمله عواقب بروز تنفس در فرد، می‌توان به افزایش ضربان قلب اشاره نمود که این خود موجب تشدید علایم در فرد مبتلا به آنژین صدری می‌گردد. افزایش ضربان قلب موجب افزایش نیاز اکسیژن میوکارد و کوتاه شدن به نسبت بیش‌تر دیاستول نسبت به سیستول می‌شود و به این ترتیب کل زمان خون‌رسانی موجود در دقیقه کاهش می‌یابد [۳].

افرادی که دچار حمله قلبی، سکته و یا تاراحتی و درد قلبی گردیده‌اند، نیاز به تقویت روحیه و کنترل تنیدگی دارند، که دست‌یابی به این هدف مهم مستلزم کاهش سطح تنفس آنان به روش‌های مختلف می‌باشد. زیرا بیماری‌های قلبی عروقی یک رخداد ویران کننده است و بیمار و اطرافیانش را به وحشت می‌اندازد، به نحوی که به حمایت جهت سازگاری با چنین موقعیت مصیبت‌باری دارند. پرستاری از این بیماران باید به همراه یک تماس مثبت با بیمار و خانواده‌اش باشد [۴].

تنفس، سبب افزایش سرعت ضربان قلب و فشار بطن چپ می‌شود که در نتیجه، نیاز عضله قلب به اکسیژن افزایش می‌یابد. افزایش نیاز عضله قلب به اکسیژن، فرآیند ایسکمی و نکروز میوکارد را افزایش می‌دهد. اضطراب از طریق ایجاد آریتمی می‌تواند باعث مرگ بیمار شود. بیمار به علت اضطراب دچار کم‌خوابی می‌شود. هم‌چنین اضطراب سبب کاهش قدرت تمرکز و تفکر شده و خود این امر از میزان تأثیر آموزش‌های پرستاران در بیماران می‌کاهد. بیماری که مضطرب است، نقش کم‌تری در امر مراقبت از خود به عهده می‌گیرد و مدت بیش‌تری در بیمارستان اقامت می‌کند، که این امر هزینه درمان او را افزایش می‌دهد [۵].

تنفس می‌باشد، که با استفاده از نظر ده نفر از اساتید دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران نسبت به تعیین اعتبار محتوای پرسشنامه طراحی شده اقدام و اصلاحات لازمه صورت گرفت. در مورد صحت کنترل علائم حیاتی از ضریب همبستگی بین مشاهده‌گرها استفاده شد که با $r = 0.86$ مورد تأیید قرار گرفت. از آنجا که این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی می‌باشد، برای جلوگیری از احتمال تماس نمونه‌های دو گروه و تأثیر احتمالی آن‌ها بر یک‌دیگر، به‌طور تصادفی، ابتدا نمونه‌های گروه آزمون مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و پس از رسیدن تعداد نمونه‌های گروه آزمون به حد نصاب، نمونه‌گیری و بررسی گروه شاهد انجام شد.

تعداد نمونه با استفاده از جدول آلتمن و فرمول تفاوت استاندارد محاسبه گردید. بر اساس مطالعه مقدماتی ($S = 11$) و با در نظر گرفتن پذیرش تفاوت بالینی در حد ده امتیاز، از نظر محقق اختلاف استاندارد محاسبه شد و طبق جدول آلتمن، با اطمینان ۹۵٪ و توان ۸۰٪ تعداد ۳۸ نمونه در هر گروه به دست آمد.

معیارهای ورود به مطالعه.

(۱) سابقه اختلالات روانی تشخیص داده شده، نداشته باشد.

(۲) کاملاً هوشیار بوده و قادر به پاسخ‌گویی به سوالات باشد.

(۳) وضعیت جسمانی وی به نحوی باشد که با تأیید پزشک معالج قادر به انجام مراحل کار باشد.

(۴) با تشخیص قطعی سکته قلبی در بخش بستری باشد.

(۵) مدت بیماری، نوع و میزان انفارکتوس با وجود دو گروه آزمون و شاهد، مورد نظر نمی‌باشد.

روش کار. این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در آن بیماران با تشخیص سکته قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه پژوهش در این تحقیق، بیماران با تشخیص سکته قلبی هستند. واحدهای مورد پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور

پرستار و بیمار از طریق ایجاد اعتماد و افزایش ارتباط، از آن‌ها استفاده کرد. استفاده از مداخلات غیردارویی برای تکمیل طب پیش‌رفته در بین پرستاران در تجارب بالینی، در حال اصلاح است [۱۰].

آرامسازی پیش‌رونده عضلانی (Progressive muscle relaxation (PMR) یا آرامسازی فعال، تکنیکی است که در آن شخص از طریق انقباض فعال و سپس شل کردن گروه‌های ماهیچه‌ای خاص در یک حالت پیش‌رونده، باعث کسب احساس آرامش در خود می‌شود [۱۱].

با توجه به این‌که بیماران سکته قلبی به منظور کاهش نیاز قلب، محدودیت فعالیت دارند، ریسک ایجاد عوارض ناشی از بی‌حرکتی از جمله ترومبوز و پنومونی افزایش می‌یابد. انجام آرامسازی پیش‌رونده عضلانی، علاوه بر اثرات آرامسازی و در نتیجه بهبود علائم حیاتی، ممکن است در پژوهش‌گر در این زمینه عوارض نیز مؤثر باشد. تجارب بالینی پژوهش‌گر در این زمینه که صرف وجود بیماری انفارکتوس میوکارد می‌تواند یک عامل مهم استرس و اضطراب در بیمار باشد و همچنین لزوم کنترل این استرس، این سوال را در ذهن پژوهش‌گر ایجاد کرد که این شیوه آرامسازی تا چه اندازه بر علائم حیاتی بیماران سکته قلبی مؤثر است. لذا پژوهش‌گر بر آن شد که تأثیر آرامسازی پیش‌رونده عضلانی را بر علائم حیاتی بیماران مبتلا به سکته قلبی مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روش‌ها

ابزار گردآوری اطلاعات. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه‌ای است شامل بخش‌های زیر: اطلاعات فردی. جنس، سن، قد، وزن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، شغل، تعداد فرزندان، شغل همسر، وضعیت مسکن، سابقه مصرف دخانیات، سابقه بیماری قلبی در خانواده، سابقه مصرف دارو، سابقه بستری قلبی، نحوه پرداخت هزینه و میزان شاخص توده بدنی. جدول ثبت علایم حیاتی. شامل فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، تعداد نیض و تعداد

سوم بررسی، پس از انجام آخرین جلسه آرامسازی، علایم حیاتی مجددًا اندازه‌گیری و ثبت می‌شد.

روش آرامسازی به این ترتیب است که بیمار در هر مرحله گروهی از عضلات بدن خود را منقبض کرده و پس از ۳-۵ ثانیه رها می‌کند و در پایان، تمام عضلات را شل کرده و پنج بار نفس عمیق می‌کشد. هر جلسه ۱۶ دقیقه به طول می‌انجامد. در گروه شاهد، هیچ مداخله‌ای انجام نشده و نمونه‌ها تحت درمان و مراقبت‌های معمول بوده‌اند. فقط علایم حیاتی در روز اول و سوم بررسی، اندازه‌گیری و ثبت شده است.

پس از کدبندی پرسشنامه‌ها، اطلاعات وارد کامپیوتر شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام شد. برای بررسی یکسان بودن دو گروه، از آزمون آماری تی مستقل و کای-اسکوئر استفاده گردید و برای مقایسه دو گروه از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد.

نتایج

در بررسی انجام شده نمونه‌های مورد پژوهش از نظر اطلاعات دموگرافیک (کمی و کیفی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. دو گروه از نظر متغیرهای کمی و کیفی و مقدار متغیرهای وابسته قبل از مطالعه تفاوت معنی‌داری نداشتند (جدول ۱).

جلوگیری از در معرض بودن نمونه‌های آزمون و شاهد و خدشه‌دار شدن مداخله، ابتدا نمونه‌ها تحت گروه آزمون انتخاب و مراحل بررسی بر روی آن‌ها انجام شد. پس از رسیدن تعداد نمونه‌های گروه آزمون به حد نصاب، نمونه‌های گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. برای هریک از نمونه‌ها ابتدا اطلاعات فردی جمع‌آوری و ثبت می‌گردید، سپس علامت حیاتی نمونه سه بار و هر بار به فاصله ۱-۰/۵ ساعت اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. بررسی و انجام مداخله برای هر نمونه طی سه روز انجام می‌شد. اولین روز بررسی، روزی است که بیمار از استراحت مطلق خارج شده و شخصاً مایل به ادامه برنامه بوده و طبق تأیید پژوهش مجاز به انجام تمرینات آرامسازی باشد.

پس از ثبت اطلاعات اولیه، در گروه آزمون روش آرامسازی پیش‌رونده عضلانی، با استفاده از نمایش عملی حرکات توسط محقق، به مددجو آموزش داده شد. پس از اطمینان از درک و انجام صحیح روش، کاست صوتی در مورد مراحل اجرای آرامسازی در اختیار بیمار قرار می‌گفت تا آرامسازی را به مدت سه روز و هر روز دو بار در زمانی که بخش، آرامتر است (در کل ۶ جلسه) انجام دهد. در تمامی جلسات آرامسازی محقق شخصاً بر بالین نمونه‌ها حضور داشت و در صورت لزوم به سوالات آن‌ها پاسخ می‌داد. روز

جدول ۱. مقایسه متغیرهای کیفی و کمی در دو گروه مورد مطالعه (قبل از مطالعه)

متغیرهای کیفی	درجه آزادی	کای دو	وضعیت معنی‌داری	متغیرهای کمی	مقدار تی	وضعیت معنی‌داری
جنس	۱	۴/۱	NS*	سن		NS
سواد	۳	۰/۵۳	NS	قد	.۰/۶۵	NS
شغل فرد	۵	۸/۱	NS	وزن	.۰/۱۱	NS
شغل همسر	۵	۶/۶	NS	شاخص توده بدنی		NS
نوع مسکن	۱	۱	NS	فشار خون سیستولیک		NS
سابقه مصرف سیگار	۱	۰/۶۴	NS	فشار خون دیاستولیک		NS
سابقه فامیلی	۵	۶/۰۴	NS	تعداد نیض	۱/۱	NS
سابقه بستری شدن	۵	۹/۶	NS	تعداد تنفس	۱/۱۵	NS
نوع مصرف دارو	۵	۹/۲	NS	* NS= No Significant		
نوع پرداخت بیمه	۲	۲/۴	NS			

۷۷/۹۵ و ۷/۶۲ می‌باشد. آزمون آماری نشان دهنده عدم

اختلاف معنی‌دار بین دو گروه است (جدول ۲).

در مقایسه میانگین و انحراف معیار نبض قبل از مطالعه در گروه آزمون (۱۱/۶ و ۸۰/۷۴) و این میزان در گروه شاهد (۸۰/۲۴ و ۸۰/۹)، در حالی‌که میانگین و انحراف معیار نبض بعد از مداخله در گروه آزمون (۷۸ و ۹/۴) و در گروه شاهد (۸۰/۸ و ۹/۳)، آزمون آماری قبل از مطالعه نشان‌گر عدم ارتباط معنی‌دار بین دو گروه است و پس از آزمون نیز ارتباط معنی‌دار بین دو گروه وجود ندارد.

در مقایسه میانگین و انحراف معیار تنفس قبل از مطالعه در گروه آزمون (۲۰/۲۴ و ۲/۳) و این میزان در گروه شاهد (۱۹/۶ و ۲/۴)، در حالی‌که میانگین و انحراف معیار تنفس بعد از مداخله در گروه آزمون (۱۸/۷۴ و ۱/۸) و در گروه شاهد (۱۹/۷۸ و ۳/۵)، آزمون آماری قبل از مطالعه نشان‌گر عدم ارتباط معنی‌دار بین دو گروه است، اما پس از آزمون ارتباط معنی‌دار بین دو گروه وجود دارد ($p=0.03$). (جدول ۳).

مقایسه میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، تعداد نبض و تعداد تنفس را در دو گروه آزمون و شاهد (جدول ۲ و ۳) نشان می‌دهد که میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولیک قبل از مطالعه در گروه آزمون ۱۲۸/۸۴ و ۱۱/۹۴ و در گروه شاهد ۱۲۷/۳۶ و ۱۳/۱۵ می‌باشد. آزمون آماری نشان می‌دهد که اختلاف آماری معنی‌دار بین دو گروه وجود ندارد. میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولیک بعد از مطالعه در گروه آزمون ۱۲۴/۲۱ و ۱۳/۲۵ و در گروه شاهد ۱۲۷/۷۱ و ۱۲/۵۰ می‌باشد. آزمون آماری نشان می‌دهد که اختلاف آماری معنی‌دار بین دو گروه وجود ندارد و عدم همبستگی بین دو گروه مشخص شده است.

میانگین و انحراف معیار فشارخون دیاستولیک قبل از مطالعه در گروه آزمون ۷۶/۷۱ و ۷/۲۰ و در گروه شاهد ۷۶/۳۹ و ۸/۳۰ می‌باشد. آزمون آماری نشان می‌دهد که اختلاف آماری معنی‌دار بین دو گروه قبل از مطالعه وجود ندارد. میانگین و انحراف معیار فشارخون دیاستولیک پس از مطالعه در گروه آزمون ۷۴/۸۱ و ۷۴/۲۷ و در گروه شاهد

جدول ۲. مقایسه میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در نمونه‌های مورد پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد قبل و بعد از مطالعه

وضعیت معنی‌داری	شاهد		آزمون		گروه‌ها		متغیرها
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	قبل از مطالعه	بعد از مطالعه	
۰/۶۱	۱۳/۱۵	۱۲۷/۳۶	۱۱/۹۴	۱۲۸/۸۴	قبل از مطالعه	بعد از مطالعه	فشارخون سیستولیک
۰/۲۴	۱۲/۵۰	۱۲۷/۷۱	۱۳/۲۵	۱۲۴/۲۱			
۰/۸۶	۸/۳۰	۷۶/۳۹	۷/۲۰	۷۶/۷۱	قبل از مطالعه	بعد از مطالعه	فشارخون دیاستولیک
۰/۰۹	۷/۶۲	۷۷/۹۵	۸/۲۷	۷۴/۸۱			

جدول ۳. مقایسه میانگین، تعداد نبض و تعداد تنفس در نمونه‌های مورد پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد قبل و بعد از مطالعه

وضعیت معنی‌داری	شاهد		آزمون		گروه‌ها		متغیرها
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	قبل از مطالعه	بعد از مطالعه	
۰/۸۴	۹/۳۱	۸۰/۲۴	۱۱/۶۹	۸۰/۷۴	قبل از مطالعه	بعد از مطالعه	تعداد نبض
۰/۲۱	۹/۳۴	۸۰/۷۹	۹/۴۷	۷۸/۰۸			
۰/۲۵	۲/۴۷	۱۹/۶۱	۲/۲۹	۲۰/۲۴	قبل از مطالعه	بعد از مطالعه	تعداد تنفس
۰/۰۳	۲/۴۸	۱۹/۸۷	۱/۸۵	۱۸/۷۴			

کاهش داشت، اما اختلاف معنی دار ایجاد نکرد که این معیار نیز می تواند تحت تأثیر زمان تحقیق و تعداد نمونه قرار گیرد. مقایسه میانگین تعداد تنفس در دو گروه آزمون و شاهد نشان دهنده کاهش تعداد تنفس در اثر آرامسازی پیش رونده عضلانی است.

تحقیق پورمعماری (۱۳۷۳) نیز بیان گر این است که روش آرامسازی بنsson در بیماران کاتتریسم قلبی روی مقدار فشارخون سیستولیک، مقدار درجه حرارت بدن و تعداد تنفس مؤثر بوده و آزمون های آماری اختلاف معنی دار را نشان دادند [۱۴]. شرفی نیز در تحقیق خود تحت عنوان تأثیر آرامسازی بر اضطراب بیماران سکته قلبی، به این نتیجه رسید که روش آرامسازی از نوع تلقین، بر علایم حیاتی نظیر فشارخون سیستول و دیاستول، نبض و تنفس تأثیر دارد، که بیشترین تأثیر در فشارخون سیستولی بوده است [۶].

چنان چه ملاحظه می شود، در این پژوهش، آرامسازی عضلانی باعث کاهش معنی دار در میانگین تعداد تنفس شده است ولی در سایر معیارها تغییرات کاهشی آن در حد معنی دار نیست. با توجه به محدودیت زمان تحقیق و تعداد نمونه ها این امر تا حدودی قابل توجیه است.

آرامسازی پیش رونده عضلانی تا حد معنی داری موجب کاهش تعداد تنفس در بیماران سکته قلبی شده است ($p=0.02$)؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که «آرامسازی پیش رونده عضلانی باعث کاهش تعداد تنفس در بیماران مبتلا به سکته قلبی می شود و در سایر معیارها تفاوت معنی دار آماری مشاهده نمی شود و نیازمند مطالعه بیشتر و استفاده از نمونه های وسیع تر می باشد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کلیه بیماران مشارکت کننده در این مطالعه که مساعدت لازم را مبذول داشتند قدردانی می شود. هم چنین از حمایت های گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس و پرسنل محترم بخش سی سی یو و داخلی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) تشکر می گردد.

بحث و نتیجه گیری

چنان چه ملاحظه می شود در این پژوهش اختلاف معنی دار آماری قبل و بعد از مداخله در دو گروه شاهد و مورد و بین گروه های مورد و شاهد مشاهده نشد. این مسأله با توجه به کوتاه بودن زمان مداخله قابل توجیه است. تحقیق یانگ و کلت (۱۹۹۶) با عنوان مقایسه تأثیر آرامسازی عضلانی و آرامسازی شناختی بر فشار خون، نشان داد که فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پس از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه های آرامسازی کاهش قابل ملاحظه ای داشت. آرامسازی عضلانی، به خصوص آرامسازی تنفسی بیشترین کاهش فشار خون را موجب شدند. طی سه دهه اخیر گزارش های متعددی وجود دارند که آموزش آرامسازی می تواند فشار خون را در بیماران دچار هیپرتانسیون کاهش دهد و اخیراً نیز تلاش های بسیاری شده است که کارآیی تکنیک های مختلف آرامسازی با هم مقایسه شوند [۱۲].

مقایسه میانگین تعداد نبض در دو گروه آزمون و شاهد نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار تعداد نبض قبل از مطالعه در گروه آزمون و شاهد نشان دهنده عدم اختلاف آماری معنی دار بین دو گروه می باشد. تغییرات تعداد نبض بدون انجام اقدامات تهاجمی، اطلاعاتی در مورد تنظیم تعداد نبض توسط سیستم عصبی خودکار، در موقعیت های مختلف مثل تحريك عاطفی و ورزش فراهم می کند. تغییر تعداد نبض در افراد دارای اختلالات تنفسی گزارش شده است. در یک گزارش، بیماران دچار اختلال عمومی تنفس، در حال استراحت تعداد نبض بالاتری نسبت به افراد بی تنفس داشتند [۱۳].

پاولو و جونز (۲۰۰۱) تحقیقی در مورد تأثیر آرامسازی عضلانی پیش رونده بر کورتیزول بzac انجام دادند. نتایج نشان داد که میزان تعداد نبض، اضطراب موقعیتی، استرس دریافتی و کورتیزول بzac در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است [۱۴]. در تحقیق یانگ و کلت نیز نمونه هایی که آرامسازی شناختی و آرامسازی کششی دریافت کردند، پس از مداخله کاهش قابل توجیه در تعداد نبض داشتند [۱۲]. در این پژوهش نیز میانگین تعداد نبض در گروه آزمون تعایل به

[8] Rukholm E, Bailey P, Couto-Wakulczyk G, Bailey WB. Needs and anxiety levels in relatives of intensive care unit patients. *J Adv Nurs*, 1991; 16(8):920-8.

[9] یوسفی حجت ا.... بررسی تأثیر روش‌های غیردارویی بر کاهش فشار خون بیماران هیپرتابنسیونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳.

[10] Hayes J, Cox C. Immediate effects of a five-minute foot massage on patients in critical care. *Intensive Crit Care Nurs*, 1999; 15(2):77-82.

[11] یخنی محمود. بررسی تأثیر آرامسازی پیش‌روندۀ عضلانی بر میزان تهوع و استفراغ حاد و تأخیری بیماران سرطانی تحت شیمی‌درمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰.

[12] Yung PM, Keltner AA. A controlled comparison on the effect of muscle and cognitive relaxation procedures on blood pressure: implications for the behavioural treatment of borderline hypertensives. *Behav Res Ther*, 1996; 34(10):821-6.

[13] Dishman RK, Nakamura Y, Garcia ME, Thompson RW, Dunn AL, Blair SN. Heart rate variability, trait anxiety, and perceived stress among physically fit men and women. *Int J Psychophysiol*, 2000; 37(2):121-33.

[14] پورمعماری حسین. بررسی تأثیر کاربرد روش آرامسازی بنسون روی اضطراب و دیس‌ریتمی‌های قلبی بیماران کاتتریسم قلبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳.

منابع

[1] Jairath N. Coronary heart diseases and risk factor management: A Nursing Perspective. 1st ed. New York: W.B. Saunders Co., 1999.

[۲] شرفی فربنا. تأثیر آرامسازی بر اضطراب بیماران سکه قلبی بستره در بخش‌های ویژه قلبی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۲.

[۳] موسوی نسب جلال. در ترجمه: درمان بیماری‌های قلبی. سایت‌اندسا سومی (مؤلف). چاپ اول، تهران: انتشارات فراروان، ۱۳۷۶، صفحه ۱۱۹.

[4] Sebrechts EH, Falger PR, Bar FW. Risk factor modification through nonpharmacological interventions in patients with coronary heart disease. *J Psychosom Res*, 2000; 48(4-5):425-41.

[۵] نادری مرتضی. تأثیر برنامه آشناسازی بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸.

[۶] تجویدی منصوره. میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی قلب در بیمارستان‌های منتخب تهران سال ۱۳۷۶. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۷.

[۷] واھی کامیار. در ترجمه: بیماری‌های قلبی. پاچل چاندرا (مؤلف). چاپ اول، تهران: انتشارات فقنوس، ۱۳۷۵، صفحه ۳۱۹.