

اثر وابسته و غیر وابسته به اندوتلیوم مصرف خوراکی قره قاط سیاه بر خواص انقباضی آئورت سینه‌ای موش صحرائی دیابتی

مهرداد روغنی^{*} (Ph.D)، مهدی شکوهی (M.D)

۱- دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

چکیده

سابقه و هدف: بیماری دیابت شیرین با افزایش وقوع بیماری‌های قلبی-عروقی همراه می‌باشد. شواهدی دال بر اثر حفاظتی و ضد دیابتی گیاه قره قاط سیاه (*Vaccinium myrtillus*) وجود دارد، لذا در این تحقیق اثر مصرف خوراکی و وابسته و غیر وابسته به اندوتلیوم این گیاه به مدت ۶ هفته بر پاسخ انقباضی و رفع انقباضی آئورت سینه‌ای ایزوله در مدل تجربی دیابت در موش صحرائی نر مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: موش‌های صحرائی نر به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با گیاه، دیابتی و دیابتی تحت درمان با گیاه تقسیم شدند. دو گروه تحت تیمار با گیاه نیز پودر برگ این گیاه محلول شده با غذای استاندارد موش را با نسبت وزنی ۵٪ دریافت نمودند. میزان وزن و گلوکز قبل از کار و در هفته‌های سوم و ششم پس از کار تعیین شد. در پایان، پاسخ انقباضی حلقه‌های آئورت سینه‌ای به کلرور پتابسیم و فنیل‌افرین و رفع انقباضی به استیل‌کولین (با اندوتلیوم) و سدیم نیتروپروسید (بدون اندوتلیوم) با استفاده از بساط بافت ایزوله مورد سنجش قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی تحت تیمار به طور معنی دار کمتر از گروه دیابتی بود ($p=0.04$). بعلاوه، حداقل پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای دارای اندوتلیوم در گروه دیابتی تحت درمان با گیاه به کلرور پتابسیم و فنیل‌افرین به ترتیب به طور غیر معنی دار و معنی دار ($p=0.04$) کمتر از گروه دیابتی بود و با حذف اندوتلیوم این تفاوت کاهش یافت. بعلاوه، پاسخ شل شدگی حلقه‌های آئورتی دارای اندوتلیوم به استیل‌کولین در گروه دیابتی تحت درمان با گیاه در مقایسه با گروه دیابتی تیمار نشده بیشتر و معنی دار بود ($p=0.02$).

نتیجه‌گیری: تجویز خوراکی و دراز مدت قره قاط سیاه از طریق تغییر دادن تولید و آزادسازی عوامل موثر بر عروق با منشا اندوتلیوم و با نیز با اعمال اثرات مستقیم بر عضله صاف عروقی موجب کاهش پاسخ انقباضی و افزایش پاسخ شل شدگی در بافت آئورت موش صحرائی دیابتی می‌گردد که این می‌تواند در جلوگیری از برخی عوارض عروقی دیابت در دراز مدت سودمند باشد.

واژه‌های کلیدی: قره قاط سیاه، دیابت شیرین، آئورت، خاصیت انقباضی، بافت ایزوله، موش صحرائی

مقدمه

افزایش خواهد یافت [۱]. کمبود و یا کاهش نسبی میزان انسولین در این بیماری با عوارض متابولیکی حاد و مزمن همراه می‌باشد [۲]. در بیماری دیابت شیرین عوامل مختلف شامل افزایش تشکیل رادیکال‌های آزاد اکسیژن به علت افزایش سطح گلوکز خون و تشدید پراکسیداسیون لیبیدی

دیابت شیرین از نظر بالینی یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای برخی عوارض نظیر نفوپاتی، رتینوپاتی، نوروپاتی، و بیماری‌های قلبی عروقی محسوب می‌شود که بر اساس پیش‌بینی به عمل آمده، شیوع آن در جامعه انسانی در آینده

[۷]. در این خصوص، گیاه قره‌قاط یک گیاه دارویی با خواص ضد اسهال، جمع‌کننده رادیکال‌های آزاد، محافظ سلول در برابر آسیب‌های شیمیایی شامل سوم محيطی، کاهش دادن برآکسیداسیون لیپیدی، و محافظت کبد در برابر انواع استرس‌ها می‌باشد که علت اصلی آن سطح بالای مواد آنتی‌اکسیدانت در این گیاه می‌باشد. از طرف دیگر بر اساس منابع طب سنتی، دم کرده برگ و میوه برای بیماری قند و فشار خون بالا و تورم قولون و رفع اسهال مفید است. برگ آن نیز در دفع ناراحتی مخاطی مثانه و مجرای ادراری مفید است [۸-۱۲]. به علاوه، اضافه نمودن عصاره این گیاه به محیط کشت حاوی سلول‌های اندوتیال انسانی به صورت واپسته به دوز موجب مهار آنزیم تبدیل کننده آنزیوتانسین می‌گردد که از این طریق موجب جلوگیری و حفاظت در برابر بیماری‌های قلبی عروقی می‌گردد [۱۳]. ضمناً، اضافه نمودن عصاره این گیاه به صورت واپسته به دوز در حالت بروون تن موجب بروز پاسخ شل‌شدگی وابسته به اندوتلیوم در شریان کورونری خوک می‌گردد. در این خصوص برای بروز اثرات گشاد کننده گیاه به حضور اندوتلیوم نیاز بوده و عصاره گیاه موجب حفاظت بافت عضله صاف رگی در برابر آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌گردد و تجویز گیاه عملأ بر پاسخ عضله صاف به عوامل خارجی آزادکننده نیتریک اکسید نظیر سدیم نیتروپرسید تاثیری ندارد [۱۴]. از طرف دیگر، اثر کاهش‌دهنده گلوكز یک ترکیب گیاهی حاوی قره‌قاط سیاه در مدل تجربی دیابت القا شده بر اثر آلوکسان مورد تائید قرار گرفته است [۱۵] و جدیداً اثر ضد دیابتی مصرف خوارکی آن در مدل تجربی دیابت القا شده بر اثر استرپتوزوتوسین گزارش شده است [۱۶]. هم‌چنین تجویز مواد موثره گیاه در گروه روتین‌ها از شدت مشکلات عروقی مسئول بروز رتینوپاتی دیابت القا شده بر اثر استرپتوزوتوسین در مosh صحرائی می‌کاهد [۱۷]. در ضمن، عصاره هیدروالکلی برگ این گیاه دارای خواص پائین‌آورندگی سطح چربی‌های خون در مدل تجربی دیس‌لیپیدمی در مosh صحرائی بوده و از بروز ترومبوز عروقی جلوگیری می‌نماید [۱۸]. با در نظر گرفتن این موضوع

موجب افزایش بروز آترواسکلروز و بیماری‌های قلبی-عروقی می‌گردد. در همین ارتباط نتایج تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که پاسخ انقباضی برخی نواحی عروقی شامل آئورت سینه‌ای به نورآدرنالین و کلرور پتاسیم در مosh‌های صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین به طور معنی‌داری نسبت به حیوانات سالم افزایش می‌یابد [۳] که در این افزایش پاسخ انقباضی عروق عوامل گوناگون از جمله تشدید تولید اندوتلین سنتز و ترشح برخی از پروستاگلاندین‌های تنگ‌کننده عروقی، افزایش غلظت داخل سلولی دی‌اسیل‌گلیسرول و افزایش متعاقب کلسیم داخل سلولی به عنوان عامل محرک انقباض در عضله صاف عروقی، و کاهش توانایی تولید فاکتورهای گشادکننده عروقی با منشأ اندوتیال نظیر نیتریک اکسید می‌تواند مطرح باشد [۳]. هم‌چنین پاسخ اتساعی سیستم عروقی دارای آندوتلیوم شامل آئورت در مosh‌های صحرائی دیابتی به استیل‌کولین به طور محسوس کمتر از مosh‌های صحرائی می‌باشد [۳،۴]. هدف اصلی که از روش‌های درمانی دیابت شیرین تعقیب می‌شود برقراری میزان طبیعی قند خون و جلوگیری و یا به تعویق انداختن ظهور عوارض آن می‌باشد. با توجه به افزایش دانش بشری در مورد تنوع این بیماری، نیاز برای یافتن ترکیبات مؤثر با حداقل عوارض جانی در درمان دیابت و اختلالات ناشی از آن شدیداً احساس می‌گردد [۵]. از دیر باز گیاهان داروئی به علت سهولت دسترسی و در بیش‌تر موارد دارای عوارض جانی بسیار کمتر از جایگاه ویژه‌ای در علم پزشکی برای درمان بیماری‌های رایج بشری بهویژه آن دسته از امراض با ماهیت متابولیک نظیر دیابت شیرین برخوردار بوده‌اند [۶]. هم‌چنین، در طی سالیان اخیر هدف بسیاری از تحقیقات، بررسی اثر بخشی مواد طبیعی با خاصیت هیپوگلیسمیک بر روی عوارض بافته و ارگانیک ناشی از دیابت بوده است [۶]. با توجه به افزایش دانش بشری در مورد هتروژنیته این بیماری، نیاز برای یافتن ترکیبات مؤثر با عوارض جانی کمتر در جلوگیری از یا درمان دیابت یا مشکلات ناشی از آن شدیداً احساس می‌گردد

تیمار راه یافتند. میزان وزن حیوانات و گلوکز سرم (روش آزمیمی گلوکز اکسیداز- شرکت زیستشیمی، تهران) قبل از انجام کار و در طی هفته‌های ۳ و ۶ پس از بررسی اندازه‌گیری شد.

اندازه‌گیری خواص انقباضی و شلشیدگی آنورت سینه‌ای در پایان کار، موش‌ها با استفاده از اتر بی‌هوش شده، با باز کردن قفسه سینه آنورت سینه‌ای را جدا کرده و در داخل محلول کربس سرد (که به طور مداوم به داخل آن گاز کربوژن دمیده می‌گردید) قرار داده شد. مواد شیمیایی محلول کربس (تهییه شده از شرکت مرک آلمان) مورد استفاده در تمام آزمایش‌ها به قرار زیر بود (بر حسب میلی‌مولار):

$\text{NaCl}: ۱۱۸/۵$, $\text{KCl}: ۴/۷۴$, $\text{CaCl}_2: ۵/۲$, $\text{MgSO}_4: ۱/۱۸$, $\text{NaHCO}_3: ۲۴/۹$, $\text{KH}_2\text{PO}_4: ۱/۱۸$, Glucose: ۱۰

در داخل محلول کربس سرد (به منظور کاهش دادن متابولیسم بافت و کاهش مرگ و میر سلولی)، آنورت به دقت از بافت پیوندی اطراف پاک شده، سپس به حلقه‌هایی به طول حدوداً ۴ (۳-۵) میلی‌متر تقسیم گردید. برای حصول اطمینان از سلامت آندوتیلیوم، پس از ایجاد انقباض با غلظت ۱۰-۶ مولار فنیل‌افرین (داروپیخش، تهران)، استیل‌کولین (سیگما، آمریکا) با غلظت ۱۰-۵ مولار به حمام بافت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد اضافه شد. مشاهده پاسخ شلشیدگی بیشتر از ۴۰-۳۰٪ در حلقه‌های آنورت به عنوان ملاک سالم بودن آندوتیلیوم در نظر گرفته شد [۲۱]. برای ثبت پاسخ حلقه‌های آنورتی، آن‌ها به کمک سیم‌های پلاتینی ۱۰ شکل که به موازات هم قرار داشتند، از یک طرف به قلاب فلزی و از طرف دیگر به ترانسدیوسر ایزومتریک F-60 متصل شدند. در این بررسی کشش اولیه اعمال شده به حلقه‌های آنورتی ۱/۵ گرم بود. پس از اعمال این کشش، حداقل ۶۰ دقیقه به بافت اجازه داده شد تا وضعیت ثابت پیدا کند. محلول کربس داخل حمام بافت هم هر ۳۰ دقیقه تعویض گردید. پس از حصول حالت تعادل، بافت به ترتیب در معرض غلظت‌های افزایش یابنده کلرور پتاسیم (۱۰^{-۵} تا ۵۰ میلی‌مولار) و فنیل‌افرین (۱۰^{-۹} تا ۱۰^{-۵} مولار) قرار گرفت. برای ثبت پاسخ شلشیدگی در حالت


که دیابت قندی در موش در دراز مدت (پس از گذشت حداقل ۱ ماه) با یکسری اختلالات عملکردی عروق همراه می‌باشد [۱۹] در بررسی حاضر اثر وابسته به آندوتیلیوم مصرف خوراکی و مزمن این گیاه بر پاسخ انقباضی و شلشیدگی آنورت سینه‌ای موش صحرائی دیابتی نر مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه از ۳۲ سر موش صحرائی نر سفید نژاد ویستان (انستیتو پاستور، تهران) در محدوده وزنی ۲۵۵-۳۱۵ گرم استفاده شد. تمام حیوان‌ها در دمای ۲۱-۲۳ درجه سانتی‌گراد در گروه‌های ۳ تا ۴ تایی در هر قفس قرار داده شدند. حیوان‌ها آزادانه به آب لوله‌کشی و غذای مخصوص موش (شرکت خوراک دام پارس، کرج) و یا غذای مخلوط شده با پودر برگ قره قاط سیاه (گونه واکسینیوم مرتیلیوس تهییه شده از دشت مغان و تأیید علمی و سیستماتیک توسط گروه بذر و نباتات دانشکده کشاورزی کرج) به نسبت ۵٪ [۲۰، ۱۶] به مدت ۶ هفته دستررسی داشتند. برای تهییه غذا، پودر به دست آمده از آسیاب نمودن گیاه با غذای پودر شده و استاندارد موش مخلوط و مجددًا غذای حیوان تولید گردید.


در این بررسی از آن دسته موش‌های صحرائی نر استفاده شد که در شرایط طبیعی بدون برقراری حالت روزه‌داری، میزان گلوکز سرم آن‌ها کم‌تر از ۲۵۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بود. در این خصوص از شبکه رترواوریتال و لوله موئینه برای خون‌گیری استفاده شد. موش‌ها به طور تصادفی به ۴ گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با گیاه و دیابتی، دیابتی تحت تیمار با گیاه تقسیم شدند. برای دیابتی نمودن موش‌ها از داروی استرپتوزوتوسین (آپجون فارماشیا، آمریکا) به صورت تک دوز و داخل صفاقی به میزان ۶۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم حل شده در محلول سالین فیزیولوژیک سرد استفاده شد. یک هفته پس از تزریق، برای اطمینان از دیابتی بودن حیوانات، قند ادرار به روش نوار ادراری (شرکت گلوکسیاب، تهران) کنترل شد و فقط حیوانات دیابتی شده به مرحله بعدی برای شروع

هفته هشتم در حد معنی دار نبود هر چند میزان وزن در گروه دیابتی تحت تیمار با گیاه کاهش کمتری نشان داد (شکل ۱).



شکل ۱. تغییرات وزن در هفته های مختلف در موشاهی صحرایی کنترل و دیابتی تیمار شده. $p < 0.05$, $p < 0.01$, $p < 0.005$ (در مقایسه با سطح پایه در همان گروه)

در خصوص میزان گلوکز سرم، در هفته قبل از بررسی تفاوت معنی دار بین گروه ها یافت نشد، در هفته های ۳ و ۶ میزان گلوکز سرم در دو گروه دیابتی ($p = 0.0003$) و ($p = 0.0004$) و دیابتی تحت تیمار با گیاه در حد معنی دار ($p = 0.008$ و $p = 0.009$) بیشتر از گروه کنترل بود هر چند که در گروه دیابتی تحت تیمار با گیاه میزان گلوکز سرم به طور معنی دار در هفته های ۳ و ۶ کمتر از گروه دیابتی درمان نشده بود ($p = 0.02$ و $p = 0.04$) (شکل ۲).



شکل ۲. تغییرات گلوکز سرم در هفته های مختلف در موشاهی صحرایی کنترل و دیابتی تحت تیمار. $p < 0.01$, $p < 0.005$, $p < 0.0005$ (در مقایسه با سطح پایه در همان گروه)، φ (در مقایسه با گروه دیابتی در همان هفته)


پاسخ انقباضی آثرت سینه ای به کلرور پتابسیم. شکل ۳، پاسخ انقباضی حلقه های دارا و فاقد اندوتیلیوم را به غلظت های افزایش یابنده کلرور پتابسیم در گروه های کنترل، کنترل تحت

دارای اندوتیلیوم، حلقه های آثرتی در ابتدا در معرض غلظتی از فنیل افرین که حدود ۸۰٪ حداکثر پاسخ را ایجاد نمود قرار گرفته و سپس در معرض غلظت های افزایش یابنده استیل کولین (10^{-5} مولار) قرار گرفت. برای ثبت پاسخ شل شدگی در حالت بدون اندوتیلیوم، در ابتدا اندوتیلیوم با چرخاندن یک لوله موئینه در داخل لومن رگ تخریب شده (عدم مشاهده پاسخ شل شدگی در حلقه های پیش منقبض شده با فنیل افرین در حضور استیل کولین (10^{-5} مولار) تایید کننده عدم وجود اندوتیلیوم در چنین حلقه هایی در نظر گرفته شد) و سپس حلقه های آثرتی در ابتدا در معرض غلظتی افزایش یابنده استیل کولین که حدود ۸۰٪ حداکثر پاسخ را ایجاد نمود قرار گرفته و سپس در معرض غلظت های افزایش یابنده سدیم نیتروپرسید (سیگما، آمریکا) (10^{-9} تا 10^{-5} مولار) قرار گرفت. برای ثبت و آنالیز داده ها نیز از نرم افزار فیزیوگراف ۱ (شرکت بهینه آرمان، تهران) استفاده گردید. پاسخ انقباضی در تمامی بررسی ها به صورت گرم و در مورد پاسخ شل شدگی به صورت درصد بیان شد. آنالیز آماری. تمام نتایج به صورت میانگین \pm انحراف معیار بیان شده است. در مورد وزن و میزان گلوکز سرم حیوانات در هفته های مختلف از آزمون آنوازا با اندازه گیری مکرر و در مورد نتایج عروقی و برای مقایسه بین گروه هی آنها از آزمون آنوازی یک طرفه و تست توکی استفاده گردید. به علاوه، سطح معنی دار در تمام آنالیز ها، $p < 0.05$ در نظر گرفته شد.

نتایج

از نظر وزن، هیچ گونه تفاوت معنی دار بین گروه ها در هفته قبل کار (سطح پایه) مشاهده نشد. گروه کنترل تحت تیمار مشابه با گروه کنترل یک افزایش طبیعی وزن را در پایان هفته ششم نشان داد هر چند این افزایش کمتر بود. در گروه دیابتی در هفته ششم نیز یک کاهش معنی دار در مقایسه با هفته قبل بررسی ($p = 0.004$) مشاهده گردید. از طرف دیگر، تفاوت موجود بین دو گروه دیابتی و دیابتی تحت تیمار با گیاه در


افزایش یابنده فنیل افرین در گروههای کنترل، کنترل تحت تیمار با گیاه، دیابتی و دیابتی تحت تیمار با گیاه نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است پاسخ انقباضی به فنیل افرین در مورد این گروهها با و بدون اندوتلیوم از یک طرح وابسته به غلظت تبعیت نموده است و دیابت موجب افزایش بارز و معنی‌دار حداکثر پاسخ حلقه‌های آئورتی به فنیل افرین در دو حالت دارا و بدون اندوتلیوم گردید (به ترتیب $p=0.006$ و $p=0.007$). همچنین درمان موش‌های دیابتی با قره قاط سیاه موجب کاهش معنی‌دار پاسخ انقباضی به فنیل افرین در مقایسه با گروه دیابتی در حلقه‌های دارای اندوتلیوم گردید ($p<0.04$) و حذف اندوتلیوم موجب کاهش این تفاوت گردید.



شکل ۴. پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای به غلظت‌های افزایش یابنده فنیل افرین در گروه‌های مختلف در دو حالت دارای اندوتلیوم (الف) و بدون اندوتلیوم (ب). $P<0.05$, $* p<0.01$ (در مقایسه با گروه کنترل)، $\phi p<0.05$ (در مقایسه با گروه دیابتی)

پاسخ شل‌شدگی آئورت سینه‌ای به استیل‌کولین و نیتروپرسید. از نظر پاسخ شل‌شدگی حلقه‌های آئورتی پیش منقبض شده با فنیل افرین و دارای اندوتلیوم، با اضافه شدن دوزهای تجمعی استیل‌کولین، یک پاسخ شل‌شدگی وابسته به

تیمار با گیاه، دیابتی و دیابتی تحت تیمار با گیاه نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است پاسخ انقباضی به کلرور پتاسیم در مورد این گروهها از یک طرح وابسته به غلظت تبعیت نموده است و حالت دیابت موجب افزایش معنی‌دار حداکثر پاسخ‌گویی حلقه‌های آئورتی به کلرور پتاسیم در مورد حلقه‌های دارا ($p=0.02$) و بدون اندوتلیوم ($p=0.04$) گردیده است. به علاوه حذف اندوتلیوم موجب افزایش غیر معنی‌دار پاسخ انقباضی به کلرور پتاسیم در مورد تمام گروه‌ها گردید. در این ارتباط، حذف اندوتلیوم موجب شد تفاوت موجود بین موش‌های دیابتی درمان شده با قره قاط سیاه با گروه دیابتی درمان نشده کاهش یابد که این خود تا حدودی وابستگی چنین پاسخی را به عوامل مشتق از اندوتلیوم نشان می‌دهد.



شکل ۵. پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای به غلظت‌های افزایش یابنده کلرور پتاسیم در گروه‌های مختلف در دو حالت دارای اندوتلیوم (الف) و بدون اندوتلیوم (ب). $P<0.05$, $* p<0.01$ (در مقایسه با گروه کنترل)



پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای به فنیل افرین. شکل ۴، پاسخ انقباضی حلقه‌های دارا و فاقد اندوتلیوم را به غلظت‌های

بحث و نتیجه‌گیری

مکانیسم‌های متفاوتی در ایجاد اختلال در ساختمان و عمل کرد عروق خونی در دیابت قندی دخالت دارند. در این ارتباط ظرفیت آندوتلیوم عروق در سنتر گشادکننده‌های عروقی مانند پروستاسایکلین و نیتریک اکسید کم شده و تنگ گشادکننده‌های عروقی مانند آندوتلین به مقدار زیادی تولید می‌شوند. هر چند که در مورد نقش هیبرگلیسمی مزمن در بروز عوارض عروقی بزرگ در حالت دیابت قندی شواهد قطعی وجود ندارد، ولی برخی از نتایج به دست آمده خود هیبرگلیسمی و تشدید استرس اکسیدانتیو ناشی از آن را دلیل بروز این عوارض می‌دانند [۳]. نتیجه یکی از مطالعات نشان می‌دهد که در دیابت قندی اختلال متابولیسم گلوکز و گلیکوزیلاسیون پروتئین‌ها نقش مهمی در ایجاد آتروسکلروز و افزایش نفوذیزیری و اسکلروز عروق خونی دارند. به علاوه در بیماران دیابتی تولید رادیکال‌های آزاد از طریق اتوکسیداسیون گلوکز افزایش می‌یابد [۱۷]. نتایج به دست آمده از مطالعه ما نشان داد که پاسخ انقباضی حلقه‌های آورتی دارای آندوتلیوم به فنیل‌افرین و کلرور پتاسیم در موش‌های صحرایی نر دیابتی به طور معنی‌داری نسبت به حیوانات سالم افزایش یافته است که این با نتایج مطالعه آیب و همکاران مطابقت دارد [۴]. به علاوه، با حذف آندوتلیوم به علت حذف عوامل گشادکننده عروقی نظیر نیتریک اکسید پاسخ انقباضی تشدید می‌شود [۴] که این با نتایج مطالعه ما نیز همخوانی داشت.

در این مطالعه موش‌های دیابتی شده توسط استریتوزو-توسین گیاه قره قاط سیاه را با یک نسبت وزنی ۵٪ از غذای استاندارد موش به فرم خوراکی و بدون محدودیت به مدت ۶ هفته دریافت نمودند. نتایج مطالعات قبلی نشان می‌دهد که در مورد این گیاه تجویز مقادیر بالاتر نیز عملاً فاقد اثرات سمی در بافت‌های بدن می‌باشد و گیاه حتی در مقادیر کم نیز دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانتی می‌باشد [۲۰]. در خصوص اثرات سودمند عروقی مصرف خوراکی و دراز مدت قره قاط که در تحقیق حاضر به دست آمد بل و همکاران نشان

غاظت در تمام گروه‌ها مشاهده گردید (شکل ۵). در این خصوص گروه دیابتی یک کاهش معنی‌دار در حداقل پاسخ شل‌شده‌گی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد ($P=0.006$). هم‌چنان، حداقل پاسخ شل‌شده‌گی در گروه دیابتی تحت درمان با گیاه در مقایسه با گروه دیابتی تیمار نشده به طور معنی‌دار بیشتر بود ($P=0.02$). در خصوص پاسخ شل‌شده‌گی حلقه‌های آورتی پیش منقبض شده با فنیل‌افرین و بدون آندوتلیوم، با اضافه شدن دوزهای تجمعی سدیم نیتروپروسید، یک پاسخ شل‌شده‌گی وابسته به غاظت در تمام گروه‌ها مشاهده گردید (شکل ۵). در این خصوص تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها مشاهده نشد.



شکل ۵. پاسخ شل‌شده‌گی به استیل کولین (الف) و سدیم نیتروپروسید (ب) بصورت تجمعی و وابسته به غاظت در حلقه‌های آورتی پیش منقبض شده با فنیل‌افرین در گروه‌های مختلف پس از گذشت ۶ هفتۀ $P<0.05$. * $P<0.01$ ، ** $P<0.02$ (در مقایسه با گروه کنترل)، φ ($P<0.05$ در مقایسه با گروه دیابتی).

کمتر بین گروههای مورد مطالعه و پراکنش بیشتر داده را در یک چنین مطالعاتی توجیه کند. البته هدف اصلی کار این نبوده است که همه حیوانات به یک میزان از غذای حاوی گیاه مصرف کنند و مقدار مصرف غذا در واقع به میزان تمایل حیوان برای مصرف بستگی دارد. به عبارت دیگر هدف از این گونه تحقیقات این است که گفته شود اگر در جامعه انسانی یک رژیم غذائی حاوی یک گیاه خاص بیشتر استفاده شود که در اینجا مقدار مصرف به عوامل فیزیولوژیک متعدد بستگی دارد) احتمال بروز عوارض بیماری می‌تواند کمتر شود. بدلاًوه، بررسی مکانیسم اثر عروقی گیاه با تأکید بر سیستم نیتریک اکسید و پروستاگلاندین‌ها در حالت دیابت شیرین در مطالعات آینده توصیه می‌شود.

به طور خلاصه، تجویز خوارکی و دراز مدت قره قاط سیاه از طریق تغییر دادن تولید و آزادسازی عوامل موثر بر عروق با منشا اندوتلیوم و با اعمال اثرات مستقیم بر عضله صاف عروقی موجب کاهش پاسخ انقباضی و افزایش پاسخ شل شدگی در بافت آورت موش صحرائی دیابتی می‌گردد که این می‌تواند در جلوگیری از برخی عوارض عروقی دیابت در دراز مدت سودمند باشد.

تشکر و قدردانی

بخشی از پژوهش حاضر با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی داشتگاه شاهد (تهران) در سال ۱۳۸۶ به انجام رسیده است که بدینوسیله تشکر می‌گردد. نویسندهان مقاله مراتب تشکر وافر خود را از سرکار خانم فربیان انصاری کارشناس گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی شاهد در کمک به انجام آزمایشات اعلام می‌دارند.

منابع

[1] Tripathi BK and Srivastava AK. Diabetes mellitus: complications and therapeutics. Med Sci Monit 2006; 12: 130-147.

[2] Wandell PE. Quality of life of patients with diabetes mellitus. An overview of research in primary health care in the Nordic countries. Scand J Prim Health Care 2005; 23: 68-74.

[3] Mori S, Takemoto M, Yokote K, Asaumi S, and Saito Y. Hyperglycemia-induced alteration of vascular smooth muscle phenotype. J Diabetes Complications 2002; 16: 65-68.

داده‌اند که اضافه نمودن عصاره این گیاه به صورت وابسته به دوز در حالت برون تن موجب بروز پاسخ شل شدگی وابسته به اندوتلیوم در شریان کورونری خوک می‌گردد [۱۴] که بخش کمی از این پاسخ با اعمال اثرات حفاظتی مستقیم بر عضله صاف رگی و بخش عمدۀ آن از طریق تشدید مکانیسم‌های سنتز نیتریک اکسید (افزایش بیان ژن نیتریک اکسید سنتاز) و افزایش آزادسازی آن و پروستاگلاندین‌های گشادکننده عروقی و احتمالاً هم‌چنین از طریق کاهش تولید عوامل منقبض‌کننده عروقی نظیر اندوتلین‌ها و برخی پروستاگلاندین‌ها به انجام می‌رسد [۱۴] که نتایج این مطالعه به طور کلی با مطالعه ما مطابقت دارد هر چند در مطالعه حاضر عمل کرده عضله صاف کبدی در جهت اصلاح تغییرات نامطلوب سطح گلوكز و چربی‌های خون می‌باشد [۱۵] که این تا حدودی می‌تواند کاهش سطح گلوكز در گروه دیابتی در بررسی حاضر را توجیه کند. با توجه به این موضوع که دیابت قندی با تشدید روند استرس اکسیداتیو همراه بوده و بخشی از تغییرات بیوشیمیابی خون در دیابت قندی بهویژه در دیابت وابسته به انسولین از این طریق توجیه می‌گردد [۵] و گیاه قره قاط به علت سطح بالا از مواد آنتی‌اکسیدانت از جمله آنتوسبیانین‌ها دارای خاصیت کاهش‌دهنده اکسیداتیو ناشی از تشکیل رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌باشد [۱۰] که این خود می‌تواند بخشی از تغییرات مطلوب در خصوص پاسخ‌گوئی بافت آورت به عوامل منقبض‌کننده و گشادکننده در موش‌های دیابتی را ایجاد کرده باشد.

در خصوص محدودیت‌های بررسی حاضر و مطالعات مشابه می‌توان گفت که غذای تهیه شده حاوی گیاه به طور آزاد و بدون اعمال محدودیت در اختیار حیوانات تحت درمان قرار می‌گیرد. لذا این احتمال وجود دارد که تمام حیوانات به یک میزان از گیاه استفاده نکرده باشند که این می‌تواند تفاوت‌های

- enzyme activity in human endothelial cells. *J Agric Food Chem* 2009; 57: 4626-4629.
- [14] Bell DR. and Gochenaur K. Direct vasoactive and vasoprotective properties of anthocyanin-rich extracts. *J Appl Physiol* 2006; 100: 1164-1170.
- [15] Petlevski R, Hadzija M, Slijepcevic M. and Juretic D. Effect of 'antidiabetis' herbal preparation on serum glucose and fructosamine in NOD mice. *J Ethnopharmacol* 2001; 75: 181-184.
- [16] Roghani M, Baluchnejad mojarad T. and Taheri S. The effect of feeding of aerial part of *Vaccinium myrtillus* on blood glucose and lipids of diabetic rats. *Iranian J Diabetes Lipid* dis 2007; 7: 151-158. (Persian).
- [17] Chung HK, Choi SM, Ahn BO, Kwak HH, Kim JH. and Kim WB. Efficacy of troxerutin on streptozotocin-induced rat model in the early stage of diabetic retinopathy. *Arzneimittelforschung* 2005; 55: 573-580.
- [18] Cignarella A, Nastasi M, Cavalli E. and Puglisi L. Novel lipid-lowering properties of *Vaccinium myrtillus* L. leaves, a traditional antidiabetic treatment, in several models of rat dyslipidaemia: a comparison with ciprofibrate. *Thromb Res* 1996; 84: 311-322.
- [19] Yildirim O. and Buyukbingol Z. Effect of cobalt on the oxidative status in heart and aorta of streptozotocin-induced diabetic rats. *Cell Biochem Funct* 2003; 21: 27-33.
- [20] Bagchi D, Roy S, Patel V, He G, Khanna S, Ojha N. and et al. Safety and whole-body antioxidant potential of a novel anthocyanin-rich formulation of edible berries. *Mol Cell Biochem* 2006; 281: 197-209.
- [21] Baluchnejadmojarad T. and Roghani M. Garlic extract attenuates time-dependent changes in the reactivity of isolated aorta in streptozotocin-diabetic rats. *Life Sci* 2003; 73: 2281-2289.
- [4] Abebe W, Harris KH. and Macleod KM. Enhanced contractile responses of arteries from diabetic rats to alpha 1-adrenoceptor stimulation in the absence and presence of extracellular calcium. *J Cardiovas Pharmacol* 1990; 16: 239-248.
- [5] Suji G. and Sivakami S. Approaches to the treatment of diabetes mellitus: an overview. *Cell Mol Biol* 2003; 49: 635-639.
- [6] Grover JK, Yadav S. and Vats V. Medicinal plants of India with anti-diabetic potential. *J Ethnopharmacol* 2002; 81: 81-100.
- [7] Dey L, Attele AS. and Yuan CS. Alternative therapies for type 2 diabetes. *Altern Med Rev* 2002; 7: 45-58.
- [8] Milbury PE, Graf B, Curran-Celentano JM. and Blumberg J. Bilberry (*Vaccinium myrtillus*) anthocyanins modulate heme oxygenase-1 and glutathione S-transferase-pi expression in ARPE-19 cells. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2007; 48: 2343-2349.
- [9] Yao Y. and Vieira A. Protective activities of *Vaccinium* antioxidants with potential relevance to mitochondrial dysfunction and neurotoxicity. *Neurotoxicology* 2007; 28: 93-100.
- [10] Ichiyanagi T, Shida Y, Rahman MM, Hatano Y. and Konishi T. Bioavailability and tissue distribution of anthocyanins in bilberry (*Vaccinium myrtillus* L.) extract in rats. *J Agric Food Chem* 2006; 54: 6578-6587.
- [11] Ramirez MR, Izquierdo I, do Carmo Bassols Raseira M, Zuanazzi JA, Barros D. and Henriques AT. Effect of lyophilised *Vaccinium* berries on memory, anxiety and locomotion in adult rats. *Pharmacol Res* 2005; 52: 457-462.
- [12] Mirheydar H. Medicinal plants science: Application of plants in prevention and treatment of disorders. Vol. 1, 1997: pp:131-135.
- [13] Persson IA, Persson K. and Andersson RG. Effect of *Vaccinium myrtillus* and its polyphenols on angiotensin-converting

Endothelium-dependent and-independent effects of *Vaccinium myrtillus* feeding on contractile reactivity of thoracic aorta from diabetic rats

Mehrdad Roghani (Ph.D)^{*}, Mehdi Shekouhi (M.D)

Dept of Physiology, School of Medicine, Shahed University and Medicinal Plant Research Center, Tehran, Iran.

(Received: 22 Agu 2009 Accepted: 24 Nov 2009)

Introduction: Diabetes mellitus is followed by higher incidence of cardiovascular disorders. There is some evidence on protective and antidiabetic effects of *Vaccinium myrtillus* (VM). Thus, the endothelium-dependent and –independent effect of oral administration of VM for 6 weeks on contractile and relaxatory response of thoracic aorta from diabetic rats was investigated.

Materials and Methods: Male rats were divided into control, VM-treated control, diabetic and VM-treated diabetic groups. Treated groups received VM-mixed pelleted food at a weight ratio of 5%. Body weight and serum glucose levels were measured before the study and at weeks 3 and 6. At the end of study, contractile reactivity of thoracic aortic rings to KCl and phenylephrine and relaxatory response to acetylcholine (with endothelium) and sodium nitroprusside (without endothelium) was determined using isolated tissue setup.

Results: Serum glucose levels significantly decreased in VM-treated diabetic group versus untreated diabetics ($p=0.04$). In addition, endothelium-intact VM-treated diabetic group showed a significantly lower contraction to KCl and phenylephrine ($p=0.04$) as compared to diabetic group and endothelium removal reduced this difference. Meanwhile, relaxation response of endothelium-intact rings to acetylcholine was significantly higher in VM-treated diabetic group as compared to diabetics ($p=0.02$).

Conclusion: Chronic oral administration of VM through affecting synthesis and release of endothelial vasoactive agents and also via direct effects on vascular smooth muscle could decrease contractile and enhance relaxatory responses in aortic tissue of diabetic rat. These effects may have the beneficial effects in prevention of some long-term vascular complications of diabetes.

Key words: *Vaccinium myrtillus*, Diabetes mellitus, Aorta, Contractility, Isolated tissue, Rat

* Corresponding author: Tel: +98 9121794950, Fax: +98 21 88966310
mehjour@yahoo.com