

مقایسه تأثیر سرم نرمال سالین و دکستروز سالین بر طول زایمان و برخی پیامدهای زایمانی در زنان نخستزا

رضیه حاتمی راد^۱ (M.Sc)، شهناز نجار^۲ (M.Sc)، خدیجه حکمت^{۳*} (M.Sc)

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی

۲- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

سابقه و هدف: اثر کربوهیدرات داخل وریدی یا خوراکی بر زمان زایمان و پی آمدهای آن کمتر مطالعه شده است. هدف این مطالعه، مقایسه تأثیر تزریق داخل وردیدی سرم نرمال با و بدون دکستروز بر پیامد زایمانی زنان نخستزا بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی ۹۷ زائوی نخستزا که به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده نرمال سالین یا دکستروز سالین ۵ درصد تقسیم شدند. محلولها با سرعت ۱۲۰ میلی لیتر در دقیقه به صورت داخل وریدی تزریق شده و مراحل زایمان از زمان شروع مداخله بررسی شد.

یافته‌ها: از ۹۷ بیمار، ۸۰ بیمار شرایط مطالعه را دارا بوده و مطالعه را به پایان رساندند. تفاوت آماری معنی‌داری در زمان کامل شدن دیلاتاسیون در گروه نرمال سالین ($P=0.001$) و گروه دکستروز سالین ($P=0.001$) (۱۶۳/۷۳+۳۹/۵ دقیقه) مشاهده شد. همچنین تفاوت آماری معنی‌داری در طول مدت مرحله دوم زایمان در گروه نرمال سالین ($P=0.001$) و گروه دکستروز سالین ($P=0.001$). گروه‌ها از نظر میزان نیاز به اکسی توسین نیز تفاوت آماری قابل ملاحظه‌ای داشتند ($P=0.019$). اما تفاوت آماری معنی‌داری از نظر نمره آپگار دقیقه اول ($P=0.086$) و دقیقه پنجم ($P=0.079$) جنین، و هیپوگلیسمی نوزادی در ساعت اول ($P=0.28$) و ساعت دوم ($P=0.46$) پس از تولد مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که مصرف محلول‌های دکستروز در زنان نخستزا در مقایسه با مصرف سرم نرمال سالین موجب کوتاه‌تر شدن مراحل زایمان می‌شود.

واژه‌های کلیدی: زایمان، شروع زایمان، قند خون، محلول نمکی، هیپرتونیک

مطالعات متعددی صورت گرفته است یکی از عواملی که در مورد آن مطالعات کمی صورت گرفته است، تأثیر انواع مایعات بر روند زایمان می‌باشد [۲].

رحم، مجموعه‌ای از هزاران فیبر عضلانی صاف تک واحدی است که با یکدیگر به صورت یک واحد مقبض شونده در می‌آیند [۳]. بیشتر انرژی مصرف شده در طی زایمان از طریق مسیر اکسیدانتیو به دست می‌آید و گلوکر

مقدمه

هدف علم زایمان آن است که هر حاملگی نهایتاً به وجود مادر و نوزاد سالم خاتمه یابد. در راه وصول به این هدف نهایی سعی بر این است که حتی‌امکان از مرگ و میر مادران و نوزادانی که در اثر عوارض حاملگی و زایمان رخ می‌دهد جلوگیری شود [۱]. عوامل متعددی سیر زایمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند که در مورد اثر آن‌ها بر روی روند زایمان،

گردید و بدین منظور سرم نرمال سالین و دکستروز سالین را در طی لیبر انتخاب نموده و اثر هر کدام از سرم‌ها بر برخی پیامدهای زایمانی زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه نموده بودند بررسی شد.

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور بر روی ۹۷ زن نخست‌زا با حاملگی کم خطر مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز، به منظور تعیین و مقایسه طول مدت فاز فعال و مرحله دوم در هر دو گروه انفوژیون سرم نرمال سالین و دکستروز سالین انجام شد. نمونه‌ها از بین زائوها مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند انتخاب شدند. شرایط ورود به مطالعه شامل: ملیت ایرانی، نخست‌زا بودن، سن بین ۱۸–۳۵ سال، سن حاملگی ترم، حاملگی تک قلو با پرزاتاسیون سفالیک، ورود به فاز فعال زایمان با دیلاتاسیون ۳–۴ سانتی‌متر و شروع خودبه‌خودی لیبر، حداقل نمره بیش از سرویکس در موقع پذیرش ۷ یا بیشتر، فقد مشکلات بارداری فعلی نظیر: پلی‌هیدرآمینوس – پره‌اکلامپسی، حاملگی کم خطر (عدم پارگی بیش از ۶ ساعت کیسه آب، زایمان زودرس، خون‌ریزی سه ماهه سوم، عدم وجود اختلال رشد جنین)، طبیعی بودن تست غربال‌گری قند خون ۱ ساعته که در سن ۲۴–۲۸ هفته بارداری انجام شده باشد، قد مادر بالای ۱۵۰ سانتی‌متر، اندکس توده بدن مادر در سه ماهه اول <26 (کیلوگرم بر مترمربع) و در ۲–۴ ساعت گذشته هیچ غذایی مصرف نکرده باشد. محاسبه حجم نمونه بر اساس هدف کلی مطالعه و با استفاده از فرمول مقایسه بین دو میانگین که بر اساس آن با خطای نوع اول 0.05 و خطای نوع دوم 0.10 درصد تعداد حجم نمونه حدود 40 نفر برای هر گروه تعیین شد نمونه‌گیری به صورت مبتتنی بر هدف بوده و نمونه‌های واجد شرایط به صورت تصادفی شدن به روش کامپیوتروی در 2 گروه سرم درمانی با نرمال سالین (54 نفر) یا گروه دکستروز سالین 5 درصد (43 نفر) قرار گرفتند.

مادری مهم‌ترین منبع انرژی جنین است. نیاز فیزیولوژیک به گلوکز در طی زایمان 10 گرم در ساعت می‌باشد. برای حفظ توان فرد در طی فعالیت زایمان منابع کافی انرژی مورد نیاز است [۴]. گرسنگی هم‌زاه با افزایش سطوح بتا هیدروکسی بوتیرات و استواتات اسید و چربی‌های غیراشبع در خون می‌باشد، افزایش این متابولیت‌ها در خون موجب کاهش قند خون می‌شود. هر چند از نظر علمی ثابت نشده، پیشنهاد شده است که تغییرات این متابولیت‌های خون روی فعالیت رحم و پیامد زایمان تأثیر می‌گذارد [۵].

شیر او استراوا و همکاران در طی پژوهشی به منظور بررسی مقایسه‌ای تأثیر سرم نرمال سالین با و بدون دکستروز بر سیر زایمان زنان نخست‌زا، دریافتند که سرم‌های حاوی دکستروز طول زایمان را به میزان 20 درصد کوتاه‌تر خواهد کرد و این کاهش با عوارض ناگوار جنبی و مادری هم‌زاه نیست [۲]. اما از سوی دیگر کوبیلی و همکاران در طی پژوهشی به بررسی تأثیر مقدار و نوع مایعات خوراکی در طی لیبر پرداختند که هیچ تفاوتی را در طول مدت زایمان در بین گروه‌های مورد مطالعه نیافتند [۶]. در مطالعه‌ای که توسط جمال و همکاران در سال 2007 انجام شد نشان داده شد که مصرف سرم‌های حاوی دکستروز 5 درصد نسبت به سرم رینگر در حین زایمان در جنین اسیدوز کم‌تری ایجاد خواهد کرد و در صورت ایجاد، اسیدوز با سطوح پایین‌تر خواهد بود [۷]. سری و همکاران در سال 2000 نشان دادند که pH در دو گروهی که برای یکی انفوژیون دکستروز 5 درصد و برای دیگری هیچ نوع انفوژیونی انجام نشده بود، یکسان بود و هم‌چنین انفوژیون گلوکز 5 درصد اسیدمی مادر را در طی زایمان کاهش نداده بود [۸].

با توجه به این مطالب و این‌که اکثریت زائوها به محض پذیرش و شروع فاز فعال زایمان، NPO شده و برای آن‌ها اقدام به برقراری یک راه وریدی می‌شود، لذا سعی در یافتن یک روش مناسب، کم‌هزینه و سازگار با شرایط فیزیولوژیک بدن مادر جهت تأمین مایعات و کالری لازم در زمان زایمان

۱۵-۳۰ دقیقه و در انتهای این فاز هر $10-15$ دقیقه یکبار با قرار دادن کف دست بر روی قله رحم جهت بررسی شدت، طول، مدت و فاصله بین انقباضات ارزیابی شدند. در صورت عدم پیش رفت زایمان و با تشخیص اختلالات تعویقی بیش از ۲ ساعت، طبق نظر متخصص زنان از اکسی توسین برای تسریع زایمان آنها استفاده شد. ضربان قلب جنین در فاز فعال هر 30 دقیقه و در مرحله دوم هر 15 دقیقه توسط سونی کید سمع شد. علایم حیاتی مادر هر 4 ساعت کنترل و ثبت شد. در موارد ایجاد هر گونه الگوی غیرطبیعی در ضربان قلب جنین، دفع مکونیوم یا تغییر علایم حیاتی مادر اکسیژن تراپی انجام می شد و به پزشک کشیک اطلاع داده می شد. پس از کامل شدن دیلاتاسیون بیماران در وضعیت لیتو تومی قرار گرفتند و تشویق به زور زدن شدند. همچنین نحوه زایمان و آپگار دقیقه اول و پنجم جنین و نیاز به مصرف اکسی توسین و دوز مورد نیاز در صورت مصرف به دقت ثبت گردید. به طور تصادفی از 97 نمونه 40 نفر از نمونه ها (20 نفر در هر گروه) بررسی الکتروولیت های سرم مادر (سدیم، پتاسیم، کلسیم) در زمان پذیرش و 2 ساعت پس از زایمان به منظور بررسی تأثیر سرم های انفوژیون شده بر سطوح الکتروولیت های مادر انجام شد. قند خون نوزادان 1 و 2 ساعت پس از تولد اندازه گیری و ثبت شد. همچنین پس از زایمان وضعیت مادر و نوزاد تا زمان ترخیص از بیمارستان پیگیری گردید و در صورتی که مدت اقامت مادر و نوزاد بیش از 24 ساعت به دلایل طبی و مامایی رخ داد به عنوان موارد غیرطبیعی محسوب می شد.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی و روش های آمار استنباطی شامل آزمون های کای اسکوئر و تی تست و تست تی زوجی و آزمون نسبت شناس و با نرم افزار spss 15 انجام شد. نتایج در سطح معنی دار 0.05 ٪ گزارش گردید.

ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک (تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی، سن، شاخص توده بدنی، محل سکونت، قومیت، وضعیت اشتغال، آخرین وعده غذایی مصرف شده) و فرم مشاهده و معاينه (حاوی اطلاعات فردی و حاملگی فعلی، نتایج معاينات، بررسی علائم حیاتی، اطلاعات مربوط به نوع زایمان، وزن و آپگار نوزاد) جهت تعیین روایی پرسشنامه این پژوهش از اعتبار محتوى استفاده شد، بدین صورت که پس از مطالعه کتب و مقالات و ژورنال ها، اطلاعات لازم درباره موضوع جمع آوری و فرم ثبت اطلاعات و پرسشنامه تهیه گردید سپس اصلاحات لازم توسط 10 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی صورت گرفت. جهت تعیین پایایی فرم چک لیست مشاهده و معاينه از روش ارزیابی هم زمان استفاده شد. بدین ترتیب که پژوهش گر نتایج حاصل از مشاهده و معاينه 10 نفر از کسانی که دارای شرایط واحد های پژوهش بودند ثبت و سپس از یک رزیدنت زنان درخواست شد تا او نیز مشاهدات و معاينات خود را ثبت نماید. پس از مقایسه مشاهده و معاينات پایایی پرسشنامه با $=85\%$ تأیید گردید.

پس از پذیرش زائو و برقراری مایعات وریدی، زائو به اتاق لیبر منتقل شده و پژوهش گر از همان ابتدای پذیرش تا 2 ساعت پس از زایمان به طور مداوم بر بالین زائو حضور داشت. آمنیوتومی در صورت سالم بودن کیسه آب طبق روش روتین در هنگام بستری توسط هوک آمنیوتومی برای زائو انجام شد. بیماران NPO شدند. نوع مایع انفوژیون شده برای هر فرد با توجه به گروهی که در آن قرار گرفته بود با سرعت 120 میلی لیتر در ساعت توسط دستگاه انفوژیون تنظیم گردید. سیر زایمان به دقت کنترل می شد و میزان دیلاتاسیون سرویکس و نزول سر جنین بعد از هر معاينه ثبت می گردید. طول زمان فاز فعال از دیلاتاسیون $3-4$ سانتی متر سرویکس تا زمان کامل شدن دیلاتاسیون سرویکس بر حسب دقیقه تعریف شده بود، همچنین طول مرحله دوم نیز برای زائو بر حسب دقیقه محاسبه و ثبت می شد. انقباضات رحمی در ابتدای فاز فعال هر

(جدول ۲). همچنین بین دو گروه تقاضت آماری معنی‌داری از نظر آپکار دقیقه اول و پنجم پس از تولد وجود نداشت. از نظر نوع زایمان بیشترین فراوانی در هر دو گروه با زایمان واژینال خودبه‌خود بود ($94/4$) درصد در گروه نرمال سالین و $97/7$ درصد در گروه دکستروز سالین). ۳ نفر از بیماران گروه نرمال سالین (۱ نفر به‌دلیل دیسترس جنینی و ۲ نفر به‌دلیل توقف در مرحله دوم زایمان) و ۱ نفر از گروه دکستروز سالین (به‌دلیل توقف در مرحله دوم زایمان) سزارین اورژانسی شدند. به‌دلیل محدود بودن تعداد سزارین‌ها نسبت به زایمان طبیعی از آزمون آماری کای‌اسکوئر برای تست کردن نمی‌توان استفاده نمود اما با استفاده از آزمون Odds Ratio حاصل عدد $2/38$ شد. این عدد نشان‌دهنده این است که احتمال سزارین در گروه دکستروز سالین نسبت به گروه نرمال سالین حدود ۲ برابر می‌باشد (جدول ۳).

با بررسی تغییرات هر الکتروولیت به‌طور جداگانه مشخص شد که میزان تغییرات قبل و بعد از زایمان در درون هر گروه و در بین گروه‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبود.

نتایج

نتایج حاصل از بررسی 97 زائو که جهت زایمان به بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه نموده بودند و واجد شرایط پژوهش بودند به شرح زیر می‌باشد: در هر دو گروه از نظر شاخص‌های دموگرافیک و مامایی مانند سن مادر، شاخص توده بدنی قبل از بارداری، شغل مادر، سن بارداری اختلاف آماری معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۱).

متوسط طول فاز فعال زایمان در گروه نرمال سالین $291/5 \pm 89/3$ دقیقه و در گروه دکستروز سالین $163/73 \pm 39/5$ دقیقه بود که با استفاده از آزمون T تست از نظر آماری اختلاف معنی‌دار بود ($P=0/001$). همچنین میانگین مرحله دوم زایمان در گروه نرمال سالین $58/88 \pm 33/58$ دقیقه و در گروه دکستروز سالین $33/12 \pm 10/48$ دقیقه بود که با استفاده از آزمون T تست اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد ($P=0/00$).

جدول ۱. مشخصات دموگرافیک و مامایی زنان به تفکیک گروه‌های پژوهش

نتیجه آزمون	میانگین و انحراف معیار در گروه دکستروز سالین	میانگین و انحراف معیار در گروه نرمال سالین	مشخصات دموگرافیک	میانگین در گروه‌ها
$P=0/44$	$21/68 \pm 2/712$	$22/18 \pm 2/054$	سن مادر(سال)	
$P=0/26$	$21/22 \pm 0/86$	$21/5 \pm 1/07$	شاخص توده بدنی (kg/m ²)	
$P=0/41$	$274/85 \pm 5/01$	$273/98 \pm 4/61$	سن بارداری (روز)	
$P=0/56$	$0/57 \pm 7/98$	$0/59 \pm 8/05$	نمره بیشاب	

جدول ۲. میانگین طول مدت فاز فعال، مرحله دوم (دقیقه)، میزان نیاز به ستنتوسینون به تفکیک گروه‌های مطالعه

میزان نیاز به ستنتوسینون	میانگین و انحراف معیار طول مرحله دوم	میانگین و انحراف معیار طول فاز فعال زایمان	میانگین در گروه‌ها	گروه درمان
$\%24/5$	$58/88 \pm 33/58$	$291/5 \pm 89/3$		گروه نرمال سالین
$\%7$	$33/12 \pm 10/48$	$163/73 \pm 39/5$		گروه دکستروز سالین
$P=0/021$	$P=0/00$	$P=0/00$		نتیجه آزمون

نوزادان نشده است. اما از آنجایی که برخی شاخص‌های تولد مثل وزن و قد نوزاد متأثر از قومیت‌های نژادی مختلف می‌باشد [۹] و تولد نوزاد با میانگین وزنی کمتر در آسیایی‌ها نسبت به آمریکایی تبارها شیوع بیشتری دارد [۱۰] ممکن است بدین‌وسیله این کوتاه‌تر بودن مدت فاز فعال و مرحله دوم در مطالعه ما نسبت به مطالعه شیراواستاوا و همکاران توجیه شود. ممکن است دلیل دیگر این اختلاف طول فاز فعال و مرحله دوم مربوط به استفاده از بی‌حسی اپیدورال توسط شیراواستاوا و همکاران در مطالعه خود برای بیماران و عدم استفاده از این نوع بی‌حسی در مطالعه ما باشد. بی‌حسی اپیدورال عامل مهمی در طولانی‌تر شدن مرحله اول و دوم زایمان است [۱۱، ۱۲].

از مجموع ۹۷ نمونه بررسی شده ۱۳ نفر (۲۴/۵ درصد) از نمونه‌های مطالعه در گروه نرمال سالین و ۳ نفر (۷ درصد) از گروه دکستروز سالین نیاز به تجویز سنتوسبینون داشتند. و بر اساس آزمون دقیق فیشر ($P=0.043$) اختلاف آماری معنی‌داری در میزان نیاز به سنتوسبینون بین گروه مصرف‌کننده نرمال سالین و گروه مصرف‌کننده دکستروز سالین وجود دارد. در حالی که در مطالعه‌ای اسچیبر و همکاران (۲۰۰۲) (ش) با هدف تاثیر دریافت کربوهیدرات‌ها در طول لیبر انجام شده بود، اختلاف آماری معنی‌داری در میزان استفاده از اکسی‌توسین در گروه‌های مطالعه وجود نداشت [۱۳]. همچنین نتایج مطالعه ما از این نظر با مطالعه شیراواستاوا و همکاران نیز مشابه نمی‌باشد، شاید علت آن عدم محدودیت در استفاده از سنتوسبینون در گروه‌های مطالعه شیراواستاوا و همکاران باشد. از سوی دیگر گروه‌های مطالعه شیراواستاوا و همکاران برای زایمان از بی‌حسی اپیدورال استفاده کرده بودند. کمیلی و همکاران اظهار می‌دارند، افرادی که برای زایمان از بی‌حسی اپیدورال استفاده می‌کنند زایمان طولانی‌تر دارند و نیاز به سنتوسبینون بیشتری دارند [۱۴].

از نظر نوع زایمان بیشترین فراوانی در هر دو گروه مربوط به زایمان طبیعی بود (۹۴/۴ در در گروه نرمال سالین و

جدول ۳. توزیع فراوانی زنان بر حسب نوع زایمان به تفکیک گروه‌های درمان

نوع زایمان	گروه درمان	درمان	
		خوب‌بخود	زایمان واژینال
گروه نرمال سالین	۵۱	۳	زایمان سازارین
گروه دکستروز سالین	۴۲	۱	

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج بالا مشخص شد که طول مدت فاز فعال زایمان در گروه نرمال سالین ۱۲۷ دقیقه طولانی‌تر از گروه دکستروز سالین بود ($P=0.001$). و طول مدت مرحله دوم زایمان در گروه نرمال سالین ۲۵ دقیقه طولانی‌تر از گروه دکستروز سالین بود که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ($P=0.001$).

شیراواستاوا و همکاران [۲] در طی تحقیقی مشابه که به بررسی و مقایسه سه گروه مصرف‌کننده نرمال سالین، دکستروز سالین ۵ درصد و دکستروز سالین ۱۰ درصد پرداختند، طول مدت مرحله اول زایمان در گروه نرمال سالین ۴۶۱ دقیقه، در گروه دکستروز سالین ۵ درصد ۳۶۳ دقیقه و در گروه دکستروز سالین ۱۰ درصد ۳۴۰ دقیقه بود ($P=0.039$). و طول مرحله دوم در گروه نرمال سالین ۱۰۴ دقیقه، در گروه دکستروز سالین ۵ درصد ۸۷ دقیقه و در گروه دکستروز سالین ۱۰ درصد ۷۳ دقیقه بود ($P=0.27$). که از این نظر با نتایج پژوهش حاضر همسو می‌باشد، در صورتی که در مطالعه کوبلی و همکاران که بررسی تاثیر یک نوع محلول ایزوتوئنیک خاص در طی لیبر در مقایسه با مصرف آب انجام داده بودند تفاوتی در طول مراحل زایمان بین دو گروه مشاهده نشد [۵]. میانگین فاز فعال زایمان و مرحله دوم زایمان در مطالعه ما نسبت به مطالعه شیراواستاوا و همکاران کوتاه‌تر بود ممکن است کوتاه‌تر بودن زمان فاز فعال و مرحله دوم در مطالعه ما نسبت به مطالعه شیراواستاوا و همکاران به دلیل تفاوت در وزن جنین‌های این افراد در گروه‌های مطالعه باشد. هر چند در مطالعه شیراواستاوا و همکاران اشاره‌ای به میانگین وزن تولد

در آخر با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری نمود که سرم دکستروز سالین در طی لیبر به علت افزایش ATP نیاز انرژی بیمار را طی زایمان تأمین می‌کند و از ایجاد متabolیت‌های مضر که طی چرخه غیرهوایی و در موارد عدم دسترسی به کربوهیدارت ایجاد می‌شود و روی قدرت انقباضی رحم تأثیر منفی می‌گذارند پیش‌گیری می‌کند. و با این مکانیسم زایمان را کوتاه‌تر می‌کند. لذا سرم دکستروز سالین نسبت به سرم نرمال سالین در طی لیبر مطلوب‌تر بوده و می‌توان با اطمینان در طی زایمان از آن استفاده نمود.

تشکر و قدردانی

از زحمات و همکاری صمیمانه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور قدردانی به عمل می‌آید.

منابع

- [1] Daneshkajouri M. Midwifery and intensive care. 1st ed. Tehran, Boshra publication 1378; 132. [Persian].
- [2] Shrivastava VK, Garite TJ, Jenkins SM, Saul L, Rumney P, Preslicka C, Chen K. A double-blinded randomized controlled trial comparing normal saline with and without dextrose on the course of labor in nulliparas. Am J Obstet Gynecol 2009; 200: 379-376.
- [3] Gayton A. Medical Physiology. Translated by F. Shadan, Tehran, chehr Publication 1381; 1:142. [Persian].
- [4] Shields SG, Ratcliffe SD, Fontaine P, Leeman L. Dystocia in Nulliparous women. Am Fam Physician 2007; 75: 1671-1678.
- [5] Kubli M, Scrutton MJ, Seed PT, O'Sullivan G. An evaluation of isotonic "sport drinks" during labor. Anesth Analg 2002; 94: 404-408.
- [6] Garite TJ, Weeks J, Peters-Phair K, Pattilo C, Brewster WR. A randomized controlled trial of the effect of increased intravenous hydration on the course of labor in nulliparous women. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: 1544-1548.
- [7] Jamal A, Coobak N, Tabassomi F. Intrapartum maternal glucose infusion and fetal acid-base status. Int J Gynaecol Obstet 2007; 97: 187-189.
- [8] Cerri V, Tarantini M, Zuliani G, Schena V, Redaelli C, Nicolini U. Intravenous glucose infusion in labour dose not affect maternal and acid-base balance. J Maternal Fetal Med 2000; 9: 204-208.
- [9] Golali poor MJ, Vakili MA. Relationship between infant weight and height for age, ethnicity, number and type of delivery the mother. J Babol Univ Med Sci 2006; 2: 41-47. [Persian].
- [10] Coningham FG, Leveno KJ, Bloom FL, Hauth JC, Gilstrap L, Wenstrom KD. Pregnancy and childbirth williams. translated by B. ghazi jahani. Tehran Golban 2006; 2: 319, 549, 261, 279, 500-557.
- [11] Wong LF, Caughey AB, Nakagawa S, Kaimal AJ, Tran SH, Cheng YW. Perinatal outcomes among different Asian-American subgroups. Am J Obstet Gynecol 2008; 199: 382-386.
- [12] Alexander JM, Lucas MJ, Ramin SM, McIntire DD, Leveno KJ. The course of labor with and without epidural analgesia. Am J Obstet Gynecol 1998; 178: 516-520.

۹۷/۷ درصد در گروه دکستروز سالین). از آنجایی که بیماران از گروه‌های کم خطر انتخاب شده بودند، تعداد زایمان‌های منجر به سزارین کم بود. بدلیل محدود بودن تعداد سزارین‌ها با استفاده از آزمون Odds ratio این احتمال مطرح شد که شناس سزارین شدن در گروه نرمال سالین نسبت به گروه دکستروز سالین حدود دو برابر است اما این نسبت جهت اظهار نظر قطعی در رابطه با تأثیر نوع سرم بر نوع زایمان کفايت نمی‌کند، و نیاز به انجام مطالعه در حجم بالاتری از نمونه می‌باشد، در حالی که اسچیپر و همکاران در مطالعه خود گزارش کردند که میزان سزارین در گروه دریافت‌کننده محلول قندی بالاتر است [۱۳].

در پژوهش حاضر هیچ تفاوتی در نمرات آپگار بین دو گروه مطالعه مشاهده نشد. در مطالعه شیراواستاوا و همکاران و مطالعه کوبلی و همکاران نیز تفاوت معنی‌داری در نمرات آپگار بین گروه‌ها مشاهده نشد [۵,۲]. لذا با توجه به این مطالب مشخص می‌شود که تفاوت در نوع سرم نرمال سالین یا دکستروز سالین تجویزی در طی لیبر، تأثیری در نمرات آپگار پس از تولد نوزاد ندارد.

از نظر بررسی بروز عوارض مادری و جنینی، تمام نمونه‌ها و نوزادان آن‌ها از ابتدا تا زمان ترخیص از بیمارستان بررسی شدند که هیچ گونه عارضه خاصی در دو گروه مشاهده نشد. با این وجود مطالعه حاضر دارای محدودیت‌های نیز بود که شامل توانایی‌های فیزیکی مادر و پاسخ فیزیولوژیکی انقباضات که بر طول مرحله دوم زایمان مؤثر است. که سعی گردید با آموزش مناسب و یکسان به واحدهای پژوهش جهت زور زدن در مرحله دوم این مورد را تقریباً کنترل نمود. پاسخ‌گویی سرویکس به انقباضات رحمی خودبه‌خودی یا در اثر مصرف اکسی‌توسین در افراد مختلف متفاوت است. ارزیابی تفاوت‌های فردی نظیر شکل لگن، بافت‌های نرم لگن و مقاومت آن‌ها در برابر عبور جنین به طور کامل امکان‌پذیر نیست.

[14] Kukulu K, Demirok H. Effects of epidural anesthesia on labor progress. Pain Manag Nurs 2008; 9: 10-16.

[13] Scheepers HC, Thans MC, de Jong PA, Essed GG, Le Cessie S, Konhali HH. A double-blind, randomized, placebo controlled study on the influence of carbohydrate solution intake during labor. BJOG 2002; 109: 178-181.

Archive of SID

Effects of intravenous normal saline with and without dextrose on labour duration and delivery outcomes in nulliparous women

Raziye Hatami Rad (M.Sc)¹, Shahnaz Najar(M.Sc)², Khadijeh Hekmat (M.Sc)^{*2}

1 - Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 - Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Beranagh, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

(Received: 14 Feb 2011 Accepted: 25 Jan 2012)

Introduction: Effects of carbohydrate administration, either oral or intravenously, on the course of labor and its consequences has been less studied. The objective of this study was to compare effects of intravenous normal saline with and without dextrose on length of labour and delivery outcomes in nulliparae.

Materials and Methods: This randomized clinical trial was conducted on 97 primiparous women who divided into normal saline (NS) and dextrose 5% in normal saline (D5NS) groups. The solutions were injected intravenously by a machine in rate of 120 ml/min and stages of parturition were monitored.

Results: Of 97 subjects enrolled, 80 met inclusion criteria and completed the study. There was a significant difference in the time (min) to complete dilation between groups (NS: 291.5+89.38; D5NS: 163.73+39.5) ($P=0.000$), and length of stage II labor (NS: 58.88+23.13; D5NS: 33.58+10.48) ($P=0.000$). There was a significant difference in terms of the need for oxytocin between two groups ($P=0.019$), but no significant differences were observed between two groups in terms of cesarean section rates, Apgar score at the one and five min after birth, and neonatal hypoxia in the first and two hours after birth.

Conclusion: Our findings indicate that intravenous dextrose solution can reduce effectively delivery time in nulliparous women.

Key Words: Labor, Obstetric, Labor onset, Blood glucose, Saline solution, Hypertonic

* Corresponding author: Fax: +98 611 3738333; Tel +98 9161117300
hekmat1346@gmail.com