



## ● مقالات تحقیقی

### بررسی خصوصیات دموگرافیک و عوامل زمینه‌ساز تشنج ناشی از تب در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر علی حسینی نسب\*

دکتر محمدحسین داعی پاریزی<sup>۱</sup>

کبری علیدوستی<sup>۲</sup>

۱- دستیار فوق تخصصی عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲- استاد گروه بیماری‌های کودکان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۳- کارشناس ارشد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

#### چکیده

**زمینه:** تشنج ناشی از تب یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عصبی کودکان است که عوامل زمینه‌ساز متعددی برای آن ذکر شده است.

هدف این مطالعه بررسی عوامل زمینه‌ای و خصوصیات دموگرافیک کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب می‌باشد.

**روش‌کار:** گروه مورد شامل ۱۱۵ کودک سنین ۵ تا ۶۰ ماه و گروه شاهد ۳۴۵ کودک که از نظر سن و جنس کاملاً مشابه بودند.

**یافته‌ها:** براساس خصوصیات دموگرافیک، نتیجه مقایسه میانگین وزن و تاریخچه خانوادگی تشنج ناشی از تب بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار بود. در حالی که تقاضه معنی‌داری بین قد، دور سر، استفاده از شیر مادر، قطره ویتامین و آهن و آپکار زمان تولد دو گروه وجود نداشت.

**نتیجه‌گیری:** به نظر می‌رسد که تشنج ناشی از تب در کودکان با وزن بالاتر و تاریخچه فامیلی مثبت شایع‌تر باشد.

**واژگان کلیدی:** تشنج ناشی از تب، کودک، خصوصیات دموگرافیک

\*نشانی نویسنده مسئول: شیراز، بیمارستان

نمایزی، دفتر گروه اطفال، تلفن: ۰۷۱۱۲۲۱۴۲۵۱ ،

فکس: ۰۷۱۱۶۲۸۷۰۷۱

پست الکترونیک: ahoseini@sums.ac.ir

## روش کار

پس از اقدامات درمانی اولیه شامل کنترل تشنج، کاهش درجه حرارت بیمار با تب برای ابدن شویه و درمان بیماری زمینه‌ای، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با والدین جمع آوری و در فرم از قبل طراحی شده ثبت می‌گردید.

به ازای هر کودک بیمار، سه کودک همسن و هم جنس سالم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و اطلاعات مربوط به آنها با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی، از ۵ منطقه مختلف شهر کرمان جمع آوری گردید.

اطلاعات توصیفی بیماران با استفاده از برنامه SPSS آنالیز شده و مقایسه‌آماری دو گروه نیز با استفاده از برنامه مذکور و آزمون independent sample t-test

گروه مورد مطالعه شامل ۱۱۵ کودک ۵ تا ۶۰ ماهه بود، که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ به علت تشنج ناشی از تب به بیمارستان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه کرده بودند و طبق معیارهای زیر وارد مطالعه شدند:

- ۱- تأیید پزشک مبنی بر داشتن تشنج
  - ۲- عدم وجود علل شناخته شده تشنج مثل منژیت، انسفالیت، شیگلوز، هیپوکلمی و ....
  - ۳- عدم وجود بیماری عصبی مثل صرع، فلج مغزی و سابقه تشنج بدون تب.
  - ۴- وجود تب در زمان تشنج
- تب به صورت درجه حرارت زیر بغل ۳۸ و بالاتر در نظر گرفته شد.

## مقدمه

تشنج ناشی از تب عارضه عصبی شایع در کودکان است و در ۳-۵ درصد کودکان ۶ ماهه تا ۶ ساله اتفاق می‌افتد [۱، ۲]. نوع ساده تشنج به صورت حرکات تونیک کلونیک جنژالیزه که کمتر از ۱۵ دقیقه طول می‌کشد و تغییرات عصبی پست ایکتال ندارد، می‌باشد. نوع کمپلکس، فوکال است، بیش از ۱۵ دقیقه طول می‌کشد، در ۲۴ ساعت بیش از یک بار اتفاق می‌افتد و همراه با علایم عصبی پست ایکتال می‌باشد. نوع کمپلکس، ۱۵ تا ۲۰ درصد موارد را تشکیل می‌دهد [۳]. در سال‌های اخیر نقش وراثت در بروز این نوع تشنج مورد توجه قرار گرفته است [۴، ۲].

تشنج ناشی از تب بیماری خود محدود شونده و خوش خیم است [۵]. ولی در موارد اندکی ممکن است به سمت بیماری صرع پیشرفت کند [۱، ۲].

به نظر می‌رسد کودکان مستعد این بیماری، دارای خصوصیات مشترکی باشند که بررسی و شناخت بیشتر این خصوصیات، جهت پیشگیری از تشنج ناشی از تب کمک کننده خواهد بود.

در برخورد کلینیکی و بررسی‌های اولیه، این تصور قوت گرفت که تشنج ناشی از تب در کودکان با رشد وزنی خوب و بالاتر، بیشتر از کودکان هم سن اتفاق می‌افتد. ولی هیچ گونه مطالعه آماری در این زمینه انجام نشده است و این امر انگیزه اصلی این تحقیق قرار گرفت.

جدول ۱- مقایسه شاخص‌های رشد بیماران با گروه شاهد					
P	انحراف معیار	میانگین	تعداد	شاخص رشد	وزن
۰/۰۹۷	۳/۲۳	۱۱/۹۱ کیلوگرم	۱۱۵	بیمار	
	۲/۸۶	۱۱/۳۹ کیلوگرم	۳۴۵	شاهد	
**۰/۰۰۱	۱۲/۳۷	%۹۳/۲۸	۱۱۵	بیمار	*گومز*
	۹/۱۷	%۸۹/۸۱	۳۴۵	شاهد	
***۰/۰۰۱	۰/۲۹	-۰/۱۶	۱۱۵	بیمار	-Z اسکور وزن **
	۰/۲۲	-۰/۲۴	۳۴۵	شاهد	
۰/۰۶۳	۵۶۳	۳۰۰/۶ گرم	۱۱۲	بیمار	وزن تولد
	۱۵۱۱	۳۲۷۴ گرم	۳۴۵	شاهد	

\* ۱۰۰ وزن صدک ۵۰ / وزن بیمار = گومز

\*\* اختلاف معنی‌دار است

\*\*\* وزن صدک ۳- وزن صدک ۵۰ / (وزن صدک ۵۰ - وزن بیمار) Z = اسکور وزن

توجه: Z اسکور قد و وزن از +۲ تا -۲ طبیعی است



جدول ۲- مقایسه خصوصیات فردی دو گروه بیمار و شاهد

نتیجه	شاهد	مورد	خصوصیت
۰/۰۰۱	%۲۰۲	%۵۰/۴	سابقه خانوادگی تشنج
۰/۶۱	%۷۵/۳	%۷۸/۳	زایمان طبیعی
۰/۶۳	%۹۵/۰۷	%۹۳/۹	تعذیه انحصاری با شیر مادر
۰/۶۶	۴۹	%۴۶/۱	استفاده از قطره ویتامین و آهن
۰/۴۱	%۹۸/۵	%۹۷/۴	آپگار زمان تولد
۰/۰۶۳	گرم ۳۲۷۴	گرم ۳۰۰۶	میانگین وزن زمان تولد

جدول ۳- تعداد موارد تشنج ناشی از تب بر حسب بیماری زمینه‌ای (علت تب)

بیماری مسبب تب	تعداد موارد	درصد
اتیت حاد میانی	۴۶	۴۰
عفونت ویروسی تنفسی فوقانی	۴۱	۳۵/۷
فارنژیت استرپتوکوکی	۱۲	۱۰/۴
روزنوا اینفانتوم	۲	۱/۷
سایر موارد (علتی برای تب مشخص نشد)	۱۴	۱۲/۲
جمع	۱۱۵	۱۰۰

وزن زمان تولد در ۱۱۲ مورد از گروه مورد وجود داشت، که میانگین آن  $۳۰۱۳/۳۹$  گرم و در گروه شاهد ۳۲۷۴ گرم برآورد شد ( $P=0/063$ ). نوع ساده تشنج در  $۷۶/۴\%$  و نوع کمپلکس در  $۲۳/۶\%$  وجود داشت.  $۷۹/۱\%$  از کودکان برای اولین بار تشنج کردند.  $۱۵/۹\%$  دومین بار و  $۵\%$  نیز سه بار یا بیشتر تشنج داشته‌اند. در مقایسه با گروه شاهد که فقط ۲ درصد دارای سابقه فامیلی تشنج بودند، نیمی از گروه مورد ( $۵۰/۴\%$ ) سابقه فامیلی تشنج یا تشنج ناشی از تب را در فامیل درجه یک خود ذکر کردند ( $P<0/001$ ) (جدول ۳).

گروه شاهد  $۸۹/۸۱\pm ۹/۷$  SD درصد به دست آمد ( $P=0/001$ ). میانگین قد گروه مورد  $۸۴/۷۵\pm ۱۱/۷$  SD سانتی‌متر و گروه شاهد  $۸۳/۹۶\pm ۱۱/۴$  SD سانتی‌متر بود ( $P=0/0527$ ). میانگین دور سر گروه مورد  $۴۵/۶۲\pm ۳/۱$  SD و گروه شاهد  $\pm ۲/۱۷$  SD  $\pm ۴۶/۴۴$  محاسبه شد ( $P=0/028$ ). اسکور وزن گروه مورد  $-0/۱۶$  و گروه شاهد  $-0/۲۴$  است ( $P=0/001$ ). اسکور قد گروه مورد  $-0/۱۳$  و در مورد گروه شاهد  $-0/۱۷$  برآورد گردید ( $p=0/218$ ) اسکور دور سر گروه مورد  $-0/۱۴$  و گروه شاهد  $-0/۲$  به دست آمد ( $p=0/011$ ). (جدول ۱).

## نتایج

از مجموع ۴۶۰ کودک، ۱۱۵ نفر براساس معیارهای ورود به مطالعه در گروه مورد و ۳۴۵ نفر در گروه شاهد قرار گرفتند که  $۵۸/۳\%$  پسر و  $۴۱/۷\%$  دختر بودند. نیمی از آنها بیش از ۲۲ ماه سن داشتند. کمترین سن، ۵ ماه و بیشترین سن، ۶۰ ماه بود و میانگین سنی آنها ( $SD$ )  $۲۵ \pm ۱۴/۵$  ماه برآورد شد.

میانگین وزن گروه مورد  $۱۱/۹۱\pm ۳/۳$  SD کیلوگرم و گروه شاهد  $۱۱/۳۸\pm ۲/۸$  SD محاسبه گردید ( $p=0/097$ ). (نمودارهای ۱ تا ۴). میانگین گومز گروه بیمار  $۹۳/۲۸\pm ۱۲/۲$  SD درصد و

بیشترین عامل زمینه‌ساز تب، اتیت حاد

میانی تشخیص داده شد (جدول ۲).

گروه مورد و شاهد از نظر وضعیت

زایمانی، آپگار زمان تولد، تغذیه با شیر مادر،

استفاده از قطره ویتامین و آهن همگون


بودند (جدول ۲).

میانگین درجه حرارت زیر بغل کودکان

$39/14 \pm 0/49$  SD

درجه سانتی‌گراد، حداقل درجه حرارت ۳۷/۲

و حداکثر ۴۲ درجه سانتی‌گراد گزارش گردید.




وزن صد.<sup>۳</sup> = WT3، وزن گروه شاهد = C.WT، وزن بیماران = P.WT، وزن صد.<sup>۵۰</sup> = WT50

نمودار ۱ - مقایسه وزن کودکان مبتلا به تشنجه ناشی از تب با گروه شاهد

(پسران ۵ تا ۲۳ ماه)

این تحقیق بیشتر به منظور مقایسه خصوصیات رشد وزنی کودکان مبتلا به تشنجه ناشی از تب و همسالان سالم آنها صورت گرفته است، که با بررسی انجام شده مشخص گردید، میانگین وزن، میانگین گومز وزن و میانگین Z اسکور وزن کودکان مبتلا به تشنجه ناشی از تب نسبت به همسن و سالان سالم آنها بیشتر است. گرچه در مطالعات دیگر، شخص رشد به عنوان عامل زمینه‌ساز تشنجه ناشی از تب ذکر نشده ولی در یک مطالعه که در اسرائیل انجام شده ارتباط بین چاقی، عقب ماندگی ذهنی و تشنجه ناشی از تب به عنوان یک سنتروم مطرح گردیده است [۶]. در مطالعه حاضر مقایسه میانگین قد و دور سر نیز در دو گروه انجام شد که اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

در مطالعه انجام شده، میانگین سنی ۲۵ ماه برآورد گردید، نوع ساده تشنجه و نوع کمپلکس آن ۲۳/۶٪ و ۷۹/۱٪ از



وزن صد.<sup>۳</sup> = WT3، وزن گروه شاهد = C.WT، وزن بیماران = P.WT، وزن صد.<sup>۵۰</sup> = WT50


نمودار ۲ - مقایسه وزن کودکان مبتلا به تشنجه ناشی از تب

با گروه شاهد (پسران ۲۴ تا ۶۰ ماه)

کودکان برای اولین بار تشنج کرده‌اند، ۱۵/۹٪ دومین بار و ۵٪ نیز سه بار یا بیشتر تشنج داشته‌اند. در مطالعه آقای اظهر داوود، میانگین سنی ۲۳ ماه ذکر شده است [۳]. در مطالعه‌ای دیگر نوع ساده تشنج ۷۵/۲٪، نوع کمپلکس ۲۴/۸٪ بوده، ۶۰٪ برای اولین بار تشنج کرده بودند ۳۰٪ برای دومین بار و ۱۰٪ سه بار یا بیشتر تشنج داشته‌اند [۷]. در مطالعه ما نقش وراثت به وضوح مشخص می‌باشد به طوری که بیش از ۵۰ درصد کودکان بیمار، تاریخچه مثبت خانوادگی تشنج یا تشنج ناشی از تب داشتند که به طور مشخص بیشتر از گروه شاهد بود و این موضوع در مطالعات دیگر نیز بررسی شده و نتایج مشابهی به دست آمده است [۸، ۹].


در این بررسی ارتباط معنی‌داری بین، استفاده از شیر مادر، استفاده از قطره ویتامین و آهن، نوع زایمان، آپگار زمان تولد و تشنج ناشی از تب وجود نداشت، که در مطالعات دیگر نیز ارتباط بین این عوامل و تشنج ناشی از تب تأیید نشده است [۷]. براساس این بررسی، عامل ایجاد کننده تب در اکثر موارد اتیت حاد میانی بوده است. گرچه نوع بیماری زمینه‌ای، پیشگویی کننده پیش‌آگهی تشنج نمی‌باشد [۵]، ولی تشخیص به موقع و درمان آن موجب پیشگیری از تشنج می‌گردد [۹].

در پایان، توصیه می‌شود بررسی‌های بیشتری در مورد مقایسه رشد وزنی کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب با کودکان سالم انجام شود تا در صورت تأیید یافته‌های این مطالعه، در مورد علت این موضوع بررسی‌های جامعتری به عمل آید.



وزن صدایک ۵۰ = WT50، وزن گروه شاهد = C.WT، وزن بیماران = P.WT، وزن صدایک ۳ = WT3

نمودار ۳- مقایسه وزن کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب با گروه شاهد (دختران ۵ تا ۲۳ ماه)



وزن صدایک ۵۰ = WT50، وزن گروه شاهد = C.WT، وزن بیماران = P.WT، وزن صدایک ۳ = WT3

نمودار ۴- مقایسه وزن کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب با گروه شاهد (دختران ۲۴ تا ۶۰ ماه)

## مراجع

1. Marvin A. Fishman. *Febrile Seizure*. In: Julia A, McMillan, Catherine D, et al. *Oski's Pediatrics. Principles and Practice*. 3th ed. Philadelphia: A Wolters Kluwer Co; 1999: 1949-1952.
2. Robert H.A, Haslam. *Febrile Seizure*. In: Behrman, kliegman and Jenson. *Nelson textbook of pediatrics*. 16th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 2000: 1818-1819.
3. Azhar D. *Febrile convulsion*. *J Ped Neur* 2004; 2(1):9-14.
4. Racacho LJ, McLachlan RS, Ebers GC, Maher J, Bulman DE. Evidence favoring genetic heterogeneity for febrile convulsions. *Epilepsia* 2000;41(2):132-9.
5. Rajadhyaksha S, Shah KN. Controversies in febrile seizures. *Indian J Pediatr* 2000; 67 (1 Suppl): S71-9.
6. Lev D, Watemberg N, Aviram A, Fishoff J, Antman E, Lerman-Sagie T. Febrile convulsions, ataxia, developmental delay, and obesity: a new syndrome? *J Child Neurol* 2001;16(3):174-6.
7. Proc Natl Acad. Identification of an  $Na_v1.1$  sodium channel (SCN1A) loss-of-function mutation associated with familial simple febrile seizures. *Sci U S A* 2005 December 13; 102(50): 18177-18182.
8. Webb DW, Jones RR, Manzur AY, Farrell K. Retrospective study of late febrile seizures. *Ped Neu* 1999; 20(4): 270.
9. Vestergaard M, Basso O, Henriksen TB, Ostergaard JR, Olsen J. Risk factors for febrile convulsions. *Epidemiology* 2002; 13 (3): 282-7.

