

## ارزیابی تغذیه ای کودکان با فقر آهن

ضیاء الدین قرشی: گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ نویسنده رابط

E-mail: Dr\_ziaedin\_ghorashi@yahoo.com

حسن سلطانی اهری: گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
افشین قلعه گلاب بهبهانی: گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
سونا قرشی: دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دریافت: ۸۶/۱۰/۳، پذیرش: ۸۷/۳/۲۹

### چکیده

**زمینه و اهداف:** فقر آهن شایعترین کمبود تغذیه ای کودکان است. بنابرگزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه تقریباً پنج بیلیون نفر از کمبود آهن رنج می برند. این مطالعه جهت مقایسه تغذیه و دریافت آهن کودکان با آنمی کمبود آهن و آنهاییکه آنمی نداشتند انجام گرفت.

**روش بررسی:** در یک مطالعه مقایسه ای مقطعی بروی کودکانی که در بیمارستان کودکان تبریز در طی سال ۱۳۸۵ بستری شده بودند، نوع تغذیه و دریافت آهن ۶۰ بیمار با آنمی فقر آهن با ۶۰ کودک بعنوان شاهد که آنمیک نبوده و در محدوده سنی ۹ تا ۳۶ ماه قرارداشتند واژ نظر جنسی یکسان بودند مقایسه شد.

**یافته:** میزان متوسط هموگلوبین، حجم متوسط گلبولی و آهن سرم به ترتیب در گروه مورد ۹/۱ گرم درصد، ۱۹/۳۳ و ۱۹/۴۱ میکروگرم درصد و گروه کنترل ۱۲/۶ گرم درصد، ۷۵/۱۸ و ۷۸/۲۸ میکروگرم درصد بود. گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری از نظر سن متوسط شروع تغذیه تکمیلی نداشتند ( $P=0/۰۵۸$ ).

**نتیجه گیری:** دریافت ناکافی و یا نامرتب قطره آهن از سن ۶-۴ ماهگی در موارد زیادی از آنمی فقر آهن گزارش شده بود. غذای تکمیلی به تنهایی نمی تواند از آنمی فقر آهن جلوگیری نماید. تجویز مرتب قطره آهن به مقدار کافی روزانه از سن ۶-۴ ماهگی برای جلوگیری از آنمی فقر آهن ضروری است.

**کلید واژه ها:** آنمی کمبود آهن، تغذیه، کودک، مکمل یاری آهن

### مقدمه

تغذیه کودکان و کمیته علمی آهن یاری تجویز روزانه ۱۵ قطره آهن دوز مناسبی جهت پیش گیری از آنمی کمبود آهن در کودکان ۶-۲۴ ماهه می باشد. فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در شیرخوارگی به اختلال رشد و تکامل و نهایتاً رفتار اجتماعی نامناسب منجر خواهد شد(۷). وقتی که سطح هموگلوبین به کمتر از پنج گرم درصدی رسد، بیقراری و بی اشتیایی بعلوه تاکی کاردي و نارسایی قلبی ایجاد می شود(۸). بعلت مشاهده موارد زیادی از کم خونی فقر آهن خفیف تا متوسط در کودکانی که با مشکلاتی غیر از کم خونی بستری شده بودند، جهت مقایسه کیفیت تغذیه تکمیلی و دریافت آهن و پیداکردن عوامل خطرساز فقر آهن این مطالعه انجام گرفت.

بطورکلی فقر آهن شایعترین کمبود تغذیه ای در کودکان می باشد(۱). سازمان بهداشت جهانی وجود ۵ بیلیون نفر در دنیا با کمبود آهن را تخمین می زند(۲). بیشترین شیوع آنمی فقر آهن در محدوده سنی ۹-۲۴ ماه بعلت رشد سریع شیرخواران می باشد، هرچند که در کودکان سینین مدرسه و قبل از بلوغ با شیوع کمتری وجود دارد (۳-۵). موجودی آهن بدن بزرگسالان خیلی بیشتر از شیرخواران می باشد، برای جبران این مقدار روزانه بطور متوسط ۰/۸ میلی گرم آهن باید در پانزده سال اول زندگی جذب شود(۳). عدم دریافت آهن به همراه تغذیه در شیرخواران ترم از ۶ ماهگی و در نارس ها بعد از ۳-۴ ماه اول زندگی، منجر به تحلیل رفتن و تمام ذخایر آهن خواهد شد (۶). براساس توصیه کمیته کشوری

بدون گوشت، آب میوه، تخم مرغ، عدس، غذاهای آماده و نحوه دریافت آهن بطور مرتب و کافی، یا نامرتب و ناکافی ثبت گردید. آنالیز آماری اطلاعات دو گروه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت. تست های آماری بکار رفته Chi-square و T-Test بود. مقدار  $P$  کمتر از  $0.05$  بعنوان اختلاف معنی دار در نظر گرفته شد.

### یافته ها

از نظر جنسی گروه مورد  $63/3\%$  پسر و  $36/7\%$  دختر، گروه شاهد  $40\%$  پسر و  $40\%$  دختر بود. اختلاف معنی داری از نظر جنس در محدوده سنی  $9-36$  ماه در دو گروه وجود نداشت.  $48/3\%$  کودکان در گروه مورد و  $71/7\%$  گروه شاهد شهری و بقیه از قسمت های روستایی بودند، ولی اختلاف معنی داری بین گروه مورد و شاهد از نظر محل زندگی شان وجود نداشت ( $P=0.073$ ). سن مادران در گروه مورد  $25/52 \pm 4/4$  و در گروه شاهد  $27/17 \pm 5/7$  سال بود ( $P=0.081$ ). جدول ۱ مقایسه بین گروه مورد و شاهد را از نظر برنامه غذایی شامل نوع شیر، آب میوه و تغذیه تکمیلی خانگی یا آماده نشان می دهد. تغذیه تکمیلی در گروه مورد از سن  $7/42 \pm 0/98$  ماه و در گروه شاهد از سن  $7/03 \pm 1/25$  ماه شروع شده بود. این نشانگر نبودن اختلاف معنی دار در سن شروع تغذیه تکمیلی می باشد ( $P=0.058$ ). بر عکس از نظر دریافت آهن بین دو گروه اختلاف معنی دار بود ( $P<0.001$ ) و گروه شاهد آهن المتال بیشتری دریافت کرده بودند. جدول ۲ تاثیر تجویز مرتب و کافی آهن را بر روی هموگلوبین و هماتوکریت نشان می دهد. وزن در گروه مورد و شاهد به ترتیب  $33/3\%$  و  $25-75$  و  $8/3\%$  بین صدک  $25-3$ ،  $43/3\%$  و  $35\%$  بین صدک  $25-75$  و  $23/3\%$  و  $56/7\%$  بین صدک  $75-97$  قرار داشت که اختلاف آنها معنی دار بود ( $P<0.001$ ). نتایج آزمایش‌های خون در گروه مورد و شاهد در جدول ۳ نشان داده شده است. آزمایش مدفع از نظر انگل و خون مخفی در تمام موارد منفی بود.

### مواد و روش ها

طی یکسال از اول فروردین تا آخراسفند ماه ۱۳۸۵ دو هزاروصد بیمار در بخش عفونی بیمارستان کودکان تبریز مستری شده بودند. نتایج آزمایش‌های خون بیمارانی که در محدوده سنی  $9-36$  ماه بودند ارزیابی شد. این مطالعه مورد شاهدی بر روی  $60$  بیمار با تشخیص قطعی آنمی فقرآهن بعنوان گروه مورد انجام گرفت. سپس بصورت راندوم  $60$  بیمار را که بعلی غیر از آنمی مستری شده و در همان گروه سنی با توزیع جنسی مشابه قرار داشتند بعنوان گروه شاهد انتخاب کردیم. معیار انتخاب برای گروه مورد کم خونی فقر آهن به ترتیب در کودکان  $9-24$  ماه و بیشتر از دو سال هموگلوبین کمتر از  $10/5$  و  $11/5$  گرم درصد تعیین گردید. معیارهای انتخاب گروه کنترل هموگلوبین بیشتر از  $11/9$  گرم درصد و یکسان بودن از نظر سن و جنس با گروه مورد بود. چون هیچ آزمایش اضافی و یا هزینه ای به خاطر این مطالعه به بیماران تحمیل نشده بود از نظر کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام این تحقیق بلا منع اعلام شد. با وجود این تمام جوانب برنامه به والدین توضیح داده شد و سپس رضایتمند کنی دریافت گردید. برای تشخیص قطعی آنمی فقرآهن، هموگلوبین، MCHC<sup>۱</sup> MCH<sup>۲</sup> MCV<sup>۳</sup> RDW<sup>۴</sup> با استفاده از شمارشگر سلولی Abacus و روش استاندارد Lysate انجام گرفت. آهن سرم و TIBC<sup>۵</sup> با دستگاه Auto analyzer selectra Ferine و فریتین روش Immunoturbidimetric انجام گرفت. کودکان با یافته های بالینی یا آزمایشگاهی کم خونی بعلل دیگر، بیماران آنمیک همراه با پارازیت ها و مواردیکه کم خونی تغذیه ای فقرآهن اثبات نشده بود از مطالعه کنار گذاشته شدند. سپس نوع، تغذیه اصلی و تکمیلی و دریافت آهن در هر دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه شدند. یافته های بیماران از جمله سن، جنس، محل زندگی، سن مادر، نوع شیر دریافتی، سن کودک در زمانیکه تغذیه تکمیلی شروع شده بود و نوع غذا شامل لعاب برنج، فرنی، نان و چای، سوپ با یا

جدول ۱: مقایسه تغذیه ای گروه مورد و شاهد

نوع غذا	درصد مورد	درصد شاهد	P
لباب برنج	۵۳/۳	۴۵	۰/۳۶۱
نان و چای شیرین	۵۵	۷۳/۳	۰/۰۳۶
آب میوه	۷۱/۷	۷۷/۷	۰/۰۳۲
فرنی	۶۰	۶۵	۰/۰۷۲
سوپ بدون گوشت	۸۶/۷	۴۶/۷	< ۰/۰۰۱
سوپ با گوشت	۶۶/۷	۶۶/۷	۱
تخم مرغ	۶۷/۳	۷۷/۷	۰/۳۰۷
عدس	۴۶/۷	۴۸/۳	۰/۸۵۵
غذای آماده	۱۸/۳	۱۰	۰/۱۹۱
شیر مادر	۶۰	۶۸/۳	۰/۴۴۹
شیر خشک	۱۰	۱۱/۷	۰/۴۴۹
شیر مادر، شیر گاوه، شیر خشک	۳۰	۲۰	۰/۴۴۹

- Mean Corpuscular Volume, MCV
- Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH
- Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC

- Red Cell Distribution Width, RCDW
- Total Iron Bindings Capacity, TIBC

جدول ۲: مقایسه تجویز آهن و میزان هموگلوبین و هماتوکریت در گروه مورد و شاهد

P	درصد شاهد	درصد مورد	
< ۰/۰۰۱	۹۳/۳	۴۵	آهن مصرف کرده
۰/۰۰۶	۷۵	۴۴/۴	دربافت آهن مداوم
۰/۰۰۵	۸۳/۹	۵۵/۶	دربافت آهن کافی
۰/۰۰۱	۷۷	۵۵	آهن مصرف نکرده
۰/۰۰۱	۱۲/۶	۹/۱۱	میزان متوسط هموگلوبین
۰/۰۰۱	۳۴/۸۸	۲۹/۷	میزان متوسط هماتوکریت

جدول ۳: عالائم آزمایشگاهی در گروه مورد و شاهد

SD*	حداکثر								هموگلوبین
	شاهد	مورد	شاهد	مورد	شاهد	مورد	شاهد	مورد	
۰/۵۸	۰/۸۳	۱۲/۲۰	۹/۱۱	۱۵/۲	۱۰/۳	۱۲/۱	۷/۱		هموگلوبین
۰/۲۵	۰/۴۷	۱/۱۲	۰/۷۴	۲	۳/۳۰	۰/۷	۱/۱۰		رتیکولوسیت
۳۸/۹	۴۱/۴۵	۷۹/۹۸	۲۷/۶۳	۲۹۴	۲۶۸	۲۱	۵/۲		فریتین
۱۴/۰۳	۱۵/۴۳	۷۸/۲۸	۱۹/۳۳	۱۵۱	۷۴	۵۵	۵		آهن
۳۲/۶۱	۸۷/۲۳	۲۹۰/۷۲	۴۰۹/۳۷	۳۸۰	۵۸۰	۱۸۰	۲۲۰		TIBC
۷/۹۴	۷/۵۱	۷۵/۱۸	۶۵/۴۱	۸۵	۷۸	۵۶	۴۸		MCV
۲/۲۶	۳/۵۹	۲۸/۰۲	۲۰/۶۴	۳۳	۲۶/۸	۲۲	۱۴/۴		MCH
۲/۶۲	۲/۴۳	۳۱/۱۰	۳۰/۶۴	۳۹	۳۶	۲۷	۲۴/۲		MCHC
۰/۷۷	۲/۴۹	۱۲/۶۴	۱۷/۶۲	۱۲/۳	۳۰/۴	۱۲	۱۴/۴		RDW

\*SD=Standard Deviation

## بحث

ذکر شده است بطوریکه گروه مورد در این بررسی بیشتر از گروه شاهد شیرگاو دریافت کرده بود(۱۰). اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر زمان شروع تغذیه تكمیلی وجود نداشت( $P=0/۰۵۸$ )، ولی در گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی و مطالعات مشابه، غذاهای تکمیلی آهن دار چنانچه از ۴-۶ ماهگی شروع شوند از آنمی فقر آهن جلوگیری می کنند(۱۴ و ۱۳). مطالعه‌ای در پاکستان نشان داد که بیشتر کودکان با آنمی فقر آهن بیشتر از ۶ ماه منحصرأ از شیرماهی تغذیه شده بودند(۱۵). در حالیکه گروه مورد اغلب غذاهایی با آهن کم مثل لعاب برنج و سوپ بدون گوشت مصرف کرده بودند، در گروه شاهد آب میوه و نان با چایی هم مصرف شده بود. غذاهای سرشار از پروتئین و آهن مثل زرده تخم مرغ و عدس، مختصراً در گروه شاهد بیشتر مصرف شده بود. بنابراین غذاهای تکمیلی به تنها یک نمی توانند از آنمی فقر آهن جلوگیری نمایند، این موضوع در مطالعات دیگر هم نشان داده شده است (۱۴). در گروه شاهد تجویز شده بود و اختلاف معنی داری با گروه بیشتر از کودکان تجویز شده بود و اختلاف معنی داری با گروه مورد داشت( $P=0/۰۰۱$ ). طبق بررسی پاییش و ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۸۴ میانگین مصرف مکمل آهن در کودکان شهرستان تبریز ۸۰/۷ درصد می باشد. سطح هموگلوبین و هماتوکریت در گروه شاهد بیشتر از گروه مورد بود که بعلت دریافت کافی آهن در گروه شاهد بود ( $P=0/۰۰۲$ ). یافته های ما همراه با مطالعات دیگر نشان می دهد که

نتایج آزمایش‌های خون در گروه مورد شامل مقدار متوسط هموگلوبین ۹/۱۱ گرم درصد، فریتین ۲۷/۶۳ میکروگرم درصد، آهن سرم ۱۹/۳۳ میکروگرم درصد، TIBC ۴۰/۹۳۷ میکروگرم درصد، اندرس های پائین گلبول قرمز و RCDW=۱۷/۶۲ تشخیص آنمی فقر آهن را مسجّل می کرد. خطر فقر آهن در موقوعی که نیاز فیزیولوژیک آهن افزایش می یابد بیشتر است. در چنین حالاتی فریتین سرم کمتر از ۳۰ میکروگرم درصد برای آنمی فقر آهن تشخیصی می باشد(۴). در هر دو گروه تعداد افراد مذکور بیشتر از مونث بودوی اختلاف معنی دار نبود، هرچند که در مطالعه‌ای توسط Magnous آنمی فقر آهن در پسرها بیشتر از دخترها بود(۹). در مطالعه ما زندگی در مرکز شهر در گروه شاهد بیشتر از گروه مورد بود ، هر چند که این اختلاف معنی دار نبود ولي مطالعه انجام شده در Arizona آمریکا نشان داد که وضعیت اجتماعی اقتصادی پائین برای آنمی فقر آهن ریسک فاکتور محسوس می شود(۱۰). سن متوسط مادران در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود ولي اختلاف معنی دار نبود. گرچه هر دو گروه تقریباً بصورت یکسان شیرماه خورده بودند، چون اکثر افراد گروه مورد آهن المتألف کافی بصورت مرتب بعد از ۴-۶ ماهگی دریافت نکرده بودند، موارد بیشتری از آنمی فقر آهن در این گروه وجود داشت. یافته های مشابهی در مطالعات دیگری توسط Arvas و Saarinen توسط تغذیه ای از نظر آنمی فقر آهن با شیرگاو بعنوان بزرگترین ریسک تغذیه ای از نظر آنمی فقر آهن

### نتیجه گیری

کم خونی آهن منجر به بی اشتهایی و اختلال رشد می شود. تنها شروع غذای تکمیلی از ۶-۴ ماهگی نمی تواند از آنmi فقر آهن پیشگیری نماید، لذا تمام شیرخواران می بایستی بصورت روتن و مرتب آهن دریافت نمایند.

شروع آهن در شیرخواران از سن ۶-۴ ماهگی جهت جلوگیری از آنmi فقر آهن ضروری می باشد(۸و۱۲). در این مورد نمی توان صرفاً به شروع تغذیه تکمیلی بستنده نمود. وزن متوسط در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بوده که این اختلاف معنی دار می باشد ( $P<0.001$ ). این امر می تواند بعلت بی اشتهایی ایجاد شده بعلت آنmi فقر آهن در گروه مورد باشد.

## References

- Verster A, Vander polls JC. Anemia in the Eastern Mediterranean Region. *Eastern Mediterranean Health Journal* 1995; **1**(1): 64-79.
- Stoltzfus RJ. Defining Iron-Deficiency Anemia in Public Health Terms: A Time for Reflection. *J Nutr* 2001; **131**(2): 565-567.
- Behrman R, Kliegman R, Jenson H. *Nelson Textbook of Pediatrics*. 17<sup>th</sup> ed, Philadelphia, Saunders, 2004; PP: 1606-1617.
- Cook JD. Diagnosis and management of iron-deficiency anemia. *Best practice & Research Clinical Hematology* 2005; **18**(2): 319-332.
- Coyer SM. Anemia: Diagnosis and Management. *Pediatr Health care* 2005; **19**(6): 380-385.
- Rudolph AM, Kamei RK, Overby KJ. *Rudolph's Fundamentals of pediatrics*. 3<sup>rd</sup> ed, Toronto, McGraw-Hill, 2002; PP: 520-543.
- Beard JL, Felt B, Schallert T, Burhans M, Connor JR. Moderate iron deficiency in infancy: Biology and behavior in young rats. *Behavioral Brain Research* 2006; **170**(2): 224-232.
- McIntosh N, Helms PJ, Smyth RL. *Forfar and Arneil's Textbook of Pediatrics*. 6<sup>th</sup> ed, London, Churchill Livingstone, 2003; PP: 1059-1070.
- Domellof M, Lonnerdal B, Dewey KG, Cohen RJ, Rivera L, Hernell O. Sex Differences in Iron Statues During Infancy. *Pediatrics* 2002; **110**(3): 545-552.
- Kazal LA. Prevention of Iron deficiency in infants and Toddlers. *American Family Physician* 2002; **66**(7): 1217-1223.
- Saarinen UM. Need for iron supplementation in infants on prolonged breast feeding. *Journal of pediatrics* 1978; **93**(2): 177-180.
- Arvas A, Elgormus Y, Gur E, Alikasifoglu M, Celebi A. Iron Status in breast-fed full-term infants. *Turk J Pediatr* 2000; **42**(1): 22-26.
- Giugliani EJ, Victoria CG. Complementary feeding. *J Pediatr* 2000; **76**(3): 253-262.
- Makrides M, Hawkes JS, Neumann MA, Gibson R. Nutritional effect of including egg yolk in the weaning diet of breast-fed and formula-fed infants: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr* 2002; **75**(6): 1084-1092.
- Fasih Z, Ahmad A, Ali Z. Relationship between iron status, Nutritional status the feeding practices of infants and toddlers with deficiency anemia in different age groups. *Pakistan J Pathol* Mar 2002; **13**(1): 15-21.