

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
دوره ۳۳ شماره ۵ آذر و دی ۱۳۹۰ صفحات ۶۵-۶۱

## همبستگی پروکلستیونین با WBC، ESR و CRP قبل و بعد از درمان سندروم پاسخ التهابی سیستمیک در کودکان زیر ۳ سال

معصومه عابدینی: گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سنترج، ایران  
عبدالرحیم افخم زاده: گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، عضو مرکز تحقیقات کبد و گوارش، دانشگاه علوم پزشکی، سنترج، ایران، نویسنده رابط:  
Email: afkham@gmail.com

سعید ستاری: گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سنترج، ایران  
عباس احمدی: گروه هماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سنترج، ایران  
اسماعیل ایزدپناه: گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سنترج، ایران  
رضا جانمردی: گروه بیهودی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

دریافت: ۹۰/۲/۱۱، پذیرش: ۸۹/۶/۱۶

### چکیده

**زمینه و اهداف:** سندروم پاسخ التهابی سیستمیک (SIRS) یکی از علل عمده بیماری و مرگ و میر در بخش کودکان است و مهم‌ترین و شایع‌ترین علت SIRS عفونت‌ها هستند. این مطالعه به بررسی همبستگی بین CBC, ESR, CRP و پروکلستیونین در کودکان زیر ۳ سال می‌پردازد.

**مواد و روش‌ها:** جامعه مورد مطالعه ۵۰ کودک ۳-۳۶ ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان بعثت بود. روش نمونه گیری سرشماری بود. آزمایش CBC با دستگاه سل کاتر انجام شد، ESR به روش وسترن گرین، CRP به روش نیمه کمی و کشت خون در محیط مونوفازیک صورت گرفت. پروکلستیونین با روش ایمونوکروماتوگرافی نیمه کمی بوسیله کیت‌های BRAHMS, PCT-Q اندازه گیری شد. داده‌ها پس از جمع آوری وارد رایانه شده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرها بررسی گردید. سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

**یافته‌ها:** پروکلستیونین روز اول (قبل از درمان) با CRP همبستگی خوب و با ESR همبستگی متوسط داشت، در حالی که با WBC همبستگی نداشت. ولی در روز سوم درمان، پروکلستیونین با هیچ کدام از مارکرهای ESR، WBC و CRP همبستگی نداشت.

**نتیجه گیری:** در شروع درمان و جهت تایید تشخیص وجود SIRS پروکلستیونین و CRP دارای ییشورین ارزش هستند. جهت پیگیری درمان و ارزیابی چگونگی پاسخ به درمان، پروکلستیونین مارکر بهتری است.

**کلید واژه‌ها:** سندروم پاسخ التهابی سیستمیک (SIRS)، همبستگی، CRP، ESR، WBC، پروکلستیونین

### مقدمه

می‌شود. ۶۴ درصد موارد در بخش‌های ICU روی می‌دهد و ۲۰/۶ درصد موارد، اکتسابی از اجتماع است. علایم آن بسیار متغیر بوده و بر اساس سن، بیماری زمینه‌ای، دوره عفونت و نوع میکروارگانیسم متفاوت است. علایم از یک تب بدون کانون تا لرز، تهوع، استفراغ، اسهال، راش و پتشی و تغییرات هوشیاری WBC بسته به شدت بیماری و زمان مراجعته متفاوت است (۲). WBC بسته از ۱۵۰۰۰ و کمتر از ۵۰۰۰ در سن زیر یک سال و کمتر از ۶۰۰۰ در

سندروم پاسخ التهابی سیستمیک (SIRS) از علل عمده ابتلا و مرگ و میر در بخش کودکان است که مهم‌ترین و شایع‌ترین علت آن عفونت‌ها هستند و با هیبری یا هیپوترمی، تاکیکارادی، تاکی پنه و کاہش یا افزایش گلبول‌های سفید خون مشخص می‌شود و در صورتی که همراه هیپوتانسیون باشد تحت عنوان سپسیس شناخته می‌شود (۱). سپسیس بیماری جدی و تهدیدکننده حیات است که توسط طیف وسیعی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی ایجاد

یک روش سریع و قابل اعتماد برای شروع و قطع درمان آنتی-بیوتیکی مطرح کرده است (۱۴). تحقیقات انجام گرفته در ایران نقش پروکلستیونین را در منژیت و عفونت ادراری کودکان نشان داده است (۱۵ و ۱۶). از آنجا که کشت خون در ۳۰ درصد موارد مشتبه می شود که در مراکز ما بسیار کمتر از این مقدار است از مجموعه عالیم بالینی و تعداد نوتروفیل ها در WBC و همچنین CRP و ESR به عنوان استاندارد پایه استفاده می شود. از طرف دیگر در مطالعه تانگ و همکاران طی یک مرور سیستماتیک روی ۱۸ مطالعه بیان شده که پروکلستیونین قادر به افتراق سپسیس باکتریال از سایر علل غیر باکتریال ایجاد کننده پاسخ التهابی سیستمیک نیست (۱۷).

با توجه به اینکه یکی از مهمترین فاکتورها در کاهش ابتلا و مرگ و میر کودکان مبتلا به سپسیس و SIRS تشخیص سریع و درمان مناسب و صحیح است، یافتن روش های موثرتر و قاطع تر در تشخیص الزاماً است و با توجه به اینکه طی مطالعات انجام شده نقش پروکلستیونین بسیار امیدوار کننده بوده است، بخصوص طی ۱۲ ساعت اول که در آن پروکلستیونین بالا رفته ولی CRP هنوز مشتبه نشده و تغییرات WBC و ESR نیز ایجاد نشده اند (۱۸ و ۱۷). این مطالعه با هدف بررسی همبستگی بین ESR و WBC با پروکلستیونین در SIRS کودکان زیر ۳ سال طراحی و اجرا گردید.

## مواد روش ها

جامعه مورد مطالعه کودکان ۱ تا ۳۶ ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان بعثت سنتیج بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل: تب ۳۷/۷ و بالاتر آگریلاری در کودکان ۱ تا ۳ ماهه، تب بالاتر از ۳۸/۵ آگریلاری در کودکان ۳ ماه تا ۳ سال، شمارش گلولهای سفید بالاتر از ۱۵۰۰۰ و یا کمتر از ۵۰۰۰ در اطفال زیر ۱ سال، و WBC کمتر از ۶۰۰۰ در کودکان ۱-۳ ساله، ضربان قلب بیشتر از ۱۲۰ در کمتر از ۱ سال و بیشتر از ۱۱۰ در کودکان ۱ تا ۳ ساله، تعداد تنفس بیشتر از ۴۰ در کمتر از ۱ سال و بیشتر از ۳۰ در ۱ تا ۳ ساله، درجه حرارت بیشتر از ۳۸ و کمتر از ۳۶ درجه سانتی گراد بودند. بیمارانی که معیار کامل SIRS را داشتند، وارد مطالعه شدند. معیار خروج از مطالعه شامل وجود SIRS به همراه هیپو تانسیون بود که سپسیس تلقی می شود. ۵۰ کودک که دارای معیارهای بالینی SIRS بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری سرشماری بود. از هر کودک ۲ نمونه (اولی قبل از شروع درمان و دومی ۷۲ ساعت بعد) تهیه شد. این دو نمونه از نظر سطح پروکلستیونین، CBC، ESR و CRP بروزی شدند. روز سوم پس از شروع درمان مجدداً CBC، ESR CRP و PCT اندازه گیری شد و ارزیابی بالینی از بیماران به عمل آمد و نتایج بالینی و آزمایشگاهی مقایسه گردید. داده ها پس از جمع آوری وارد رایانه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی و ضریب همبستگی پرسون خطی ارتباط بین متغیر بررسی گردید.

فاصله ۱ تا ۳ سالگی، ضربان قلب بیشتر از ۱۲۰ تا یک سالگی و بیشتر از ۱۱۰ در فاصله ۱ تا ۳ سالگی، تعداد تنفس بیشتر از ۴۰ تا یک سالگی و بیشتر از ۳۰ در فاصله ۱ تا ۳ سالگی و حرارت بیشتر از ۳۸ و کمتر از ۳۶ درجه سانتی گراد مطرح کننده SIRS است (۲). نمونه هایی از مایع مغزی نخاعی (CSF)، ادرار و سایر محل های در دسترس که احتمال عفونت در آنها به عنوان منبع اولیه بیماری وجود دارد، تهیه شد. از آنجا که تشخیص و درمان SIRS و سپسیس از اورژانس های کودکان می باشد، در موارد مشکوک، درمان دارویی بلا فاصله پس از بستری شدن در بیمارستان اندیکاسیون دارد. زیرا تاخیر در شروع درمان پیش آگهی بیماری را بدتر می کند. در صورت عدم درمان ۵-۱۰ درصد منژیت، ۱۰ درصد عالیم لوکالیزه و ۳۰ درصد باکتریمی مداوم پیدا می کنند (۳). نکته چالش برانگیز این است که سپسیس فاقد عالیم اختصاصی بوده و کشت های میکروبی بخصوص کشت خون به دلایل مختلف از جمله مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک قبل از مراجعه به پزشک و انجام آزمایش ها غالباً منفی می باشد. از طرفی کشت نیاز به حداقل ۵ سی سی خون در دو نوبت دارد که با توجه به سن شیر خوار، حجم قابل توجهی است و همچنین کشت خون ۴۸ ساعت زمان نیاز است. علاوه برای بسیاری از باکتری ها محیط اختصاصی لازم است که در اکثر مراکز وجود ندارد و ممکن است کشت خون در مراحل اولیه منفی باشد. از طرف دیگر کشت میکری، پاسخ التهابی میزان و اختلالات ارگانها را نشان نمی دهد (۴). بیمارکرهای زیادی جهت تشخیص زودرس سپسیس پیشنهاد شده است از جمله IL6,IL8,TNF alpha و پروکلستیونین که مطالعات گسترده ای روی آنها انجام شده است، ولی در کتب مرجع پژوهشی هنوز بر WBC,ESR,CRP تاکید شده است. پروکلستیونین می تواند به عنوان مارکری برای تشخیص سپسیس به کار رود و با شدت آسیب ارگانها و شدت بیماری ارتباط دارد. در میان بیمارکرهای یادشده در مقالات متشر شده، توجه روزافزونی به پروکلستیونین وجود دارد (۵).

پروکلستیونین (PCT) یک پروتئین اولیه در ستر کلستیونین است. هرچند کلستیونین توسط سلولهای C تیروئید ساخته می شود، ولی پروکلستیونین به وسیله سلولهای متعدد و ارگان های مختلف در پاسخ به عفونت های باکتریایی تولید می گردد (۶ و ۷). پروکلستیونین در عفونت های ویروسی، عفونت های موضعی، اختلالات آرژیک، بیماری های اتو ایمیون و یا دفع پیوند افزایش پیدا نمی کند. موارد افزایش آن علاوه بر عفونت های سیستمیک باکتریال، جراحی های بزرگ، ترومای شدید و سوختگی در نوزادان است (۸-۱۰). در دهه اخیر مطالعات متعددی بر روی پروکلستیونین به ویژه در بخش های مراقبت ویژه (ICUs) انجام شده است که نتیجه آنها حاکی از اهمیت ویژه پروکلستیونین در مقایسه با IL6,IL8,CRP و شمارش نوتروفیل ها در تعیین سیر و پیش آگهی سپسیس و SIRS می باشد (۱۱-۱۳) و آن را به عنوان

جدول ۲، ضرایب همبستگی پروکلستیونین با CBC و CRP را در روز اول و روز سوم نشان می‌دهد. هم چنان که از جدول پیداست، پروکلستیونین روز اول (قبل از درمان) با همبستگی خوب و با ESR همبستگی متوسط داشت، در حالی که با WBC همبستگی نداشت. ولی در روز سوم درمان، پروکلستیونین با هیچ کدام از CBC و ESR و CRP همبستگی نداشت.

جدول ۲: ضرایب همبستگی پیوelon پروکلستیونین با CBC و ESR در روز اول و روز سوم CRP

P	R	روز سوم	P	R	روز اول	پروکلستیونین
۰/۵		۰/۰۸۴	۰/۴		۰/۱۱۴	<b>WBC</b>
۰/۸		۰/۰۳۶	۰/۰۴		۰/۲۸۹	<b>ESR</b>
۰/۶		۰/۰۷۵	۰/۰۱		۰/۶۵۲	<b>CRP</b>

### بحث

در آزمایش دوم که سه روز بعد از شروع درمان انجام شده، تمام موارد پروکلستیونین به حد نرمال رسید که نمایانگر کاهش سریع پروکلستیونین بعد از شروع درمان و پاسخ بالینی بوده است. در حالی که ۱۸ نفر از بیماران بعد از سه روز WBC غیرطبیعی و ۶ بیمار ESR غیرنرمال و ۱۰ نفر CRP غیرطبیعی داشته‌اند که نشان دهنده تغییرات آهسته تر این مارکرها نسبت به پروکلستیونین است (جدول ۱). به عبارت دیگر پروکلستیونین جهت پیگیری درمان و ارزیابی چگونگی پاسخ به درمان مناسب تر است. بنابراین در شروع درمان و جهت تایید تشخیص وجود SIRS پروکلستیونین و CRP دارای بیشترین ارزش هستند و WBC ارزش کمتری دارد. البته با توجه به اینکه پروکلستیونین طی ۶ ساعت اول پس از شروع بیماری افزایش می‌یابد و افزایش آن سریع تر از CRP صورت می‌گیرد، مارکر بهتری است.

جدول ۲ ضرایب همبستگی را در روز اول و سوم (قبل و بعد از شروع درمان) نشان می‌دهد. پروکلستیونین با CRP همبستگی خوب و با ESR همبستگی متوسط داشت، در حالی که با WBC همبستگی نداشت. در مورد ESR که همبستگی کمتری داشت می‌توان گفت چون افزایش آن کنترل از پروکلستیونین و CRP می‌باشد، بنابراین جهت تشخیص در ۲۴ ساعت اول بستری نمی‌توان به آن تکیه کرد. هرچند مثبت بودن آن دارای ارزش است، ولی موارد منفی ردکننده نیست.

در مطالعه سیادتی و همکاران (۱۳۸۴) که ارزش تشخیصی پروکلستیونین در افتراق منتشریت باکتریال از غیرباکتریال را در ۴۰ کودک مبتلا به منتشریت بررسی کرده، تفاوت آماری معنی دار بوده است (۱۵). در مطالعه نیکفر و همکاران در دانشگاه تهران کاربرد پروکلستیونین در عفونت‌های اداری کودکان بررسی شده و ارجحیت معنی داری برای پروکلستیونین نسبت به CRP به دست آمده است که با نتایج مطالعه حاضر سازگار است (۱۶).

این طرح پس از تصویب در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کردستان شروع شد و در تمام مراحل کار اصول اخلاقی رعایت گردید.

گرفتن شرح حال و معاینه بالینی توسط رزیدنت کودکان انجام شد. آزمایش CBC با دستگاه سل کانتر Sysmex KX21 به روش نیمه کمی و کشت ESR به روش وسترن گرین، CRP به روش نیمه کمی و کشت خون در محیط مونوفازیک صورت گرفت. پروکلستیونین با روش BRAHMS,PCT- Q اندازه گیری شد. داده‌ها پس از جمع آوری وارد رایانه شده و از طریق نرمافزار SPSS و به وسیله ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل صورت گرفت.

### یافته‌ها

میانگین سنی کودکان مورد مطالعه ۱۷/۰ ماه با انحراف معیار ۱۰/۰۱ ماه بود. از این ۵۰ کودک، ۲۹ نفر (۵۸ درصد) پسر و ۲۱ (۴۲ درصد) دختر بودند. پروکلستیونین روز اول درمان در ۱۷ کودک (۳۴ درصد) طبیعی و در ۳۳ نفر (۶۶ درصد) غیرطبیعی بود. شمارش گلbul های سفید خونی در ۷ نفر طبیعی و در ۲۳ کودک غیرنرمال بود. CRP روز اول در ۲۲ کودک نرمال و در ۲۸ نفر غیرنرمال بود. ESR در ۳۷ کودک نرمال و ۱۳ نفر غیرنرمال بودند. و کودکان با ESR نرمال ۳۷ نفر و غیرنرمال ۱۳ نفر بودند. در آزمایش دوم که سه روز بعد از شروع درمان انجام شده، تمام موارد پروکلستیونین به حد نرمال رسید، در حالی که ۱۸ نفر از بیماران بعد از سه روز WBC غیرطبیعی و ۶ بیمار ESR غیرنرمال و ۱۰ نفر CRP غیرطبیعی داشته‌اند. قابل ذکر است که کلیه بیماران در روز سوم پس از شروع درمان آنتی بیوتیک از نظر بالینی بهبود واضحی داشتند (جدول ۱).

جدول ۱: مقایسه نتایج پروکلستیونین و CBC و ESR و CRP قبل و بعد از درمان SIRS

P	متغیر	روز سوم	روز اول	تعداد (درصد)
۰/۰۲	WBC	۳۲(۶۴)	۷(۱۴)	۷(۱۴)
	طبیعی	۱۸(۳۶)	۴۳(۸۶)	۴۳(۸۶)
۰/۰۵	ESR	۴۴(۸۸)	۳۷(۷۴)	۳۷(۷۴)
	طبیعی	۶(۱۲)	۱۳(۲۶)	۱۳(۲۶)
۰/۰۴	CRP	۴۰(۸۰)	۲۱(۴۲)	۲۱(۴۲)
	طبیعی	۱۰(۲۰)	۲۹(۵۸)	۲۹(۵۸)
<۰,۰۰۱	پروکلستیونین	(۱۰۰)	۱۷(۳۴)	۱۷(۳۴)
	طبیعی	۰(۰)	۳۳(۶۶)	۳۳(۶۶)
<۰,۰۰۱	غیرطبیعی	(۱۰۰)	۱۷(۳۴)	۱۷(۳۴)
	غیرطبیعی	۰(۰)	۳۳(۶۶)	۳۳(۶۶)

تجویز می شود) باعث افزایش مدت بستری و مقاومت میکروبی و افزایش عوارض دارویی و هم چنین ابتلای به عفونت بیمارستانی می گردد. در تحقیق مارک و همکاران در فرانسه پروکلسیتونین باعث کاهش مصرف آنتی بیوتیک به هنگام شیوع منژیت ویرال در کودکان شده است (۲۲).

از محدودیت های ما در این مطالعه عدم امکان استفاده از PCR به عنوان استاندارد طلایب اثبات عفونت بود. محدودیت دیگر به علت عدم همکاری والدین کودکان جهت انجام آزمایش های تکراری برای پیگیری، امکان تکرار آزمایش و پیگیری نبود.

### تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که هزینه این طرح را تامین نمودند، تشکر و قدردانی می گردد. در ضمن این مقاله استخراج شده از پایان نامه دستیاری می باشد.

در مجموع می توان گفت که پروکلسیتونین و CRP بیشتر از دو مارکر دیگر در روز اول بیماری ارزشمند هستند و در میان این دو، پروکلسیتونین ارزش بیشتری دارد که این نتیجه با مطالعه ری و همکاران که روی ۹۶ کودک بستری در بخش مراقبت ویژه انجام شد و پروکلسیتونین در تشخیص SIRS برتری مشخص نسبت به CRP داشت، هم خوانی دارد (۱۹). در مطالعه ارکادر و همکاران (۲۰۰۶) پروکلسیتونین در افتراق SIRS از سپسیس مفید تشخیص داده شد و نقطه cut off برای پروکلسیتونین  $2 \text{ ng/ml}$  به دست آمد (۲۰). در مطالعه آسیکات و همکاران (۱۹۹۳) مشخص گردید که میزان پروکلسیتونین در افراد سالم بسیار اندک می باشد و متعاقب عفونت های باکتریال افزایش پیدا می کند که بسته به شدت بیماری افزایش آن نیز بیشتر خواهد شد (۲۱). نکته جالب اینکه در مطالعه حاضر هر ۵۰ بیمار دارای اکشت خون منفی بوده اند و درمان به صورت تجربی شروع شده و استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها (که معمولاً حداقل طول مدت توصیه شده برای درمان

## References

1. Feign textbook of pediatric infectious disease. 5<sup>th</sup> ed. PP: 810-824.
2. Nelson textbook of pediatrics. 17<sup>th</sup> ed. 2004; PP: 841-850 & 793-795.
3. Harbarth S, Holeckova K, Froidevaux C, Pittet D, Ricou B, Grau GE. Diagnostic value of procalcitonin, interleukin-6, and interleukin-8 in critically ill patients admitted with suspected sepsis. *Am J Respir Crit Care Med* 2001; **164**(3): 396-402.
4. Gendrel D, Raymond J, Coste J, Moulin F, Lorrot M, Guérin S, et al. Comparison of procalcitonin with C-reactive protein, interleukin 6 and interferon-alpha for differentiation of bacterial vs. viral infections. *Pediatric Infect Dis J* 1999; **18**(10): 875-881.
5. Galetto A, Lacour A, Zamora SA, Gervaix A. Procalcitonin, IL 6, IL 8, IL 1 receptor antagonist & CRP as identifications of serious bacterial infections with fever without localizing sign. *Eur J Pediatric* 2001; **165**: 95-100.
6. Maruna P, Nedeljková K, Gürlich R. Physiology and genetics of procalcitonin. *Physiology Res* 2000; **49** Suppl 1: 57-61.
7. Karzai W, Oberhoffer M, Meier-Hellmann A, Reinhart K. Procalcitonin, a new indicator of the systemic response to severe infections. *Infection* 1997; **25**(6): 329-334.
8. Von Heimburg D, Stieghorst W, Khorram-Sefat R, Palau N. Procalcitonin-a sepsis parameter in severe burn injuries. *Burns* 1998; **24**(8): 745-750.
9. Reith HB, Mittelkötter U, Debus ES, Küssner C, Thiede A. Procalcitonin in early detection of postoperative complications. *Dig Surg* 1998; **15**(3): 260-265.
10. Meissner M, Tschaikowsky K, Hutzler A, Schick C, Schüttler J. Postoperative plasma concentrations of procalcitonin after different types of surgery. *Intensive Care Med* 1998; **24**(7): 680-684.
11. Tsangaris I, Plachouras D, Kavatha D, Gourgoulis GM, Tsantes A, Kopterides P, et al. Diagnostic and prognostic value of procalcitonin among febrile critically ill patients with prolonged ICU stay. *BMC Infect Dis* 2009; **22**: 213.
12. Lacour AG, Gervaix A, Zamora SA, Vadas L, Lombard PR, Dayer JM, et al. Procalcitonin, IL-6, IL-8, IL-1 receptor antagonist and C-reactive protein as identifiers of serious bacterial infections in children with fever without localising signs. *Eur J Pediatric* 2001; **160**(2): 95-100.
13. Harbarth S, Holeckova K, Froidevaux C, Pittet D, Ricou B, Grau GE, et al. Diagnostic value of procalcitonin, interleukin-6, and interleukin-8 in critically ill patients admitted with suspected sepsis. *Am J Respir Crit Care Med* 2001; **164**(3): 396-402.
14. Han YY, Doughty LA, Kofos D, Sasser H, Carcillo JA. Procalcitonin is persistently increased among children with poor outcome from bacterial sepsis. *Pediatr Crit Care Med* 2003; **4**(1): 21-25.
15. Sedighi I, Rahimi H, Kadkhodaei A, Siadati A. Evaluation of sensitivity and specificity of CSF Procalcitonin levels in differentiation of bacterial and viral Meningitis in children older than two months, Markaz Tebbi Hospital, 1382-83. *Journal of Tehran Faculty of Medicine* 2005; **3**(63): 255-262.
16. Schroeder S, Hochreiter M, Koehler T, Schweiger AM, Bein B, Keck FS. Procalcitonin (PCT)-guided algorithm reduces length of antibiotic treatment in surgical intensive care patients with severe sepsis: results of a prospective randomized study. *Langenbecks Arch Surg*. 2009; **394**(2): 221-226.
17. Tang Benjamin, Eslick GD, Ceag JC, McLean AS. Accuracy of procalcitonin for sepsis diagnosis in critically

- ill patients: systematic review and Meta – analysis. *Lancet Infect Dis* 2007; **7**(3): 210 – 217.
18. López Sastre JB, Pérez Solís D, Roqués Serradilla V, Fernández Colomer B, Coto Cotallo GD, Krauel Vidal Xet al. Procalcitonin is not sufficiently reliable to be the sole marker of neonatal sepsis of nosocomial origin. *BMC Pediatr* 2006; **18**(6): 16.
19. Rey C, Los Arcos M, Concha A, Medina A, Prieto S, Martínez P, et al. Procalcitonin and C-reactive protein as markers of systemic inflammatory response syndrome severity in critically ill children. *Intensive Care Med* 2007; **33**(3): 477-484.
20. Arkader R, Troster EJ, Lopes MR, Júnior RR, Carcillo JA, Leone C, et al. Procalcitonin does discriminate between sepsis and systemic inflammatory response syndrome. *Arch Dis Child* 2006; **91**(2): 117-120.
21. Assicot M, Gendrel D, Carsin H, Raymond J, Guilbaud J, Bohuon C. High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection. *Lancet* 1993; **341**(8844): 515-518.
22. Du B, Pan J, Chen D, Li Y. Serum procalcitonin and interleukin-6 levels may help to differentiate systemic inflammatory response of infectious and non-infectious origin. *Chin Med J (Engl)* 2003; **116**(4): 538-542.

Archive of SID