

Comparison the Effect of Two Chronic and Acute Loading of Sodium Bicarbonate Supplementation on Fatigue and Performance Indices after Exhaustive Aerobic Activity in Active Men

Asgar Tofighi, Saber Saedmocheshi*

Department of Exercise Physiology, Urmia University, Urmia, Iran

Received: 23 Nov, 2012 Accepted: 2 Mar, 2013

Abstract

Backgrounds and Objectives: Approach of supplementation usage and its effect on fatigue retarding had been attention of athletes and coaches. The aim of this study was to comparison the acute and chronic loading of sodium bicarbonate supplement on fatigue and performance indices after exhaustive aerobic activity in active men.

Materials and Methods: 10 active men were selected and assign to experimental group. The participants had taken sodium bicarbonate supplement in two forms of acute and chronic loading. For determine the amount of lactate production and blood PH, blood samples were taken in four stages including's before exercise and after either supplementation method usage and also immediately after exercise test. Modified BRUCE moderate-intensity test were done up to 75% of maximum heart rate as exercise test.

Results: The result showed that bicarbonate supplement in form of chronic loading inhibits blood lactate accumulation significantly. Compared with acute model, chronic loading of sodium bicarbonate increased the duration of activity and blood PH up to 26 percent ($P<0/05$).

Conclusion: It seems that chronic loading of sodium bicarbonate by improving the buffering capacity increase the amount of blood PH and retarding the fatigue period and induces the much time of activity.

Keywords: Bicarbonate sodium, Chronic and acute loading, Blood PH, lactate, Young Men, Exhaustive aerobic activity

*Corresponding author:

E-mail: saedsaber384@gmail.com

مقاله پژوهشی

مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم بر شاخصهای خستگی و عملکردی مردان فعال به دنبال فعالیت هوایی و امانده ساز

اصغر توفیقی: گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

صابر ساعد موچشی: گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، نویسنده رابط:

E-mail: saedsaber384@gmail.com

دریافت: ۹۱/۹/۳ پذیرش: ۹۱/۱۲/۱۲

چکیده

زمینه و اهداف: رویکرد استفاده از مکمل‌های غذایی در به تاخیر انداختن خستگی ناشی از ورزش همواره مورد توجه ورزشکاران و مردمان بوده است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو نوع بارگیری کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت مکمل بیکربنات سدیم به همراه فعالیت هوایی و امانده‌ساز بر شاخصهای خستگی و عملکردی در مردان جوان فعال بود.

مواد و روش‌ها: تعداد ۱۰ مرد فعال بطور غیرتصادفی انتخاب و در یک طرح تجربی طی دو مرحله بارگیری کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت؛ مکمل بیکربنات را مصرف کردند. برای محاسبه لاكتات و PH خون، نمونه‌های خونی در طول ۴ مرحله در حالت ناشتاگی، قبل از شروع تست ورزشی، پس از بارگیری کوتاه‌مدت و بلند مدت مکمل و بلافلسله پس از اجرای تست مربوط به هر مرحله بارگیری گرفته شد. آزمون ورزشی شامل تست بروس تعديل شده GXT با شدت ۷۵٪ ضربان قلب بیشینه بود.

یافته‌ها: نتایج آماری نشان داد که مصرف بیکربنات در مدل بارگیری طولانی‌مدت به شکل معناداری از افزایش لاكتات خون جلوگیری می‌کند؛ همچنین این مدل بارگیری در مقایسه با نوع کوتاه‌مدت آن باعث افزایش مدت زمان انجام فعالیت و افزایش ۲۶ درصدی میزان PH خون شد ($P < 0.05$).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد بارگیری طولانی‌مدت بیکربنات سدیم با افزایش ظرفیت تامponی بدن باعث افزایش مقدار PH خون شده و با به تاخیر انداختن زمان رسیدن به خستگی، مدت زمان انجام فعالیت را طولانی‌تر می‌کند.

کلید واژه‌ها: بیکربنات سدیم، بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت، PH خون، لاكتات، مردان جوان، فعالیت هوایی و امانده ساز

مقدمه

درگیر در ورزش می‌شود (۲). خستگی به عنوان «ناتوانی در حفظ برون ده توانی معین یا مورد انتظار» تعریف شده است (۳). فعالیت عضلانی شدید ممکن است موجب تغییر PH درون سلولی شود، به طوری که در آغاز فعالیت، به دلیل کاتابولیسم کراتین فسفات، حالت قلیابی ایجاد شده و در ادامه با شدت یافتن گلیکولیز، فضای اسیدی حاکم می‌شود (۴). اغلب یافته‌ها در بیان علل خستگی و محل بروز آن، به مواردی نظیر دستگاه‌های انرژی (ATP-CP)

افراد شرکت کننده در رویدادهای ورزشی بدنی کسب بهترین نتایج و رتبه‌های عالی در مسابقات می‌باشند. این افراد سعی می‌کنند که بهترین اجرای خود را به نمایش بگذارند و در این میان عوامل متعددی از بروز عملکرد ایده‌آل آنها جلوگیری می‌کند (۱). از جمله سازوکاری که عملکرد ورزشی افراد را کاهش داده و از ادامه آن جلوگیری می‌کند افزایش عوامل خستگی در بدن است که این سازوکار سبب ایجاد خستگی و کوفتگی بدن و عضلات

این تحقیق طی دو جلسه جداگانه با فاصله ده روزه انجام شد. این دوره ده روزه بخاطر ممانعت تاثیر بارگیری کوتاه مدت مکمل و دوره تمرينی بر بارگیری طولانی مدت آن و آزمون ورزشی مربوط به این مرحله بود (۲۱). تعداد ۴۵ دانشجو برای شرکت در تحقیق داوطلب شدند که پس از گرفتن رضایت نامه از آنها، با توجه به شرایط تحقیق ۱۰ نفر (سن ۱۸ ± ۲/۸، قد: ۲۳/۲ ± ۱/۷۵ سانتی متر، وزن: ۶۵ ± ۲/۴ کیلوگرم) به صورت غیرتصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به دلیل مصرف بیکربنات سدیم آزمودنی‌ها از افرادی بودند که سابقه بیماری دستگاه گوارشی، قلبی - عروقی، تنفسی و بیماری خاص نداشتند. دو روز قبل از آزمون افراد به منظور آشنایی با پروتکل ورزشی در محل آزمون جمع شده و با نحوه کار بر روی دستگاه آشنا شدند. بارگیری مکمل در دو مرحله کوتاه مدت و طولانی مدت به نمونه‌ها داده شد. در مرحله کوتاه مدت ۰/۳ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بیکربنات سدیم که در ۲۵۰ میلی‌لیتر آب حل شده بود ۹۰ دقیقه قبل از شروع تست و در مرحله طولانی مدت ۰/۵ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در طی ۴ مرحله در روز و به مدت ۵ روز مصرف شد (۲۲، ۲۳). در روز آزمون مکمل مصرف نشد. برای بررسی متغیرهای بیوشیمیایی، عمل خونگیری در طول ۴ مرحله در حالت ناشتابی، قبل از شروع تست ورزشی، پس از بارگیری کوتاه مدت و بلند مدت مکمل و بلافاصله پس از اجرای تست مربوط به هر مرحله بارگیری گرفته شد. بدین منظور در حالت استراحت، ۵ میلی‌لیتر خون گرفته شد و نمونه‌ها برای اندازه‌گیری PH و لاكتات مورد استفاده قرار گرفت. لاكتات سرم با استفاده از روش الیزا و توسط کیت آزمایشگاهی ساخت شرکت پارس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های لاكتات می‌بایست به محض اخذ شدن به آزمایشگاه ارجاح داده می‌شدند چون به محض گذشت ۱۵ دقیقه از عمل خونگیری خود پلاسمای نیز شروع به تولید لاكتات می‌کرد. آزمون ورزشی شامل آزمون بیشینه GXT با استفاده از بروس تعديل شده با شدت ۷۵ درصد ضربان قلب بیشینه پیش‌بینی شده بود. در طی این آزمون ضربان قلب به طور مداوم اندازه‌گیری می‌شد و از مقیاس بورک در تعیین شدت تمرينات و رسیدن به خستگی ارادی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده ابتدا از آمار توصیفی جهت تنظیم داده‌ها و تعیین شاخص‌های گرایش مرکزی و شاخص‌های پراکنده‌گی استفاده شد و سپس برای مقایسه اختلاف موجود در میانگین توزیع شاخص‌های مربوط به دو مدل بارگیری از آزمون t همبسته استفاده شد. سطح معناداری ۵ درصد برای آزمون فرضیات در نظر گرفته شد و تمام مراحل آماری با استفاده از بسته نرم‌افزاری SPSS نسخه ۱۸ انجام شد.

گلیکولیز و اکسیداسیون هوازی)، تجمع فرآورده‌های جانبی متابولیسم، سیستم عصبی، و اختلال در سازوکار انقباضی متمرکز شده است (۵). با فرها از جمله مکمل هایی هستند که امروزه مصرف آنها در بین ورزشکاران به منظور حفظ انقباض عضلاتی و به تأخیر انداختن خستگی رایج شده است (۶). امروزه به دلیل وسعت کاربرد مواد کمکی نیروز، تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است؛ از این جمله می-توان به پژوهش‌های انجام شده در زمینه سیستم‌های تامپونی فسفات، پروتئین، سیترات سدیم و بهویژه بیکربنات سدیم اشاره کرد. اگرچه برای سالیان متمادی عوامل کمکی نیروزا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است، اما هنوز در مورد تاثیر آنها شک و تردید وجود دارد (۶، ۷). بیکربنات سدیم به عنوان یکی از این عوامل معرفی شده است که عمل آن خشتش کردن بیون‌های هیدروژن برای تشکیل دی اکسید کربن و آب نشده است (۷). این مکمل تاکنون از سوی سازمان‌های بین‌المللی ورزشی به عنوان یک ماده شیمیایی غیرقانونی معرفی نشده است و مصرف آن به منظور بهبود عملکرد ورزشی، در بین ورزشکاران رشته‌های مختلف شایع شده و توجه بسیاری از پژوهشگران را نیز به خود جلب کرده است (۸). برخی از تحقیقات افزایش در توان بی‌هوازی و مدت زمان اجرا را بعد از مصرف این مکمل گزارش کرده‌اند (۹)؛ با این حال بیشتر پژوهش‌های انجام شده، اثر حاد مصرف بیکربنات سدیم را تنها به دنبال یک تکرار انجام آزمون بررسی کرده‌اند. به عنوان مثال درباره اثر این مکمل بر لاكتات خون بعد از یک جلسه فعالیت تناوبی شدید، گزارش‌ها نشان می‌دهد که به دنبال بهبود عملکرد، میزان تجمع این شاخص نیز به طور معناداری زیاد می‌شود (۱۰-۱۲). مطالعات انجام شده روی PH نشان می‌دهد که مصرف بیکربنات سدیم در شروع تمرين موجب افزایش PH خون می‌شود (۱۳، ۱۴). با این حال در تحقیق کاستیل و همکارانش در مورد تاثیر این مکمل در شروع تمرينات شدید، افزایش این شاخص با مقادیر گروه شاهد تفاوت معناداری نداشت (۱۵). در پژوهش‌های انجام شده دو مدل بارگیری برای مکمل بیکربنات سدیم تعریف شده است: بارگیری کوتاه مدت و بلندمدت. مدل بارگیری کوتاه مدت در حداود ۹۰-۶۰ دقیقه قبل از فعالیت ورزشی و بارگیری طولانی مدت آن ۶-۵ روز به طول می‌انجامد (۱۶-۱۸). نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که هر دو مدل بارگیری این مکمل سبب افزایش کار انجام شده از ۹ به ۲۱ درصد و افزایش توان اوج عملکردی از ۵/۳ به ۸/۷ (۱۹-۲۲). اغلب تحقیقات انجام گرفته به تاثیرات ارگوژنیکی این مکمل متمرکز شده و تحقیقات کمی در مورد مقایسه بین دو مدل بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت و برتری هر کدام انجام گرفته است. در تنها تحقیقی که به مقایسه دو مدل بارگیری گزارش نشده است (۲۱)، در این تحقیق سعی شد تا علاوه بر مقایسه بین دو مدل بارگیری، اثر استفاده این مکمل بر شاخص‌های خستگی، عملکرد و اسیدیت بدن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش‌ها

تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی بود که با یک گروه تجربی، به شکل میدانی و به صورت پیش‌آزمون - پس آزمون انجام گرفت.

متغیر	سن(سال)	قد(سانتی متر)	وزن(کیلو گرم)	شاخص توده بدن
۲۳/۳±۱/۳	۱۷۵±۲/۸	۶۵±۲/۴±۲/۶	۲۱/۲۴±۱/۴	

جدول ۲: نتایج آزمون t همبسته در تعیین اختلاف توزیع شاخص‌های آزمون بین دو مدل بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت بیکریبات سدیم

شاخص	تغییرات	میانگین	همبستگی	% فاصله اطمینان	حد بالایی	آمحاسبه شده	درجه آزادی	سطح معناداری
لاکات	-۱/۰۰۰۵	.۷۸۲	-	-۹/۷۰۶۷۱	۶/۷۰۶۷۱	-۰/۴۱۳	۹	۰/۰۴۹ ^{***}
PH	.۰۶۲	.۷۸۷	.۰/۱۱۴۹۲	۰/۰۲۱۴۹۲	۲/۸۸۲	۹	۰/۰۲۸ ^{**}	۰/۰۲۸ ^{**}
مدت زمان انجام فعالیت	.۰/۴۹	.۷/۹۰	.۰/۱۴۶۶۹۶	.۰/۱۲۸۵۳۷	۷/۰۴۳	۹	۰/۰۰۰ [#]	P>.۰/۰۰۱*; P>.۰/۰۵*

نظر می‌رسد مصرف این مکمل اثر مثبتی بر عملکرد ورزشی داشته باشد. در تأیید این موضوع پژوهشگران دریافتند که مصرف مکمل بیکریبات سدیم موجب بهبود عملکرد شناگران سرعتی می‌شود (۲۳). پژوهشگران بر این باورند که افزایش پروتون‌های بافری می‌تواند خستگی را به تاخیر بیندازد و این کار با بهبود استفاده انرژی سوپسترا و حفظ انتقاض عضلانی انجام می‌شود (۱۱). همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بارگیری طولانی مدت بیکریبات سدیم، تاثیر مثبتی بر عملکرد ورزشی و مدت زمان انجام فعالیت دارد. این یافته‌ها می‌تواند از اثر ارگوژنیکی ناشی از ایجاد شرایط آکالولزی بارگیری بلند مدت مکمل بیکریبات سدیم حکایت داشته باشد که ممکن است با افزایش ظرفیت تامپونی در ارتقای سطح عملکرد موثر باشد. این یافته‌ها با نتایج برخی از تحقیقات همخوانی دارد. نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که مصرف بیکریبات سدیم، موجب افزایش معنادار سطوح بیکریبات پلاسمای نسبت به سطح استراحتی آن می‌شود (۵،۲۰). افزایش PH خون و مدت زمان عملکرد نیز در برخی پژوهش‌ها گزارش شده است (۱،۲۱). با این وجود برخی از گزارش‌ها نیز عدم افزایش معنادار PH و مدت زمان فعالیت را پس از مصرف این مکمل گزارش کردند. پژوهشگران بر این باورند که در زمینه اثر مکمل بیکریبات سدیم بر تغیرات شاخص‌های عملکردی مدت زمان فعالیت تاثیرگذار است. به عنوان مثال گزارش شده است که در فعالیت‌های کمتر از ۱ دقیقه، زمان کافی برای متابولیسم گلیکولیز، تولید پروتون، افزایش ظرفیت تامپونی داخل سلولی و در نتیجه ایجاد شب مشیت بین محیط داخل و خارج سلول وجود ندارد و از این رو در تحقیقاتی که فعالیت آنها کمتر از ۱ دقیقه و یا بیشتر از ۳۰ دقیقه انجام گرفته، تاثیر مثبتی از اثر بخشی این مکمل گزارش نشده است (۱۸،۱۱).

یافته‌ها

ویژگی‌های عمومی آزمودنی‌ها در جدول ۱ گزارش شده است. نتایج مربوط به اندازه‌گیری لاکات سرم در دو مدل بارگیری بیکریبات سدیم نشان داد که اختلاف معناداری در این شاخص بین دو مدل وجود دارد. همچنین نتایج مربوط به اندازه‌گیری PH و مدت زمان انجام فعالیت در دو مدل بارگیری نشان داد که بین دو مرحله متفاوت بارگیری تفاوت معناداری وجود دارد (P<.۰/۰۵). مدت زمان انجام فعالیت و میزان PH بدن در مرحله بارگیری طولانی مدت نسبت به بارگیری کوتاه مدت آن به طور معناداری افزایش یافته بود (P<.۰/۰۵) (جدول ۲).

بحث

هدف از این پژوهش مقایسه مدل کوتاه مدت و طولانی مدت بارگیری مکمل بیکریبات سدیم و تعیین اثربخشی این مدل‌ها بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بدنبال انجام تست هوایی و امانده‌ساز بارگیری بلندمدت این مکمل در مقایسه با مدل کوتاه مدت آن توانست از افزایش معنادار لاکات استراحتی افراد جلوگیری کند که این نتیجه همسو با نتایج تحقیق مک ناتون و تامسون (۲۰۰۱) است. در بارگیری کوتاه مدت این مکمل میزان لاکات پلاسمایی نسبت به بارگیری طولانی مدت افزایش بیشتری نشان داد و این نمایانگر این مطلب بود که بارگیری بلندمدت این مکمل توانست ظرفیت بافری بدن را بالا ببرد (۲۱). نتایج پژوهشی نشان می‌دهد به علت شرایط آکالولزی که بارگیری طولانی مدت این مکمل ایجاد می‌کند میزان لاکات عضله فعال کاهش می‌یابد و این عامل سبب کاهش انتقال این متابولیت از محیط درون‌عضلانی به داخل پلاسمای خون می‌شود (۲۲). از آثار مصرف بیکریبات سدیم در طول فعالیت‌های تناوبی، افزایش ظرفیت تامپونی برای یون‌های هیدروژن، افزایش تحمل لاکات و متعاقب آن افزایش زمان رسیدن به واماندگی گزارش شده است (۹،۲۲). بنابراین به

جلسه فعالیت هوایی و امانده‌ساز توانست با افزایش ظرفیت بافری بدن از تجمع بیش از حد لاکات خون جلوگیری کند و موجب طولانی‌تر شدن مدت زمان انجام فعالیت شود.

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر نشان داد که بارگیری طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم در مقایسه با بارگیری کوتاه مدت آن بعد از یک

References

1. Tarverdizade B, Effect of sodium bicarbonate consumption on fatigue threshold of elite men volleyball players after a powerful work. [Ph.D thesis]. Supervisor: Khosro Ebrahim: Azad University Tehran branch; 1997 [In Persian]
2. Verbitsky O, Mizrahi J, Levin M, Isakov E. Effect of ingested sodium bicarbonate on muscle force, fatigue, and recovery. *J Appl Physiol* 1997; **83**: 333-337.
3. Sahlin K, Harris RC, Nylin B, Hultman E. Lactate content and pH in muscle obtained after dynamic exercise. *Pflugers Arch* 1976; **367**: 143-149.
4. Gleason M and Green H. *Exercise biochemistry and training*. Translated by: Hoseini M, Askari A. Tehran, Norpardazan Pub, 2001; PP: 99. [In Persian]
5. Motsan LG, Tran ZV. Effects of sodium bicarbonate ingestion on anaerobic performance: a meta-analytic review. *Int J Sports Nutr* 1996; **3**: 2-28.
6. Mastonc LG, Tran ZV. Effect of sodium bicarbonate ingestion on anaerobic performance. *Int J Sport Med* 1993; **3**(1): 2-38.
7. Mckenzi DC, Coutts KD, Strrlng DR, Hhoebe HH, Kuzara G. Maximal work production following two levels of artificially induced metabolic alkalosis. *Eur J Appl Physiol* 1986; **4**(1): 8-35.
8. Hirakoba K, Maruyama A, Misaka k. Effect of acute sodium bicarbonate ingestion on excess CO_2 output during incremental exercise. *Eur J Appl Physiol* 1993; **66**(6): 536-541.
9. Mcnaghton L, Backs K, Palmer G, Strage N. Effects of chronic bicarbonate ingestion on the performance of high-intensity work . *Eur J Appl Physiol* 1993; **80**(4): 333-336.
10. Harkinz JD, Kamerling SG. Effect of induced alkalosis on performance in thoroughbreds during a 1660m race, *Equin Vet J* 1992; **24**(2): 94-98.
11. Lambert CP, greenhaff PL, Ball D, Manghan RG. Influence of sodium bicarbonate ingestion on plasma ammonia accumulation during incremental exercise in men. *Eur J Appi Physiol* 1993; **66**(1): 45-49.
12. Parry-bilings M, Maclaren DP. The effect of sodium bicarbonate and sodium citrate ingestion on anaerobic power during intermittent exercise. *Eur J Appl Physiol* 1986; **55**: 524-529.
13. McNaughton L. Bicarbonate loading and its use in sports. *Int Clin Nutr Rev* 1992; **12**: 65-67.
14. Denning H, Talbot JT, Edwards HT, Dill DB. Effects of acidosis and alkalosis upon capacity for work. *J Clin Invest* 1931; **9**: 609.
15. Costill DL, Gao J, Horswill CA, and Park SH. Sodium bicarbonate improves performance in interval swimming. *Eur J Appl physiol* 1988; **58**: 171-174.
16. Dill DB, Edwards HT, Talbot JT. Alkalosis and the capacity for work. *J Biol Chem* 1932; **97**: 58-59.
17. Kozak-Collins K, Burke E, Schoene RB. Sodium bicarbonate ingestion does not improve performance in women cyclists. *Med Sci Sports Exerc* 1994; **26**: 1510-1515.
18. Parkhouse WS, McKenzie DC. Possible contribution of skeletal muscle buffers to enhance anaerobic performance: a brief review. *Med Sci Sports Exerc* 1984; **16**: 328-338.
19. Adam Zajac1 A, Cholewa1 J, Poprzeczk1 S, Waskiewicz Z, Langfort J. Effects of sodium bicarbonate ingestion on swim performance in youth athletes, *Journal of Sports Science and Medicine* 2009; **8**: 45-50.
20. Mohamadpour H, Pouzeshjadidi J, Alamdar K and Pouzeshjadidi R. Effect of sodium bicarbonate supplementation on lactate, ammonia concentration and performance of 400 meter young runners. *Bio Science J* 2009; **4**: 79-92 [In Persian]

21. Mc Naughton LR & Thompson D. Acute versus chronic sodium bicarbonate ingestion and anaerobic work and power output. *J Sports Med Phys Fitnes* 2001; **41**(4): 436-462.
22. Jourkesh M, Ahmadi S, Mehdipoor B, Sadri I & Ojagi A. Effects of six weeks sodium bicarbonate supplementation and high-intensity interval training on endurance performance and body composition. *Annals of Biological Research* 2011; **2**(2): 403-413.
23. Boyd JH & Walley KR. Is there a role for sodium bicarbonate in treating lactic acidosis from shock? *Pharmacology, metabolism and nutrition* 2008; **14**: 379–383.

Archive of SID