

Outcome of Trabeculectomy Procedure in Glaucoma

Rana Sorkhabi*, Ali Mahdavi Fard, Babak Rahimi

Department of Ophthalmology, School of Medicine, Nikookari Hospital, Tabriz University of Medical Sciences,
Tabriz, Iran

Received: 16 Dec, 2012 Accepted: 23 Jan, 2013

Abstract

Backgrounds and Objective: Glaucoma is the most common cause of irreversible blindness in worldwide and trabeculectomy is the gold standard surgical treatment in these patients.

Materials and Methods: In this study the medical recordings of the patients who underwent trabeculectomy surgery reviewed and patients recalled for examination.

Results: Records of 209 trabeculectomy surgery were evaluated. Most of patients (96%) before their surgery had been received antiglaucoma medications and preoperative mean deviation in perimetry was -12 ± 6.3 and mean cup to disc ratio was 0.79 ± 0.2 . Mean preoperative intraocular pressure was 30 ± 9.7 mmHg which was decreased to 13.6 ± 5.2 mmHg ($P=0.001$) after surgery. We re-examined 78% of patients and in these patients mean intraocular pressure were increased to 16.8 ± 4.3 mmHg ($P=0.001$).

Conclusion: Most glaucoma patients underwent trabeculectomy in more advanced stage of disease; however success in early postoperative period is higher than 90%.

Keywords: Glaucoma, Trabeculectomy outcome, Intraocular pressure

*Corresponding author:

E-mail: Sorkhabi_r@Yahoo.com

مقاله پژوهشی

پیامد جراحی ترابکولکتومی در بیماران مبتلا به گلوكوم در مرکز آموزشی-درمانی نیکوکاری تبریز

رعنای سرخابی: گروه چشم، دانشکده پزشکی، بیمارستان نیکوکاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران، نویسنده رابط

E-mail: Sorkhabi_r@yahoo.com

علی مهدوی فرد: گروه چشم، دانشکده پزشکی، بیمارستان نیکوکاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

باکب رحیمی: گروه چشم، دانشکده پزشکی، بیمارستان نیکوکاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

دریافت: ۹۱/۹/۲۶ پذیرش: ۹۱/۱۱/۴

چکیده

زمینه و اهداف: بیماری گلوكوم شایعترین علت کوری غیر قابل برگشت در جهان می باشد ترابکولکتومی به عنوان روش استاندارد طلائی در جراحی این بیماران بکار می رود. این مطالعه با هدف بررسی نتایج عمل جراحی ترابکولکتومی در بیمارستان نیکوکاری تبریز طراحی و انجام شده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه اطلاعات موجود در پرونده بیمارانیکه در فاصله زمانی سالهای ۸۹-۸۵ تحت عمل جراحی ترابکولکتومی قرار گرفته بودند بررسی و بیماران جهت معاینه مجدد فراخوان شدند.

یافته ها: نتایج مربوط به ۲۰۹ مورد جراحی مورد بررسی قرار گرفت. از کل بیماران مورد بررسی ۹۶٪ قبل از عمل تحت درمان با ۲/۴±۰/۹ داروی آنتی گلوكوم بوده و میانگین انحراف در پریمتری قبل از عمل ۱۲±۶/۳- و میانگین نسبت کاپ به دیسک قبل از عمل ۰/۷۹±۰/۲ بود متوسط فشار داخل چشمی قبل از عمل ۳۰±۹/۷ mmHg بود که بعداز عمل به ۱۳/۶±۵/۲ mmHg رسیده بود ($P=0/001$). از کل موارد بررسی شده ۷۸٪ بیماران جهت معاینه مجدد مراجعه نمودند که در این تعداد میانگین فشار داخل چشمی به ۱۶/۸±۴/۲ mmHg افزایش یافته بود ($P=0/001$) و موفقیت جراحی در این بیماران به ۷۴٪ کاهش یافته بود.

نتیجه گیری: اکثر بیماران گلوكومی در مراحل پیشرفتی بیماری مراجعه و کاندید جراحی شده، با اینحال موفقیت جراحی در مراحل اولیه در ۹۱٪ موارد وجود داشت که با گذشت زمان این درصد کاهش می یابد.

کلید واژه ها: گلوكوم، پیامد ترابکولکتومی، فشار داخل چشمی

مقدمه

از نظر کلاسیک بیماری گلوكوم به دو گروه بزرگ زاویه باز و زاویه بسته تقسیم می شود. هر چند طبقه بندی های مختلفی نیز برای این بیماری ارائه شده است ولی هنوز هم این طبقه بندی کلی باعث سهولت در تشخیص و درمان بوده و در ادبیات علمی کاربرد زیادی دارد. از نظر شیوع جهانی بیماری تخمین زده

بیماری گلوكوم شایعترین علت کوری غیر قابل برگشت در جهان می باشد و تا سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۰ میلیون نفر به این بیماری گرفتار بودند و بیش از ۸ میلیون در کل دنیا به علت این بیماری قدرت بینایی خود از دست داده اند و تخمین زده میشود که تعداد مبتلایان تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۸۰ میلیون نفر برسد (۱).

مواد و روش‌ها

در طی این مطالعه مقطعی پرونده تمامی بیماران با سن بالای ۱۵ سال که از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ در بیمارستان نیکوکاری تبریز مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-تحت عمل جراحی ترابکولکتومی قرار گرفته بودند بررسی شدند.

طراحی مطالعه در همخوانی با یافته های هلسینکی وبا حفظ اطلاعات موجود در پرونده ها انجام وتوسط کمیته اخلاق وپژوهش بیمارستان مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات موجود در پرونده ها شامل سن، جنس، محل سکونت، داروهای مصرفی قبل و بعد از عمل، فشار داخل چشمی قبل و بعد از عمل، نسبت کاپ به دیسک، حدت بینائی، اطلاعات مربوط به پریمتری، نوع گلوكوم، وجود بیماریهای سیستمیک همراه نظریه دیابت، هیپرتانسیون و بیماریهای چشمی همراه، سابقه مصرف سیگار، تکنیک جراحی به کار رفته و استفاده از میتوماسین در حین عمل استخراج و ثبت گردید. مواردیکه اطلاعات مورد نیاز در پرونده موجود نبود از مطالعه حذف گردیدند. بیمارانی که اطلاعات موجود در پرونده آنها کافی بود. مجدداً فراخوان شده مورد معاینه قرار گرفته و یافته های بالینی موجود بررسی شد. نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار، فراوانی و درصد بیان شده اند. آنالیز داده ها پس از انتقال داده ها به نرم افزار آماری SPSS به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده و برای مقایسه میانگین داده ها از تست های آماری U Mann-Whitney و T استفاده شد. در تمامی موارد مقادیر P value کمتر از ۰/۰۵ از لحاظ آماری معنی داری تلقی گردید.

یافته ها

در فاصله زمانی سالهای ۱۳۸۵-۸۹، ۲۳۰ مورد جراحی ترابکولکتومی در بیمارستان نیکوکاری تبریز انجام گرفته بود که اطلاعات مورد نیاز در پرونده ۲۰۵ بیمار موجود بود که استخراج گردید. در این فاصله زمانی در ۸ بیمار جراحی دو طرفه انجام شده بود. بنابراین اطلاعات مربوط به ۲۰۹ چشم نهایتاً مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران مورد بررسی در جدول ۱ خلاصه شده است. در موقع جراحی ۳۷ چشم سودوفاک بوده، ۵۵ چشم برای بار دوم و ۸ چشم برای بار سوم تحت عمل جراحی قرار می گرفتند. متوجه سن بیماران ۶۳/۸۷±۱۶/۶۳ سال بودو ۶۶٪ از بیماران مرد بودند. شایعترین بیماری سیستمیک همراه، هیپرتانسیون بود که در ۳۹٪ موارد مشاهده گردید.

از نظر نوع گلوكوم اکثر موارد جراحی ترابکولکتومی روی بیماران با گلوكوم زاویه باز انجام گرفته بود که گلوكوم زاویه باز اولیه در ۴۹/۷۶٪ موارد و گلوكوم زاویه باز ثانویه به سودواکسفویلیاسیون در ۳۴/۴۵٪ موارد وجود داشت. از سایر انواع گلوكوم می توان به ترتیب به گلوكوم زاویه بسته مزمن (۱۲/۴۵٪)، گلوكوم نئوواسکولار (۰/۲۳۹٪) و گلوكوم ثانویه به مصرف کورتیکوستروئید (۰/۹۵٪) اشاره نمود.

می شود که شیوع گلوكوم زاویه بازیه اندازه گلوكوم زاویه بسته باشد (۱و۲).

برخی محققین معتقدند که در قاره‌ی آسیا بیشترین شیوع بیماری گلوكوم مربوط به نوع زاویه باز آن می باشد ولی تفاوت در شیوع بیماری در کشورهای مختلف آسیا دیده می شود و با توجه به این که اکثر مطالعات در سطح آسیا بیشتر در کشورهای آسیای شرقی بوده و با در نظر گرفتن جمعیت بالای این کشورها نباید احتمال وجود تفاوت زیاد با کشورهای دیگر آسیایی را از نظر دور داشت (۳و۴).

در مسیر درمان هر دو نوع گلوكوم، عمل جراحی ترابکولکتومی یک نقطه‌ی عطف به شمار می آید. معمولاً در گلوكوم زاویه باز عمل جراحی زمانی اندیکاسیون پیدا می کند که درمان های طبی کاهنده فشار داخل چشمی و یا درمان های لیزر ترابکولوپلاستی نتواند آسیب های عصب اپتیک را متوقف نماید و یا این که عوارض ناشی از درمان و عدم تحمل بیمار منجر به اقدام عمل جراحی ترابکولکتومی شود. در مورد گلوكوم زاویه بسته محققان و صاحب نظران معتقدند اولین درمان انجام اپریلو تویی محيطی لیزری و پس از آن در صورت لزوم درمان با داروهای کاهنده فشار داخل چشمی می باشد و در صورت شکست درمانهای فوق عمل جراحی ضرورت پیدا می کند.

نظارات متخصصین در مورد تقدم و تاخر روش‌های درمانی در گلوكوم متفاوت بوده، تنوع مکانیسم های ایجاد کننده بیماری باعث شده است که هر بیمار مبتلا به گلوكوم درمان خاص خود را اقضا نماید؛ ولی آنچه که مسلم است عمل جراحی ترابکولکتومی به عنوان شایعترین و پرکاربردترین عمل جراحی در بیماری گلوكوم محسوب شده و هنوز هم از زمان ابداع آن در سال ۱۹۶۷ به عنوان روش استاندارد طلائی در جراحی های فیلترینگ به کار می رود (۵-۷).

در حال حاضر با توجه به مکانیسم های مطرح در گلوكوم های زاویه بسته جهت کنترل فشار داخل چشمی خارج سازی لنز نیز به عنوان یکی از درمان های جراحی در بیماران مطرح شده است (۸-۱۰).

هرچند اصول جراحی در تمامی روش‌های جراحی ترابکولکتومی یکسان است ولی تعديلات مختلفی در تکنیک ها و استفاده یا عدم استفاده از داروهای آنتی متابولیت و نیز همراه کردن عمل جراحی کاتاراکت با این عمل همگی باعث تنوع روش‌های متداول گردیده است.

هرچند که ترابکولکتومی روش جراحی موقّفی برای گلوكوم های مزمن می باشد ولی در مطالعات مختلف درصد های موقّفیت متفاوتی برای این تکنیک جراحی گزارش شده است (۱۱و۱۲) با توجه به تفاوت میزان پاسخ دهی بیماران به جراحی ترابکولکتومی در مطالعات انجام شده، مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج اعمال جراحی ترابکولکتومی در مرکز آموزش-درمانی نیکوکاری تبریز در طی یک دوره ۵ ساله طراحی و انجام گردید.

قابل تنظیم در ۴ مورد(۶۸٪) و باز سازی بلب با سوزن در ۹۳ مورد(۴۷٪) و تزییق زیر ملتحمه ۵-فلورواوراسیل در ۳۱ مورد(۱۴٪) انجام شده بود. در فراخوان مجدد ۱۶۳ بیمار مراجعه و تحت بررسی معاینه قرار گرفتند در این بیماران متوسط فاصله زمانی از موقع جراحی تا ویزیت نهایی $34 \pm 1/9$ ماه بود. میانگین فشار داخل چشمی در این بیماران از $13/1 \pm 3/4$ mmHg آخرین فالوآپ موجود در پرونده به $16/8 \pm 4/3$ mmHg افزایش یافته بود ($P=0/001$). میانگین داروهای مصرف این در بیماران ۱/۸ \pm ۲/۳ بود که نسبت به قبل از عمل که $2/6 \pm 0/3$ بود کاهش قابل ملاحظه ای یافته بود ($P=0/03$). درصد موقیت جراحی طبق تعریف قبلی ارائه شده در ۷/۴٪ از بیماران وجود داشت و در ۸٪ از این بیماران پیشرفت تغییرات گلوكومی در نسبت کاپ به دیسک از $0/73 \pm 2/1$ به $0/79 \pm 1/3$ مشاهده شد که از نظر آماری معنی دار نبود ($P=0/06$) ولی در هیچ مورد از این بیماران علی رغم پیشرفت نسبت کاپ به دیسک دید بیمار به عدم درک نور کاهش یافته بود.

بحث

هدف جراحی ترابکولکتومی حفظ ویا بهبود کیفیت زندگی بیمار با حفظ میدان بینایی از طریق کاهش فشار داخل چشمی می باشد. شکست جراحی منجر به افزایش فشار داخل چشمی و متعاقباً پیشرفت گلوكوم خواهد شد. موقیت جراحی توسط مولفین به شکلهای نسبتاً متفاوت بیان شده است ولی به عنوان یک قانون قراردادی کاهش فشار چشمی به زیر 21 mmHg و یا کاهش درصد مشخصی در فشار داخل چشمی به عنوان یک نتیجه جراحی موقیت امیز تعریف می شود (۱۴ و ۱۳).

در این بررسی اکثر بیماران موقع جراحی دچار بیماری پیشرفتنه بودند به طوریکه ۷۱٪ بیماران موقع جراحی نسبت کاپ به دیسک بالای ۰/۷ داشتند. در بیماران مبتلا به گلوكوم پیشرفتنه تصمیم گیری برای جراحی تا حدود زیادی بحث انگیز است. برخی مولفین به عوارض زیاد جراحی در این بیماران تأکید نموده در حالیکه عده ای دیگر خطرات جراحی را در مقابله خطرات ناشی از پیشرفت گلوكوم و از دست دادن دید بیمار جزئی قلمداد می نمایند (۱۵ و ۱۶).

در این مطالعه مقطعی نتایج جراحی ترابکولکتومی در انواع گلوكوم مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از عوارضی که بعد از جراحی گلوكوم ممکن است ایجاد شود منجر به افزایش فشار داخل چشمی و متعاقباً پیشرفت گلوكوم شود، شکست جراحی می باشد. نتایج به دست آمده در مطالعه ما مشابه یا بهتر از مطالعات قبلی می باشد بطوریکه در ۵۸٪ بیماران یکسان بعد از عمل بدون نیاز به درمان دارویی و در ۹۱٪ بیماران با دو دارو یا کمتر فشار داخل چشمی زیر 21 mmHg وجود داشت. البته در مطالعات با دوره پیگیری طولانی مدت با گذشت زمان درصد موقیت جراحی کاهش یافته است به طوری که $7-12$ ٪ بیماران گلوكومی بعد از ۱۰ سال و $15-25$ ٪ بیماران بعد از ۲۰ سال علیرغم درمان نایینا شده اند (۱۷ و ۱۶).

جدول ۱: مشخصات بیماران ترابکولکتومی شده

متغیر	تعداد	درصد
جنس		
زن	۷۰	۳۴
مرد	۱۳۵	۶۶
محل سکونت		
شهری	۶۹	۳۴
روستایی	۱۳۶	۶۶
بیماریهای همراه		
دیابت	۱۰	۴.۹
هیپرتانسیون	۸۰	۳۹
صرف سیگار	۶۰	۲۹.۳

اکثر بیماران قبل از جراحی تحت درمان با داروهای آنتی گلوكوم قرار گرفته بودند که مدت زمان مصرف دارو در محدوده $2-5$ ماه (با متوسط $6/3 \pm 4/28$ ماه) قرار داشت.

تعداد داروهای مصرفی در بیماران بصورت متوسط $2/4 \pm 0/9$ دارو بود که بیشترین داروهای مصرفی به ترتیب تیمولول در ۹۸٪ موارد و لاتاپروست و دورزولامید در ۷۴٪ از بیماران بود. در کلیه بیماران قبل از عمل جراحی؛ پرمیتری در پرونده وجود داشت که میانگین انحراف در بیماران قبل از عمل $-12 \pm 6/3$ MD بود. متوسط نسبت کاپ به دیسک در بیماران قبل از عمل $0/79 \pm 0/2$ و متوسط فشار داخل چشمی قبل از عمل در بیماران $30 \pm 9/7$ mmHg بود که بعداز عمل به $13/6 \pm 5/2$ mmHg کاهش یافته بود ($P=0/001$). متوسط حدت بینایی قبل از عمل بر حسب $1/0/7 \pm 0/5/3 \log Mar$ بود که بعداز عمل به $1 \pm 0/46$ رسیده بود ($P=0/4$)

در ۲۳ چشم (۱۱٪) در حین عمل از میتومامایسین با غلاظت $0/4 \pm 0/04$ mg/dl به مدت زمان $2-4$ دقیقه استفاده شده بود. میانگین IOP در افراد عمل شده با میتو مایسین (mmHg) $(13/9 \pm 4/5)$ در مقایسه با موارد بدون استفاده از میتومامایسین $(13/8 \pm 5/3)$ mmHg اختلاف معنی داری نداشت ($P=0/9$).

از نظر عوارض حین عمل عارضه جدی نظیر خونریزی کوروئیدال یا اکسپالسیو در هیچ موردی مشاهده نشده بود.

از $20/9$ چشم مورد مطالعه مورد به روش limbal base fornix based گرفته بودند که از نظر میزان IOP بعد از عمل بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشت ($P=0/8$).

متوسط زمان پیگیری بعد از عمل بیماران $7/3 \pm 1/4$ ماه بود. موقیت جراحی که به صورت فشار داخل چشمی زیر 21 mmHg بدون دارو یا حداقل با دو دارو در فاصله زمانی $6-12$ ماه بعد از عمل تعریف گردید در ۹۱٪ از بیماران گزارش گردید.

از نظر عوارض بعد از عمل هایفما در ۱۴٪ موارد، کم عمق بودن اتاق قدامی در ۲۳٪ مواردو افیوژن کوروئید در ۱۶٪ موارد گزارش گردید که فقط در ۲ مورد تخلیه به روش جراحی انجام شده و بقیه موارد با درمانهای متداول طبی اداره گردید. برداشتن بخیه فلپ اسکلرایی با لیزر در ۸ مورد (۳/۹٪) و استفاده از بخیه

شدت گلوكوم که با میزان از دست رفتن میدان بینایی اندازه گرفته می شود نیز عنوان یکی از فاکتورهای پیش آگهی ضعیف بعداز عمل در مطالعات قبلی در نظر گرفته شده است که منجر به از دست رفتن دید مرکزی بعداز عمل می شود که پدیده "wipe-out" نامیده می شود (۲۶ و ۲۵). البته در مطالعه ما علی رغم اینکه اکثر بیماران در مراحل پیشرفته بیماری از نظر نسبت کاپ به دیسک و یافته های پرمتری (میدان بینایی) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند هیچ موردی از این پدیده گزارش نشده بود و هیچیک از بیماران دچار ناینایی نشده بودند.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر بازتابی از نتایج جراحی ترابکولکتومی در بیماران منطقه شمال غرب کشور است که نشان می دهد نتایج جراحی در مرکز مورد بررسی موفقیت آمیز بوده و از نظر عوارض و سرانجام نهایی در مقایسه با مطالعات قبلی در محدوده قابل قبول و حتی بهتری می باشد ولی با توجه به احتمال کاهش میزان موفقیت جراحی با گذشت زمان لازم است که این بیماران پس از جراحی نیز بطور منظم تحت پیگیری و کترل جدی و مستمر قرار گیرند.

در مطالعه ما نیز در بیمارانی که جهت تکمیل معاینه مراجعه نموده بودن میزان موفقیت به ۷۴٪ کاهش یافته بود. سن، گلوكوم ناشی از یویست، وجود سودو اکسفولیاسیون یا آفا کیا از سایر عوامل موثر در افزایش احتمال شکست جراحی ترابکولکتومی مطرح شده اند (۱۸-۲۰). ولی در بررسی ما به دلیل محدود بودن موارد گلوكوم ناشی از یویست و گلوكوم ناشی از سودو اکسفولیاسیون چنین بررسی محدود نشد. در برخی مطالعات مصرف داروهای آنتی گلوكوم قبل از جراحی به عنوان عامل موثر در شکست جراحی گلوكوم عنوان شده است و مکانیسم احتمالی این مساله مواجهه با بنزالکوئنیوم موجود در این داروهاست که منجر به افزایش تعداد فیروپلاستها، ماکروفرازها، لنفوسيتها و کاهش سلولهای گلوبلت ملتجمه می گردد (۲۱).

در مطالعه ما علیرغم اینکه اکثر بیماران (۹۱٪) قبل از عمل از داروهای آنتی گلوكوم استفاده می نمودند موفقیت جراحی در کل بیماران در محدوده قابل قبول بود. ضمناً نظیر مطالعات قبلی بین طول مدت استفاده از داروهای آنتی گلوكوم و نیاز به مصرف دارو بعد از جراحی رابطه مستقیمی وجود داشت به طوریکه بیمارانیکه مدت طولانی قبل از عمل تحت درمان دارویی بودند برای کسری فشار داخل چشمی بعد از جراحی نیز به داروهای بیشتری نیاز داشتند. به عبارت دیگر بین طول مدت مصرف داروهای قبل از عمل و نیاز به داروهای بعد از عمل ارتباط مستقیمی وجود داشت که مشابه مطالعات قبلی می باشد (۲۲-۲۴).

References

- Quigley HA, Broman AT. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. *Br J Ophthalmology* 2006; **90**(3): 262-267.
- Foster PJ, Johnson GJ. Glaucoma in China: how big is the problem? *Br J Ophthalmology* 2001; **85**(11): 1277-1282.
- Foster PJ, Oen FT, Machin D, Ng TP, Devereux JG, Johnson GJ, et.al. The prevalence of glaucoma in Chinese residents of Singapore: a cross-sectional population survey of the Tanjong Pagar district. *Arch Ophthalmology* 2000; **118**(8): 1105-1111.
- Dandona L, Dandona R, Mandal P, Srinivas M, John RK, McCarthy CA, et al. Angle-closure glaucoma in an urban population in southern India. The Andhra Pradesh eye disease study. *Ophthalmology* 2000; **107**(9): 1710-1716.
- Fang EN, Law SK, Walt JG, Chiang TH, Williams EN. The prevalence of glaucomatous risk factors in patients from a managed care setting: a pilot evaluation. *Am J Manag Care* 2008; **14** Suppl 1: 28-36.
- Lai JS, Tham CC, Lam DS. Incisional surgery for angle closure glaucoma. *Semin Ophthalmology* 2002; **17**(2): 92-99.
- Lai JS, Tham CC, Chan JC, Lam DS. Phacotrabeculectomy in treatment of primary angle-closure glaucoma and primary open-angle glaucoma. *Jpn J Ophthalmology* 2004; **48**(4): 408-411.
- Sihota R, Sood A, Gupta V, Gupta V, Dada T, Agarwal HC. A prospective long-term study of primary chronic angle closure glaucoma. *Acta Ophthalmology Scand* 2004; **82**(2): 209-213.
- Sihota R, Gupta V, Agarwal HC. Long-term evaluation of trabeculectomy in primary open angle glaucoma and chronic primary angle closure glaucoma in an Asian population. *Clin Experiment Ophthalmology* 2004; **32**(1): 23-28.
- Aung T, Tow SL, Yap EY, Chan SP, Seah SK. Trabeculectomy for acute primary angle closure. *Ophthalmology* 2000; **107**(7): 1298-1302.
- Watson PG, Barnett F. Effectiveness of trabeculectomy in glaucoma. *Am J Ophthalmology* 1975; **79**(5): 831-845.
- Tham CC, Lai JS, Poon AS, Lai TY, Lam DS. Results of trabeculectomy with adjunctive intraoperative mitomycin C in Chinese patients with glaucoma. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging* 2006; **37**(1): 33-41.
- Ehrnrooth P, Lehto I, Puska P, Laatikainen L. Long term outcome of trabeculectomy in terms of intraocular pressure. *Acta Ophthalmology Scand* 2002; **80**(3): 267-271.
- Casson R, Rahman R, Salmon JF. Long term results and complications of trabeculectomy augmented with low dose mitomycin C in patients at risk for filtration failure. *Br J Ophthalmology* 2001; **85**(6): 686-688.
- Landers J, Martin K, Sarkies N, Bourne R, Watson P. A twenty-year follow-up study of trabeculectomy: risk

- factors and outcomes. *Ophthalmology* 2012; **119**(4): 694-702.
16. Ederer F, Gaasterland DA, Dally LG, Kim J, Van Veldhuisen PC. The Advanced Glaucoma Intervention study (AGIS): 13. Comparison of treatment outcomes within race: 10-year results. *Ophthalmology* 2004; **111**(4): 651-664.
17. Chen PP. Blindness among patients with treated open angle glaucoma. *Ophthalmology* 2003; **110**(4): 726-733.
18. Heuer DK, Gressel MG, Parrish RK 2nd, Anderson DR, Hodapp E, Palmberg PF. Trabeculectomy in aphakic eyes. *Ophthalmology* 1984; **91**(9): 1045-1051.
19. Broadway DC, Chang LP. Trabeculectomy, risk factors for failure and the preoperative state of the conjunctiva. *J Glaucoma* 2001; **10**(3): 237-249.
20. Towler HMA, Bates AK, Broadway DC, Lightman S. Primary trabeculectomy with 5-fluorouracil for glaucoma secondary to uveitis. *Ocul Immunol Inflamm* 1995; **3**(3): 163-170.
21. Broadway DC, Grierson I, Brien C, Hitchings RA. Adverse effects of topical anti glaucoma medication. II. The outcome of filtration surgery. *Arch Ophthalmology* 1994; **112**(11): 1446-1454.
22. Hyman L, Heijl A, Leske MC, Bengtsson B, Yang Z. Natural history of intraocular pressure in the early manifest glaucoma trial: a 6-year follow-up. *Arch Ophthalmology* 2010; **128**(5): 601-607.
23. Leske MC, Heijl A, Hussein M, Bengtsson B, Hyman L, Komaroff E. Factors for glaucoma progression and the effect of treatment. The Early Manifest Glaucoma Trial. *Arch Ophthalmology* 2003; **121**(1): 48-56.
24. Heijl A, Bengtsson B, Hyman L, Leske MC. Natural history of open angle glaucoma. *Ophthalmology* 2009; **116**(12): 2271-2276.
25. Law SK, Nguyen AM, Coleman AL, Caprioli J. Severe loss of central vision in patients with advanced glaucoma undergoing trabeculectomy. *Arch Ophthalmology* 2007; **125**(8): 1044-1050.
26. Topouzis F, Tranos P, Koskosas A, Pappas T, Anastasopoulos E, Dimitrakos S, et.al. Risk of sudden visual loss following filtration surgery in end-stage glaucoma. *Am J Ophthalmol* 2005; **140**(4): 661-666.