

گزارش موردي

Case Report

سندروم بک ویت ویدمن در یک نوزاد

*دکتر فاطمه اقبالیان

Beckwith-Wiedemann syndrome in a newborn

F.Eghbalian

*Abstract

Beckwith-Wiedemann Syndrome is a congenital growth disorder with unknown etiology which correlates with a number and genetic disorders.

The prevalence of this syndrome is 1/15000 live birth and the mortality rate is 20% due to complication of prematurity, emphalocele, macroglossia, neonatal hypoglycemia and rarely cardiomyopathy. The basis for diagnosis includes at least two major and one minor criteria.

This article presents a 7 hours old neonate with emphalocele, macroglossia and late neonatal hypoglycemia. Having diagnosed as BWS, the patient underwent for repair of abdominal wall defect, correction of hypoglycemia and abdominal sonography to assess the embryonal tumors. A serum insulin level measurement plus an isotope scan on pancreas to determine the cause of hypoglycemia were requested.

Keywords: Medical Genetics, Beckwith-Wiedemann, Infancy and Childhood Mortality, Premature Infant, Neonatal Abnormalities, Hypoglycemia

*چکیده

سندروم بک ویت ویدمن (BWS)، اختلال رشد مادرزادی با علت ناشناخته است که با برخی از اختلال های ژنتیکی ارتباط دارد. شیوع این بیماری یک در هر پانزده هزار تولد زنده و مرگ و میر بیماران حدود ۲۰٪ است که بیش تر به علت عوارضی مانند نارسی، امفالوس، ماکروگلوسی، هیپوگلیسمی نوزادی و به ندرت کاردیو میوپاتی است. اساس تشخیص آن وجود حداقل دو معیار اصلی و یک معیار فرعی است. در این مقاله یک نوزاد ۷ ساعته با امفالوس، ماکروگلوسی و هیپوگلیسمی دیررس نوزادی معرفی می شود که پس از مطرح شدن تشخیص BWS تحت ترمیم نقص جداره شکم، اصلاح هیپوگلیسمی و سونوگرافی کامل شکم برای بررسی تومورهای امپریونال قرار گرفت و اندازه گیری انسولین سرم و اسکن ایزوتوب برای بررسی پانکراس و تشخیص علت هیپوگلیسمی بیمار پیشنهاد شد.

کلید واژه ها: ژنتیک پزشکی، بک ویت ویدمن، مرگ و میر در نوزادی و کودکی، نوزاد نارس، ناهنجاری های نوزادان، کاهش

قند خون

*** مقدمه :**

کاردیومگالی، دیاستازیس حرکتی، سن استخوانی پیشرفت و دوقلوهای منوزیگوت (که معمولاً دختر هستند)، هیپوگلیسمی نیز در برخی بیماران گزارش شده است.^(۱)

معرفی بیمار:

بیمار نوزاد پسر ۷ ساعته ای بود که در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۲۸ از توانی کان به دلیل امفالوسل به بیمارستان اکباتان همدان اعزام شد. بیمار نوزاد رسیده حاصل زایمان واژینال طبیعی با آپگار طبیعی بود که پس از زایمان متوجه بیرون زدگی احشاء از ناف بیمار شده بودند. همراهان سابقه تشنج، استفراغ و مشکل خاص دیگری را ذکر نمی کردند. نوزاد فرزند اول خانواده بود و والدین با یکدیگر نسبت فamilی نزدیک داشتند (پسرعمو، دخترعمو). در سابقه خانوادگی بیمار اختلال های مشابه وجود نداشت. در بدو مراجعته، علائم حیاتی وی طبیعی بود. قد بیمار ۴۷ سانتی متر (بین صدک ۱۰ و ۲۵)، وزن ۲۲۰۰ گرم (زیر صدک ۵) و دور سر ۳۷ سانتی متر (زیر صدک ۵) بود. فونتانل قدامی به اندازه $3 \times 2/5$ سانتی متر و فونتانل خلفی به اندازه $5 \times 1/5$ سانتی متر باز بود. زبان بزرگ بود و خارج از دهان قرار داشت (شکل شماره ۱).



شکل ۱- نوزاد مبتلا به BWS همراه با ماکروگلوسی

سندرم بک ویت ویدمن (Beckwith - wiedmann syndrome) یا congenital overgrowth syndrome یک اختلال رشد است که با ماکروزوومی، ماکروگلوسی، ویسروموگالی، تومورهای امبریونال (ویلمز، هپاتوبلاستوما، نروبلاستوما، رابdomiosarکوما)، امفالوسل، هیپوگلیسمی نوزادی و شیارهای گوش مشخص می شود.^(۲) شیوع آن حدود یک در پانزده هزار تولد زنده است.^(۳) میزان شیوع در هر دو جنس یکسان گزارش شده است و در تمام گروههای نژادی دیده می شود.^(۴) عامل بیماری پیچیده بوده و به خوبی شناخته نشده است. درصد موارد اسپورادیک هستند و کاریوتیپ طبیعی دارند و ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد به صورت اتوزوم غالب منتقل می شود.^(۱) این سندرم اغلب در تشخیص افتراقی کودکانی که چهار رشد بیش از حد هستند، قرار می گیرد. سندرم های پرلمن، کاستلو و همی هیپرپلازی های نیز در تشخیص افتراقی BWS قرار می گیرند.^(۵) برای تشخیص BWS باید حداقل ۳ یافته (۲ یافته اصلی و ۱ یافته فرعی) در بیمار وجود داشته باشد. معیارهای اصلی عبارت اند از: تاریخچه خانوادگی مثبت، ماکروزوومی، آنومالی های لاله گوش (بیش از ۷۵ درصد موارد)، ماکروگلوسی، امفالوسل، ویسروموگالی، تومورهای امبریونال (ویلمز، هپاتوبلاستوما و رابdomiosarکوما)، همی هیپرپلازی، سیتوموگالی آدرنوکورتیکال، آنومالی های کلیه (آنومالی ساختمانی، نفرومگالی و نفوکلیسیوز و شکاف کام (نادر). معیارهای فرعی عبارت اند از: پلی هیدروآمنیوس، نارسی، هیپوگلیسمی نوزادی، خال شعله شمعی (در صورت وجود همانژیوم)، نمای ویژه صورت (شامل هیپوپلازی میانی صورت و شیارهای زیر چشمی)،

برای بیمار اندازه گیری سطح انسولین سرم در زمان هیپوگلیسمی انجام شد که مقدار انسولین سرم ۱۱ میکرویونیت در میلی لیتر گزارش شد.

پس از اصلاح آب و الکترولیت و مشاوره جراحی و تشخیص امفالوسل، بیمار تحت ترمیم نقص جدار شکم و امفالوپلاستی قرار گرفت. هیپوگلیسمی بیمار با تجویز سرم قندی تا ۱۲/۵ درصد و دیازوکساید به صورت نسی اصلاح شد و با توجه به وجود هیپرأنسولینیسم، جهت اصلاح هیپوگلیسمی مقاوم به درمان پانکراتکتومی ساب توtal توصیه شد و نوزاد به بخش جراحی اطفال ارجاع داده شد.

*بحث و نتیجه گیری :

در بیمار فوق با توجه به وجود امفالوسل و ماکروگلوسی (یافته اصلی) و هیپوگلیسمی (یافته فرعی) تشخیص BWS مطرح شد.

ماکروگلوسی در بیش از ۸۰ درصد بیماران مبتلا به BWS وجود دارد و عموماً همراه با ماکروزومی در زمان تولد دیده می شود، اما می تواند پس از تولد نیز تظاهر یابد.^(۱) اگرچه سرعت رشد زبان در ماکروگلوسیا به مرور کاهش می یابد و رشد فک به صورت جبرانی تسریع می شود، اما انجام جراحی نیز مفید است که به طور معمول بین ۲ تا ۴ سالگی انجام می شود.^(۱)

هیپوگلیسمی نوزادی حداقل در نیمی از موارد دیده می شود که علت آن، هیپرأنسولینیسم در نظر گرفته می شود.^(۲)

بیش تر موارد هیپوگلیسمی گذرا و خفیف است، اما در موارد شدید، ممکن است پایدار باشد. گاهی شروع هیپوگلیسمی تأخیری است که در بیمار فوق هیپوگلیسمی در روز پنجم پس از تولد اتفاق افتاد.^(۱) در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، تکامل بیمار به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. لذا در برخورد با

معاینه قلب و ریه طبیعی بود و در ناحیه شکم بیرون زدگی احساس از ناف وجود داشت (شکل شماره ۲).



شکل ۲- نوزاد مبتلا به BWS همراه با امفالوسل دستگاه تناسلی طبیعی و پسرانه بود. واکنش مکیدن ضعیف ولی سایر واکنش‌ها طبیعی بودند. در آزمایش‌های درخواست شده، نتایج زیر به دست آمد :

تعداد پلاکت‌ها ۷۹۰۰۰، هموگلوبین ۱۶، تعداد گلbulوی های سفید ۱۴۳۰۰، CRP ۵۳ Ptt ۲/۶، رتیکولوسیت ۰/۶، کومبیز مستقیم منفی، گروه خون AB⁺، G6pD طبیعی، کلسیم، سدیم، پتاسیم، BUN و کراتینین طبیعی بودند. قند خون پنجمین روز ۳۲ میلی گرم در دسی لیتر گزارش شد. آزمایش‌های تیروئیدی طبیعی بودند. در بررسی نمونه ادرار، حجم مخصوص ادرار ۱۰۰/۶ بود. پروتئین و باکتری به میزان کم گزارش شد، خون ۱۰ و ۱۵ تا ۱۵ عدد RBC به دست آمد. کشت خون، ادرار و CSF و همچنین تجزیه طبیعی گزارش شد. در تجزیه و تحلیل گازهای خون شربانی، اسیدوز متابولیک خفیف مشاهده شد. کبد، طحال و پانکراس در سونوگرافی طبیعی گزارش شدند، ولی کیسه صفراء دیده نشد که احتمالاً به دلیل انقباض ناشی از ناشتابوندن بیمار بوده است. کلیه‌ها و مجاری ادراری طبیعی بودند.

کاردیومیوپاتی است. همچنین این بیماران در خطر مرگ و میر ناشی از نشوپلازی به خصوص تومور ویلمز و هپاتوبلاستوما هستند.^(۱)

همدا و همکاران یک شیرخوار مبتلا به BWS همراه با همی هیپرتروفی و هماتوبلاستوما همزمان را معرفی کرده اند که میزان آلفافیتوپروتئین وی حتی پس از برداشتن کامل تومور بالا بوده است و علت این پدیده را مربوط به ماهیت پرولیفراطیو بیماری ذکر کرده اند.^(۲)

برآورد خطر ایجاد تومور در این مبتلایان، ۷/۵ درصد است که در ۸ سال اول زندگی بیماران بیش تر دیده می شود.^(۳) در یک مطالعه در نیومکزیکو ۵ شیرخوار مبتلا به BWS از طریق سونوگرافی شکم و اندازه گیری آلفافیتوپروتئین پیگیری شدند و محققین به کمک این دو روش توانستند به تشخیص زود هنگام هپاتوبلاستوما برسند.^(۴)

بیمارانی که فنتویپ خفیف تری (کمتر از ۳ یافته) دارند نیز ممکن است به تومور مبتلا شوند، بنابراین باید پی گیری شده و تحت نظر باشند.^(۵) توصیه فعلی پیگیری برای یافتن تومورهای احتمالی امپریونال است که شامل اقدام های نظیر سونوگرافی شکم و اندازه گیری آلفافیتوپروتئین سرم هر ۶ ماه تا سن ۶ سالگی است.^(۶) در مطالعه شاه ۱۰ نوزاد مبتلا به BWS تا ۱۴ سالگی بی گیری شدند که در اسکن کلیه و شکم در سه ماهگی این کودکان شایع ترین یافته ها نفرومگالی و کیست کورتیکومد ولاری بود.^(۷) تیلی و همکاران بر ارزش انجام سونوگرافی شکم و اندازه گیری آلفافیتوپروتئین برای تشخیص زودهنگام تومور آذرنال در این سندروم تأکید دارند.^(۸)

در این بیمار سونوگرافی شکم طبیعی گزارش شده بود. بیمار فوق با توجه به وجود هیپرأنسولینیسم و هیپوگلیسمی مقاوم به درمان جهت پانکراتکتومی نسبی به بخش جراحی اطفال ارجاع داده شد.

موارد BWS، هیپوگلیسمی به خصوص طی ۷ روز اول پس از تولد از مهم ترین اقدام های پایش است.^(۹)

درمان به موقع هیپوگلیسمی، خطر عوارض عصبی را نیز کاهش می دهد. ۸۰ تا ۹۰ درصد بیمارانی که دچار هیپرأنسولینیمی هستند، برای تنظیم قند خون به پانکراتکتومی نسبی نیاز دارند.^(۱۰)

نقایص دیواره شکم شامل امفالوسل و فتق نافی است که در بیش از ۸۰ درصد موارد دیده می شود.^(۱۱) در بیمار فوق، امفالوسل به عنوان یک یافته اصلی تشخیص داده شد. این نقایص باید بلا فاصله پس از تولد با جراحی ترمیم شوند. اما ماکروگلوسی ممکن است در لوله گذاری اندوتراکتال مشکل ایجاد کند.^(۱۲) گلدمن و همکاران نوزاد مبتلا به BWS و ماکروگلوسی شدیدی را معرفی کرده اند که با ماسک لارنژیال وی را به خوبی تهویه کرده و مانع از لوله گذاری داخل تراشه وی شدن.^(۱۳) طی روزهای اول پس از تولد، نقص دیواره شکم این بیمار با استفاده از فلاپ عضلات آپونوروژی زیر جلد و امفالوپلاستی ترمیم شد و خوشبختانه در حین عمل جراحی مشکلی ایجاد نشد.

بیش از ۷۵ درصد این بیماران دچار ماکروزوومی هستند که به طور معمول طی رشد در همین حد باقی می مانند، البته بیمار فوق در محدوده طبیعی قد و وزن سن خود قرار داشت. معمولاً تکامل نوزادان مبتلا به BWS طبیعی است، مگر این که همراه آنومالی کروموزومی باشد یا تاریخچه ای از هیپوکسی با هیپوگلیسمی واضح درمان نشده وجود داشته باشد.^(۱۴) گومز و همکاران یک نوزاد مبتلا به سندروم بک ویت ویدمن همراه با همی هیپرپلازی ایزوله را معرفی کرده اند.^(۱۵) کویشی و همکاران یک مورد میلودیسپلازیا را در یک شیرخوار مبتلا به BWS در سال ۱۹۹۶ گزارش کرده اند.^(۱۶)

پس از دوران کودکی عوارض BWS شایع نیست و پیش آگهی آن مطلوب است. مرگ و میر بیماران حدود ۲۰ درصد است که بیش تر به علت عوارض نارسی، امفالوسل، ماکروگلوسی، هیپوگلیسمی نوزادی و به ندرت

* مراجع :

1. Fanaroff AA, Martin RJ. Neonatal perinatal medicine, 7th ed, USA, Mosby, 2003. 551, 1366-7
2. Behrman E R, Kliegman MR. Nelson's textbook of pediatrics. 16th ed, Philadelphia, W B Saunders, 2000, 445, 1687, 1736
3. Milan MC, Deanglis Catherine. Oski's pediatrics. Lippincott Williams, 3rd ed, 1999, 218, 223, 346-7
4. Behrman E R, Kliegman M R. Nelson's essentials of pediatrics. 3rd ed, Philadelphia, W B Saunders, 2000, 445, 1687, 1736
5. Goldman L, Nodal C, Jimenez E. Successful airway control with the laryngeal mask in an infant with Beckwith Wiedemann syndrome. Paediatr Anaesth 2000; 10(40): 445-8
6. Gomes M, Ramos E. Beckwith Wiedemann syndrome and isolated hemihyperplasia. Med J 2003 May; 121(3): 1333-8
7. Koishi S, Kubola M, Taniguchi Y. Myelodysplasia in a child with Beckwith Wiedemann syndrome. J Pediatr 1996 Nov; 18(4) 419-20
8. Hamada Y, Takada K. Hepatoblastoma associated with Beckwith Wiedemann syndrome and hemihyertrophy. Pediatr Surg Int 2003 Apr; 19(1-2): 112-4
9. Clericuzio C, Chen E. Serum alpha fetoprotein screening for hepatoblastoma in children with Beckwith Wiedemann syndrome. J Pediatr 2003 Aug; 143(2):270-2
10. Shah K. Beckwith Wiedemann syndrome: role of ultrasound in its management. Clin Radiol 1993 May; 34(3): 313-9
11. Tlili Graiess, Gharbi Jemmi, Golli M. Adrenal tumors in Beckwith Wiedemann syndrome. J Radiol 1996 Jun; 75(6-7): 395-8

--