

**\* مقدمه :**

میزان ترکیب‌های شیمیایی انسانس آن در شرایط تولید در قزوین تعیین شود.

**\* مواد روش‌ها :**

این مطالعه در سال ۱۳۸۱ بر روی ۱۲ نمونه زنیان تولید شده در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد.

اسانس دانه به روش تقطیر با آب (hydro-distillation) با دستگاه Glevenger (مدل دارونامه بریتانیا) که به‌طور معمول جهت استخراج انسانس از اندام‌های خشک گیاه مانند دانه به کار می‌رود، انجام شد. از هر نمونه مقدار ۱۰۰ گرم دانه به صورت تصادفی انتخاب و پس از آسیاب نمودن با مش ۱/۰ میلی‌متر به همراه یک لیتر آب مقطر در داخل بالن ریخته و با حرارت (هیتر برقی) به مدت ۳ ساعت انسانس گیری شد.<sup>(۲)</sup> انسانس حاصل از روی آب تقطیر جمع آوری و با سولفات سدیم رطوبت زیادی شد و پس از تعیین وزن دقیق، بازده آن بر حسب وزن دانه محاسبه شد. انسانس‌ها قبل از تجزیه و تحلیل در ظروف شیشه‌ای کدر در درجه حرارت پایین نگهداری شدند. انسانس هر نمونه ابتدا به دستگاه کروماتوگراف گازی تزریق شد و طیف‌های جرمی ترکیب‌های موجود در انسانس به دست آمد. کروماتوگراف گازی الگوی Gc-9A Shimadzu مجهز به دتکتور FID، یونیزاسیون با شعله Chromatopac C-R3A هیدروژن و داده پرداز

ستون DB-1 غیر قطبی به طول ۶۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر و ضخامت لایه فاز ساکن برابر ۰/۰۲۵ میکرون است. با استفاده از برنامه حرارتی ستون DB-1، در مرحله اول از دمای ۷۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت افزایش دمای ۱/۵

زنیان که در کتب طب سنتی با نام‌های مختلف نانخواه، انسونبری، بادیان رومی آورده شده است با اسمی انگلیسی Ajowan، Carum و Bishopweed Carum copticum و Trachyspermum ammi متراff و از تیره چتریان (Apiaceae) است. منشأ گیاه در آسیاست و در کشورهای هند، ایران، مصر به صورت طبیعی می‌روید یا کشت می‌شود. زنیان گیاهی است یک ساله که قسمت مورد استفاده آن در طب سنتی دانه (بذر) آن است. زنیان در طب سنتی به عنوان ضد تهوع، خد نفح، مدر، مقوی معده، کاهش دهنده کلسترول خون و تسکین دهنده اسپاسم به کار می‌رود.<sup>(۱) (۲) (۳)</sup>

بررسی آثار عصاره آبی زنیان بر کاهش نشانگان قطع مرفین در موش صحرایی نشان داد که با احتمال ۹۵ درصد می‌تواند همانند متابدون در کاهش علائم نشانگان ترک اعتیاد اثربخش باشد.<sup>(۴)</sup>

عصاره الکلی زنیان شامل ساپونین با شاخص ۵۰۰ فلاونوئید زرد کریستاله و یک ماده استروئیدی است که به عنوان ضد میکروب بر ۹ گونه باکتری گرم مثبت و گرم منفی مؤثر است.<sup>(۵)</sup> همچنین عصاره الکلی زنیان به عنوان آنتی‌هیستامین کاربرد دارد.<sup>(۶)</sup> زنیان از جمله گیاهانی است که میزان انسانس دانه آن از ۲ تا ۴ درصد متفاوت است.<sup>(۷)</sup> انسانس آن در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی استفاده می‌شود. تعداد ترکیب‌های شیمیایی موجود در انسانس زنیان در منابع مختلف از ۹ تا ۱۷ مورد گزارش شده است.<sup>(۸)</sup>

با توجه به نیاز روزافزون کشور به گیاهان دارویی و فرآورده‌های حاصل از آنها ضرورت انجام تحقیق در خصوص ترکیب‌های شیمیایی این داروها در مناطق مختلف کشور ضروری است. از آنجا که گیاه زنیان امکان تولید حدود ۲ تن دانه و بیش از ۷۰ کیلوگرم انسانس را در هکتار دارد،<sup>(۹)</sup> جهت مطالعه حاضر انتخاب شد تا بازده انسانس، نوع و

سه ترکیب تیمول، گاماترپین و پاراسیمن با بیش از ۸۵ درصد ترکیب‌های عمدۀ اسانس زنیان را تشکیل می‌دادند(جدول شماره ۲).

#### جدول ۲- میزان ترکیب‌های اصلی اسانس زنیان در نمونه‌های مختلف

نام ترکیب (درصد)	شماره نمونه	تیمول	گاماترپین	پاراسیمن
۲۵	۱	۴۰	۳۰	۳۰
۲۳	۲	۴۱/۵	۲۹	۲۹
۱۸	۳	۴۳	۲۹	۲۹
۲۴	۴	۴۱	۳۰	۳۰
۱۸	۵	۴۴	۳۰	۳۰
۱۷	۶	۴۵	۲۸	۲۸
۱۶	۷	۴۳/۱	۳۲	۳۲
۱۶	۸	۴۴/۲	۳۲	۳۲
۱۷	۹	۴۲/۶	۳۱	۳۱
۱۷	۱۰	۴۴	۳۰	۳۰
۲۲	۱۱	۴۱/۸	۳۲	۳۲
۱۷	۱۲	۴۵	۳۲	۳۲

#### \* بحث و نتیجه‌گیری :

بازده اسانس دانه زنیان در نمونه‌های مختلف از ۳/۱ تا ۳/۵ درصد محاسبه شد که در مقایسه با نمونه‌های زنیان در کشورهای دیگر تفاوت چندانی ندارد.<sup>(۱) و (۴)</sup>

ترکیب‌های اسانس زنیان مشابه با تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر و شامل سه ترکیب اصلی تیمول، گاماترپین و پاراسیمن (بیش از ۸۵ درصد اسانس) بود.<sup>(۴) و (۷)</sup> البته نوع و درصد این ترکیب‌ها در نمونه‌های مختلف تا حدودی متفاوت بود به طوری که با افزایش میزان تیمول از میزان پاراسیمن کاسته می‌شد. این در حالی است که نمونه‌ها از نظر میزان گاماترپین تفاوت چندانی با یکدیگر نشان ندادند. مقایسه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اسانس زنیان با نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر نشان داد که کیفیت اسانس

درجۀ سانتی‌گراد در دقیقه و در مرحله دوم از ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت افزایش دمای ۲ درجه سانتی‌گراد در دقیقه استفاده شد. شناسایی ترکیب‌ها با استفاده از شاخص بازداری کواتس بود. شاخص کواتس عددی ثابت و مستقل از طول ستون، ضخامت فاز ساکن ستون، سرعت جریان گاز، برنامه حرارتی و غیره و عاملی قابل اعتماد برای تأیید شناسایی ترکیب‌هایی است که طیف جرمی آنها مشخص است. درصد نسبی هر ترکیب با توجه به سطح زیر منحنی آن در طیف کروماتوگرام حاصل از GC با روش استاندارد کردن سطح زیر منحنی‌ها و بدون محاسبه ضریب تصحیح شد.<sup>(۹)</sup>

#### \* یافته‌ها :

میزان اسانس دانه نمونه‌ها با توجه به درصد رطوبت از ۳/۱ تا ۳/۵ درصد متفاوت بود. تعداد ۹ ترکیب شیمیایی در اسانس زنیان شناسایی شد(جدول شماره ۱).

#### جدول ۱- ترکیب‌های شیمیایی تشکیل‌دهنده اسانس دانه زنیان

نام ترکیب	شاخص بازداری کواتس	درصد
تیمول	۱۲۸۰	۴۰-۴۵
گاماترپین	۱۰۵۶	۲۸-۳۳
پاراسیمن	۱۰۱۷	۱۶-۲۵
میرسن	۹۸۵	۱-۵
بنافلاندرون	۱۰۲۴	۱-۵
بتاپین	۹۷۳	کمتر از ۱
آلقاتوجن	۹۱۹	کمتر از ۱
ساپین	۹۶۱	کمتر از ۱
آلپاپین	۹۲۷	کمتر از ۱

4. Nagalakshmi S, Shankaracharya N B. Studies on chemical and technological aspects of ajowan. *J. Food Science and Technological Mysore* 2000; 37(3): 277-81
5. جعفری حسین، واعظ مهدوی محمد رضا. بررسی اثرات عصاره آبی گیاه نانخواه (زنیان) بر کاهش نشانگان قطع مرفین در موش صحرایی. چکیده مقالات اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی. ۱۳۷۹، ۹۸-۹ تهران،
6. Sadananda C, Arunabh R, Sangita D. Volatile seed oil of Trachyspermam ammi from Northeast india. *J Essential oil Research* 2000; 12 (6): 731- 4
7. Srivastava M, Saxena A, Baby P. GC-MS investigation and antimicrobial activity of the essential oil of carum copticum. *Acta Alimentatoria* 1999; 28 (3): 291-5
8. Boskabady M H, Shainkhi J, Inhibitory effect of carum copticum on histamine J Ethnopharmacology 2000; 69: 217-27
9. Sefidkon F, Akbari Nia A. Essential oil composition of Nepeta pogonosperma, J Essent Oil Res 2003; 15: 327-8

زنیان کشت شده در قزوین در حد مطلوبی است. به عبارت دیگر اسانس دانه زنیان از نظر ترکیب تیمول غنی است.<sup>(۶)</sup>

تیمول دارای ارزش زیادی در صنایع دارویی و بهداشتی است و از نظر دارویی اثر کاهش دهنده فشارخون دارد و در درمان بیماری های پوستی مانند آکنه، پسوریازیس و درماتیت همراه سایر ترکیبات فلی کاربرد دارد.<sup>(۷)</sup> اسانس زنیان در این تحقیق از لحاظ گاماتریپین و پاراسیمن با ترتیج گزارش شده در کشورهای دیگر تفاوت چندانی نداشت.<sup>(۸)</sup> گاماتریپین در صنایع عطرسازی و پاراسیمن در صنایع عطرسازی و دارویی خاصیت انتقال داروهای مختلف از منافذ پوست، ضد باکتری و ضد قارچ را دارد.

#### \* مراجع :

۱. اکبری نیا احمد. بررسی عملکرد و بازده موثره زنیان در نظامهای کشاورزی متداول، ارگانیک و تلفیقی. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲
۲. سفیدکن فاطمه. بررسی کمی و کیفی اسانس رازیانه در مراحل مختلف رشد. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر، ۱۳۸۰، شماره ۷، ۱۰۴ - ۸۵
3. Krishnamoorthy V, Maddalageri M B. Trachyspermam ammi an essential crop for north karnataka. *J Medic Aromatic Plant Science* 1999; 4: 996-8

