

همه گیرشناسی شکستگی های قسمت میانی صورت در بیمارستان های قدس و شهید رجایی قزوین (۱۳۷۴-۸۴)

دکتر منصور خراسانی* دکتر سارا باقری وند**

The epidemiology of midfacial fractures at two hospitals in Qazvin (1995-2005)

M Khorasani♦ S Bagherivand

دریافت: ۸۶/۷/۱۷ پذیرش: ۸۵/۱۰/۲۶

*Abstract

Background: Trauma to facial area often causes damage to soft tissues, teeth and bones including maxillae, mandible, naso-orbital-ethmoid complex, and supra orbital structures.

Objectives: to determine the pattern of midfacial fractures referred to Qods and Rajaei hospitals in Qazvin (Iran) during 1995-2005.

Methods: This was a descriptive cross-sectional study in which the demographic and other existing information including age, sex, job, site and cause of fracture, place of living, season, fracture-associated signs and symptoms, type of radiography, and the treatment methods were collected and analyzed statistically using SPSS.

Findings: The data obtained from 3257 cases showed that the prevalence of fracture in men was higher than that of females. Most fractures occurred in 10-19 year age group. The nasal bone was the most commonly fractured bone (97%) followed by zygomatic fracture (3%) and fractures of maxilla (2/4%) and orbital (2/1%). Fall (31/9%) and traffic accidents (23/3%) were found to be the two major causes of fractures. Regardless of nasal bone fractures, the most common cause of midfacial fractures was traffic accident (39/2%). The type of radiography requested was mostly lateral nasal. The majority of fractures (30/8%) occurred in summer and mostly (22/9%) among students. Pain, bleeding, tenderness, and swelling were demonstrated to be the most frequent signs and symptoms.

Conclusion: High prevalence of nasal fracture could be due to the prominence of this bone compared with other midfacial bones. Our findings in consistent with similar studies, support the view that the pattern of midfacial fractures vary from one country to another. Strict following of traffic and safety rules by drivers is of prime essentiality in reduction of such events.

Keywords: Fracture, Facial Bones, Epidemiology

* چکیده

زمینه: ضربه به ناحیه صورت اغلب موجب آسیب بافت نرم، دندان ها و اجزای استخوانی (فك بالا، پایین گونه، بینی و غیره) می شود.

هدف: مطالعه به منظور بررسی همه گیرشناسی شکستگی های ناحیه میانی صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های قدس و شهید رجایی قزوین در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر پرونده بیماران مبتلا به شکستگی های قسمت میانی صورت که بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ به بیمارستان های قدس و شهید رجایی مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. اطلاعات دموگرافیک، علت، محل، علایم، نوع درمان و فصل وقوع شکستگی ها ثبت شدند. داده ها با آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: در بررسی ۳۲۵۷ پرونده، مردان و افراد ۱۰ تا ۱۹ ساله بیشتر دچار شکستگی میانی صورت شده بودند. شکستگی بینی (۹۷٪) از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بود و پس از آن شکستگی های گونه (۳٪)، فک بالا (۲/۴٪) و کاسه چشم (۲/۱٪) قرار داشتند. شایع ترین علت شکستگی، سقوط (۳۱/۹٪) و تصادفات (۲۲/۳٪) بودند. با حذف شکستگی های بینی، تصادف با اتومبیل (۳۹/۲٪) شایع ترین علت شکستگی میانی صورت بود. بیش ترین رادیوگرافی درخواست شده، رادیوگرافی طرفی بینی بود. ۳۰/۸٪ از بیماران در فصل تابستان مراجعه کرده بودند و درد، خون ریزی، تورم، بدشکلی از علایم شایع بودند.

نتیجه گیری: رعایت بیشتر اصول ایمنی در رانندگی و اجرای بهتر قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند به کاهش شکستگی های میانی صورت کمک کند.

کلیدواژه ها: شکستگی، استخوان های صورت، اپیدمیولوژی

* استادیار جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

** دانش آموخته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

* مقدمه:

بررسی همه‌گیرشناسی شکستگی‌های ناحیه میانی صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های قدس و شهید رجایی قزوین در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ انجام شد.

* مواد و روش‌ها:

در این مطالعه توصیفی گذشته‌نگر، پرونده بیمارانی که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ به علت شکستگی ناحیه میانی صورت به بیمارستان‌های قدس و شهید رجایی قزوین مراجعه نموده بودند، مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک (جنس، سن، محل سکونت و شغل) علت و محل شکستگی، علایم، درمان و فصل وقوع شکستگی‌ها با توجه به تاریخ حادثه و رادیوگرافی‌های در خواست شده، ثبت شدند. داده‌ها در نرمافزار SPSS پردازش و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.

* یافته‌ها:

از تعداد ۳۲۵۷ نفر که دچار شکستگی‌های میانی صورت شده و به مراکز درمانی استان قزوین مراجعه نموده بودند، ۲۴۳۳ نفر (۷۴/۷ درصد) مرد و ۸۲۴ نفر (۲۵/۳ درصد) زن بودند. بیشتر افراد (۴۰/۴ درصد) در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال و کمترین آنها (۲/۲ درصد) در گروه سنی بالاتر از ۶۰ سال قرار داشتند. گروه سنی شایع در شکستگی میانی صورت (غیر از شکستگی بینی) ۲۰ تا ۲۹ سال بود (۷/۳ درصد). ۴۶/۴ درصد افراد ساکن شهرستان قزوین، ۴۹/۵ درصد ساکن نقاط دیگر استان و ۴/۱ درصد ساکنین خارج از استان قزوین بودند. از میان ۲۵۸۸ نفری که شغل آنها در پرونده

ناحیه میانی صورت به دلیل وجود درزهای تکاملی از قبیل درزهای پیشانی- گونه‌ای، گونه‌ای- فکی و غیره مستعد شکستگی در اثر نیروهای وارد است.^(۱) صدمه به ناحیه صورت اغلب موجب آسیب به بافت نرم، دندان‌ها و اجزای استخوان اصلی صورت (فك بالا، فك پایین، مجموعه نازواریتواموئید و ساختمنهای فوق کاسه چشمی) می‌شود. شکستگی‌های این ناحیه را می‌توان به شکستگی‌های مجموعه گونه‌ای- فکی، شکستگی‌های قوس گونه یا شکستگی‌های نازواریتواموئید طبقه‌بندی کرد.^(۲) میزان بروز علت، جنس و سن شکستگی‌های میانی صورت به عوامل اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و موقعیت تحصیلی جمعیت مورد مطالعه بستگی دارد. در بیشتر مطالعه‌ها این شکستگی‌ها در دهه دوم و سوم و در مردان بیشتر از زنان دیده می‌شود. مراحل درمانی شکستگی‌های ناحیه میانی صورت شامل اعاده و برقراری اکلوژن، جاندازی بسته و جاندازی باز با استفاده از پیچ و پلاک است.^(۳) عوارض شکستگی‌های میانی صورت عبارت‌اند از: عفونت، کوری، هماتوم، اکیموز تحت ملتحمه‌ای، بدشکلی، انسداد راه هوایی، اختلال در اکلوژن، سینوزیت، پاراستزی، بی‌حسی یا درد عصب تحت کاسه چشمی، فرورفتگی چشم، خون‌ریزی از بینی، دویینی و تریسموس هستند.^(۴) عمدت‌ترین علل شکستگی‌های صورت، تصادف با وسایل نقلیه، ضرب و شتم، سقوط، حوادث ورزشی و حوادث ناشی از کار است.^(۵) از آنجا که استان قزوین در مسیر جاده‌ای غرب و شمال غرب کشور واقع است و تردد و ترافیک زیاد دارد، این مطالعه به منظور

جدول ۲- توزیع فراوانی علایم شکستگی‌های میانی صورت

درصد	تعداد	فراوانی علایم
۵۷/۹	۱۸۸۶	درد
۵۷/۲	۱۸۶۳	خونریزی
۴۱/۶	۱۳۵۵	تندرنس
۳۹/۴	۱۲۸۳	تورم
۳۹/۲	۱۲۷۷	تعییر شکل
۲۹/۲	۹۵۱	کربیبتاپیون
۲۴/۶	۸۰۱	اکیموز
۲۴/۴	۷۵۹	پارگی
۹/۹	۳۲۲	گرفتگی بینی
۶/۲	۲۰۲	همatom
۲/۱	۶۸	مشکل تنفسی
۱/۴	۴۶	سرگیجه
۱/۴	۴۶	مشکلات دندانی
۱/۲	۳۹	استفراغ
۱/۱	۳۶	مشکل بینایی
۰/۹	۲۹	محدوديث در باز کردن دهان
۰/۶	۱۹	ترشحات بینی
۰/۴	۱۳	به هم خوردن رابطه دندانی
۰/۱	۳	بی حسی

شکستگی بینی بیشترین فراوانی را (۹۷ درصد) داشت و پس از آن به ترتیب شکستگی گونه (۳ درصد) فک بالا (۲/۴ درصد) کاسه چشم (۲/۱ درصد) دتوالوئولار (۳/۰ درصد) و اتموئید (۱/۰ درصد) قرار داشتند. شکستگی‌های میانی صورت در ۲۱ مورد با شکستگی فک پایین و در ۲۸ مورد با شکستگی‌های سایر نواحی همراه بودند. با حذف شکستگی‌های بینی، شکستگی‌های استخوان گونه و فک بالا به ترتیب ۶۴ و ۵۱ درصد شکستگی‌ها را به خود اختصاص می‌دادند. استخوان اتموئید (۲ درصد) کمترین نوع شکستگی بود. شایع‌ترین علت شکستگی، سقوط، تصادف با موتور و ماشین بودند (نمودار شماره ۱).

درج شده بود، بیشترین فراوانی (۲۲/۹ درصد) مربوط به دانش آموزان بود (جدول شماره ۱).

جدول ۱- فراوانی شکستگی‌های میانی صورت بر حسب شغل


درصد	تعداد	فراوانی شغل
۲۲/۹	۵۹۳	دانش آموز
۱۹/۲	۴۹۹	آزاد
۱۶/۹	۴۳۷	کارگر
۱۳/۴	۳۴۷	خانه دار
۱۱	۲۸۵	کارمند
۴/۸	۱۲۴	کشاورز
۲/۸	۷۲	راننده
۲/۶	۶۷	دانشجو
۲/۳	۵۹	بازنیسته
۲/۱	۵۴	بی کار
۲	۵۱	سریاز
۱۰۰	۲۵۸۸	جمع

حدود ۳۰/۸ درصد بیماران در فصل تابستان و ۲۵/۶ درصد در بهار، ۲۲/۳ درصد در پاییز و ۲۱/۳ درصد در زمستان مراجعه نموده بودند. رادیوگرافی جانبی بینی ۹۵ درصد و واتز ۱۵ درصد رادیوگرافی‌های درخواستی و ثبت شده در پرونده‌ها را به خود اختصاص داده بودند. رادیوگرافی پانورامیک و قدامی خلفی در ۲/۸ درصد، نمای جانبی جمجمه در ۱/۳ درصد و سی‌تی اسکن مغزی در ۰/۸ درصد از موارد وجود داشتند. با حذف شکستگی‌های بینی، نمای واتز با ۵۷/۵ درصد بیشترین رادیوگرافی و سپس رادیوگرافی‌های پانورامیک (۴۰/۵ درصد) و قدامی خلفی (۲۴/۸ درصد) شایع‌ترین رادیوگرافی‌ها بودند. در درمان شکستگی‌های قسمت میانی صورت ۹۳/۱ درصد موارد به صورت بسته و ۵/۸ درصد به صورت باز درمان شده و در ۳۳ پرونده، نوع درمان ذکر نشده بود. شایع‌ترین علایم در شکستگی‌های میانی صورت شامل درد (۵۷/۹ درصد) و خونریزی (۵۷/۲ درصد) بودند (جدول شماره ۲).

الگوهای شکستگی فک و صورت در مناطق مختلف جهان بسیار متنوع است.^(۵) در مطالعه‌های گذشته در اروپا و آمریکا تصادف‌ها علت بیشتر شکستگی‌های صورت ذکر شده بود، اما مطالعه‌های اخیر نشان داده که نزاع شایع‌ترین علت این شکستگی‌ها در بیشتر کشورهای پیشرفت‌ه است.^(۶-۸) در حالی که تصادف‌ها همچنان شایع‌ترین علت در اکثر کشورهای در حال توسعه است.^(۹) در بررسی متنوع گذشته، مردان اکثر بیماران را تشکیل می‌دادند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد و به نظر می‌رسد علت این امر، به حضور فعال‌تر مردان در اجتماع باشد.^(۱۰-۱۲) شایع‌ترین گروه سنی در افراد مورد مطالعه به ترتیب ۱۰ تا ۱۹ و ۲۰ تا ۲۹ سال بودند. گروه سنی شایع در مطالعه تاناکا و همکاران (۱۰ تا ۳۰ سال) مشابه مطالعه حاضر، شایع‌ترین گروه سنی در گیر افراد بینی در مطالعه حاضر، شایع‌ترین گروه سنی در گیر افراد ۲۰ تا ۲۹ ساله بودند که با نتایج برخی مطالعه‌ها همخوانی دارد.^(۱۳-۱۵)


شیوع شکستگی بینی در مطالعه حاضر بسیار بالا بود و پس از آن شکستگی گونه، فک بالا و کاسه چشم قرار داشتند. میزان بالای شکستگی بینی، به دلیل بر جسته بودن این ناحیه نسبت به سایر استخوان‌های صورت است. البته اختلاف نسبتاً زیاد بین شکستگی بینی و سایر استخوان‌های صورت به خصوص استخوان گونه، می‌تواند به دلیل عدم حضور متخصص فک و صورت در استان، عدم درمان توسط متخصصین گوش و حلق و بینی و ارجاع این بیماران به تهران در ابتدای دوران مطالعه حاضر باشد. با حذف شکستگی‌های بینی، گونه بالاترین میزان شکستگی را (۶۴ درصد) به خود اختصاص داد. در مطالعه کرکانویک شکستگی گونه و بینی بعد از شکستگی فک پایین، شایع‌ترین شکستگی بود.^(۱۶) در مطالعه اکسوی شایع‌ترین شکستگی، شکستگی کاسه چشم بود.^(۱۷) ولی در سایر مطالعه‌ها شکستگی گونه شایع‌ترین شکستگی بوده است.^(۱۸-۱۹)

نمودار ۱- مقایسه فراوانی شکستگی‌های میانی صورت بر حسب علت شکستگی



با حذف شکستگی‌های بینی، تصادف با اتومبیل، تصادف با موتور و سقوط از ارتفاع شایع‌ترین علت شکستگی‌ها بودند (نمودار شماره ۲). روش درمان بسته در ۶۰/۸ درصد موارد و روش درمان باز با استفاده از پیچ و پلاک در ۳۷/۲ درصد موارد استفاده شده بود.

نمودار ۲- مقایسه فراوانی شکستگی‌های میانی صورت با حذف شکستگی‌های بینی بر حسب علت شکستگی



*بحث و نتیجه‌گیری:

این مطالعه نشان داد که استخوان‌های بینی و گونه شایع‌ترین محل‌های شکستگی در قسمت میانی صورت هستند. سقوط و تصادف‌ها شایع‌ترین علت شکستگی بودند. مردان بیش‌تر از زنان دچار شکستگی استخوان‌های میانی صورت شدند.

*** مراجع:**

1. Fonseca RJ, Marciani RD. Oral and maxillofacial surgery. 1st ed. USA: W.B. Saunders Co; 2000. 245 [Vol 3]
2. Peterson LJ, Ellis E, Hupp J, et al. Oral and maxillofacial surgery. 3rd ed. USA: Mosby; 1998. 587, 594, 597
3. Peterson LJ, Indersano A, Marciani RD. Principles of oral maxillofacial surgery. Philadelphian, Lippincott Company; 1992. 489, 547 [Vol 2]
4. Kwon PH, Laskin DM. Clinician's manual of oral and maxillofacial surgery. 3rd ed. USA: Quintessence Publishing; 2000. 379-387
5. Adebayo ET, Ajike OS, Adekeye EO. Analysis of the pattern of maxillofacial fractures in Kaduna, Nigeria. Br J Oral Maxillofac Surg 2003 Dec; 41(6): 396-400
6. Posnick JC, Wells M, Pron GE. Pediatric facial fractures: evolving patterns of treatment. J Oral Maxillofac Surg 1993 Aug; 51(8): 836-44
7. Iizuka T, Thoren H, Annino DJ Jr, et al. Midfacial fractures in pediatric patients. Frequency, characteristics and causes. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995 Dec; 121(12): 1366-71
8. Marin MI, Tejero TR, Dominguez FM, Gutierrez ME. Ocular injuries in midfacial fractures. Orbit 1998 Mar; 17(1): 41-6
9. Ansari MH. Maxillofacial fractures in Hamedan province, Iran: a retrospective study (1987 - 2001). J Craniomaxillofac Surg 2004 Feb; 32(1): 28-34
10. Tanaka N, Tomitsuka K, Shionoya K, et al. Aetiology of maxillofacial fracture. Br J Oral Maxillofac Surg 1994 Feb; 32: 19-23
11. Bataineh AB. Etiology and incidence of maxillofacial fractures in the north of Jordan.

در مطالعه حاضر شایع ترین علت شکستگی ها سقوط و پس از آن تصادفها بود که مشابه یافته های مطالعه تاناکا و همکاران در ژاپن است.^(۱۰) در مطالعه شری و همکاران سقوط بیشترین عامل شکستگی در مردان جوان بود.^(۱۳) در حالی که در مطالعه های دیگر تصادفها به عنوان عامل اصلی شناخته شد.^(۱۹-۲۴و۱۲و۱۱) در مطالعه حاضر نیز با حذف شکستگی های بینی، شایع ترین علت شکستگی ها تصادفها بود.

درمان شایع در این مطالعه، درمان بسته بود که با مطالعه های فریرا، باتینه و کرکانویک همخوانی داشت.^(۱۱و۱۵و۱۹) در حالی که در برخی بررسی ها بیشترین درمان انجام شده، درمان باز بوده است.^(۱۴و۱۷و۲۱)

بیشترین رادیوگرافی درخواستی در مطالعه حاضر رادیوگرافی طرفی بینی بود که با توجه به فراوانی بالای شکستگی های بینی قابل پیش بینی بود و پس از آن گرافی و اترز قرار داشت. در مطالعه کاس طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ بیشترین گرافی هایی که برای تشخیص شکستگی های میانی صورت تهیه شدند، رادیوگرافی و اترز و سی تی اسکن بودند.^(۲۵)

در مطالعه حاضر فصل تابستان شایع ترین فصل رجوع بیماران دچار شکستگی بود. شایع ترین علایم همراه با شکستگی های میانی صورت در این مطالعه شامل درد و خونریزی، لمس، تورم، تغییر شکل، کریپتاتسیون و کبودی بود.

به طور کلی نتایج بررسی ها بر روی شکستگی های قسمت میانی صورت، با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در مطالعه حاضر بیشتر شکستگی ها در اثر سقوط و تصادفها، در جنس مذکور، در گروه سنی ۱۰ تا ۲۹ سال و در فصل تابستان اتفاق افتاده بود. بنابراین به نظر می رسد مؤثر ترین راهکار جهت کاهش این گونه حوادث در استان قزوین اجرای بیش از پیش قوانین رانندگی توسط مسؤولین امر و بالا بردن فرهنگ عمومی جامعه در این راستا باشد.

- in elderly people. *Gerodontology* 2002 Jul; 19(1): 60-4
19. Ferreira P, Marques M, Pinho C, et al. Midfacial fractures in children and adolescents: a review of 492 cases. *Br J Oral Maxillofac Surg* 2004 Dec; 42(6): 501-5
20. Klenk G, Kovacs A. Etiology and patterns of facial fractures in the United Arab Emirates. *J Craniofac Surg* 2003 Jan; 14(1): 78-84
21. Tian W, Li S, Pan J, et al. Surgical reduction and rigid internal fixation of midface fractures. *Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi* 1999 May; 17(2): 136-9
22. Ashar A, Kovacs A, Khan S, Hakim J. Blindness associated with midfacial fractures. *J Oral Maxillofac Surg* 1998 Oct; 56(10): 1146-50
23. Hussain SS, Ahmad M, Khan MI, et al. Maxillofacial trauma: Current practice in management at Pakistan Institute of Midfacial Sciences. *J Ayub Med Coll Abbottabad* 2003 Apr-Jun; 15(2): 8-11
۲۴. حضوری ح. بررسی چگونگی توزیع متغیرهای متفاوت در بین ۷۴ پرونده مربوط به شکستگی‌های فک و صورت موجود در مراکز آموزشی درمانی قدس و شهید رجایی در قزوین (۱۳۷۵-۱۳۷۷). پایان‌نامه دکترای عمومی، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم قریون، سال تحصیلی ۱۳۷۸-۷۹
25. Kos M, Luczak K, Godzinski J, et al. Midfacial fractures in children. *Eur J Pediatr Surg* 2002 Aug; 12(4): 218-25
- Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998 Jul; 86(1): 31-5
12. Bo B, gu X, Zhou S. An epidemiologic retrospective study of 1693 maxillofacial injuries. *Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi* 1998 Feb 16(1): 56-8
13. Shere JL, Boole JR, Holtel MR, Amoroso PJ. An analysis of 3599 midfacial and 1141 orbital blowout fractures among 4426 United States Army Soldiers, 1980-2000. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2004 Feb 130 (2): 164-70
14. Fasola AO, Obiechina AE, Arotiba JT. An audit of midfacial fractures in Ibadan, Nigeria. *Afr J Med Sci* 2001 Sep; 30(3): 183-6
15. Chrcanovic BR, Freire-Maia B, Souza LN, et al. Facial fractures: a - 1 year retrospective study in a hospital in belo Horizonte. *Braz Oral Res*. 2004 Oct-Dec; 18(4): 322-8
۱۶. اصغری س. بررسی علل و شیوه شکستگی‌های میانی صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان طالقانی تهران طی سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۷۳. پایان‌نامه دکترای عمومی، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۳-۸۴
17. Aksoy E, Unlu E, Senoz O. A retrospective study on epidemiology and treatment of maxillofacial fractures. *J Craniofac Surg* 2002 Nov; 13(6): 772-5
18. Rehman K, Edmondson H. The causes and consequences of maxillofacial, injured