



Research Paper

Antibacterial Effects of Kumquat Peel Essential Oil on *Staphylococcus Aureus* and *Escherichia Coli* Bacteria in Comparison With Some Standard Antibiotics

Sara Moosazad¹ , Katayoon Aghaei¹ , *Razzagh Mahmoudi² , Shaghayegh Moosavy³ , Saeed Shahsavari⁴

1. Student Research Committee, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
2. Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

3. Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Iran.

4. Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.



Citation Moosazad S, Aghaei K, Mahmoudi R, Moosavy Sh, Shahsavari S. Antibacterial Effects of Kumquat Peel Essential Oil on *Staphylococcus Aureus* and *Escherichia Coli* Bacteria in Comparison With Some Standard Antibiotics. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2020; 23(6):504-513. <https://doi.org/10.32598/JQUMS.23.6.3>



ABSTRACT

Background Studies have been conducted on citrus fruits and their essential oils in terms of preservative properties and the effect on food safety.

Objective This study aimed to examine the antibacterial effects of kumquat peel essential oil.

Methods In this experimental study, Kumquat fruit was purchased from the market in Qazvin, Iran. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of kumquat peel essential oil against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli* strains were measured using broth microdilution method (the range of essential oil concentrations was 25000-12500-6250-3125-1562.5-781.25-390.625-195.31-97.655-48.82 µg/ml), and the diameter of the bacteria growth inhibition zone was determined by diffusion method (the percentage of essential oil was (4×10^5) µg/ml) and then compared with standard 10^6 - 8×10^5 - 6×10^5 -antibiotics. For statistical analysis, independent t-test and one-way ANOVA were used.

Findings Their mean levels of MIC and MBC for the essential oil against the *Staphylococcus aureus* were 0.42 ± 0.18 and 1.04 ± 0.3 , and against the *Escherichia coli*, they were 0.26 ± 0.09 and 0.42 ± 0.18 , respectively. Under Disk diffusion, the highest mean diameter of growth inhibition zone for *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli* were obtained 12.1 and 10.17 mm, respectively.

Conclusion The kumquat peel essential oil has a significant antimicrobial effect on the study bacteria. As an herbal product, it can be useful as an alternative to synthetic drugs and food additives.

Received: 30 Jan 2019
Accepted: 10 Jul 2019
Available Online: 01 Feb 2020

Keywords:

Kumquat, Essential oil, Antibacterial effect, Foodborne pathogen

Extended Abstract

1. Introduction

Foodborne pathogens are a group of microorganisms that cause foodborne diseases. Finding effective drugs against these diseases is essential. Foodborne diseases have increased

worldwide and have become a leading cause of death [1]. Several foodborne pathogens have been identified that affect the health and safety of humans and animals. Since the use of antibiotics for the treatment of infectious diseases, it has been observed that bacteria have resistance to them [2]. Due to the increasing desire of consumers to use natural products and food free of chemical preservatives, studies have been conducted on the plants and aromatic fruits

* Corresponding Author:

Razzagh Mahmoudi

Address: Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Tel: +98 (912) 7868571

E-Mail: r.mahmodi@yahoo.com

and their extracts in terms of preservative properties and the effect on food safety. Their preservative properties are mostly because of their essential oils and metabolite components [3].

Kumquat is a fruit-bearing tall tree of the Rutaceae family [4]. Their fruits are eaten whole, and are used in making products such as marmalade and sauces. Dried Kumquat was often used as a traditional medicine for the treatment of respiratory tract infections such as hoarseness and cough [5]. The fruits' color is orange. This plant is native to China, but today it is grown in many parts of the world, including northern Iran [6]. An important feature of Kumquat plant fruits is their consumable skin which is rich in a variety of metabolites and substances useful for human health [7]. In this study, we aimed to investigate the antimicrobial effect of the essential oil of kumquat peel on foodborne pathogens including *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli* in comparison with some standard antibiotics.

2. Materials and Methods

The kumquat fruit was purchased from market in Qazvin, Iran in January 2017. The skin of the fruit was removed with a sharp knife and after crushing, the skin was dried in the shade and at room temperature. After that, the dried skin was thoroughly powdered using an electric grinder machine [8]. The essential oil was extracted by Klevenguer apparatus using steam distillation method for 3 hours. For disk diffusion test, the bacteria were first introduced into Brain Heart Infusion Broth (BHI Broth) Then, from colonies in this medium, 0.5 MacFarland was diluted and 100 ppm of pre-prepared suspension was removed and was poured into the Mueller Hinton Agar medium and spread by Pasteur Pipette. Then, paper discs were placed on an empty plate and 20 ppm of different concentrations of essential oil was poured onto them. At the same time, ampicillin, amoxicillin, tetracycline and chloramphenicol antibiotics were used to compare the effect of essential oil. In this regard, the bacteria were cultured uniformly on the Mueller-Hinton agar surface and then placed on the surface of antibiotic-impregnated discs at a specific concentration. Finally, the plates were incubated at 37 °C for 24 hours [9].

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) measurements were carried out in a 96-well sterile microplate using broth microdilution technique. First, 100 µl from the BHI Broth medium was poured into the 96-well microplate. To the first well of each row, 100 µl of kumquat peel essential oil (dissolved in dimethyl sulfoxide solvent) was added. Then, 100 µl was taken from the first well and poured into the second well and, after being repeatedly filling and emptying by a sampler, 100µl was taken from the second well and poured into the third well. This work continued until well No. 11. Wells No. 11 of each row, as control essential oil (negative control), contained only medium and essential oil. Wells No. 12 of each row, as control bacteria (positive control) to determine the turbidity of the bacteria, contained the medium, dimethyl sulfoxide and bacteria. To determine the MIC of bacterial growth, the lowest concentration level that had no turbidity, was considered as a MIC level [10]. To measure the Minimum Bactericidal Concentration (MBC), 10 µl were taken from the turbidity-free wells (MIC concentrations and more) under very sterile conditions near the flame, and inoculated and cultured on the surface of Tryptic Soy Agar. After 24-h incubation at 37 °C, the lowest concentration that could kill 99.9% of the bacteria was considered as MBC level [11].

3. Results

The essential oil yield of kumquat peel in this study was obtained 6.66% using following Formula 1:

$$1. \text{ Percentage of essential oil yield} = 100 \times (\text{dry weight of plant peel/essential oil weight})$$

The results of MIC and MBC measurements for essential oil of kumquat peel against the study bacteria are shown in Table 1. The results showed that *Staphylococcus aureus* is less sensitive to the essential oil compared to *Escherichia coli*. Based on independent t-test results, the mean levels of MIC and MBC against the study bacteria were not significantly different ($P=0.089$ and 0.468). Their mean levels against the *Staphylococcus aureus* were 0.42 ± 0.18 and 1.04 ± 0.3 , and against the *Escherichia coli*, they were 0.26 ± 0.09 and 0.42 ± 0.18 , respectively. The results of

Table 1. The mean MIC and MBC levels for kumquat peel essential oil against the study bacteria

| Bacteria | MIC (µg/ML) | MBC (µg/ML) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Staphylococcus Aureus</i> | 0.42 ± 0.18 | 1.04 ± 0.3 |
| <i>Escherichia Coli</i> | 0.26 ± 0.09 | 0.42 ± 0.18 |
| P | 0.468 | 0.089 |

ANOVA showed a significant difference in the diameter of the growth inhibition zones between the five concentrations of extracted essential oil against the study bacteria ($P<0.001$). In other words, different concentrations of the kumquat peel essential oil had a significant effect on the diameter of the growth inhibition zone.

4. Discussion

Kumquat peel essential oil has significant antibacterial effect which is different depending on the species and the growth region. With high yield of Kumquat fruit, the variety of its species and the increase in its consumption in Iran, the use of this fruit as a combination of antimicrobial and natural preservative, instead of chemical preservatives, in the food and pharmaceutical industries can be beneficial.

Compliance with ethical guidelines

The present study was approved by the Ethics Committee of Qazvin University of Medical Sciences (code: 14003076).

Funding

This study was extracted from the research proposal of first author (Code: 14003076) supported by the Research Committee of Qazvin University of Medical Sciences.

Authors' contributions

Writing and investigation: Sara Moosazad; Methodology and experiments: Katayoon Aghaei, Shaghayegh Moosavy; Supervision, project administration, and funding acquisition: Razzagh Mahmoudi; Data curation and analysis: Saeed Shahsavari.

Conflicts of interest

The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgment

Authors appreciate Deputy of the Vice Chancellor for Research in Medical Sciences of Qazvin University.

اثرات ضد باکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشیشیا کلای و مقايسه آن با برخی آنتی بیوتیک های استاندارد

سارا موسیزاده^۱, کتایون آقایی^۱, رزاق محمودی^۲, شقایق موسوی^۳, سعید شهسواری^۴

۱. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 ۲. مرکز تحقیقات میکروبشناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 ۳. دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 ۴. گروه ایدئولوژی و امار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

حکیم

مینه تحقیقات سیاری، بر روی مرکبات و اسانس، آن‌ها را نظر خاصیت نگهداشته‌اند، و تأثیر پر اینمنی، مواد غذایی، صورت گرفته است.

هدف این مطالعه با هدف تعیین اثاث ضدیاکتی باز انسانی، پوست مسنه کامپونات انجام شده است.

بافتگاه غلظت $4/2 \pm 1/8$ میکروگرم بر میلی لیتر اسانس پوست میوه کامکوات بر ضد باکتری استافیلیکوکوس اوروفوس و غلظت $2/6 \pm 0/9$ میکروگرم بر میلی لیتر اسانس بر ضد باکتری اشريشیا¹ کلای بیشترین اثر مهار کنندگی را از خود نشان داد. در روش دیسک یافیفیوزن هم میانگین بیشترین قطر هاله عدم رشد برای استافیلیکوکوس اوروفوس و اشريشیا¹ کلای به ترتیب $12/1$ و $17/1$ میلی متر بود.

اگر خود را می‌خواهید در این مقاله مفید باشد و همچنین می‌توانید جایگزین می‌باشد، پس برای داروها و افزودنی‌های غذایی، سنتزی باشد.

کلیدواژه‌ها:

کامکوات، اسانس،
اثر ضد باکتریایی،
بیماری‌های غذایی

مقدمة

می‌شوند [۲]. باکتری گرم منفی/اشریشیا کلای یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده عفونت‌های غذایی است که اسهال خونی، تهوع و دلپیچه‌های شدید و حتی مرگ را در بیماران باعث شده و به عنوان عامل اصلی تولید سم وروتوکسین شناخته شده است. این باکتری ممکن است از طریق منابعی مانند گوشت چرخ کرده، لبینیات مخصوصاً شیر، آبمیوه غیرپاستوریزه، سبیزه‌مینی، سبزی‌های خام، سالاد، کالباس، سوسيس و همبرگر وارد بدن شده و ایجاد بیماری کند. همچنان باکتری استافیلوکوکوس پوروس یک باکتری گرم مثبت با قابلیت تولید انتروتوكسین است که از طریق گوشت، مرغ، تخمر مرغ، ماهی، شیر و فراورده‌های آن و سرمهای خامه‌ای در بدن انسان ایجاد مسمومیت می‌کند [۳].

بیماری‌زاهای غذا، گروهی از میکروارگانیسم‌ها هستند که باعث ایجاد بیماری‌های منتقله از غذا می‌شوند؛ بنابراین بسیار ضروری است که داروهای مؤثری علیه شیوع این گونه بیماری‌ها ساخته شود. بیماری‌های منتقله از غذا در سراسر جهان افزایش یافته و به یک علت مرگ‌ومیر تبدیل شده‌اند [۱]. هزاران باکتری بیماری‌زای غذازاد شناسایی شده‌اند که بر سلامت و ایمنی انسان و حیوانات تأثیر می‌گذارند. باکتری‌های سالمونلا، اشنریشیا کلای، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا، سودوموناس، پرتوئنوس در این زمینه شاخص هستند که سبب شیوع بیماری‌های غذازاد

نویسنده مسئول:

رزاقي محمودي

نشانی: مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

تلفن: +۹۸ (۰)۱۲ ۷۸۶۸۵۷۱

ایمیل: mahmodi@yahoo.com.r

دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد، میوه کامکوات در اوایل زمستان سال ۱۳۹۶ از بازار قزوین خریداری شد. پوست میوه با استفاده از یک چاقوی تیز با دقت گرفته شد و پس از خرد کردن، پوست در سایه و دمای اتاق خشک شد. سپس پوست خشک شده با استفاده از آسیاب برقی کامل‌پودر شد.^[۵] ۱۰۰ گرم از پودر پوست کامکوات آسیاب شده به بالون ژوژه منتقل و یک لیتر آب مقطر به آن افزوده شد.^[۵] اسانس توسط دستگاه کلونجر^۱ با استفاده از روش تقطیر با بخار آب به مدت سه ساعت استخراج و بازده اسانس پوست میوه کامکوات در این مطالعه نسبت به وزن خشک میوه با فرمول شماره ۱، ۶۴/۶ درصد محاسبه شد.

۱۰۰ (وزن خشک گیاه / وزن اسانس) = درصد بازده اسانس.^۱
پس از آبگیری، اسانس توسط سولفات سدیم خشک شد و تا هنگام استفاده در ظروف شیشه‌ای تیره در یخچال در دمای چهار درجه سانتی گراد نگهداری شد.^[۱۱]

برای انجام آزمایشات انتشار دیسک، ابتدا از کشت ۲۴ ساعته باکتری سوسپانسیونی که در هر میلی لیتر حاوی cfu.ml ۱۰۸ باکتری است با استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتر برابر با جذب ۰/۰۸-۰/۰۱۳ در طول موج ۶۲۵ نانومتر تهیه شد. غلظت‌های مختلف ۴×10^0 , ۶×10^0 , ۸×10^0 , ۱0^0 میلی گرم بر میلی لیتر از اسانس تهیه شد. هر دیسک با قطر $6/4$ میلی متر از غلظت‌های تهیه شده اشباع شد. سپس دیسکها به مدت یک ساعت روی صفحه مشبك استریل گذاشته شد تا اسانس به طور کامل جذب دیسک شود. جهت مقایسه هاله‌های عدم رشد از آنتی‌بیوتیک‌های آمپی‌سیلین، آموکسی‌سیلین، تتراسایکلین و کلاموفنیکل استفاده شد.

در این آزمایشات از محیط کشت مولر هینتون آگار استفاده شد. بعد از ریختن محیط کشت درون پلیت و بسته شدن آن، ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی دارای cfu.ml ۱۰۸ روی محیط کشت ریخته و با اسپریدر در تمام نقاط محیط کشت پخش شد. سپس بلافصله دیسک‌های تهیه شده از اسانس پوست میوه با غلظت‌های مختلف در فاصله مناسب از یکدیگر کاشته شد. محیط‌های کشت، برای مدت ۲۴ ساعت در گرمخانه با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری شد. سپس قطر هاله‌های عدم رشد با خط کش اندازه‌گیری شد.^[۱۲، ۱۳]

به دلیل عدم حلالیت اسانس پوست میوه کامکوات در محیط کشت حاوی آب از دی متیل سولفوکساید^۲ به عنوان حلال و امولوسیفایر استفاده شد. با تکرار آزمایش‌های متناوب بهترین میزان حلالیت اسانس به دست آمد. سپس در یک لوله آزمایش استریل 5^0 میکرولیتر اسانس خالص پوست میوه کامکوات ریخته شد و ۱۹۵^0 میکرولیتر از حلال DMSO به

تقریباً از زمانی اینکه آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان بیماری‌های عفونی معرفی شدند، باکتری‌ها قادر به ایجاد مقاومت در برابر آن‌ها بوده‌اند.^[۴] به علت افزایش میل مصرف کنندگان به استفاده از محصولات طبیعی و مواد غذایی فاقد نگهدارنده‌های شیمیایی، تحقیقاتی بر روی گیاهان و میوه‌های معطر و عصاره آن‌ها از نظر خاصیت نگهدارندگی و تأثیر بر اینمی مواد غذایی صورت گرفته است. قسمت اعظم خاصیت نگهدارندگی مربوط به اسانس و اجزای تشکیل‌دهنده آن‌هاست.^[۵] روغن اسانس شامل مونوتريپن‌ها، الکل، آلدیدها، کتون‌ها و استرهاست که مونوتريپن دارای فعالیت ضدمیکروبی بالاتر نسبت به هیدروکربن‌هاست.^[۶]

کامکوات درختی پرپشت و انبوه با مقدار محصول بالا از خانواده روتاسه است. میوه‌های آن کروی و بیضی‌شکل است. میوه‌های کامکوات معمولاً به صورت کامل خورده می‌شوند و یک مزه شیرین در ابتدا و کمی تند در پایان دارند.^[۵] رنگ آن نارنجی است. این میوه بومی کشور چین است، اما امروزه در بسیاری از مناطق جهان از جمله شمال ایران می‌روید.^[۸] این میوه‌ها در تولید فراورده‌های مانند مارمالاد و سس‌ها کاربرد دارند. کامکوات خشک شده در گذشته اغلب به عنوان یک داروی سنتی برای درمان امراض مجاری تنفسی مانند گرفتگی صدا و سرفه استفاده می‌شد.^[۷]


گل‌دهی کامکوات‌ها به طور معمول در سه مرحله روی می‌دهد. میوه‌های پدیدآمده از گل‌های نخست بزرگ‌ترند و کیفیت بهتری دارند. ویژگی مهم این میوه قابل مصرف بودن پوست آن است که سرشار از انواع متابولیت و مواد مفید برای سلامت انسان است.^[۷] به صورت کلی پوست مرکبات می‌تواند غنی از ترکیبات فنلی و فیرهای رژیمی باشد که معمولاً به عنوان زباله در محیط دفع می‌شوند. این مواد می‌توانند منابعی کم‌هزینه و با دسترسی آسان جهت تولید مواد غذایی جدید یا بهبود فراورده‌های قدیمی تر باشند.^[۹]

این میوه بیشتر توسط پنی‌سیلیوم دیجیاتوم و پنی‌سیلیوم ایتالیکوم فاسد می‌شود. ذخیره‌سازی سرد یک روش مؤثر برای طولانی‌شدن عمر مفید میوه است؛ بهویژه هنگامی که با ترکیبات بعد از گل‌دهی به غیر از قارچ‌کش‌های مصنوعی ترکیب شده است که رشد بیماری‌زاها را بدون کاهش مواد شیمیایی میوه به تأخیر می‌اندازد.^[۱۰] در این مطالعه بر آن شدیدم تا اثر ضدمیکروبی اسانس پوست میوه کامکوات را بر باکتری‌های بیماری‌زای غذازاد شاخص شامل استافیلکوکوس اورئوس و اشتریشیا کلای در مقایسه با برخی آنتی‌بیوتیک‌های استاندارد مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی که در آزمایشگاه دانشکده بهداشت

1. Clevenger
2. Dimethyl sulfoxide (DMSO)



محله علمی
دستگاه علوم پزشکی قزوین

شد. برای تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد، کمترین غلظتی که کدروتی نداشت و به عبارت دیگر رشد باکتری در آن مشاهده نشد، به عنوان عدد MIC منظور شد [۱۴].

برای اندازه‌گیری حداقل غلظت کشندگی^۵، از چاهک‌های فاقد کدروت (غلظت‌های MIC و بیشتر از آن) مقدار ۱۰ میکرولیتر در شرایط کاملاً استریل و در نزدیکی شعله برداشته و بر روی محیط بلاد آگار تلقیح و کشت داده شد. پس از انکوباسیون ۲۴ ساعته در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد، کمترین رقتی که توانست ۹۹/۹ درصد باکتری‌ها را بکشد، به عنوان رقت MBC در نظر گرفته شد [۱۴].

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخه ۱۱ نرمافزار آماری SPSS انجام شد. برای بررسی وجود اختلاف معنی‌دار در نتایج به دست آمده از آزمون‌های آنوای یک‌طرفه^۶ و تی مستقل^۷ استفاده شد. کلیه مراحل آزمایش، سه‌بار تکرار شد و نتایج به صورت میانگین ارائه شد.

پافته‌ها

نتایج حاصل از سنجش MIC و MBC انسس پوست میوه کامکوات علیه باکتری‌های مورب‌بررسی براساس آزمون تی مستقل به صورت میانگین در جدول شماره ۱ و شکل شماره ۱ قابل مشاهده است. این پژوهش نشان داد که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مقایسه با کلایی حساسیت کمتری نسبت به انسس دارد. نتایج حاصل از بررسی اثر ضدباکتریایی انسس پوست میوه کامکوات به روش دیسک و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های استاندارد در جدول‌های شماره ۲ و ۳ نشان داده شده است.

5. Minimum bactericidal concentration (MBC)

6. One way anova

7. Independent test

شکل ۱. میکروپلیت ۹۶ خانه‌ای (روش براث میکرودایلوشن)
+ کنترل مثبت / حاوی محیط کشت و باکتری
- کنترل منفی / حاوی محیط کشت و اسانس

آن اضافه شد و با شیکر هم زده شد. از این استوک برای آزمون‌های بعدی استفاده شد [۱۴].

آزمایش حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی رشد^۸، در میکروپلیت ۹۶ چاهکی استریل و با روش براث میکرودایلوشن^۹ انجام شد. این میکروپلیت‌ها، دارای ۸ ردیف ۱۲ چاهکی به حجم ۲۵۰ میکرولیتر هستند. ابتدا از محیط کشت نوترینت براث، به اولین چاهک هر ردیف، توسط سمپلر، ۱۰۰ میکرولیتر از اسانس پوست میوه کامکوات (که در حل DMSO حل شده بود) اضافه شد؛ سپس ۱۰۰ میکرولیتر از چاهک اول برداشته و در چاهک دوم ریخته و بعد از چندبار پر و خالی کردن توسط سمپلر، ۱۰۰ میکرولیتر از چاهک دوم برداشته و به چاهک سوم ریخته شد. این کار، تا چاهک شماره ۱۱ ادامه داده شد. سپس ۱۰ میکرولیتر از محیط کشت حاوی هر باکتری که معادل کدروت نیم مک فارلند شده بود، به تمام چاهک‌ها به استثنای چاهک شماره ۱۱ هر ردیف، به عنوان شاهد اسانس (کنترل منفی)، فقط حاوی محیط کشت و اسانس بود. چاهک‌های شماره ۱۲ هر ردیف، به عنوان شاهد باکتری (کنترل مثبت) حاوی محیط کشت، DMSO و باکتری‌ها بود.

پس از تلقیح باکتری‌ها، میکروپلیت بر روی شیکر به مدت ۳۰ ثانیه قرار داده شد تا مخلوط کاملاً یکنواخت شود؛ سپس جذب نوری با استفاده از دستگاه الیزا ریدر در ساعت صفر و با طول موج ۶۳۰ نانومتر خوانده شد. در مرحله آخر، میکروپلیت در انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شد و بعد از اتمام انکوباسیون، کدروت یا عدم کدروت در چاهک‌ها به صورت چشمی مشاهده و نیز جذب نوری توسط الیزا ریدر خوانده

3. Minimum inhibitory concentration (MIC)

4. Broth microdilution

جدول ۱. میانگین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و کشنده‌گی (MBC) اسانس پوست کامکوات علیه باکتری‌های موردمطالعه (بر حسب میکروگرم بر میلی‌لیتر)

| باکتری | میکروگرم بر میلی‌لیتر (MIC) | میکروگرم بر میلی‌لیتر (MBC) | میکروگرم بر میلی‌لیتر (MBC) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| استافیلوکوکوس اورئوس | ۰/۴۲±۰/۱۸ | ۱/۰۴±۰/۳ | |
| اشریشیا کلای | ۰/۲۶±۰/۰۹ | ۰/۳۲±۰/۱۸ | |
| سطح معنی‌داری | P=۰/۴۶۸ | P=۰/۰۸۹ | |

محله علمی
دستگاه علوم پزشکی قزوین

جدول ۲. میانگین قطر هاله‌های عدم رشد اسانس پوست میوه کامکوات علیه باکتری‌های موردمطالعه (بر حسب میلی‌متر)

| باکتری | (x±SD) | | | | سطح معنی‌داری |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | ۱۰ ^۰ | ۸×۱۰ ^۰ | ۶×۱۰ ^۰ | ۴×۱۰ ^۰ | |
| استافیلوکوکوس اورئوس | ۸/۷۴±۰/۲۵ | ۸/۶۶±۰/۵۷ | ۱۲/۱±۰/۲ | ۱۰/۰۰۱* | |
| اشریشیا کلای | ۸/۷۳±۰/۲۵ | ۹/۳۳±۰/۲۸ | ۱۰/۱۷±۰/۲۸ | P<۰/۰۰۱* | |

*سطح معنی‌داری

جدول ۳. میانگین نتایج آزمون آنتی‌بیوتیک هاله عدم رشد دیسک‌های مختلف آنتی‌بیوتیک (بر حسب میلی‌متر)



| باکتری | آنتی‌بیوتیک (میانگین ± انحراف معیار) | | | | | سطح معنی‌داری |
|----------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| | آموکسی‌سیلین | آمپی‌سیلین | کلروفنیکل | تتراسایکلین | تتراسایکلین | |
| استافیلوکوکوس اورئوس | ■ | ■ | ۳۰/۶±۰/۷ | ۳۰/۸±۰/۵ | ۳۰/۰۰۱* | |
| اشریشیا کلای | ■ | ■ | ■ | ۳۰/۳±۰/۵۷ | ۳۰/۰۰۱* | |

*سطح معنی‌داری

محله علمی
دستگاه علوم پزشکی قزوین

و اشریشیا کلای وجود داشت (P<۰/۰۰۱). به عبارت دیگر غلظت‌های مختلف تأثیر معناداری بر قطر هاله عدم رشد داشت (P<۰/۰۰۱). مشاهدات حاکی از این بود که قطر هاله

نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان‌دهنده این بود که تفاوت معناداری بین قطر هاله‌های عدم رشد در پنج غلظت مختلف اسانس استخراج شده، علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس



شکل ۲. روش دیسک دیفیوژن علیه باکتری‌های موردمطالعه با غلظت‌های مختلف اسانس

اسانس کامکوات کاملاً مشهود بود. همچنین وانگ^۹ و همکارانش در چین مطالعه‌ای روی ترکیبات شیمیایی اسانس خلال میوه کامکوات انجام دادند. این فعالیت‌ها به صورت کیفی و کمی با توجه به وجود یا عدم وجود مناطق مهار، قطرهای منطقه، مقادیر MIC و MBC مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان MIC برای استافیلوكوکوس اورئوس و اشريشیا کلای به ترتیب ۶۵ و ۵۰ میلی گرم بر میلی لیتر تعیین شد. آن‌ها گزارش کردند که اسانس موردنظر دارای خاصیت ضدمیکروبی بسیار زیادی عليه باکتری‌های گرم مثبت (استافیلوكوکوس اورئوس /باسیلوس سرئوس /باسیلوس سوبتیلوس الکتوپاسیلوس بولگاریکوس) و گرم منفی (ای کلای سالمونلا تیفی موریوم) است. نتایج آزمون‌های این مطالعه در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر بیشتر بود که می‌توان علت را به تفاوت در منطقه رشد میوه موردنظر نسبت داد. به این صورت که تفاوت در منطقه رشد می‌تواند در ترکیبات اسانس میوه مربوطه تفاوت ایجاد کند. همچنین روش اسانس‌گیری نیز می‌تواند متفاوت باشد [۱۶].

يانگ^{۱۰} و همکارانش در مطالعه‌ای خاصیت ضدالتهابی و ضدمیکروبی پوست مرکبات از جمله کامکوات (گونه فورتولیکا جاپونیکا) علیه بیماری‌ Zahای پوست انسان شامل استافیلوكوکوس اورئوس، پروپیونی باکتریوم آکنس و کاندیدا آلبیکنیس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان دهنده خاصیت ضدمیکروبی بسیار زیاد مرکبات موردمطالعه از جمله کامکوات بود [۱۷]. چن^{۱۱} و همکاران مطالعه‌ای بر روی خواص بیولوژیکی مرکبات سایز کوچک در تایوان انجام دادند که کامکوات نیز جزء آن‌ها بود. ترکیبات فرار اسانس و فیتواسترول‌های آن توسط روش کروماتوگرافی گازی و فلاونوئیدها و لیمونوئیدها توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارابی بالا مورد آنالیز قرار گرفت. آن‌ها میزان بالای فلاونوئید در اسانس این میوه و همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی آن را گزارش کردند که از این خواص می‌توان جهت جلوگیری از بیماری‌های مزمن استفاده کرد [۱۸].

تراؤ^{۱۲} و همکاران در مطالعه‌ای به بررسی نقش و تأثیر دو جزء اصلی میوه کامکوات، یعنی بتاکریپتوگرانتین و آر-لیمونون در اینمی سیستم بدن پرداختند. در این پژوهش از پودر لیوفیلیزه کامکوات استفاده شد. بر اساس نتایج، مشخص شد که مصرف کامکوات به صورت روزانه باعث سرکوب سطوح بالای کورتیکواسترول پلاسمما و کاهش سمیت سلولی ناشی از استرس می‌شود و این دو جزء سبب افزایش فعالیت سلول‌هایی شد که در اینمی ذاتی بدن در حذف سلول‌های سرطانی نقش دارند [۱۹]. آنیس بن^{۱۳} و همکاران فعالیت ضدمیکروبی

عدم رشد باکتری‌ها تقریباً مانند یکدیگر است. به طور کلی در هر دو باکتری با افزایش غلظت اسانس، قطرهای عدم رشد نیز افزایش یافت (شکل شماره ۲).

بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس، تفاوت معناداری بین قطرهای‌ها در چهار آنتی‌بیوتیک علیه باکتری استافیلوكوکوس اورئوس وجود داشت (۱۰۰/۰<P). همچنین مشخص شد که آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین و کلرامفینیکل در مقایسه با اسانس اثر مهاری بیشتری بر باکتری استافیلوكوکوس اورئوس داشت. بر اساس این آزمون تفاوت معناداری بین قطرهای‌ها عدم رشد در چهار آنتی‌بیوتیک موردمطالعه، علیه باکتری اشريشیا کلای مشاهده شد (۰۰۰/۰<P). تنها آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین بر باکتری اشريشیا کلای اثر مهارکنندگی داشت.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج این دو روش نشان داد که باکتری استافیلوكوکوس اورئوس در مقایسه با باکتری اشريشیا کلای مقاومت بیشتری نسبت به اسانس پوست میوه کامکوات دارد.

مطابق با داده‌های مندرج در جدول شماره ۱ غلظت ۰/۴۲±۰/۱۸ میکرو گرم بر میلی لیتر اسانس پوست میوه کامکوات بر ضد باکتری استافیلوكوکوس اورئوس و غلظت ۰/۲۶ میکرو گرم بر میلی لیتر بیشترین اثر مهار کنندگی را خود نشان دادند. همچنین اسانس پوست این میوه به ترتیب در غلظت‌های ۰/۳۳ و ۰/۵۲ میکرو گرم بر میلی لیتر باعث مهار رشد باکتری استافیلوكوکوس اورئوس و اشريشیا کلای شد.

در روش دیسک دیفیوژن میانگین بیشترین قطرهای عدم رشد توسط اسانس پوست کامکوات برای استافیلوكوکوس اورئوس و اشريشیا کلای به ترتیب ۱۲/۱ و ۱۰/۱۷ میلی متر شد (جدول شماره ۲). همچنین نتایج نشان داد که قطرهای عدم رشد برای هر دو باکتری با افزایش غلظت اسانس افزایش می‌یابد (شکل شماره ۲). با مقایسه قطرهای عدم رشد دیسک‌های آنتی‌بیوگرام مشخص شد که آنتی‌بیوتیک‌های آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین در مقایسه با اسانس، قادر اثر مهاری بر استافیلوكوکوس اورئوس و اشريشیا کلای بودند. همچنین آنتی‌بیوتیک کلرامفینیکل قادر اثر مهاری بر اشريشیا کلای بود.

ستانی^{۱۰} و همکارانش در آلمان مطالعه‌ای بر روی اثر اسانس مرکبات مختلف از جمله کامکوات علیه ۴۳ گونه لیستریا، ۳۵ گونه استافیلوكوکوس اورئوس و ۱۴ گونه سالمونلا انجام دادند و گزارش کردند که قدرت ضدمیکروبی علیه گرم مثبت‌ها بسیار بیشتر بود [۱۵]. در مطالعه حاضر نیز بالابودن حساسیت استافیلوكوکوس اورئوس در مقایسه با اشريشیا کلای نسبت به

- 9. Vang
- 10. Yang
- 11. Chen
- 12. Teraou
- 13. Anis Ben

- 8. Settani

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

این مقاله حاضر مستخرج از طرح دانشجویی مصوب دانشگاه علوم پزشکی قزوین است (کد ۱۴۰۰۳۰۷۶).

حامی مالی

این مقاله بر اساس طرح تحقیقاتی خانم سارا موسیزاد و با حمایت کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شده است.

مشارکت نویسندها

نگارش و مجری پژوهش: سارا موسیزاد؛ مشارکت در انجام مراحل آزمایشگاهی: کتابیون آفایی؛ استاد راهنمای و نظارت و مدیریت پژوهش: رزاق محمودی؛ کارشناس آزمایشگاه و مشارکت در مراحل آزمایشگاهی: شقایق موسوی؛ نگارش و تحلیل داده‌ها: سعید شهسواری.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندها این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه قزوین تقدیر و تشکر می‌شود.

اسانس لیمو را در برابر گرم مثبت‌ها از جمله باسیلوس سرئوس، انتروباکتر فکالیس، استافیلکوکوس اورئوس، باسیلوس سوبیتیلیس، لیستریا مونوسیتوئنر و باکتری‌های گرم منفی شامل سودوموناس آئروزینوز، ای کلای و سالمونلا مورد بررسی قرار دادند و فعالیت آنتی‌باکتریایی با ارزیابی محدوده مهار و تعیین مقادیر MIC مورد ارزیابی قرار گرفت. آن‌ها گزارش کردند که بیشترین مهارکنندگی مربوط به لیستریا مونوسیتوئنر (۲۶ میلی‌متر) و پس از آن باسیلوس سرئوس (۲۴ میلی‌متر) و استافیلکوکوس اورئوس (۲۲ میلی‌متر) بود. در میان گرم منفی‌ها، بیشترین مهارکنندگی در برابر سالمونلا (۱۸ میلی‌متر) مشاهده شد. با توجه به نتایج مهارکنندگی در این مطالعه، تأثیر این اسانس بر باکتری‌های گرم مثبت بیشتر از باکتری‌های گرم منفی بود که از این جهت با مطالعه ما مطابقت داشت. همچنین میزان MIC از ۱/۲۵ تا ۱/۲۹ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای باکتری‌های گرم مثبت و از ۰/۲۵ تا ۰/۲۸ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای باکتری‌های گرم منفی متغیر بودند [۲۰].

گو^{۱۲} و همکاران به بررسی اجزای شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس پوست پرتقال گنان ناول پرداختند و فعالیت ضدمیکروبی آن را علیه میکروارگانیسم‌های استافیلکوکوس اورئوس، اشريشیا کلای، باسیلوس سوبیتیلیس و ساکارومایسیس سرویزیه سنجیدند و به این نتیجه رسیدند که میانگین MIC گزارش شده برای میکروارگانیسم‌های موردنظر به ترتیب ۳/۱۳، ۱/۵۶، ۰/۷۸ و ۰/۳۹ بود. مانند مطالعه حاضر میزان MIC در استافیلکوکوس اورئوس بیشتر از اشريشیا کلای بود که از این نظر با مطالعه ما همخوانی داشت، اما به طور کلی مقادیر MIC در این مطالعه بالاتر بود که می‌توان علت آن را به تفاوت در ترکیبات اسانس و یا تفاوت در سویه‌های مختلف باکتری دانست. تجزیه و تحلیل ترکیبات اسانس آن با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی انجام و ۲۷ نوع ترکیب در آن شناسایی شد [۲۱].

نتایج حاصل از بررسی اثرات ضدمیکروبی نشان می‌دهند که فعالیت ضدمیکروبی اسانس پوست میوه کامکوات بسته به گونه و منطقه رشد متفاوت است؛ همین مورد می‌تواند در موادی که دارای خاصیت ضدمیکروبی هستند تفاوت ایجاد کند. ولی با این حال گونه‌های این میوه فعالیت ضدباکتریایی قابل توجهی دارند؛ درنتیجه با بازدهی بالای اسانس این میوه، تنوع گونه‌های آن و افزایش مصرف کامکوات در ایران، از این گونه میوه می‌توان به عنوان ترکیب ضدمیکروبی و نگهدارنده طبیعی و جایگزین نگهدارنده‌های شیمیایی در صنایع دارویی و غذایی استفاده کرد.

References

- [1] Sharatifar N, Mostaghim T, Afshar A, Mohammadpourfard I, Sayadi M, Rezaei M. Antibacterial properties of essential oil of *Heracleum persicum* (Golpar) and foodborne pathogens. *Int J Enteric Pathog.* 2017; 5(2):41-4. [DOI:10.15171/ijep.2017.10]
- [2] Wang Y, Ye Z, Ying Y. New trends in impedimetric biosensors for the detection of foodborne pathogenic bacteria. *Sensors.* 2012; 12(3):3449-71. [DOI:10.3390/s120303449] [PMID] [PMCID]
- [3] Barati A, Mohammadi Sani A, Yavarmanesh M. In vitro study on the composition and antibacterial effects of aqueous and methanol extracts of *Scrophularia khorassanica* on some of food-borne pathogens. *J Food Hyg.* 2016; 6(2):13-23. [In Persian] <https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=274795>
- [4] Trojanowska D, Paluchowska P, Soja Ł, Budak A. Activity of thyme oil (*Oleum thymi*) against multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii* and *Pseudomonas aeruginosa*. *Acta Pol Pharm.* 2016; 73(4):975-81. [PMID]
- [5] Moosavy MH, Hassanzadeh P, Mohammadzadeh E, Mahmoudi R, Khatibi SA, Mardani K. Antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of lemon (*Citrus limon*) peel in vitro and in a food model. *J Food Qual Hazard Control.* 2017; 4(2):42-8. <http://jfqhc.ssu.ac.ir/article-1-335-en.html>
- [6] Henderson AH, Fachrial E, Nyoman Ehrich Lister I. Antimicrobial activity of lemon (*Citrus limon*) peel extract against *Escherichia coli*. *Am Sci Res J Eng Technol Sci.* 2018; 39(1):268-73. https://asrjtsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/3805
- [7] Mohammadi M, Asadi M, Poorfallah Z, Nahardani M. Mathematical modeling and measure of effective moisture diffusivity in drying process of thin layer kumquat fruit slabs. *Innov Food Sci Technol.* 2012; 4(2):47-56. [In Persian] <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210953>
- [8] Jalilianabar F, Lorestani AN, Gholami R. Physical properties of kumquat fruit. *Int Agrophys.* 2013; 27(1):107-9. [DOI:10.2478/v10247-012-0074-y]
- [9] Rafiq Sh, Kaul R, Sofi SA, Bashir N, Nazir F, Nayik GA. Citrus peel as a source of functional ingredient: A review. *J Saudi Soc Agric Sci.* 2018; 17(4):351-8. [DOI:10.1016/j.jssas.2016.07.006]
- [10] Palma A, D'Aquino S. Kumquat-Fortunella japonica. In: Rodrigues S, de Oliveira Silva E, de Brit ES, editors. *Exotic Fruits*. Cambridge, MA: Academic Press; 2018. p. 271-8. [DOI:10.1016/B978-0-12-803138-4.00035-6] [PMID]
- [11] Qadir R, Anwar F, Mehmood T, Shahid M, Zahoor S. Variations in chemical composition, antimicrobial and haemolytic activities of peel essential oils from three local Citrus cultivars. *Pure Appl Biol.* 2018; 7(1):282-91. [DOI:10.19045/bpab.2018.70034]
- [12] Valizadeh S, Fakheri T, Mahmoudi R, Katiraei F, Gajarbeygi P. Evaluation of antioxidant, antibacterial, and antifungal properties of *Satureja hortensis* essential oil. *Biotechnol Health Sci.* 2014; 1(3):e24733. [DOI:10.17795/bhs-24733]
- [13] Mortezavi SH, Azadmard Damirchi S, Mahmudi R, Sowti M, Shirmohammadi M. Chemical composition and antioxi-
- dant properties of hull and core of *Pistacia khinjuk* stocks. *Iran Food Sci Technol Res J.* 2015; 11(4):408-19. [In Persian] [DOI:10.22067/ifstrj.v13n4i11.28180]
- [14] Zare Bidaki M, Arab M, Khazaei M, Afkar E. Anti-bacterial effect of *Mentha spicata* L. essential oil on eight standard species of gastrointestinal pathogens. *J Birjand Univ Med Sci.* 2014; 21(3):274-82. [In Persian]
- [15] Settanni L, Palazzolo E, Guerrasi V, Aleo A, Mammina C, Moschetti G, et al. Inhibition of foodborne pathogen bacteria by essential oils extracted from citrus fruits cultivated in Sicily. *Food Control.* 2012; 26(2):326-30. [DOI:10.1016/j.foodcont.2012.01.050]
- [16] Wang YW, Zeng WC, Xu PY, Lan YJ, Zhu RX, Zhong K, et al. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of kumquat (*Fortunella crassifolia* Swingle) peel. *Int J Mol Sci.* 2012; 13(3):3382-93. [DOI:10.3390/ijms13033382] [PMID] [PMCID]
- [17] Yang EJ, Kim S, Moon JY, Oh TH, Baik JS, Lee NH, et al. Inhibitory effects of *Fortunella japonica* var. *margarita* and *Citrus sunki* essential oils on nitric oxide production and skin pathogens. *Acta Microbiol Immunol Hung.* 2010; 57(1):15-27. [DOI:10.1556/AMicr.57.2010.1.2] [PMID]
- [18] Chen MH, Yang KM, Huang TC, Wu ML. Traditional small-size Citrus from Taiwan: Essential oils, bioactive compounds and antioxidant capacity. *Medicines.* 2017; 4(2):28. [DOI:10.3390/medicines4020028] [PMID] [PMCID]
- [19] Terao R, Murata A, Sugamoto K, Watanabe T, Nagahama K, Nakahara K, et al. Immunostimulatory effect of kumquat (*Fortunella crassifolia*) and its constituents, β-cryptoxanthin and R-limonene. *Food Funct.* 2019; 10(1):38-48. [DOI:10.1039/C8FO01971A] [PMID]
- [20] Osanloo M, Amani A, Sereshti H, Shayeghi M, Sedaghat MM. Extraction and chemical composition essential oil of *Kelussia odoratissima* and comparison its larvicidal activity with Z-ligustilide (major constituent) against *Anopheles stephensi*. *J Entomol Zool Stud.* 2017; 5(4):611-6. <https://www.researchgate.net/publication/330324086>
- [21] Guo Q, Liu K, Deng W, Zhong B, Yang W, Chun J. Chemical composition and antimicrobial activity of Gannan navel orange (*Citrus sinensis* Osbeck cv. Newhall) peel essential oils. *Food Sci Nutr.* 2018; 6(6):1431-7. [DOI:10.1002/fsn3.688] [PMID] [PMCID]