

## استفاده از سرم موش صحرایی تهیه شده در مرحله استروس برای بلوغ آزمایشگاهی تخمک های گاو

غلامعلی جلودار<sup>۱\*</sup>، سیده سارا هاشمی<sup>۲</sup>، امین الله بهاء الدینی<sup>۳</sup>، علی رضا رفعتی<sup>۴</sup>

### چکیده

مقدمه: لزوم بالغ سازی تخمک ها در محیط آزمایشگاهی به منظور بهبود شرایط باروری آزمایشگاهی (IVF) در دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. معمولاً در محیط های کشت که به این منظور تهیه می شود از مکمل های هورمونی استفاده می گردد که تهیه آنها مشکل و بسیار گران است. استفاده از سرم موش صحرایی ماده در مرحله ای استروس که غنی از هورمون ها می باشد می تواند علاوه بر افزایش احتمال بالغ سازی، هزینه های مربوط را نیز کاهش دهد.

روش بردی: این مطالعه از نوع تجربی به منظور بررسی امکان استفاده از سرم موش صحرایی تهیه شده در مرحله استروس RSS (Rat Strus Serum) به جای سرم جنبی گاو (FBS) مقایسه اثر آنها در محیط کشت جهت بالغ سازی تخمک های گاو انجام گردید. برای این منظور تعداد ۱۷۸۹ تخمک از تخدمان های گاو های ذبح شده طی یک سال در کشتار گاه جدا و پس از انجام مراحل شستشو، در سه محیط مختلف کشت داده شدند. محیط کشت کنترل حاوی TCM-199، آنتی بیوتیک، HCG و مایع فولیکولی (تهیه شده از فولیکول های قابل مشاهده بر روی تخدمان) و محیط های کشت دوم و سوم علاوه بر مواد مذکور به ترتیب حاوی FBS یا RSS بود. سرم موش صحرایی پس از تشخیص مرحله استروس با خونگیری از قلب و انجام مراحل غیر فعال سازی، تهیه و در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد تا زمان استفاده نگهداری گردید. پس از کشت تخمک ها به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور درجه سانتیگراد ۳۸/۵ درصد CO<sub>2</sub> و رطوبت ۹۵ درصد، میزان بلوغ تخمک ها با توجه به پراکندگی سلول های کومولوس یا رنگ آمیزی استواروسین و مشاهده جسم قطبی با میکروسکوپ نوری تعیین گردید.

نتایج: اطلاعات به دست آمده توسط آزمون مربع کای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن هر دو نوع سرم به طور معنی داری ( $P < 0.001$ ) بلوغ تخمک ها را در مقایسه با محیط کنترل افزایش می دهد (۹۰٪ در محیط حاوی سرم در برابر ۷۷٪ در محیط کنترل). همچنین در نتایج حاصل تفاوت معنی داری بین دو محیط حاوی سرم مشاهده نگردید (۸۶٪ در محیط حاوی FBS در برابر ۹۰٪ در محیط RSS).

نتیجه گیری: RSS برابر بالغ سازی تخمک گاو اثرات مثبت داشته و می تواند به جای FBS جهت بالغ سازی تخمک گاو مورد استفاده قرار گیرد.

### واژه های کلیدی: بلوغ آزمایشگاهی تخمک، سرم موش صحرایی، تخمک های گاو

### مقدمه

تخمکهای اضافی ایجاد می نماید، لزوم بالغ سازی تخمک ها در محیط آزمایشگاهی به منظور کاهش این مشکلات و بهبود شرایط لقاح آزمایشگاهی (IVF) در دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است<sup>(۱)</sup>. بهبود و افزایش کارایی این تکنولوژی به طور گسترده ای موجب پیشرفت در بیوتکنولوژی تولید مثل شده است. از طرف دیگر باروری و بلوغ آزمایشگاهی تخمک ها، در انسان

با توجه به مشکلاتی که فرون تحریکی تخدمان برای جمع آوری

۱- نویسنده مسئول: استاد بار بخش فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز  
تلفن: ۰۹۱۷۳۱۶۱۱۹۴، همراه: ۰۹۲۲۸۶۹۵۰، آدرس: ۸۷۵۷

Email: Jelodar@shirazu.ac.ir

۲- کارشناس ارشد بیولوژی (گرایش فیزیولوژی)  
۳- استاد بار بخش فیزیولوژی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

۴- دامپزشک، مسئول فنی کشتار گاه شیراز  
تاریخ دریافت: ۱۳۸۵/۳/۲۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۵/۱۱/۱۲

استروس (RSS) به محیط کشت کنترل بر بهبود بالغ سازی تخمک در شرایط آزمایشگاهی

- مقایسه اثراخزون RSS تهیه شده در آزمایشگاه با FBS تجاری (Sigma) به محیط کشت بر بالغ سازی تخمک در شرایط آزمایشگاهی.

### روش بررسی

این مطالعه از نوع تجربی است که بر روی ۱۷۸۹ تخمک از تخدمان گاوها ذبح شده در کشتارگاه شیراز و طی یک سال انجام گرفته و تخمک‌ها پس از مراحل شستشو در سه محیط مختلف کشت داده شده‌اند. محیط کشت پایه برای بلوغ تخمک‌های جمع آوری شده TCM-199 (ساخت Sigma) بوده که به صورت تجاری در دسترس می‌باشد، و متداول ترین محیط کشت مورد استفاده در بلوغ تخمک پستانداران می‌باشد. این محیط حاوی املح مختلف، قدها، اسیدهای امینه، ویتامین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و سایر موادی است که جزیيات آن مشخص می‌باشد<sup>(۱۲)</sup>. در این مطالعه مایع فولیکولی و RSS به ترتیبی که توضیح داده می‌شود در آزمایشگاه تهیه و اثر افزودن هر کدام از آنها به محیط کشت با FBS (ساخت Sigma) که به صورت تجاری در دسترس می‌باشد، مقایسه گردید.

تهیه سرم موش صحرایی: جهت تهیه RSS پس از تشخیص مرحله استروس با کمک گسترش واژنی در موشهای خوننگیری از قلب انجام و پس از مراحل غیرفعال سازی سرم‌ها (قرار دادن در بن ماری ۵۶ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه) و استریل نمودن آن‌ها توسط فیلتر ۰/۲۲ میکرونی، در لوله‌های اپندرف ۱/۵ میلی‌لیتری بسته‌بندی شده و تا زمان استفاده در فریزر ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری گردید.

تهیه مایع فولیکولی: برای این منظور ۱۵۰ تخدمان از گاوها تازه کشتار شده تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه، با کمک سرنگ، مایع فولیکولی از فولیکول‌های قابل مشاهده جدا گردید. مایع فولیکولی جدا شده، به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۴۰۰۰ rpm سانتریفیوژ و پس از فیلتر کردن (۰/۲۲ میکرون) در دمای ۲۰- درجه‌ی سانتی‌گراد تا زمان استفاده فریز گردید.

جهت درمان برخی از ناباروریها و در دامها به منظور افزایش تولید و پیشرفت در تحقیقات علمی پایه، انتقال هسته، حذف ژنهای معیوب و جایگزینی ژنهای مطلوب (اصلاح نژاد)، اضافه کردن ژنهای مقاوم در برابر بیماریهای خاص، ایجاد حیوانات ترانس ژنیک و ایجاد کلون به کمک مهندسی ژنتیک صورت می‌گیرد<sup>(۲)</sup>.

امروزه متداول ترین منبع جمع آوری تخمک‌های مورد نیاز برای تولید رویان در شرایط آزمایشگاهی، استفاده از تخدمان‌های حیوانات تازه کشتار شده می‌باشد که منع مناسب و ارزان قیمتی برای این منظور می‌باشد<sup>(۲)</sup>. بدین منظور محیط‌های کشت حاوی مواد شیمیایی، اسید آمینه‌های مختلف، آنتی بیوتیکها، مواد بیولوژیکی و پروتئینی (که وجود آنها برای کشت ضروری است) مورد استفاده قرار گرفته و بکاربردن محیط‌های مختلف کشت برای این منظور نتایج متفاوتی به دست آورده است<sup>(۳-۸)</sup>. معمولاً در محیط‌های کشت از مکمل‌های هورمونی استفاده می‌گردد که تهیه آنها مشکل و بسیار گران است. استفاده از سرم موش صحرایی ماده در مرحله‌ی استروس که غنی از هورمون‌ها می‌باشد می‌تواند علاوه بر افزایش احتمال بالغ سازی، هزینه‌های مربوط را نیز کاهش دهد. انواع مختلفی از سرم‌های خون به عنوان ماده مکمل به محیط کشت افزوده می‌شوند و نقش مهمی را در محیط کشت بازی می‌کنند. لیکن تا کنون نقش دقیق سرم در بهبود بلوغ و باروری تخمک و مراحل تکاملی رویان به درستی شناخته نشده است. مشخص شده است که مولکولهای درشت از جمله پروتئین‌ها و عوامل رشد موجود در سرم برای کشت تخمک ضروری می‌باشد و به همین دلیل سرم‌های مختلفی برای کشت تخمک مورد استفاده قرار گرفته‌اند<sup>(۸-۱۰)</sup>. گزارش‌های مختلف بیانگر نتایج متفاوت و بعضًا متناقض از اثر انواع سرم‌های مورد استفاده در محیط کشت تخمک می‌باشد<sup>(۱۱)</sup>. لذا این تحقیق با اهداف زیر انجام گردید:

۱- بررسی تأثیر مایع فولیکولی (FF) به تنها یی به محیط کشت (به عنوان گروه کنترل) بر بلوغ مناسب تخمک‌ها.

۲- بررسی تأثیر سرم موش صحرایی تهیه شده در مرحله

جدول (۱): مقایسه میزان بلوغ تخمک های گاو در محیط های مختلف

محیط کشت	تعداد کل تخمک	تعداد تخمک های بالغ (درصد)	تعداد تخمک های نابالغ (درصد)	تعداد تخمک های گاو در محیط های مختلف
کنترل	۳۹۵ (۷۸/۷)	۱۰۷ (۲۱/۳)	۵۰۲	
حاوی RSS	۵۶۹ (۹۰/۲)*	۶۲ (۹/۸)	۶۳۱	
حاوی FBS	۵۶۸ (۸۶/۶)*	۸۸ (۱۳/۴)	۶۵۶	
جمع	۱۵۳۲ (۸۵/۶)	۲۵۷ (۱۴/۳)	۱۷۸۹	

\* با استفاده از آزمون مریع کای، اختلاف معنی دار با گروه کنترل نشان داد ( $P < 0.001$ )

## بحث

بسیاری از محققین افزودن سرم را به عنوان یک ماده مکمل به محیط کشت تخمک، سبب بهبود کیفیت این محیط ها می دانند. مشخص شده است که مولکولهای درشت موجود در سرم برای کشت تخمک ضروری می باشند و به همین دلیل سرم های مختلفی از جمله سرم گوساله جنینی (FCS)، سرم گوسفنده (ESS)، سرم بز فحل (EGS) و سرم گاومیش فحل برای کشت تخمک مورد استفاده قرار گرفته اند<sup>(۱۰، ۱۱)</sup>. سرم حاوی انواع مختلفی از مواد از جمله هورمون ها، عوامل رشد، ویتامین ها، مواد شلاته کننده، یونهای فلز سنگین، پیتیدها، پروتئین ها و یک سری از مولکول های مشخص و نامشخص است<sup>(۱۲)</sup>. با این وجود مواد مؤثر این سرم ها هنوز ناشناخته مانده اند و نقش دقیق سرم در حمایت از بلوغ و باروری تخمک به درستی شناخته نشده است. هر چند که محققین بر این باورند که پروتئین ها و عوامل رشد موجود در سرم در موفقیت کشت آزمایشگاهی سهیم هستند. گزارش های مختلف یانگر نتایج متفاوت و بعضًا متناقض از اثر انواع سرم های مورد استفاده در محیط کشت تخمک می باشد. Totey و همکاران (۱۹۹۳) اثر غلظت ۱۰ درصد FCS را در محیط کشت مشاهده کردند که میزان بلوغ تخمک با اضافه کردن E2، FSH، LH به همراه FCS افزایش می یابد ولی اضافه کردن هر یک به تنهایی و یا با هم اثری بر میزان باروری تخمک نداشت<sup>(۲۱)</sup>. گزارش تاجیک و اسفندآبادی (۲۰۰۳) تأثیر محیط های کشت مختلف بر بالغ سازی تخمک های بز نشان داد که بلوغ تخمک ها در محیط های حاوی سرم جنین گاو (FBS)، سرم میش فحل (ESS) و سرم بز فحل (GSS) اختلاف معنی داری نداشت اما در

در این تحقیق پراکنده گی سلول های کومولوس به عنوان فاکتوری برای تعیین بلوغ تخمکها در نظر گرفته شد. سلول های کومولوس در اثر افزایش ترشح گنادوتروفین قبل از تخمک گذاری پراکنده گی پیدا می کنند و شکاف های اتصالی بین سلول های کومولوس مجاور و بین سلول های کومولوس و تخمک شکسته می شود. وجود حالت پراکنده گی در سلول های کومولوس اطراف تخمک ها رابطه قوی با بلوغ هسته ای تخمک دارد<sup>(۱۳، ۱۴)</sup>.

نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سرم موش صحرایی همانند سرم جنینی گاو بر بلوغ تخمک های گاو مؤثر بود و افزودن هر دو سرم اثراتی بهتر از مایع فولیکولی ایجاد نمود. مطالعات متعددی در مورد تأثیر غلظت های مختلف مایع فولیکولی در بهبود بلوغ آزمایشگاهی تخمک گاو و خوک صورت گرفته است<sup>(۱۵، ۱۶)</sup>. همچنین مایع فولیکولی رقیق شده به عنوان جایگزین مناسبی برای سرم در بلوغ آزمایشگاهی جنین اسب<sup>(۱۷)</sup> گاومیش<sup>(۱۸)</sup>، خوک<sup>(۱۹)</sup> و بز<sup>(۲۰)</sup> مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه کلی حاصل از این تحقیقات را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- میزان بلوغ تخمک در مایع فولیکولی بستگی به سیکل استروس دارد.

۲- مایع فولیکولی غیر رقیق شده حاصل از فولیکول های بزرگ بهتر از مایع فولیکولی حاصل از فولیکول های کوچک و متوسط برای بالغ سازی تخمک مؤثر است.

۳- رشد کامل جنین تا مرحله بلاستوستی با حضور مایع فولیکولی رقیق شده طی بلوغ آزمایشگاهی تخمک حمایت می شود گرچه مایع فولیکولی مزیتی بر سرم رقیق شده ندارد<sup>(۲۰)</sup>.

برخی مواد محرك رشد ناشناخته است که در سرم حیوانات بالغ وجود ندارد یا این سرم فاقد اجزایی همچون هورمون ها و ایمونو گلوبین هایی است که وجود آنها در سرم حیوانات بالغ موجب تأخیر در تکامل سلول ها در آزمایشگاه می شوند.<sup>(۸)</sup> برخی دیگر استفاده از سرم حیوانات فعل را به دلیل از سرگیری میوز و بلوغ تخمک در زمان فعلی در محیط کشت تخمک توصیه می کنند.<sup>(۸)</sup>

استفاده از سرم موش در مرحله استروس به علت کوتاه بودن طول دوره استروس، دسترسی آسان و این نکته که در هر سیکل جنسی چندین تخمک آزاد می کند و احتمالاً محتوى مقدار قابل توجهی هورمون ها، پروتئین ها و عوامل رشد می باشد برای کشت آزمایشگاهی و بالغ سازی تخمک مناسب به نظر می رسد.

### نتیجه گیری

این تحقیق نشان دهنده نیاز به افزودن سرم به محیط کشت بلوغ تخمک و امکان استفاده از سرم موش صحرایی تهیه شده در مرحله استروس به جای FBS با اثرات مشابه جهت بالغ سازی تخمک می باشد.

مقایسه با محیط بدون سرم میزان بلوغ به طور معنی داری افزایش یافت.<sup>(۱۰)</sup> نتایج حاصل از این تحقیق نیز نشان داد که میزان بلوغ تخمک در گروه کنترل (فاقد سرم) در مقایسه با گروههای حاوی سرم از نظر آماری به طور معنی داری کمتر بوده است.

در این تحقیق سرم موش صحرایی در مرحله استروس مورد استفاده قرار گرفت و در مقایسه با گروه کنترل اثرات مشبی بر بلوغ تخمکها ایجاد نمود. ترکیبات موجود در سرم در مراحل مختلف سیکل استروس، دائم در حال تغییر هستند و حتی مشخص شده است که در زمانهای مختلف مرحله فعلی هم اجزای مولکولی سرم همگام با تغییرات اندوکرینی متغیر هستند. امکان دارد که دریافت و مورد استفاده قرار دادن انواع خاصی از مواد موجود در سرم توسط تخمک در زمان خاصی که با روند طبیعی بلوغ و باروری آنها همخوانی دارد از ضروریات بسیار مهم بلوغ تخمک باشد. شاید به همین دلیل است که گزارشهای مختلف، نتایج متفاوت و بعضاً متناقض از انواع سرم های مورد استفاده در محیط کشت تخمک به چشم می خورد.

برخی از پژوهشگران استفاده از FCS را بر سایر انواع سرم ها ترجیح می دهند. اغلب این محققین اعتقاد دارند FCS حاوی

### References

- 1- Hreinsson, J. Rosenlund, B.Friden,B. Levkov,L. *Recombinant LH is equally effective as recombinant hCG in promoting oocyte maturation in clinical in-vitro maturation programme: a randomized study.* Hum. Repro. 2003; 18, 2131-2136.
- 2- Gordon, Ian. *Reproductive technology in farm animals.* 1st Ed. CABI publication. 2005: 108-128.
- 3- Ball, G.D, M.L. Leibfried, R.L. Ax and N.L. First. Symposium: *Embryo development and manipulation.* J. Dairy Sci , 1984: 67, 2775-2785.
- 4- Bevers, M.M., S.J. Dieleman, R. Vanden Hurk and F. Izadyar. *Regulation and modulation of oocyte maturation in the bovine.* Theriogenology, 1997: 47, 13-22.
- 5- Choi, Y.H, E.M. Carnevale, G.E. Seidel and E.L. Squires. *Effects of gonadotropins on bovine oocytes matured in TCM-199.* Theriogenology, 2000: 56, 661-670
- 6- Hafez, E.S.E. *Reproduction in Farm Animals.* 7th Ed, Wolters kluwer company, Philadelphia, 2000 U.S.A : 68-159

- 7- Monniaux, D, P. Monget, N. Besnard, C. Huet and C. Pisselet. *Growth factors and antral follicular development in domestic ruminants.* Theriogenology, 1997: 47, 3-12.
- 8- Sanbuisho, A. and W.R. Threlfall. *The effect of estrous cow serum on the in vitro maturation and fertilization of the bovine follicular oocyte.* Theriogenology, 1989: 31, 693-699.
- 9- Takagi, Y. *Development of bovine oocytes matured, fertilized and cultured in a serum-free, chemically defined medium.* Theriogenology, 1991: 35, 1197-1205.
- 10- Tajik, P. and E Shams Esfandabadi. *In vitro maturation of caprine oocytes in different culture media.* Small Ruminant Research, 2003: 47, 155-158.
- 11- Fukui, Y, H. Ono. *Effects of sera, hormones and granulosa cells added to culture medium for in-vitro maturation, fertilization, cleavage and development of bovine oocytes.* Reprod. Fertil. 1989: 86, 501-506.
- 12- Boone, W.R, S.S. Shapiro. *Quality control in the vitro fertilization laboratory.* Theriogenology. 1990: 33, 23-50.
- 13- Dos, S.K., M.S. Chauhan, P. Palta and O.S. Tomer. *Influence of cumulus cells on in vitro maturation of denuded buffalo oocytes.* Vet. Rec. 1997, 141. 522-523
- 14- Sutton, M.L, R.B. Gilchrist and J.G. Thompson. *Effects of in vivo and in vitro environments on the metabolism of the cumulus-oocyte complex and its influence on oocyte developmental capacity.* Human Reprod. 2003: Vol. 9, No. 1. 35-48.
- 15- Khatir, H. C. Carolan, P. Lonergan , P. Mermilliod. *Characterization of calf follicular fluid and its ability to support cytopasmic maturation of cow and calf oocytes.* J. Reprod. and Fertil. 1997, 41, 267-275.
- 16- Grunp, C.G, H. Nagashima, M.B. Nottel. *Asynchronous meiotic progression in porcine oocytes matured in vitro: A cause of polyspermic fertilization.* Reprod. Fertil. 1993: Dev. 9, 187-191.
- 17- Avery, B, L. Strobech, T. Jacobsen, I.B. Bogh , T. Greve. *In vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes in undiluted follicular fluid: effect on nuclear maturation, pronuclear formation and embryo development.* Theriogenology, 2003: 59, 987-999.
- 18- Aguilar, J.J, G.L. Woods, M.H. Miragaya, L.M. Olsen ,D.K. Vanderwall. *Effect of Homologous preovulatory follicular fluid In vitro maturation of Equine cumulus-oocyte complexes.* Theriogenology, 2001: Vol. 56, pp. 745-758
- 19- Jelodar, G.A, O.P. Dahanda , P.S. Yadav and Inderjeet Singh. *Buffalo oocytes maturation, fertilization and development in vitro in conventional media with supplement or in buffalo follicular fluid.* Indian Buffalo J. 2003: 1,1-4.
- 20- Driancourt, M.A. and B. Thuel. *Control of oocyte growth and maturation by follicular cells and molecules present in follicular fluid.* A Review. Reprod. Nutri. Dev. 1998: Vol. 38: 345-362
- 21- Totey, S.M, C.H. Pawshe, G.P. Singh. *In vitro maturation and fertilization of buffalo oocytes (*Bubalus bubalis*): Effects of Media, Hormones and sera.* Theriogenology, 1993: 39, 1153-1171.