

بررسی شیوع اختلالات شناوی در بین کودکان سنین ۶-۳ سال مهدکوهی شهر یزد

دکتر محمدحسین برادران فر^{*}، ابوالفضل ملاصادقی^۲، دکتر زهرا جعفری^۳

چکیده

مقدمه: نقص شناوی به معنای عملکرد غیرطبیعی یا کاهش عملکرد شناوی به دلیل وجود نوعی اختلال شناوی است. هدف هر برنامه غربالگری شناوی در سینه پیش دبستانی و دبستانی، شناسایی دقیق آن دسته از کودکانی است که شناوی آنها به علت وجود نوعی ضایعه انتقالی و یا حسی آسیب دیده است.

روش پژوهی: مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی از مهر تا بهمن ماه سال ۱۳۸۴ روی ۵۷۷ کودک (۲۹۹ دختر و ۲۷۸ پسر) انجام شد. این کودکان به صورت تصادفی از بین کودکان مهدکوهی شهرستان یزد انتخاب شدند. پس از تکمیل برگه آگاهی از وجود کم شناوی توسط والدین و مریبان، معاینه اتوسکپی، غربالگری تنفس، خالص و آزمون ایمیتانس صورت می گرفت.

نتایج: در این بررسی ۱۲/۶٪ اختلال مجرای گوش خارجی، ۳۴/۲٪ اختلال پرده گوش، ۳۵/۹٪ تمپانوگرام غیرطبیعی، ۱۳/۴٪ کم شناوی مشاهده شد. کم شناوی در ۱۱/۵٪ موارد از نوع انتقالی، ۱/۵٪ از نوع حسی - عصبی و در ۰/۵٪ از نوع آمیخته بود. در ۱۳/۴٪ کودکان مورد بررسی (۱۵/۸٪ دختران و ۵/۲۵٪ پسران) کم شناوی از حد خفیف تا عمیق مشاهده شد ۳۴/۲٪ کودکان نیازمند اقدامات درمانی و ۱/۷٪ کودکان نیازمند خدمات توانبخشی بودند و میزان آگاهی والدین (۱/۸۵٪) و مریبان (۱/۹٪) از مشکل شناوی در سطح پایینی قرار داشت.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به درصد بالای نیاز به اقدامات درمانی و اثرات سوء اختلالات شناوی بر یادگیری کودکان در سنین پایین و همچنین اهمیت شناسایی و مداخله زودهنگام کم شناوی در برنامه های توانبخشی شناوی، آگاهی رسانی و آموزش به افراد جامعه به خصوص والدین و مریبان مهدکوهی ها در باره اثرات سوء کم شناوی و نحوه پیشگیری و شناسایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

واژه های کلیدی: غربالگری شناوی، اختلالات شناوی، غربالگری جهانی شناوی

مقدمه

در حیطه آموزش و توانبخشی کودکان کم شناوا، تردیدی وجود ندارد که هیچ چیز به اندازه شناسایی و مداخله زودهنگام Early identification and intervention

*- نویسنده مسئول: دانشیار گروه گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردان
تلفن: ۰۳۵۱-۸۲۴۰۰۰؛ نامبر: ۱۰۴۲۱۰۰

Email :baradaranf@yahoo.com

-۲- کارشناس ارشد شناوی شناسی
-۱- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
-۳- کمکی تخصصی نوروساینس و عضو کادر آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۱/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۱/۱۰

توانبخشی شنیداری و کسب نتایج موفقیت آمیز، مؤثر نمی باشد. در این رابطه می توان به نتایج مطالعات متعدد استناد نمود. در بررسی Larson و Mankowitz کم شناوا که در برنامه های آموزشی خاص ثبت نام کرده بودند، مشاهده شد که هر چه سن مراجعته پایین تر باشد، کودکان از قابلیت های زبانی و بهتری برخوردار خواهند شد(۱،۲). در مطالعه Yoshinaga-Itano و همکارانش نیز گزارش شد که کودکان سخت شناوا و ناشناوا

یزد در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ بود. نمونه‌گیری به صورت خوش‌های انجام شد. به این ترتیب که از بین مهدکودک‌های یزد ۱۵ مهدکودک انتخاب و با نظر مشاور آمار، پژوهش برروی تمام کودکان ۳-۶ سال این مهدکودک‌ها تا رسیدن به تعداد ۵۷۷ نفر انجام شد. در مرحله بعد، پرسشنامه‌ای به هریک از کودکان مورد بررسی داده شد که پس از تکمیل توسط والدین جمع‌آوری گردید. پرسشنامه فوق ضمن آگاه نمودن والدین از انجام برنامه غربالگری شنوایی، آگاهی از وضعیت شنوایی کودک را جویا می‌شد. آزمایشات در محلی آرام و با سکوت نسبی صورت گرفت. در محل آزمون از رفت و آمد افراد جلوگیری شد و در صورت افزایش نویز محیط، انجام آزمون متوقف می‌شد. در جدول ۱ حداکثر نویز مجاز در فرکانس‌های مختلف را نشان می‌دهد.

ابتدا از مریبی در باره وضعیت شنوایی کودک سؤال شد. سپس معاینه اتوسکوبی، غربالگری تون خالص و ایمیتانس انجام گرفت. تمام آزمایشات توسط کارشناس شنوایی سنجی با تجربه کافی انجام شد. در کودکان با سنین پایین ۳-۴ سال از ادیومتری شرطی بازی استفاده شد. معیار ارجاع در غربالگری تون- خالص، متوسط آستانه بیش از ۲۰ dBHL در فرکانس‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هertz یا آستانه بیش از ۲۰ dBHL در هریک از این فرکانسها به طور جداگانه در راه هوایی (۷،۲) و معیار ارجاع در آزمایش ایمیتانس وجود فشار منفی برابر یا بیشتر از ۱۰۰- بود. در صورت مشاهده نتایج ناهنجار، کودکان جهت بررسی دقیق وضعیت شنوایی و دریافت خدمات درمانی یا توانبخشی مناسب به بیمارستان شهید رهنمون ارجاع می‌شدند. تمام کودکان ارجاع داده شده توسط مجریان اصلی طرح تحت معاینه کامل قرار گرفتند.

برخوردار از مهارتهای Deaf and hard of hearing (D/HH) شناختی طبیعی که پیش از سن ۶ ماهگی، شناسایی شوند، در صورت مداخله درمانی به موقع و مناسب می‌توانند مهارتهای زبانی خود را به محدوده هنجاربرسانند و مهارتهای شناختی آنها، متناسب با مهارتهای زبانیشان خواهد بود. این کودکان صرف نظر از میزان کم شنوایی، جنسیت، نژاد، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سن در زمان ارزیابی، شنوایی و نوع روش ارتباطی به قابلیت‌های زبانی متناسب با سن، دست خواهند یافت(۳،۴). بررسی دیگری در مدرسه ناشنوايان Lexington نشان داد، کودکان کم شنوایی که پیش از ۶ ماهگی در این مدرسه ثبت نام شده بودند، نسبت به کودکانی که بین ۱۶ تا ۲۴ ماهگی ثبت‌نام کرده بودند، در ۴۰ ماهگی از توانایی درک گفتار و تعاملات اجتماعی بهتری برخوردار شدند. در این راستا، غربالگری شنوایی اقدامی ضروری و مناسب برای شناسایی اختلالات شنوایی و پیشگیری از معلولیت‌های شنوایی و منطقی ترین راه برای شناسایی کم شنوایی در سنین پایین خصوصاً در بدو تولد یا زمان کوتاهی پس از آن است. هدف اصلی غربالگری شنوایی در سنین پایین، کاهش تأثیر نقص شنوایی بر درک گفتار و زبان، مهارتهای تحصیلی، رشد و تکامل اجتماعی - عاطفی و برآورد نیازهای درمانی، توانبخشی و آموزشی می‌باشد(۵). هدف کلی این بررسی تعیین شیوع اختلالات شنوایی در بین کودکان سنین ۳-۶ سال مهدکودکهای شهرستان یزد بود. در این بررسی، شیوع اختلالات شنوایی به تفکیک جنسیت، سن، میزان و نوع کم شنوایی و همچنین میزان آگاهی والدین و مریبان مهدکودکها از وجود اختلالات شنوایی مورد مطالعه قرار گرفت.

روش بررسی

جامعه آماری این پژوهش کودکان مهدکودک‌های شهرستان

جدول ۱. حداکثر نویز مجاز در فرکانس‌های مختلف

فرکانس مرکزی در هر اکتاو باند(HZ)	حد اکثر سطح نویز مجاز (dB SPL)	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰
		۶۲	۵۴/۵	۴۹/۵	۴۱/۵

نتایج

از مجموع ۱۱۵۴ گوش معاینه شده با اتوسکوب، در ۱۲/۶٪ موارد حالت ناهنجار مجرای گوش خارجی مشاهده شد.

ناهنجاری شامل وجود جرم فشرده، جرم جزئی، وجود جسم خارجی در مgra و آتزی مجرای گوش بود که بیشترین میزان

۲۱/۴٪ گوش چپ) بیشتر بود. در هردو گوش و برای هردو گروه دختر و پسر شیوع تمپانوگرام C در محدوده سنی ۵-۶ سال و شیوع تمپانوگرام B در محدوده سنی ۳-۴ سال بیشتر بود (جدول ۳).

از مجموع کودکان مورد بررسی ۱۳/۴٪ آنها (۱۵/۸٪ دختران و ۲۵/۵٪ پسران) دچار کم شنوایی بودند. کم شنوایی در ۱۱/۵٪ موارد از نوع انتقالی (۶٪ دختران و ۵/۵٪ پسران)، ۱/۵٪ از نوع حسی - عصبی (۸٪ دختران و ۷٪ پسران) و در ۰/۵٪ از نوع آمیخته (۳٪ دختران و ۲٪ پسران) بودند. در ۱۳/۴٪ کودکان مورد بررسی (۸/۱۵٪ دختران و ۵/۲۵٪ پسران) کم شنوایی از حد خفیف تا عمیق مشاهده شد (جدول ۴).

در این بررسی ۱۹۷ نفر از کودکان (۲/۳۴٪) نیازمند اقدامات درمانی و ۱۰ نفر (۱/۱۷٪) نیازمند اقدامات توانبخشی بودند. میزان آگاهی والدین و مریان از وجود اختلال شنوایی در سطح پایینی (۱/۸۵٪ والدین و ۱/۹٪ مریان) قرار داشت.

آن مربوط به انسداد مجرای گوش راست مربوط به محدوده سنی ۴-۵ سال (۱۷٪) و در گوش چپ مربوط به محدوده سنی ۳-۴ سال (۱۵/۲٪) بود. اختلالات مجرای گوش خارجی در دختران (۱۴٪) بیش از پسران (۱۱/۲٪) و بین دو گوش از نظر اختلالات مجرای گوش خارجی تفاوت معنی داری وجود نداشت. حالات ناهنجار پرده تمپان در ۲/۳۴٪ از نمونه ها مشاهده شد که بیشترین میزان آن مربوط به درون کشیدگی پرده تمپان (۱۴/۸٪) به دلیل بد کاری شیپور استاش بود. موارد ناهنجار در پسران بیشتر از دختران بود ولی تفاوت معنی داری از نظر آماری به دست نیامد. همچنین موارد ناهنجار در سنین ۳-۴ سال بیشتر از سایر سنین برای هردو گروه دختر و پسر بود (جدول ۲).

در ۳۵/۹٪ موارد، انواع تمپانوگرام غیرطبیعی مشاهده شد که بیشترین میزان آن مربوط به تمپانوگرام نوع C (۲۰/۵٪) بود. در دختران شیوع تمپانوگرام C در دو گوش (۲۲٪) گوش راست و

جدول ۲: توزیع فراوانی وضعیت ظاهری پرده گوش راست و چپ بر حسب جنس (یزد، ۸۵-۱۳۸۴)

وضعیت پرده گوش	گوش راست						گوش چپ					
	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر
هنجار	۶۹	۲۰۶	۶۵/۱	۱۸۱	۶۸/۳	۲۰۴	۶۵/۵	۱۸۲	۴۳	۱۲	۳۶	
درون کشیده			۱۴/۷۵	۴۱	۱۴/۵	۴۳	۱۵/۵					
پرخون			۹/۴	۲۶	۷/۸	۲۳	۹/۴	۲۶	۸/۷	۲۶		
نوتومپان			.	.	۰/۳	۱	۰/۳	۱	۰/۶	۲		
کلیسیفیکاسیون			.	.	۰/۶	۲	۰/۷	۲	۰/۳	۱		
غیر قابل مشاهده			۱۰/۷۵	۳۰	۸/۵	۲۶	۸/۶	۲۴	۹/۴	۲۸		
جمع			۱۰۰	۲۷۸	۱۰۰	۲۹۹	۱۰۰	۲۷۸	۱۰۰	۲۹۹		

جدول ۳: توزیع فراوانی نوع تمپانوگرام دو گوش بر حسب جنس (یزد، ۸۵-۱۳۸۴)

نوع تمپانوگرام	گوش راست						گوش چپ					
	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر
An	۶۴/۶	۱۹۳	۶۰/۷	۱۶۹	۶۵/۹	۱۹۷	۶۵/۱	۱۸۱	۶۵/۹	۱۹۷	۶۵/۱	
C	۲۲	۶۶	۱۸	۵۰	۲۱/۴	۶۴	۱۸/۴	۵۱	۲۱/۴	۶۴	۱۸/۴	
B	۳۲	۳۲	۱۵/۸	۴۴	۸/۷	۲۶	۱۱/۵	۳۲	۸/۷	۲۶	۱۱/۵	
Ad	۶	۷	۲/۵	۷	۳	۹	۲/۵	۷	۳	۹	۲/۵	
As	۲	۷	۳	۸	۱	۳	۲/۵	۷	۱	۲/۵	۱	
جمع	۱۰۰	۲۷۸	۱۰۰	۲۹۹	۱۰۰	۲۹۹	۱۰۰	۲۷۸	۱۰۰	۲۹۹	۱۰۰	

جدول ۴: توزیع فراوانی میزان کم شنایی و گوش بر حسب جنس (یزد، ۱۳۸۴-۸۵)

درصد	پسر			دختر			پسر			دختر			میزان کم شنایی
	فراوانی	درصد	فراءونی	درصد	فراءونی	درصد	فراءونی	درصد	فراءونی	درصد	فراءونی	درصد	
۸۶	۲۳۹	۸۶/۳	۲۵۸	۸۷	۲۴۲	۸۷	۲۶۰	شناختی طبیعی					
۶/۵	۱۸	۶/۶	۲۰	۷/۹	۲۲	۵/۶	۱۷	مختصر					
۵/۴	۱۵	۴/۳	۱۳	۳/۹	۱۱	۴/۶۵	۱۴	ملايم					
۰/۸	۲	۰/۷	۲	۰/۴	۱	۱	۳	متوسط					
۰/۶۵	۲	۰/۷	۲	۰/۴	۱	۰/۷	۲	متوسط-شدید					
۰/۶۵	۲	۰/۷	۲	۰/۴	۱	۰/۷	۲	شدید					
-	-	۰/۷	۲	-	-	۰/۳۵	۱	عميق					
۱۰۰	۲۷۸	۱۰۰	۲۹۹	۱۰۰	۲۷۸	۱۰۰	۲۹۹	جمع					

بحث و نتیجه‌گیری

استان تهران و کردستان شد. در آخرین بررسی انجام شده روی ۷۰ کودک استان کردستان، ۸۹/۶٪ کودکان در غربالگری شنایی قبول و ۱۰/۴٪ رد شدند. از بین موارد رد شده، ۶/۷٪ کم شنایی دو طرفه و ۳/۷٪ کم شنایی یک طرفه مشاهده شد. به طور کلی ۲۱/۶٪ از موارد نیازمند اقدامات درمانی و ۱/۳٪ نیازمند خدمات توانبخشی بودند(۸).

در مطالعه حاضر از مجموع ۳۵/۹٪ تمپانوگرام ناهنجار ۲۰٪ را تمپانوگرام نوع C، ۱۱/۶٪ را تمپانوگرام نوع B تشکیل می‌داد. همچنین از ۱۳/۴٪ کم شنایی مشاهده شده در ۱۱/۵٪ موارد کم شنایی از نوع انتقالی بود. با توجه بینکه سنین خردسالی و کودکی، سنین یادگیری و زبان آموزی است و در برخی مطالعات بین وقوع مکرر اوتیت گوش میانی و ضعف تحصیلی و توانایی در ک مطلب در سنین دبستان ارتباط نزدیکی مشاهده شده است(۹،۱۳). آمار و ارقام فوق لزوم توجه جدی به امر غربالگری شنایی در سنین پایین (نوزادی) و ارائه اطلاعات و آموزش‌های لازم به خانواده‌ها و مریبان مهدهای کودک را گوشزد می‌کند. در این رابطه سطح پایین آگاهی والدین (۱/۸۵٪) و مریبان (۱/۹٪) از مشکل شنایی کودک، اهمیت و ضرورت امر اطلاع رسانی را دوچندان می‌نماید.

تصور عامه مردم راجع به کم شنایی، میزان کم شنایی در حد شدید و عميق است بطوریکه فرد نمی‌تواند هیچ چیز را بشنود. غالباً والدین، مریبان مهد کودک و سایر کسانی که در ارتباط با

در بررسی Zinc و Fitzaland روی ۳۵۱۰ کودک کلاس اولی و پیش دبستانی، ۳/۵٪ کم شنایی انتقالی، ۰/۳٪ کم شنایی حسی-عصبي و ۰/۱٪ کم شنایی آمیخته گزارش شد(۱۴). در مطالعه حاضر نیز میزان کم شنایی انتقالی (۱۱/۵٪) نسبت به کم شنایی‌های حسی-عصبي (۱/۵٪) و آمیخته (۱/۳٪) بیشتر بود. اما نسبت به مطالعه Fitzaland، میزان کم شنایی انتقالی در حال قابل توجهی بالاتر بود.

در بررسی Jordan و Eagles روی ۴۰۶۷ کودک ۵-۱۰ ساله، ۶٪ کودکان با کم شنایی دو طرفه و ۱۲٪ با کم شنایی یک طرفه گزارش شدند(۲۰). در بررسی نیمی از کودکان مبتلا به اویست سروز و ۴۰٪ کودکانی که پرده گوش پاره، ولی بدون ترشح چرکی داشتند، متوسط سطح شنایی بهتراز ۱۵ dBHL بود. این محققان خاطرنشان کردند که در غربالگری تون-خالص، بسیاری از کودکان دچار مشکل گوش میانی نادیده گرفته می‌شوند(۲۰). در بررسی حاضر نیز در ۲۱٪ کودکان مورد مطالعه، آسیب شنایی انتقالی بدون افت آستانه‌های شنایی از سطح ۲۰ dBHL وجود داشت. این امر بر لزوم استفاده از غربالگری ایمیتانس به همراه غربالگری تون خالص و همچنین استفاده از سایر آزمایشات شنایی ابجکتیو حساس به مشکل گوش میانی برای غربالگری شنایی تأکید می‌نماید.

در کشور ما برنامه غربالگری شنایی سنین ۳-۶ سال از سال ۱۳۸۰ در استان تهران شروع شده اما متأسفانه فقط محدود به

شناختی طبیعی در صورتی که بیش از سن ۶ ماهگی شناسایی شوند، با بهره‌گیری از مداخله به موقع و مناسب می‌توانند مهارتهای زمانی خود را به حدود طبیعی برسانند اما طبق همین بررسی‌ها، قابلیت زبان دریافتی و زبان ییانی کودکان که دیرتر شناسایی می‌شوند یک انحراف استاندارد (SD) پایین‌تر از کودکانی است که به موقع شناسایی شده‌اند و مهارتهای زبانی آنها نسبت به کودکانی که قبل از شش ماهگی شناسایی می‌شوند، به طور چشمگیری پایین‌تر است (۱۵، ۲۳، ۲۰). به طور کلی کودکان کم شنوایی که پیش از شش ماهگی شناسایی شده و مداخله درمانی آنها (شامل دریافت وسیله تقویت کننده صوتی و استفاده از برنامه‌های توانبخشی خانواده محور Family-Central rehabilitation program) هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا درآید، از جنبه زبان ییانی، واژگان دریافتی، واژگان ییانی، رفتار ارتباطی درک گفتار و تعداد همخوانها و واکه‌ها عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت (۱۸). براین اساس تلاش در جهت ارتقا سطح آگاهی عمومی درباره کم شنوایی و عواقب سوء آن از طرق مختلف و همچنین معطوف نمودن توجه واحدهای بهداشتی درمانی کشور در جهت ارائه خدمات هماهنگ و عملی نمودن اجرای برنامه غربالگری شنوایی در سنین پایین (نوزادی)، به عنوان اولویت برنامه‌های پیشگیری و توانبخشی توصیه می‌گردد (۱۹).

سپاسگزاری

پژوهش فوق به عنوان طرح تحقیقاتی مصوب مرکز توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد بوده است. برخود لازم می‌دانیم که از همکاری صمیمانه مسئولین سازمان بهزیستی استان یزد به خصوص خانم شاکری و همچنین مسئولین مهد کودک‌ها، مدیریت محترم بیمارستان شهید رهنمون آقای قانع، خانم فاطمه زارعی، سمیه انصاری، احمد و علی محمد ملاصداقی که ما را در انجام این تحقیق یاری نموده‌اند سپاسگزاری نماییم.

کودکان کار می‌کنند از اینکه کم شنوایی درجات مختلفی دارد بی‌اطلاع هستند. ضمن اینکه کم شنوایی در حد ملايم یا متوسط ممکن است آنقدر مشکل ایجاد نکند که والدین و اطرافيان کودک بدان واقف گرددند. به طور کلی واژه‌های ملايم، متوسط، شدید و عميق اگرچه توصيف کننده‌های مناسبی از میزان کم شنوایی برای شنوایی شناسان و معلمین کم شنواییان می‌باشد اما نمی‌توانند میزان معلولیت شنوایی را منعکس کنند. چراکه حتی کم شنوایی در حد ملايم نیز ممکن است مشکلات قابل توجهی را از جنبه رشد گفتار و زبان و پیشرفت تحصیلی ایجاد کنند (۱۴، ۱۵). به علاوه عواملی چون فاصله نزدیک والدین و کودک در سنین پایین، اوتيت گوش میانی، تغیيرات رفتاري و استفاده از مکانيزم جبراني (نظير لب خوانی و اشارات طبیعی) می‌تواند شناسایي زودهنگام کم شنوایی‌های ملايم و متوسط حسي عصبی را به تعويق اندازد (۱۶، ۱۴). در اين راستا انجام برنامه‌های غربالگری شنوایی در سنین پایین می‌تواند در شناسایي به موقع کم شنوایی‌های ملايم و متوسط مهمترین نقش را ايفا نماید (۹، ۱۷).

عامل ديگري که بر ضرورت و اهميت اجرای برنامه‌های غربالگری شنوایی در سنین پایین تأكيد می‌کند، بار اقتصادي نقص شنوایی و افزایش هزینه‌های درمانی و توانبخشی در موارد تأخير در شناسایي و مداخله زودهنگام کم شنوایی است. بررسی‌ها نشان داده است که برای کاهش هزینه‌ها، تنها اجرای برنامه شناسایي و مداخله به موقع می‌تواند مؤثر باشد چراکه شناسایي زودهنگام، موجب اقدامات مؤثرتر و ضامن موفقیت برنامه‌های توانبخشی است (۱۸، ۱۷، ۹).

در زمان‌بندی برنامه غربالگری و مداخله کمیته مشترک شنوایی اطفال (JCIH و ۱۹۹۴) Joint Committee of Infant Hearing، سن شناسایي کم شنوایی تا سه ماهگی و سن مداخله درمانی و توانبخشی تا شش ماهگی قيد شده است (۱۸، ۶). زира مطالعات متعددی به ویژه در سالهای اخیر نشان داده است که کودکان سخت شنوای ناشنوای (DHH) برخوردار از مهارتهای

References

- 1- Mankowitz J, larson MA. *Longitudinal study of child in preschool special education programs.* Research in educa 1990 , 3: 120-7.
- 2- Northern JL, Down MP. *Hearing in children.* 5th ed. Williams & Wilkins 2000; 117-20, 332-5.
- 3- Alpiner JG, McCarthy PA. *Rehabilitative audiology in children and adult.* Third edition. Lippincott, Williams and Wilkins 2000; 83-106, 140-51.
- 4- Yoshinaga- Itano C, Apuzzo M, Coulter D, Stredler- Brown A. *The effects of early identification of hearing loss on developmental outcomes.* Paper presented at the third annual infant hearing screening seminar, providence, RI. 1996.
- 5- Biackman JA. *Indentification and assessment in early intervention.* An aspect publication, Inc. Gaithersburg, Maryland 1995: 251-8.
- 6- Hayes D, Northern JL. *Infants and Hearing.* Singular Publishing group, Inc. Scan Diego. London 1996; 227-32, 360-70.
- 7- Katz J. *Hand book of clinical audiology.* 5th edition, Williams and Wilkins, 2000.
- 8- حیدری عطا. بررسی شیوع انواع اختلالات شنوایی در بین کودکان ۶-۳ سال مهد کودکهای کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، ۱۳۸۳
- 9- Bess F, Paradise J. *Universal screening for hearing impairment: not so simple, not risk free, not necessarily beneficial and not presently justified.* Pediatrice 1994; 93(2): 330-4.
- 10- Carney A, Moeller MP. *Treatment efficacy: hearing loss in children.* Journal of speech and hearing research 1998; 41: 561-84.
- 11- Harrison M, Roush J. *Age of suspicion, Identification and intervention for infant and young children with hearing loss.* A national survey. Ear and Hearing 1996; 17(1): 55-62.
- 12- Maharjan M, Bhandari S, Singh I, Mishra SC. *Prevalence of otitis media in school going children in Eastern Nepal.* 2006;4(4):479-82.
- 13- Olatoke F, Ologe FE, Nwawolo CC, Saka MJ. *The prevalence of hearing loss among schoolchildren with chronic suppurative otitis media in Nigeria, and its effect on academic performance.* Ear Nose Throat J. 2008 Dec;87(12):E19
- 14- Fitz Zaland RE, Zink GD. *A comparative study of hearing screening procedures.* Ear Hear. 1984 Jul-Aug; 5(4):205-10.
- 15- Nicholas JB, Greers AE. *Communication of oral deaf and normal hearing children at 36 months of age.* Journal of Speech, Language and hearing research. 1997. 40: 1314-27.
- 16- Luterman D, kurtzer-White L, Seewald RE. *The Young Deaf Child.* Baltimore: York Press. 1999: 35-55
- 17- Mehl A, Thomson V. *Newborn hearing screenining : The great omission.* Pediatrics 1998 jan 101(1): E4
- 18- Hall JW, Mueller HG. *A Audiologist's Desk refrence.* Vol.1, Singular publishing group, Inc. San Diego. London 1994; 441-85.
- 19- Lotfi Y, Jafari Z. *The prevalence of hearing disorders among the 3-6 years old children of kindergartens in welfare organization of Tehran province.* Journal of rehabilitation 2001; 2(5-4): 13-7.2001.
- 20- Jordan RE, Eagles EL . *The relation of air conduction audiometry to otological abnormalities.* Trans Am otol soc. 1961,49:219-29.