

بررسی مقایسه‌ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد با شاخص‌های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از ۵

فاطمه توسلی^{*}، مرضیه قاسمی^۱، اشرف محمدزاده^۲، جمیله شریفیان^۳، سمیرا توسلی^۰

- ۱- دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- ۲- دستیار زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- ۳- فوق تخصص گروه اطفال، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- ۴- کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- ۵- کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۱۰/۲۴

تاریخ ارسال: ۱۳۸۸/۵/۴

چکیده

مقدمه: پارگی خودبخودی و قبل از موعد کیسه آب (PPROM) از مهمترین علل موربیدیته و مرگ و میر حوالی تولد است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه‌ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد (PPROM) با شاخص‌های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از ۵ می‌باشد.

روش بودسی: این مطالعه بصورت همگروهی آینده‌نگر روی ۱۳۷ خانم باردار با پارگی کیسه آب با حاملگی بین ۲۶ تا ۳۴ هفته از مهرماه ۱۳۸۵ تا مهرماه ۱۳۸۷ انجام گردید. بیماران بر اساس شاخص مایع آمنیوتیک (AFI) به دو گروه <5 (AFI<۵ نفر) و ≥ 5 (۵ نفر) تقسیم شدند. برای مقایسه دو گروه از آزمون T و کای دو استفاده شد.

نتایج: دو گروه از نظر متغیرهایی مانند تعداد حاملگی‌ها، سن حاملگی در زمان پارگی غشاها و وزن تولد همگن بودند. در گروه AFI<۵، فاز نهفته (Latency) کاربردی بطور معنی‌داری کوتاه‌تر بود ($P=0.049$) و همچنین تعداد سزارین به علت دیسترنس جنینی بالاتر ($P=0.008$)، آپگار دقیقه اول نوزادی پایین‌تر ($P=0.027$) و میزان مرگ بیشتر نوزاد در یک هفته اول بیشتر بود ($P=0.045$).

نتیجه گیری: اولیگوہیدرآمنیوس ($5 < AFI \leq 5$) به دنبال PPROM باعث زایمان سریع‌تر، افزایش تعداد سزارین به علت دیسترنس جنینی، آپگار پائین دقیقه اول نوزادی و افزایش آمار مرگ و میر نوزادی هفت‌هی اول می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پارگی زودرس قبل از ترم کیسه آب - حاملگی - شاخص مایع آمنیوتیک

* (نویسنده مسئول)؛ تلفن: ۰۵۱۱-۸۰۲۲۶۰۸، پست الکترونیکی: tavassolif@mums.ac.ir

مقدمه

بطنی و نیز خطر مرگ، جنین و نوزاد می‌باشد(۲).

زمانیکه PPROM دور از زایمان ترم اتفاق می‌افتد خطرات مشخص موربیدیتی و مرگ و میر برای مادر و جنین وجود دارد و بنابراین پزشکانی که مراقبت از زن حامله را بر عهده دارند نقش مهمی در اداره و درمان بیماری دارند که می‌بایست با توجه به عوارض بالقوه بیماری، با تصمیم‌گیری مناسب، ضمن کم کردن خطرات مادری و جنینی، پیامد حاملگی را بهبود بخشد(۲).

یافته‌های کلینیکی و درمان PPROM هنوز مورد بحث است اما بیشتر نویسندهای مقالات و منابع علمی، درمان انتظاری همراه با آنتی‌بیوتیک و کورتون را در حاملگی PPROM زیر ۳۴ هفته مطرح نموده‌اند.

مهمنترین حسن درمان انتظاری، طولانی شدن مدت حاملگی است که برای کاهش موربیدیتی‌های وابسته به سن حاملگی همراه با نارسی نوزاد مؤثر است اما این سود بایستی با ریسک خطرات درمان انتظاری از جمله کوریوآمنیونیت سنجیده و تعدیل شود(۱،۴،۹).

از سوی دیگر بعلت خاصیت میکروب‌کشی(Bactericidal) مایع آمنیونیک و نقش حفاظتی آن در مقابل عفونت، جنین بنظر می‌رسد که کاهش میزان آن پس از بروز پارگی پرده‌های جنینی، توانایی زن را در مقابل عفونت تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش ریسک عفونت گردد(۱۱،۱۰).

با توجه به موارد ذکر شده هدف از این مطالعه بررسی مقایسه‌ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد(PROM) با شاخص‌های مایع آمنیونیک کمتر و بیشتر از ۵ می‌باشد.

روش بررسی

این پژوهش از نوع کوهورت آینده‌نگر می‌باشد، که به مدت ۲ سال از تاریخ ۸۷/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱ در بخش زنان و مامایی بیمارستان امام رضا(ع) اجرا شد.

گروه مورد بررسی زنان حامله با سن حاملگی ۲۶-۳۴ هفت‌هه که با تشخیص قطعی آبریزش در بخش ماماًی بیمارستان امام رضا(ع) بستری شده و تحت درمان انتظاری قرار گرفته‌اند،

پارگی زودرس قبل از ترم کیسه‌آب (PPROM: Premature preterm rupture of membrane) در ۳ درصد حاملگی‌ها رخ می‌دهد و عامل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تمام تولدات زودرس بوده و یکی از علل مهم موربیدیتی(Morbidity) پری‌ناتال است(۱-۳). یکی از مهمترین علل اهمیت PPROM همراهی آن با کوتاهی فاصله بین زمان پارگی پرده‌ها تا زایمان می‌باشد و این مسئله بعلت تولد نوزادان نارس در PPROM از اهمیت زیادی برخوردار است(۱).

در طی فاصله زمانی میان پارگی کیسه‌آب تا زایمان، احتمال صعود میکرووارگانیسم‌های پاتوژن از واژن به حفره آمنیون افزایش یافته و گمان می‌رود در افزایش عفونت داخل رحمی نقش داشته باشد(۴-۸).

همچنین در برخی منابع PPROM بعنوان یک پروسه پاتولوژیک، که بیشتر بدنبال التهاب و عفونت غشاها رخ می‌دهد، معرفی گردیده است. در مطالعات بافت‌شناسی غشاها بعد از پارگی زودرس پرده‌ها، آلودگی مشخص باکتریال در طول سطوح کوریوآمنیونال با درگیری مختصر آمنیون نشان داده شده است و همچنین در زنان PPROM انسیدانس بالای کشت مثبت مایع آمنیون(۲۵-۳۵٪) در نمونه‌های آمنیوستزت حتی در زمانی که هیچ شک بالینی به کوریوآمنیونیت وجود ندارد مشاهده می‌شود(۱،۹).

در هر صورت بطور مسلم، یکی از خطرات عمده در بیماران PPROM بروز عفونت رحمی است که منجر به عوارضی از جمله کوریوآمنیونیت، متیرت پس از زایمان و نیز بروز عوارض پری‌ناتال از جمله سپسیس نوزادی می‌گردد(۱،۷).

از دیگر عوارض PPROM می‌توان به فشار بر روی بند ناف جنین و بدنبال آن بروز دیسترس جنینی(Fetal distress)، بروز پرولاپس بندناف در زمان پارگی پرده‌ها و دکولمان جفت اشاره کرد(۱،۷).

عوارض جنینی و نوزادی مطرح شده بدنبال PPROM شامل نارسی نوزاد، سپسیس نوزادی، سندروم زجر تنفسی نوزاد (RDS: Respiratory Distress Syndrome) و خونریزی داخل

پس از گذشت ۱۲ ساعت از بستری اولیه بیمار، چنانچه وارد فاز فعال زایمان نشده و یا هیچگونه علامتی از خونریزی، انقباض، دیسترس جنینی نداشتند، بعنوان بیماران دوره نهفته در نظر گرفته شده و جهت درمان انتظاری به بخش مامایی منتقل شدند.

جهت بیماران طی ۱۲-۲۴ ساعت اول یک سونوگرافی از نظر تعیین حجم مایع آمنیوتیک با اندازه‌گیری پا که AFI در ۴ کوادران شکمی و تعیین شاخص مایع آمنیوتیک (Amniotic Fluid Index) انجام شد و بیماران بر اساس آن در یکی از دو گروه مطالعه قرار گرفتند.

جهت بیماران با طول مدت بستری بیشتر از ۴۸ ساعت و عدم شروع زایمان، مجددًا سونوگرافی و تعیین AFI انجام شد و در صورت تغییر شاخص مایع آمنیوتیک، گروه مطالعه بیماران بر اساس این سونوگرافی جدید تعیین می‌گردید. (در واقع ملاک محاسبه AFI، در بیماران با بستری بیشتر از ۴۸ ساعت، AFI اندازه‌گیری شده دوم بود).

ضمناً بیماران، در بدو ورود، یک دوره بتامتاژون (۲ دوز بتامتاژون ۱۲ میلی گرم به فاصله ۲۴ ساعت) دریافت نموده و تحت درمان آنتی‌بیوتیکی آمپی‌سیلین و اریترومایسین (ابتدا تزریقی به مدت ۴۸ ساعت و در ادامه خوراکی تا ۷ روز) قرار گرفتند (۱۷). در طی مدت بستری کنترل FHR جنین هر ۲ ساعت انجام شده و NST روزانه یا یک روز در میان جهت جنین‌های با سن حاملگی بیشتر از ۲۸ هفته انجام گردید.

بیماران طی مدت بستری در بخش، از نظر بروز عالیم بالینی کوریوآمنیونیت از جمله تب (با کنترل درجه حرارت در هر ۴ ساعت)، حساسیت رحمی، تاکیکاردی مادر، تاکیکاردی جنین، بروز خونریزی و عالیم آزمایشگاهی (لکوسیتوز- CRP- ESR- CRP- کنترل می‌شدند).

تشخیص کلینیکی کوریوآمنیونیت بر اساس وجود حداقل دو معیار از معیارهای زیر مطرح شد (۱۲-۱۴).

تب قبل از زایمان بیشتر از 38°C و یا $100/4^{\circ}\text{F}$ ، ۲ بار یا بیشتر به فاصله یک ساعت، تاکیکاردی جنین بیشتر از ۱۶۰، حساسیت رحمی، CRP مثبت مادری، ترشحات بدبوی واژن و مایع آمنیوتیک بدبو، تاکیکاردی مادر بیشتر از ۱۲۰ در دقیقه،

می‌باشد. خانم‌های حامله‌ای که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند بر اساس AFI در یکی از دو گروه $\text{AFI} \geq 5$ و $\text{AFI} < 5$ قرار گرفته و پس از انجام زایمان، نتایج مادری و پری‌ناتال در دو گروه بررسی و مقایسه شد.

۱۳۷ خانم حامله با پارگی پیش از موعد و قبل از ترم کیسه آب مورد بررسی قرار گرفتند که ۷۷ مورد در گروه $\text{AFI} < 5$ و ۶۰ مورد در گروه $\text{AFI} \geq 5$ بودند.

معیارهای ورود به مطالعه :

۱- سن حاملگی بین ۲۶-۳۴ هفته حاملگی: تعیین سن حاملگی بر اساس تاریخ آخرین قاعدگی (LMP: Last Menstrual Period) در صورت وجود قاعدگی منظم و یا سونوگرافی زیر بیست هفته انجام شد و اگر نتایج دو روش بیشتر از هفت روز با هم اختلاف داشتند نتایج سونوگرافی پذیرفته شد. در بیمارانی که سونوگرافی همراه نداشتند، بر اساس سونوگرافی جدید و تطبیق ارتفاع رحم و تاریخ آخرین قاعدگی، سن حاملگی تعیین گردید.

۲- نرمال بودن جنین در سونوگرافی‌های قبلی

۳- وجود پارگی تأیید شده غشاها: تشخیص با یکی از روشهای مشاهده خروج مایع آمنیوتیک از واژن در معاینه با اسپکولوم و یا تست فرن یا تست نیترازین تأیید شده است.

معیارهای خروج از مطالعه شامل: افرادی که حاملگی چند قلوبی، بیماری زمینه‌ای مادر (دیابت- پرهاکلامپسی)، وجود عالیم کوریوآمنیونیت در بدو ورود، سابقه سزارین قبلی و یا جراحی قبلی بر روی رحم، وجود پرزاتاسیون غیرسفالیک، تاخیر رشد داخلی رحمی (IUGR: Intra Uterine Growth Retardation) جنین، وجود جنین با IUGR، وقوع زایمان خودبخودی طی ۱۲ ساعت از پارگی پرده‌ها بودند.

پس از انتخاب بیماران بر اساس معیارهای فوق، بیماران ابتدا در زایشگاه بستری شده و بمدت ۱۲ ساعت از نظر بروز انقباض، خونریزی و یا شروع احتمالی زایمان و نیز با انجام مانیتورینگ قلب جنینی از نظر بروز دیسترس جنینی تحت نظر قرار گرفتند. در طی مدت بستری بیماران در زایشگاه، معاینه واژینال انجام نشد و در صورت شک به پیشرفت دیلاتاسیون و افاسمان، با اسپکولوم استریل معاینه صورت پذیرفت.

می‌باشد. تشخیص سندروم زجر تنفسی نوزاد، در صورت وجود علائم نوزادی و یک کلیشه رادیوگرافی تأیید کننده بیماری غشای هیالن (HMD: Hyaline Member Disease) و یا نارسایی تنفسی در نوزاد نیازمند حمایت تنفسی برای حداقل ۲۴ ساعت، تأیید می‌گردد. همچنین تشخیص سپسیس نوزادی با یافته‌های کلینیکی مطرح کننده عفونت و یک کشت خون و یا نمونه مایع مغزی نخاعی مثبت انجام می‌شود (۱۵، ۱۶).

در این پژوهش برای توصیف متغیرهای مورد بررسی در دو گروه، از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی نسبی و مطلق، میانه، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداًکثر استفاده گردید. پس از کنترل نرمال بودن توزیع جامعه آماری، برای مقایسه دو گروه از نظر متغیرهای کیفی از آزمون کای اسکوئر (Chi-Square) استفاده و برای مقایسه دو گروه از نظر متغیرهای کمی از آزمون آماری تی (T-Test) استفاده شد که در آزمونهای انجام شده، ضریب اطمینان ۹۵٪ ($\alpha=0.05$) مدنظر بوده است.

لذا هنگامیکه مقدار P محاسبه شده از <0.05 کمتر بود، فرض صفر آماری رد شده و فرض جایگزین پذیرفته شده است، یعنی ارتباط یا تفاوت معنی دار در دو گروه از نظر متغیر مورد بررسی تأیید شده است. در مورد متغیرهایی که از نظر آماری توزیع نرمال نداشتند، به تناسب از آزمون من ویتنی یا کروسکال والیس استفاده شده است.

نتایج

در طی دوره دو ساله مطالعه، ۱۳۷ مورد زن حامله با PPROM و حاملگی ۲۶ تا ۳۴ هفتة که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. مراجعین براساس شاخص AFI در دو گروه $5 \leq AFI \leq 5$ (۶۰ نفر) و $AFI < 5$ (۷۷ نفر) تقسیم شدند. بین پاریتی در دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (جدول ۱). براساس اطلاعات جدول ۲ و آزمون تی استودنت اختلاف معنی داری بین سن مادر، سن حاملگی در زمان زایمان، سن حاملگی در زمان بستری و میانگین وزن تولد نوزاد در دو گروه وجود نداشت. براساس آزمون کی دو، بین فاز نهفته علمی در دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت ($p=0.246$) در حالیکه

لکوستیوز مادری ($WBC > 20,000$). در این صورت جهت همه بیماران با تشخیص کوریوآمنیونیت بالینی، آنتی بیوتیک تزریقی وریدی شروع شده و در صورت عدم شروع زایمان، با انجام اینداکشن حاملگی پایان داده می‌شد.

اندیکاسیونهای زایمان شامل دیلاتاسیون سرویکس به اندازه ۴cm و افاسمان ۸٪ (شروع خودبخودی فاز فعال زایمان)، کوریوآمنیونیت کلینیکی، سن حاملگی بیشتر از ۳۴ هفتة، خونریزی و دیسترس جنینی بوده است.

سازارین فقط بر اساس اندیکاسیونهای مامایی انجام می‌شد. یکی از متغیرهای مورد بررسی و مقایسه در دو گروه، فاصله زمانی از پارگی کیسه آب تا زایمان می‌باشد که با توجه به مراجعه برخی بیماران با فاصله چند روز از آبریزش به بیمارستان به دو صورت نهفته علمی و نهفته کاربردی تعریف و ارزیابی گردید. منظور از نهفته علمی، فاصله میان گزارش آبریزش توسط بیمار تا زایمان بوده و نهفته کاربردی، فاصله زمانی میان تأیید آبریزش توسط پزشک در بیمارستان از زمان بستری بیمار تا زایمان در نظر گرفته شد.

مشخصات مادر در طی دوره نهفته شامل موارد زیر جهت مقایسه بین دو گروه بشرح زیر جمع آوری شد:

طول دوره نهفته، بروز علایم بالینی کوریوآمنیونیت، نحوه زایمان، بروز دکولمان جفت، بروز مکونیوم در AF، بروز پرولاپس بند ناف، بروز دیسترس جنین.

سپس نوزاد متولد شده با هر سن حاملگی و با هر آپگار به بخش مراقبتها ویژه نوزادان جهت بررسی منتقل گردید و از نوزادان کشت خون و در صورت لزوم مایع مغزی نخاعی گرفته شد و چنانچه نیاز به بستری در NICU وجود داشت، بستری شده و در غیر اینصورت نوزادان به بخش in Roming منتقل شدند ولی از نظر بروز علایم سندروم زجر تنفسی نوزاد و یا سپسیس احتمالی تحت نظر بودند.

موربیدیتی جنینی - نوزادی مورد ارزیابی در این مطالعه شامل مرگ داخل رحمی، مرگ نوزاد قبل از ترخیص از بیمارستان، بروز سندروم زجر تنفسی نوزاد، بروز سپسیس نوزادی تأیید شده با کشت مثبت خون و یا مایع مغزی نخاعی در ۷۲ ساعت اول تولد

در NICU و شاخص AFI مشاهده نشد ($p=0.292$) (جدول ۴). در میان پیامدهای نوزادی، آپگار دقیقه اول و دقیقه پنجم کمتر از ۷ و همچنین مرگ نوزاد در هفته اول در دو گروه از نظر آماری متفاوت بود (جدول ۵).

بین فاز نهفته کاربردی در دو گروه اختلاف معنی‌داری مشاهده شد ($p=0.049$). در میان عوارض مادری تنها سزارین به علت زجر جنین در دو گروه متفاوت بود ($p=0.008$) (جدول ۳). برپایه آزمون کی دو، رابطه معنی‌داری بین میزان بستری نوزاد

جدول ۱: میزان فراوانی پارگی کیسه آب بر حسب تعداد حاملگی

PValue	کل		AFI>5		AFI<5		نولی پار	پاریته
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
0.490	0.57	78	0.41	32	0.59	46	نولی پار	مولتی پار
	0.43	59	0.47	28	0.53	31		
	1.00	137	0.44	60	0.56	77	کل	

جدول ۲: اطلاعات دموگرافیک نمونه‌های مورد نظر

PValue	AFI>5	AFI<5	
0.428	۳۱/۷۸±۲/۲۲	۳۱/۵۵±۲/۲۵	سن حاملگی در زمان بستری (هفت)
0.086	۳۲/۹۷±۲/۰۶	۳۲/۱۳±۲/۰۳	سن حاملگی در زمان زایمان (هفت)
0.253	۱۸۹۰/۱۰±۳۵۷/۰۴	۱۸۱۲/۶۰±۴۳۲/۶۳	میانگین وزن تولد نوزادان (گرم)
0.956	۲۵/۹۰±۵/۶۲	۲۵/۸۴±۶/۱۲	سن مادر (سال)

جدول ۳: بررسی و مقایسه عوارض مادری پارگی زودرس کیسه آب در دو گروه

PValue	کل		AFI>5		AFI<5		فاز نهفته علمی
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
0.246	0.17	53	0.42	22	0.58	31	کمتر از ۴۸ ساعت
	0.12	36	0.39	14	0.61	22	فاز نهفته علمی نهفته تا یک هفته
	0.05	17	0.35	6	0.65	11	یک تا دو هفته
	0.10	30	0.60	18	0.40	12	بیش از دو هفته
0.049	0.17	52	0.37	19	0.63	33	کمتر از ۴۸ ساعت
	0.14	44	0.39	17	0.61	27	فاز نهفته کاربردی نهفته تا یک هفته
	0.07	22	0.50	11	0.50	11	یک تا دو هفته
	0.06	18	0.72	13	0.28	5	بیش از دو هفته
0.467	0.02	7	0.29	2	0.71	5	تشخیص بالینی کوریوآمنیونیت
0.729	0.03	8	0.50	4	0.50	4	میزان بروز دکلمان جفت
0.008	0.08	25	0.20	5	0.80	20	میزان سزارین به علت زجر جنین
	1.00	312	0.42	131	0.58	181	کل

جدول ۴: میزان بستری نوزاد در NICU

PValue	کل		AFI>5		AFI<5		میزان بستری نوزاد در NICU
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
0.292	0.23	۳۱	0.55	۱۷	0.45	۱۴	عدم بستری
	0.45	۶۱	0.38	۲۳	0.62	۳۸	کمتر از یک هفته
	0.33	۴۵	0.44	۲۰	0.56	۲۵	بیش از یک هفته
	100	۱۳۷	0.44	۶۰	0.56	۷۷	کل

جدول ۵: بررسی و مقایسه پیامد نوزادی در دو گروه

PValue	کل		AFI>5		AFI<5		آپکار دقیقه اول کمتر از ۷ آپکار دقیقه پنجم کمتر از ۷ بروز سیندروم زجر تنفسی نوزاد بروز سپسیس زودرس نوزادی مرگ نوزاد در هفته اول تولد کل
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
0.1005	0.43	۴۵	0.27	۱۲	0.73	۳۳	
0.055	0.20	۲۱	0.29	۶	0.71	۱۵	
0.323	0.17	۱۸	0.33	۶	0.67	۱۲	بروز سیندروم زجر تنفسی نوزاد
0.298	0.09	۹	0.22	۲	0.78	۷	بروز سپسیس زودرس نوزادی
0.045	0.11	۱۲	0.17	۲	0.83	۱۰	مرگ نوزاد در هفته اول تولد
	100	105	0.27	۲۸	0.73	۷۷	کل

بحث و نتیجه گیری

با بروز PPRM دور از زایمان ترم، خطرات مشخص موربیدیتی و مرگ و میر برای مادر و جنین وجود دارد و این مساله نقش پزشکان را در مراقبت از زن حامله و توجه به کلیه علائم خطر و تصمیم گیری جهت ختم به موقع حاملگی و یا ادامه حاملگی پررنگ تر ساخته است (۲).

در حال حاضر در حاملگی زیر ۳۴ هفته، درمان انتظاری همراه با آنتی بیوتیک و کورتون انجام می شود با توجه به خاصیت میکروب کشی مایع آمنیو تیک و نقش حفاظتی آن در مقابل عفونت، چنین به نظر می رسد که کاهش میزان آن پس از بروز پارگی پرده های جنینی توانائی فرد را در مقابل عفونت تحت تأثیر قرار داده، سبب افزایش ریسک عفونت گردد. این فرضیه اولین بار توسط Vintzileos و همکاران در سال ۱۹۸۵ ارزیابی گردید، آنها طی مطالعه ای، همراهی بین اولیگو هیدر آمنیوس ($AFI < 5$) و افزایش عفونت و مورتالیتی پره ناتال را گزارش کردند (۱۰). در مطالعه حاضر، میزان بروز کوریو آمنیونیت در کل بیماران ۵٪ بود و اگر چه از بین ۷ بیمار مبتلا به کوریو آمنیونیت بالینی،

۷۰٪ آنها $AFI < 5$ داشتند اما مقایسه آماری بین دو گروه معنی دار نبود.

این یافته، با مطالعه Mercer و همکاران و همچنین Simhan و همکاران، که هیچ ارتباطی را بین بروز کوریو آمنیونیت و اولیگو هیدر آمنیوس گزارش نکرد، همخوانی داشت (۱۲، ۱۴).

Poniedziatek-Czajkowska Piazze و همکاران و همچنین Simhan در فرانسه هم علی رغم بروز ۶۶ درصدی کوریو آمنیونیت در $AFI < 5$ ، باز هم ارتباط معنی دار آماری بین دو گروه نیافت. البته در این مطالعه بین درجه حرارت مادری بالاتر و WBC بالاتر مادری و اولیگو هیدر آمنیوس با $Pv < 0.001$ ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد (۱۴، ۱۷).

مطالعه Vermillion نیز عدم وجود ارتباط را نشان داد (۱۹). اما یافته های مطالعه حاضر با مطالعه Borna و همکاران Deering و همکاران مغایر بود، در آن مطالعات ارتباط معنی داری بین $AFI < 5$ و میزان بروز بیشتر کوریو آمنیونیت یافت شده بود (۲۰، ۲۱).

شده، اما در مطالعه Borna و همکاران در تهران نیز، طول دوره نهفتگی در دو گروه برابر ذکر شده است (۲۰).

در مطالعه Vermillion و همکاران در آمریکا و Mercer و همکاران در آمریکا و Piazze و همکاران در فرانسه، ارتباطی معنی دار بین اولیگوهیدرآمنیوس و دوره نهفتگی گزارش شده است (۱۸، ۱۹).

از دیگر موارد مورد بررسی، میزان سزارین است. در این مطالعه از بین ۱۳۷ بیمار، ۴۴ نفر (۳۲٪) نیاز به سزارین پیدا کردند که بیشترین علت سزارین در گروه AFI پائین، دیسترس جنینی و در گروه AFI بالاتر، عدم پاسخ به اینداکشن بود. ارتباط سزارین بعلت دیسترس جنینی و AFI پائین بطور معناداری مشخص بود (P=۰.۰۰۸) و سایر علل سزارین بین دو گروه تفاوت آماری قابل توجهی نداشت.

این یافته با یافته های مطالعات Borna و همکاران در سال ۲۰۰۴ و نیز Vermillion و همکاران در سال ۲۰۰۰ همخوانی داشت (۱۹، ۲۰).

در مطالعه Osmanagaoglu و همکاران میزان سزارین برای کل جمعیت PROM (۲۱٪) و اندیکاسیون کلی سزارین بعلت دیسترس جنینی (۲۲٪) گزارش شده در حالیکه در این مطالعه میزان کلی سزارین (۳۲٪) و سزارین بعلت دیسترس جنینی (۲۵٪) می باشد (۱۳).

در این مطالعه همچنین روش ختم بارداری در دو گروه از نظر زایمان واژینال و یا نیاز به سزارین مورد بررسی قرار گرفت که بین روش زایمان در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین شروع خودبخود انقباضات زایمانی و یا انجام ختم زایمان به دلایل مختلف توسط پزشک در دو گروه تفاوت آماری یافت نشد. بروز دکلمان نیز در دو گروه برابر بود.

در مقایسه پیامدهای نوزادی و جنینی بین ۱۳۷ بیمار مورد مطالعه در بخش، مرگ جنین در هیچ گروهی مشاهده نشد در حالیکه در منابع علمی، مرگ یک درصدی جنینی با PPROM گزارش شده است که علت احتمالی آن تعداد محدود بیماران و نیز سن حاملگی بالاتر در این مطالعه می باشد.

همچنین در سال ۲۰۰۱ Park و همکارانش نیز بین حجم کم مایع آمنیوتیک و کشت مثبت AF در آمنیوستتر ارتباط قوی را گزارش نمودند (۱۱).

نکته قابل توجه دیگر، میزان بروز کوریوآمنیونیت در این مطالعه می باشد، میزان کوریوآمنیونیت در PPROM در برخی مقالات منتشر شده ۱۳ تا ۴۰ درصد گزارش شده و در مطالعه Osmanaghulu و همکاران نیز ۱۲/۲ درصد بوده، در حالیکه در این مطالعه حدود ۵ درصد بوده است (۲۲، ۲۳). این مسئله احتمالاً بعلت استفاده دقیق از پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی بیماران و نیز توجه به عدم معاینه انگشتی بیماران می باشد. در اکثر مطالعات قبلی، اولیگوهیدرآمنیوس بدنال PPROM با فاز نهفته کوتاه تر همراه بوده است.

یکی از محدودیت های این مطالعه، بررسی زمان دقیق پارگی کیسه آب بود. در ابتدای مطالعه، تعریف ما از نهفتگی، فاصله زمانی میان پارگی کیسه آب تا شروع زایمان بود که این تعریف در صورت مراجعه بیماران در همان ساعت اولیه شروع آبریزش، غالباً با تعداد روزهای بسترهای مادر قبل از زایمان برابر می شد. اما برخی از بیماران با PPROM در زمان مراجعه شروع آبریزش را از چند روز قبل ذکر می کردند. برای رفع این اشکال، دو عدد محاسبه گردید، یکی شروع آبریزش بیمار که فاصله آن تا زایمان، بعنوان نهفتگی علمی در نظر گرفته شد و دیگری تعداد روزهای بسترهای بیمار در بیمارستان قبل از زایمان، یعنی فاصله زمانی میان تائید آبریزش توسط پزشک در بیمارستان تا هنگام زایمان، که این فاصله نهفتگی کاربردی نامیده شد.

پس از انجام محاسبات آماری، نهفتگی علمی در دو گروه تفاوت معنی دار نداشت اما عدد دوم یعنی کاربردی بین دو گروه بطور معنی داری متفاوت بود، بطوريکه در حاملگی با $AFI \geq 5$ ، ۴۳٪ طی ۴۸ ساعت زایمان کردند و تنها ۶/۶٪ حاملگی آنها بیشتر از دو هفته ادامه یافت، اما در گروه با $AFI \leq 5$ ، ۳۱/۷٪ طی ۴۸ ساعت اول زایمان نموده و ۲۱/۷٪ حاملگی بیشتر از دو هفته بطول انجامید.

در رابطه با محدودیت فوق، در مطالعات دیگر نکته ای ذکر

سپسیس، AFI <5 داشتند اما باز هم تفاوت آماری بین دو گروه بعلت تعداد کم موارد معنی‌دار نشد.

یافته حاضر با مطالعه Borna و همکاران همخوانی داشت، ولی آمار بروز سپسیس در مطالعه حاضر به مراتب کمتر از مطالعه Borna و همکاران بود (۲۷/۹٪ در ۵ AFI \geq و ۳۰/۴٪ در ۵ AFI) (۲۰). در مطالعه Mercer و همکاران نیز همراهی پایدار بین AFI کم و موربیدیتی عفونی نوزاد یافت نشد (۱۲).

اما در مطالعه Vermillion و همکاران ذکر شده که AFI <5 تنها ریسک فاکتور مشخص مستقل همراه با سپسیس زودرس نوزادی با P=۰/۰۰۴ می‌باشد (۱۹). در مطالعه Vintzileos و همکاران نیز وجود ارتباط بین اولیگوهیدرآمنیوس و افزایش عفونت و مورتالیتی پری ناتال گزارش شده است (۱۰).

از مسائل دیگر مورد مطالعه، میانگین مدت بستری نوزادان در NICU بود که بین دو گروه تفاوت نداشت.

کاهش بروز سپسیس در مطالعه حاضر شاید بعلت ارزیابی دقیق تر و تهاجمی تر بیماران PPROM و مشاهده به موقع نشانه‌های احتمالی کلینیکی سپسیس و درمان سریع هرگونه یافته آزمایشگاهی و کلینیکی باشد. از دلایل دیگر کاهش میزان بروز سپسیس نوزادی و سندروم زجر تنفسی نوزاد و میانگین کوتاه بستری نوزادان در NICU و عدم تفاوت آماری معنی‌دار بین دو گروه مورد مطالعه می‌توان به بالابودن میانگین سنی نوزادان (۳۲/۱ هفته) و میانگین وزن تولد نوزادان (حدود ۱۸۴۰ گرم) اشاره کرد که سبب پیامدهای بهتر نوزادی می‌گردد.

مرگ نوزاد طی یک هفته اول در دو گروه مورد مقایسه از نظر آماری معنی‌دار بود.

در خصوص مرگ نوزاد و همچنین میانگین بستری در NICU در مطالعات مشابه، مطلبی ذکر نشده است و هیچ مقایسه‌ای مقدور نمی‌باشد.

با توجه به اینکه پارگی خودبه خودی و قبل از موعد کیسه آب یکی از مهمترین علل ناخوشی و مرگ و میر نوزادان هنگام تولد است و سبب افزایش عوارض مادری و جنینی حاملگی وی می‌گردد. لذا مادران باردار با مراجعته به مراکز بهداشتی و درمانی و کنترل دقیق مراقبتهای دوران بارداری می‌توانند از عوارضی

در میانگین وزن نوزادان متولد شده بین دو گروه تفاوتی معنی‌دار مشاهده نگردد.

آپگار دقیقه اول نوزاد بعنوان نشانی از وضعیت سلامت اندازه‌گیری شد که آپگار دقیقه اول کمتر از ۷ در گروه AFI <5 بطور معنی‌داری بیشتر بود و آپگار دقیقه پنجم نوزادان در دو گروه، علی‌رغم بیشتر بودن آپگاراسکور کمتر از ۷ در گروه AFI در سطح خطای ۰/۰۵٪ معنی‌دار نشد.

در مطالعه Piazze و همکاران نیز AFI <5 مشخصاً با آپگاراسکور دقیقه پنجم کمتر از ۷ بیشتری همراه بود (P<۰/۰۱) و هیچ رابطه مشخص دیگر بین اسکور AFI و سایر متغیرها یافت نشد (۱۸).

در بررسی بروز سیندروم زجر تنفسی نوزاد (RDS)، بروز ۱۳ درصدی RDS در نوزادان (۱۸ نوزاد) مشاهده شد و بر اساس آزمون کای دو، تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار نبود. در حالیکه در مطالعه Vermillion و همکاران ذکر شده که RDS همراه با یک کاهش مشخص در میزان بروز PPROM است (۱۹).

در مطالعه Sims و همکاران، تعداد دیسترس تنفسی در نوزادان با PPROM مادر، ۱۷٪ گزارش شد (۲۲). یافته‌های مطالعه حاضر با مطالعه Borna و همکاران در سال ۲۰۰۴ نیز همخوانی داشت (۲۰).

در مطالعه Piazze و همکاران نیز ذکر شده که AFI <5 در ۷۰٪ نوزادان با RDS در زمان تولد مشاهده شده که این آمار در مطالعه حاضر نیز در حد ۶/۶۶٪ مشاهده گردید (۱۸).

یافته‌های مطالعه حاضر با یافته‌های مطالعه Mercer و همکاران در آمریکا همخوانی نداشت. در آن مطالعه AFI <5 با یک ریسک مشخص بالاتر RDS با P=۰/۰۳ (P) همراه بود. اما با عوارض عفونی نوزاد همراهی نداشت. البته در مطالعه Mercer و همکاران ذکر شده که بعد از کنترل برای سایر فاکتورها، افزایش AFI همراه با کاهش موربیدیتی همراه و RDS بوده است (۱۲). در بررسی سپسیس نوزادی، بروز کلی سپسیس زودرس نوزادی در این مطالعه ۴/۷٪ بوده (بروز ۹/۳٪ در گروه AFI <5 و ۳/۳٪ در گروه AFI ≥ 5)، که علی‌رغم اینکه ۷۷٪ از بیماران با

دانشگاه علوم پزشکی مشهد که با تصویب طرح این مطالعه را از لحاظ مالی حمایت کردند تشکر می‌گردد. همچنین از همکاری سرکار خانم دکتر جهانیان و جناب آقای دکتر فرهت در ویژیت بموضع یماران و سرکار خانم محمدپرست در جمع آوری اطلاعات قدردانی می‌گردد.

همچون افزایش تعداد سزارین و افزایش مرگ و میر نوزادان در هفته اول بعد از تولد بدنیال پارگی زودرس کیسه آب خودداری کنند.

سپاسگزاری

در پایان از حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی

منابع:

- 1- Mercer BM. *Premature rupture of the membrane*. In: Petraglia F, Strauss GF, editors. *Complicated Pregnancy*. 4th ed. London: Informa health care; 2007:713-27.
- 2- Weissmann-Brenner A, O'Reilly-Green C, Ferber A, Divon MY. *Values of amniotic fluid index in cases of preterm premature rupture of membranes*. J Perinat Med 2009; 37(3):232-5
- 3- Blott M, Greenough A. *Neonatal outcome after prolonged rupture of the membranes starting in the second trimester*. Arch Dis Child 1988; 63(10 spec no): 1146-50.
- 4- Pasquier JC, Picaud JC, Rabilloud M, Claris O, Ecochard R, Moret S, et al. *Neonatal outcomes after elective delivery management of preterm premature rupture of the membranes before 34 weeks' gestation*. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 143(1): 18-23.
- 5- Keyon SL, Taylor DJ, Tarnow- mordi W; ORACLE Collaborative Group. *Broad spectrum antibiotics for preterm prelabour rupture of fetal membranes- the oracle I randomized trial*. Lancet 2001; 357(9261): 979-88.
- 6- Gopalani S, Krohn M, Meyn L, Hitti J, Crombleholme WR. *Contemporary management of preterm premature rupture of membranes: determinants of latency and neonatal outcome*. Am J perinatol 2004; 21(4): 183-90.
- 7- Yoon BH, Kim Ya, Romero R, Kim JC, Park KH, Kim MH, et al. *Association of oligohydramnios in women with preterm premature Rupture of membranes with an inflammatory response in fetal, amniotic, and maternal compartments*. Am J obstet Gynecol 1999; 181(4):784-8.
- 8- Lajos GJ, Passini Junior R, Nomura ML, Amaral E, Pereira BG, Milanez H, et al. *Cervical bacterial colonization in women with preterm labor or premature rupture of membranes*. Rev Bras Ginecol Obstet 2008; 30(8): 393-9.
- 9- Cunningham FG, Leveno KJ , Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap L, Wenstrom KD. *Williams obstetrics* . 22th ed. New york: MC Graw Mill; 2005:232-47.
- 10- Vintzileos AM, Campbell WA, Nochimson DJ, Weinbaum PJ. *Degree of oligohydramnios and pregnancy outcome in patients with PROM*. Obstet Gynecol 1985;66(2):162-7.
- 11- Park JS, Yoon BH, Romero R, Moon JB, Oh SY, Kim JC, et al. *The relationship between oligohydramnios and the onset of preterm labor in preterm premature rupture of membranes*. AM J obstet Gynecol 2001;

- 184(3):459-62.
- 12-** Mercer BM, Rabello YA, Thurnau GR, Miodovnik M, Goldenberg RL, Das AF, et al. *The NICHD-MFMU antibiotic treatment of preterm PROM study: Impact of initial amniotic fluid volume on pregnancy outcome.* Am J Obstet Gynecol 2006; 194(2):438-45.
- 13-** Osmanagaoglu MA, Unal S, Bozkaya H. *Chorioamnionitis risk and neonatal outcome in preterm premature rupture of membranes.* Arch Gynecol Obstet 2005; 271(1):33-9.
- 14-** Simhan HN, Canavan TP. *Preterm premature rupture of membranes: diagnosis, evaluation and management strategies.* BJOG 2005 Mar; 112 Suppl 1:32-7.
- 15-** Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC. *Fanaroff and Martins neonatal perinatal medicine.* 2006; 1097-1101, 791-800.
- 16-** Behrman RE, Kliegman R, Jenson HB. *Nelson text book of pediatrics. 17 th ed. Sannders* 2004:573-586, 638.
- 17-** Poniedziatek-Czajkowska E, Leszczynska- Gorzelak B, Oleszczuk J. *The relationship between the levels of proinflammatory cytokines, and AFI value in pregnancies complicated by premature rupture of membranes.* Ginekol Pol 2001; 72 (12): 1163-9.
- 18-** Piazze J, Anceschi MM, Cerekja A, Brunelli R, Meloni P, Marzano S, et al. *Validity of amniotic Fluid index in preterm rupture of membranes.* J Perinat Med 2007;35(5):394-8.
- 19-** Vermillion ST, Kooba AM, Soper DE. *Amniotic Fluid index value after preterm PROM and subsequent perinatal infection.* AM J Obstet Gynecol 2000; 183(2): 271-6.
- 20-** Borna S, Borna H, Khazardoost S, Hantoushzadeh S. *Perinatal outcome in preterm premature rupture of membranes with Amniotic fluid index < 5 (AFI<5).* BMC Pregnancy Childbirth 2004 4(1):15.
- 21-** Deering SH, Patel N, Spong CY, Pezzullo JC, Ghidini A. *Fetal growth after preterm premature rupture of membranes: Is it related to amniotic fluid volume?* J Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2007;20(5):397-400.
- 22-** Sims EJ, Vermillion ST, Soper DE. *Preterm premature rupture of the membranes is associated with a reduction in neonatal respiratory distress syndrome.* Am J Obstet Gynecol 2002;187(2):268-72.
- 23-** Mercer BM. *Preterm premature rupture of the membranes.* Obstet Gynecol 2003;101(1):178-93.